

A MORNING SALE.

ARTHUR BROLL

É. DE WILDEMAN et TH. DURAND

PRODROME

DE LA

FLORE BELGE

TOME I

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

PAR

TH. DURAND

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE BELGIQUE
DIRECTEUR DU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

THALLOPHYTES

PAR

É. DE WILDEMAN

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES

CONSERVATEUR AU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE MICROSCOPIE

Ouvrage couronné par la Société royale de Botanique de Belgique (PRIX CRÉPIN 1894-1897)

BRUXELLES ALFRED CASTAIGNE, ÉDITEUR

28, Rue de Berlaimont, 28

1898-1907

DATES DE PUBLICATION

des fascicules du PRODROME DE LA FLORE BELGE

					~		-			-	-	mpowered						
TOME 1																		
Introductio	n fa	asc	. 15,	p.	1 -	- 64	١.										septembre	1907
Énumération	on s	yst	téma	tiq	ue (C	ryp	to	gan	es):								
Fasc	1,	p.	1	à	160												février	1898
"	2,	p.	161	_	320												avril	29
27	3,	p.	321	-	54 3												août	99
TOME II																		
Énumérati	on s	ys	téma	tiq	ue (C	ryp	to	gan	ies	, s	uit	e):						
Fasc	4,	p.	1	à	160									-			octobre	1898
77	5,	p.	161	_	320												janvier	1899
20	6,	p.	321	_	480												mars	27
12	7,	p.	481	-	530								٠,				avril	99
TOME III																		
Énumérati	on s	348	téma	tiq	ue (F	ha	nér	oga	ame	88)								
Additions	et c	ori	recti	ons	(Ph	ané	ro	jan	188	et	Cı	ур	tog	am	es):		
Tables gé	néra	les	:															
Fasc.	8,	p.	1	à	160				,								mars	1900
- 29	9,	p.	161		320											٠.	août	22
"	10,	p.	321	_	480							•					mars	1901
37	11,	p.	481	-	640						ě						septembre	, ,,
29	12,	p.	641	_	800									,	٠		avril	1903
79	13,	p.	801	-	996												décembre	22
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	14,	p.	997	-	1112				1					4			janvier	1906

PRODROME

DE LA

FLORE BELFGE

A MORNING SALE.

ARTHUR BROLL

PRODROME DE LA FLORE BELGE

INTRODUCTION

PAR

TH. DURAND.

De 1550 à 1906, il a paru plus de cinq cents travaux sur la flore belge, c'est cette masse considérable de documents que, M. De Wildeman et moi, nous nous sommes efforcés de résumer dans la *Prodrome de la flore belge*. La tâche était grande, aussi ne nous a-t-il pas toujours été possible d'éviter des erreurs, mais nous espérons que notre œuvre provoquera de nouvelles recherches, en faisant mieux ressortir les points non encore étudiés, ou qui réclament de nouvelles observations.

La Belgique est, croyons-nous, le seul pays d'Europe possédant un tableau complet de sa flore, depuis les Bactéries jusqu'aux Compositacées [8896 espèces]. Les deux premiers volumes du *Prodrome* sont consacrés aux Cryptogames; le troisième aux Phanérogames. Il y a lieu de souligner les progrès considérables, réalisés en ce qui concerne la flore cryptogamique. Avant 1870, on ne connaissait, en Belgique, que 2400 Thallophytes, il y en a aujourd'hui plus de 7000 catalogués. Ce chiffre grandira encore beaucoup, car plusieurs de nos provinces sont à peine étudiées, ainsi que le montre le tableau suivant:

Brabant	4075	Luxembourg	1531
Liége	2616	Anvers	920
Namur	1936	Hainaut	708
Flandre occ.	1641	Limbourg	629
Flandre or.	1510		

Quand l'exploration du pays sera plus avancée, le Brabant passera certainement à l'arrière plan, après Liége, Namur, Luxembourg et peut-être Hainaut.

Toutes les données, relatives à la dispersion des Cryptogames, ont été

rangées par provinces; elles sont encore trop peu nombreuses pour tenter une répartition en zones ou régions botaniques.

Pour les Phanérogames, nous avons adopté les régions botaniques, établies par François Crépin. Les travaux de ce botaniste ont fait faire un pas immense à la connaissance de notre flore nationale, à laquelle son nom restera intimement uni, à côté des noms de Lejeune et de Dumortier.

Nous avons eu l'impression, en écrivant le tome III, que, pour donner une idée plus exacte de la flore belge, il faudrait subdiviser notamment les zones campinienne, calcaire et ardennaise, mais cela ne pourra se faire que plus tard, après de nouvelles recherches.

Cette Introduction est divisée en quatre chapitres.

- I. Tableau statistique de la flore belge.
- II. Marche progressive de la connaissance de la flore belge.
- III. Régions botaniques et listes des espèces largement répandues.
- IV. Énumération complète des travaux publiés sur la flore belge, avec répertoire.

CHAPITRE I.

TABLEAU STATISTIQUE DE LA FLORE BELGE. (1)

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	douteuses
	į		=	Fla	Fla		i,		2	lyh), i	Esn
Thallophyta	-		11/4			100			31		
Mycetozoa	1		-1			1				I EF Y	119
Myxomycetes	69	2	* 59	16	23		2	- 1	6	14	1
Algae	1228	393	420	479	209	159	414	321	228	139	1
Mycetes	5709	253	3251	990	1669	278	1685	137	813	1328	70
Bryophyta	582	244	305	130	176	238	476	135	441	419	
Pteridophyta	49	28	39	26	33	33	39	35	43	36	
71-1-1 A-1 11	7638	920	4075	1641	1510	708	2616	629	1531	1936	71

	Belgique	Rég. jurassique	Rég. ardennaise	Zone calcaire	Zone argilo- sablonneuse	Zone campinienne	Zone poldérienne	Zone maritime
Gymnospermae					000			1
Coniferae	2	1	1	2	1	1	1	
Angiospermae						1 11 11	1111	
Monocotyledones	329	214	201	271	235	245	152	151
Dicotyledones	927	646	647	842	660	645	505	425
	1258	861	849	1115	896	891	658	576

⁽¹⁾ Les espèces indigènes sont seules comprises dans ce tableau.

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
THALLOPHYTA						7					
Mycetozoa			- 1					9			
Monadineae	1	5 1		h -					-		
Monadineae azoospo- raceae											
Vampyrellaceae	1		1	4 0 No			11-	1	4 = 411	1	
Myxomycetes										1	
Plasmodiophorineae											
Plasmodiophoraceae	2	-1"	2	1	1		1			-	
Myxogastrineae								4		. 1	
Physaraceae Didymiaceae Spumariaceae Stemonitaceae Stemonitaceae Amaurochaetaceae Brefeldiaceae Liceaceae Clathroptychiaceae Cribrariaceae Reticulariaceae Perichaenaceae Arcyriaceae Trichiaceae Acrasiineae: Dictyosteliaceae Algae Schizophyta	18 13 2 7 1 1 1 2 2 2 1 6 9	1	15 11 2 5 1 1 1 2 2 1 1 6 8	4 2 2 2 2 1 1 1 2	6 4 1 3 3 1 1 1 3 2 2		1	1	2 1	1 1 3 1 1 1 3 3	1
Schizophyceae Chroococcaceae Chamaesiphoniaceae Oscillariaceae Nostocaceae Scytonemaceae Sirosiphonaceae Rivulariaceae	9 1 34 23 5 5 9	3 4 2 2 2	4 12 8 2 2	1 14 6 2 7	2 12 2	2 1 1	2 8 6 3 1 1	3 1 1 2 3 3 3	1 1	2 2 1 1	
Schizomycetes Coccaceae	25	6	13	5	5	6	5	6	5	13	
Bacteriaceae	49					20	21		20	28	

					,						
	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Spirillaceae Chlamydobacteriaceae Achromatiaceae Beggiatoaceae Rhodobacteriaceae	4 5 1 5 8		1	1 5 1 4 8		_	1 1	1 2 1 1	1 -	2 2	
Flagellata											
Pantostomatineae											
Rhizomastigaceae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Protomastigineae											
Oicomonadaceae Craspedomonadaceae Monadaceae Bodonaceae Amphimonadaceae Tetramitaceae	1 3 6 5 2 2	1	3 2 1 1	1 1 3 4 2 2	1	1	2 3 1	2 1 2 1	1	1	
Disto m atineae											
Distomataceae	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
$Chrysomonadineae. \ \ $											
Chromulinaceae Hymenomonadaceae Ochromonadaceae	6 3	1	4 2 1	3 2	1	1	2 1 1	3 2 1	1	1	
Cryptomonadineae.				İ							
Cryptomonadaceae	7	4	4	4	4	4	7	6	4	4	
$Chloromonadine ae. \ \ $									ŀ		
Chloromonadaceae	1		1			1	1				
Euglenineae.											
Euglenaceae Astasiaceae Peranemaceae	28 4 9	13 1 2	17 2 4	23 1 .8	13 1 2	13 1 2	17 3 5	26 2 2	13 1 2	15 3 3	
Peridinineae.											
Gymnodiniaceae Prorocentraceae Peridiniaceae	4 1 7	3	3	3	3	2	1	2	1	1 8	

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
	m		8	Flan	Fland	I		F	Lux	_	Esp.
Noctilucineae.											
Noctilucaceae	1				1						
Algae (sens. str.)											
Zygophyceae.											
Diatomine ae.											
Diatomaceae	439	197	113	197	6	22	128	4	43	6	
Conjugat i neae.											
Desmidiaceae	181	65	40	4	25	30	102	132	77	9	
Zygnemaceae Mesocarpaceae	33	19	23	10	32 2	6	17 5	9	14	8	
	9	2	9	2	z	4	Э	2	5	1	
Chlorophyceae.											
Volvocineae.											
Polytomaceae Chlamydomonadaceae.	1 5		1 4	3			1	n	1		
Volvocaceae	6	1	6	Э		2	1 2	2 3	1		
Protococcineae.											
Protococcaceae	56	13	41	3	20	12	281	29	14	8	
Confervineae.											
Ulvaceae	9	2	1	8	4						
Ulotrichiaceae Chaetophoraceae	13	1 4	4	2 4	2 10	$\frac{1}{2}$	3 7.	1 8	2 5	2 4	
Chroolepidaceae	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	
Cylindrocapsaceae	2		2		1						
Oedogoniaceae	20	6	8		8	1	3	11	3		
Coleochaetaceae Cladophoraceae	5 16	2	3	14	2	1 1	2	4	2	1	
	10		J	14	3	Ţ	1	1		1	
Siphonineae.											
Botrydiaceae Bryopsidaceae	1		1	1	1	1	1	1	1		
Vaucheriaceae	1 7	2	6	$\frac{1}{3}$	5	5	4		1	2	
Charaphyceae.										~	
Characeae	16	7	10	3	10	6	2	11	3	2	
Phaeophyceae.											
Ectocarpaceae	7			7							

	0			cid.	ent.			- Di	urg		nses
	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Sphacelariaceae Laminariaceae Fucaceae Arthrocladiaceae Chordariaceae Sporochnaceae	15 4 12 1 2 1			15 4 12 1 2							
Dictyoteae.											
Dictyotaceae	4			4							
Rhodophyceae.											Ì
Bangieae.											
Bangiaceae	2		1	1			1			1	
Florideae.								,			
Lemaneaceae Batrachospermaceae Wrangeliaceae Ceramiaceae Cryptonemiaceae Gigartinaceae Rhodymeniaceae Delesseriaceae Sphaerococcaceae Solieriaceae Spongiocarpaceae Lomentariaceae Rhodomeleaceae Corallinaceae	4 8 1 15 2 7 7 3 1 1 1 1 2 2	1	3	1 15 2 7 7 3 1 1 1 2 14 6	1	2	2 3	1	1	3 3	
Mycetes.											
Phycomycetes.		1							1		
Oomycetineas.											
Peronosporaceae Saprolegniaceae Entomophthoraceae	42 8 3	5	31 8 3	5	7	4	11	1	20	14	,
Zygomycetineae.		1									
Mucoraceae	35	4	22	1	12	2	1	1	14	. 3	2
Chytridineae.											
Olpidiaceae Synchytriaceae	17 9	1	9 5			4	3 5	2	2 3	1 2	

				id.	it.		1		0		l se
	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Mycochytridinias.											
Ancylistaceae Sporochytriaceae Hyphochytriaceae	8 24 4]	21 4			2	3 5	1]	1	
Ascomycetes.											
${\it Exoascineae}.$											
Exoascaceae	15	2	14	1	2	1			4	6	1
Erysiphacineae.											
Erysiphaceae Perisporiaceae	36 28	2		16 4	14 5	4	8 7	6	14	19 4	2
. Tuberineae.											
Onygenaceae Elaphomycetaceae Cenococcaceae Tuberaceae Endogonaceae	3 2 1 6 3		1 2 1 5 3	2 1 1	1	1	1		1		1
Pyrenomycetineae.											
Sphaeriaceae Hypochreaceae Dothideaceae Microthyriaceae Lophiostomaceae Hysteriaceae	1039 94 31 11 53 56	23 6	461 57 16 1 18 38	130 11 5 2 4 9	69 10 5 1 10	36	494 31 8 5 29 16	36	106 11 3 2	192 15 11 3 11 21	26 7
Pyrenolichenes	62	1	9	6	14	4	8	,	14	39	1
Discomycetineae.											
Helvellaceae Pezizaceae Ascobolaceae Dermateaceae Bulgariaceae Stictaceae Phacidiaceae Patellariaceae Caliciaceae Arthoniaceae Leptoascineae.	30 401 58 31 32 32 45 30 13 10	4 1 2 3 2	16 183 27 15 15 13 22 14 7 5	4 35 8 3 5 14 10 3 2	10 34 10 6 5 1 10 2 6 5	7 8 1 1 1 2	15 208 38 9 13 15 18 10 2	3 2 1	4 30 16 2 4 10 5 1	3 40 5 9 8 6 16 5 4 5	2 2 3 4
Saccharomycetaceae	5	4	4	4	4	4	4	1	4	4	1

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Protomycetaceae Discolichenes	391		2 163	1	132	106	69	20		1 1 278	
Hemibasidiomycetes.											
Ustilagineae.					!						
Ustilaginaceae	53	4	27	14	7	4	7	8	19	15	
Basidiomycetes.					1						
Protobasidiomyceti- neae.											
Uredaceae	190	22	134	69	71	11	34	5	44	117	3
Tremellinaceae	24		19	9	6	1			2	7	
${\it Gastromycetineae}.$											
Lycoperdaceae	20	1	16	8	13		2		4	6	
Nidulariaceae	8	1	6	4	4	1	1		2		
Hymenogastraceae	9	2	F	1	1				3		
Phallaceae	3	1	3	1	1				1	1	
Hymenomycetineae.											
Clavariaceae	55	3	40	11	19	3	8		10	13	
Thelephoraceae	83	3	64	15	33	4	17	4	12	27	
Hydnaceae	51	3	38	8	17	1	8	1	8	6	
Polyporaceae	159	10	126	47	81.	17	31	2	31	27	
Agaricaceae	760	17	502	121	241	9	345	4	92	30	
Sphaeropsideae.											
Sphaerioideaceae	837	34	484	149	89	18	107	19	40	172	
Nectriaceae	13		7		1	1	3		3	2	
Leptostromaceae	32	3	17	4	2		6	1	7	10	
Excipulaceae	25		13	1	4	1	8	2	2	5	
Melanconiaceae	128	5	83	21	15	2	19	1	3	41	1
Hyphomycetes.											
Mucedina <i>c</i> eae	202	11	133	28	37	2	16	3	9	38	7
Dematiaceae	213	5	155	24	18	5	26	1	15	40	4
Stilbaceae	34	4	25	5	8	3	5	3	4	. 5	
Tuberculariaceae	96	5	63	25	14	3	5	1	3	22	
Mycelia sterilia	43	2	25	13	10	1			1	14	

	Belgiqu■	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
BRYOPHYTA											
Hepaticae											
Marchantineae.											
Ricciaceae Marchantiaceae Anthocerotaceae	8 6 2	5 2	5 3 1	1 2	5 6 2	5 6 1	4 6 2	3 3 1	3	2 5	
Jungermannineae.											
Anacrogynae.											
Aneuraceae Fossombroniaceae.	10 3	4 2	8 2	1	3 1	6	8	4	8	6 2	
Acrogyneae.											
Jungermanniaceae.	88	29	32	4	18	36	69	19	73	55	
Musci											
Sphagnineae.											
Sphagnaceae	28	21	4	8	5	6	24	13	18	19	
Andreaineae.											
Andreaceae	2					1	2			1	
Bryineae.											
Archidiaceae	1					1	1		1	1	
Ephemeraceae Physcomitrellaceae	3	1	1		1	1	1				
Phascaceae	8	2	4	2	2	1	8	2	3	4	
Bruchiaceae Weisiaceae	10	3 3	3 7	1	1	1	4	,	3	4	
Rhabdoweisiaceae	5	3	2	2	3	6 2	10	1	10	9	
Dicranaceae	28	17	11	4	9	9	24	8	2 19	5 18	
Leucobryaceae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fissidentaceae	11	-3	6	2	3	3	10	2	8	8	
Seligeriaceae	2					1	2		2	2	
Ditrichiaceae	10	• 4	4	1	2	4	8	3	9	7	
Campylosteliaceae	1									1	
Pottiaceae	50	17	31	15	16	23	45	5	41	41	
Grimmiaceae	28	3	12	2	4	9	22	4	25	21	
Orthotrichiaceae	30	13	19	11	18	8	24	4	25	24	
Encalyptaceae Georgiaceae	4	1	3	1	2	2 1	4	1	3	3	

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liége	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
				Fla	Fla				1		Esp
Schistostegaceae	1						1		1	1	
Splachnaceae	. 2	2			1		1	1	1	1	ĺ
Disceliaceae	1						1				
Funariaceae	7	2	4	4	3	2	3	2	2	2	
Bryaceae	41	16	21	8	14	13	31	4	32	27	
Mniaceae	12	6	9	4	5	7	10	1	11	9	
Meeseaceae	4			2				1	1		
Aulacomniaceae	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Bartramiaceae	9	4	5	1	2	2	8	2	8	8	
Polytrichaceae	14	13	12	8	11	7	14	6	13	12	
Buxbaumiaceae	3	1	3	2	2		2	1	2	1	
Fontinalaceae	3	1	1	1	1	1	3	1	3	3	
Cryphaeaceae	3	2	3	1	3	2	2	1	3	3	
Neckeraceae	7	2	4		2	2	5	1	4	4	
Pterygophyllaceae	1.		1			1	1	-	1	1	
Leskeaceae	15	6	7	5	7	9	13	5	11	12	
Hypnaceae	112	56	73	36	56	55	95	33	87	93	
PTERIDOPHYTA											
Filicales											
Filicineae.											
Hymenophyllaceae	1								1		
Polypodiaceae	29	18	23	16	20	20	25	18	26	24	
Osmundaceae	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	
Ophioglossaceae	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	
Hydropteridineae	~		~	~	~	~	~	~	~	~	
Salviniaceae	2	1	1		1	1		2	1	1	
	2	1	1		1	1	1	2	1	1	
Equisetales											
Equisetaceae	7	6	6	4	6	6	6	7	6	5	
Lycopodiales											
Lycopodineae											
Lycopodiaceae	6	2	5	3	3	3	4	4	6 1	3	
Isoetaceae	1		1					1	i		

	Ger	res		Espi	èces		1	Espèces indigènes découvertes				
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	enfre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854	
PHANEROGAMAE Gymnospermae												
Coniferae												
Taxineae												
Taxaceae	1		1				1					
Araucariineae												
Abietaceae Cupressaceae	1	4	1	6				1				
Angiospermae												
Monocotyledones												
Helobiineae												
Alismaceae Butomaceae Hydrocharitaceae Potamogetonaceae Najadaceae Juncaginaceae	4 1 2 4 2 2	1	4 1 2 21 3 3	1			2 1 1 2	1	6	1 7 3	5	
Spathiflorineae												
Typhaceae Sparganiaceae Araceae Lemnaceae	1 1 3 3		2 3 3 5		1		1 1 2	1 1 1	3	1 2		
Glumiflorineae												
Cyperaceae Graminaceae	8 47	I	81 109	7	5	2 1	8	3 8	29 42	31 45	18 6	
Liliineae												
Juncaceae Liliaceae Asparagaceae Amaryllidaceae Dioscoreaceae Iridaceae	2 10 5 3 1	1	23 19 7 4 1	5 1 1		`	1	2 2 5 1	7 7 1 1 1 1	12 9 2	2 1 .	
Gynandrineae												
Orchidaceae	18		37					3	7	22	5	

	Gen	Genres		Esp	èces		1	Espèces indigènes découvertes			5
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	antre 1800 et 1854	après 1854
Dicotyledones Choripetalae Juliflores Amentineae Myricaceae Salicaceae	1 2		1 10		,	5	6			1	
Cupulaceae	6		8		,	5	6		3 2	1	
Urticineae											
Ulmaceae Urticaceae Moraceae [incl. Cannabin.]	1 = 1 1	1	2 2 1	1 2 1		,	1 2 1			1	
Polygonineae											
Polygonaceae	2		22			1	13		2	3	4
Choripetalae [s. str.]											
Centrospe r mineae											
Caryophyllaceae Amarantaceae Chenopodiaceae Portulaceae	24 1 7 1	1	57 1 22 2	3 2 1			13 3.	3	12 1 4	24 12 2	5 2
Polycarpineae											
Ranunculaceae Nymphaeaceae Ceratophyllaceae Berberidaceae	12 2 1 1	2	38 2 2 1	1		2	14 2		5	13 2	6
Rhoe adineae											
Fumariaceae Papaveraceae Cruciferaceae	3 30	9	7 5 59	1 18		1	2 2 15	4	1	4 2 30	3
Cistineae											
Resedaceae Droseraceae Violaceae Cistaceae Elatinaceae Hypericaceae	1 1 1 1 3		2 3 7 3 3 9			1	1 4 1 5		1 2 1 1 2	2 1 2	1 2

	Ger	nres		Esp	èces			Espèces Indigènes découvertes				
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854	
Cobrinin												
Tiliaceae Malyaceae	1 2		2 6				2 2	1	1	1	1	
Geranineae												
Geraniaceae Oxalidaceae Linaceae Balsaminaceae Aceraceae Sapindaceae [incl. Hippocastanaceae] Polygalaceae	2 1 2 1 1	1	13 2 3 1 3	1		1	2	1	3 1 1 1	1	2	
Frangulineae	1		4				1			2	1	
Celastraceae Aquifoliaceae Ampelidaceae Rhamnaceae Empetraceae Buxaceae	1 1 1 1	1	2 1	1			1 1	,	1	1		
Thymelacineae									ļ			
Thymelaeaceae Elaeagnaceae	2		3				2			1		
Tricoccineae				İ								
Euphorbiaceae Çallitrichiaceae	2		12 6	1	1		7		1	1	1	
Saxifragineae												
Crassulaceae Saxifragaceae	2 4	1	8 9	3	1		4 7		1	3	. 1	
Rosineae												
Rosaceae [incl. Pomaceae et Amygdalaceae]	14	2	90	8		3	18	5	10	30	25	
Leguminosineae												
Leguminosaceae	13	4	52	13		1	19	2	10	16	5	
Myrtineae												
Lythraceae	2		3	:]	.		1	İ	1	1		

	Genres Espèces			1	Espèces indigènes découvertes						
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854
Onagraceae [incl. Circaea- ceae] Hydrocaryaceae Haloragidaceae	3 2 2	1	15	1 2 4		1	1	4	1	7	3
Umbelliferineae											
Araliaceae Cornaceae Umbelliferaceae	1 1 30	3	1 2 48	5		1	1 2 11		13	22	2
Hysterophytineae								4			
Loranthaceae Santalaceae Aristolochiaceae	1 1 2		1 2 2				1		. ,	1 2	1
Gamopetalae									i		
Gamopetalae pentacycliquae											
Ericineae											
Pyrolaceae [incl. Monotro- paceae] Ericaceae [incl. Vaccinia- ceae]	2		3	1			2		2	1	
Primulineae											
Primulaceae Plumbaginaceae	8 2		14 3	3			5	2	4	3 2	
Gamopetalae tetracycliquae											
Superovarieae											
Tubiflorineae											
Convolvulaceae [incl. Cuscutaceae] Polemoniaceae Boraginaceae	3 7	1 5	6	1 7			4	2	2	2	1
Personineae											
Solanaceae Scrophulariaceae Lentibulariaceae	4 12 1 v. 2	2	5 49 4	2	1	5	4 16	5 1	6	1 19 1 v. 2	3 2
Gesneraceae [incl. Oroban- chaceae]	2		,11					1	2	2	6

	Genres Espèces			Espèces indigènes découvertes							
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854
Globulariaceae Plantaginaceae	1 2		1 6	1			. 4	1	1	1	
Labiatineae											
Verbenaceae Labiaceae	1 19	2	1 51	5		10	23	5	6	15	2
Contortineae											
Gentianaceae Apocynaceae Asclepiadaceae Oleaceae	6 1 1 2		13 1 1 2				1 1 2	•	2	5	2
Inferovarieae											
Rubiineae											
Rubiaceae Caprifoliaceae [incl. Adoxa]	3 4		15 8	1		2	· 7		1	5 2	2 1
Valerianineae											
Valerianaceae Dipsaceae	2 4	1	7 5	2			3 5	*		4	
Campanulineae		l									
Campanulaceae [incl. Lobeliaceae] Cucurbitaceae	6		14		1		6 1	2	1	4	1
Compositaceae [incl. Ambrosiaceae]	41	5	117	25	2	6	48	16	10	33	10

Si nous résumons, en quelques chiffres, les données du double tableau des Phanérogames, nous trouvons que la flore indigène comprend 465 genres avec 1258 espèces dont 348 découvertes au 16me siècle, 86 au 17me, 236 au 18me, 451 entre les années 1800 et 1850 et 137 après 1850. En outre, on a rencontré dans notre pays 52 genres et 157 espèces bien naturalisées et 13 hybrides. Enfin douze espèces, peutêtre indigènes, n'ayant pas été revues, sont considérées comme douteuses.

CHAPITRE II.

Marche progressive de la connaissance de la flore belge.

a) Espèces indigènes.

Dans la seconde partie du Guide du botaniste en Belgique, François Crépin a écrit une fort belle étude sur l'Histoire de la botanique en Belgique depuis le seizième siècle. Nous avons cru intéressant de la compléter, au point de vue phanérogamique, en montrant la progression des connaissances en ce qui concerne la flore indigène.

Ainsi que cela ressort du tableau par familles (chap. préc.), on connaissait 346 espèces indigènes à la fin du seizième siècle, 542 à la fin du dix-septième siècle, 670 à la fin du dix-huitième siècle.

De 1800 à 1836, la Belgique fut explorée avec ardeur par Anne Libert, Roucel, Dossin, Lejeune, Courtois, Hocquart, P. Michel, Desmasières, Dumortier, J. Kickx, Dekin, Passy et Tinant, pour ne citer que quelques noms; le nombre des espèces indigènes s'éleva à plus de 1100. Puis, pendant près de vingt ans, l'étude sérieuse de la flore nationale fut à peu près entièrement délaissée et les découvertes presque nulles.

1854 marque le point de départ d'une période de recherches extrêmement brillantes; elle s'ouvre par les noms d'Eug. Coemans, Aug. Bellynck, François Crépin, Cl. Determe, Fenninger, Scheidweiler, A. Donckier, etc. De 1854 à la fin de 1861, 67 espèces indigènes sont ajoutées à la flore. La création de la Société royale de botanique de Belgique accentue encore et généralise ce mouvement de recherches, le pays est fouillé jusque dans les moindres recoins et il n'y a presque pas d'années, de 1862 à 1893, où la flore indigène ne soit enrichie de quelques trouvailles.

Par ses nombreuses publications, d'une précision scientifique remarquable, son incessante correspondance avec tous ceux qui étudient notre flore, Fr. Crépin domine toute cette période et son nom, répété près de cinquante fois dans le tableau suivant, montre ses facultés pénétrantes d'observateur. Il était juste que celui qui a amené la connaissance du tapis végétal phanérogamique de notre pays à un point à peu près parfait, clôturât en quelque sorte, en 1893, la série des découvertes possibles.

Il eût été trop long de donner un exposé complet des additions à la flore belge, depuis le milieu du 16^{mo} siècle; nous croyons qu'un tel relevé, pour la dernière période, ne sera pas sans présenter quelque intérêt pour tous ceux qui étudient notre flore.

1854

Scirpus Holoschoenus Carex extensa Trifolium maritimum Thesium humifusum

1855

Eleocharis ovata
Carex humilis
Polygonum mite
Polycnemum majus
Ranunculus foeniculaceus
Euphorbia stricta
Rosapomifera[com.esp.indig.]
Linaria striata
Orobanche Picridis
— Hederae

Teucrium montanum Stachys recta Campanula Cervicaria Filago spathulata Crepis taraxacifolia

1856

Ventenata dubia

1859

Carex trinervis
Cerastium pumilum
Beta maritima
Ranunculus trichophyllus
Prunus Mahaleb
Myriophyllum alterniflorum
Bupleurum tenuissimum
Carum verticillatum
Orobanche caryophyllacea

— Epithymum Filago neglecta Hieracium Schmidtii

1860

Potamogeton gramineus

- acutifoliusmucronatus
- Najas major

Wolffia arrhiza Eriophorum gracile Eug. Coemans Eug. Coemans

Eug. Coemans Eug. Coemans

Fr. Crépin Fr. Crépin Eug. Coemans Fr. Crépin

Fr. Crépin A. Bellynck A. Bellynck Fr. Crépin Fr. Crépin

A. Bellynck et V. Barbier Fr. Crépin

Fr. Crépin Cl. Determe A. Bellynck

Fr. Crépin

Fr. Crépin

Fr. Crépin Fr. Crépin Fenninger Fr. Crépin Cl. Determe Fr. Crépin Fr. Crépin

Cl. Determe
Mac Leod, Crépin
et Barbier
Fr. Crépin
Fr. Crépin
Fr. Crépin

Fr. Crépin et Van-

den Born Scheidweiler Scheidweiler et Martinis Gautier

Fr. Crépin Fr. Crépin et **Mo**reau Ind. vag. 1836 (Dumortier).

Ind. dout. 1813 (Lejeune). Ind. dout. 1800 (Bory). Ind. dout. 1811 (Lejeune).

Ind. dout. 1836 (Tinant). Ind. dout. 1814 (Hocquart).

Ind. dout. 1845 (Michot).

Ind. dout. 1855 (Mathieu).

Ind. vag. 1781 (Lestiboudois).

Ind. dout. 1814 (Hocquart).

Ind. dout. 1836 (Tinant).

Ind. dout. 1803 (Roucel), 1824 (Lejeune).

Ind. dout. 1811 et 1836 (Lejeune).

Carex stricta Scheidweiler Ind. dout. 1855 (A. Bellynck). - limosa Fr. Crépin Ind. dout. 1824 (Lejeune). Festuca bromoides Martinis Ind. dout. 1823 (Dumortier). Juncus Gerardi Fr. Crépin Reussens et Van Leucoium aestivum Haesendonck Orchis Simia Fr. Crépin Fr. Crépin Gymnadenia albida Ind. vag. 1827 (Dumortier). Ind. vag. 1836 (Lejeune). Cephalanthera grandiflora Fr. Crépin Rumex limosus Fr. Crépin, Scheidweiler et Coemans Silene conica Fr. Crépin Chenopodium opulifolium 1nd. vag. 1828 (Lejeune). Scheidweiler Anemone Pulsatilla Fr. Crépin Fr. Crépin Ranunculus ololeucos Callitriche hamulata Fr. Crépin Tillaea muscosa Martinis Ind. dout. 1823 (Desmasières). Rubus saxatilis Fr. Crépin Ind. dout. 1845 (Michot). Potentilla rupestris Fr. Crépin Rosa mollis A. Donckier Trifolium filiforme Martinis Baesen, Blaise et Orobanche purpurea Fr. Crépin Gentiana amarella Eug. Coemans Ind. vag. 1824 (Lejeune). Fr. Crépin Filago apiculata Eug. Coemans Ind. dout. 1814 (Hocquart). Carduus tenuiflorus Ind. dout. 1803 (Roucel). Cirsium anglicum Fr. Gravet Ind. dout. 1823 (Desmasières). Hypochoeris maculata Fr. Crépin Ind. dout. 1803 (Roucel). Scorzonera laciniata Fr. Crépin (1) Hieracium tridentatum Fr. Crépin II N G-1 Cynoglossum montanum Fr. Crépin Orobanche Teucrii Cl. Determe (2) 1862 Potamogeton plantagineus Wesmael praelongus Wesmael Scirpus pungens Dumortier Ind. dout. 1827 (Dumortier). Carex divisa Eug. Coemans Ind. dout. 1814 (Hocquart). - ericetorum A. Donckier — strigosa Fr. Crépin Cerastium tetrandrum Eug. Coemans

(Soc. roy. de bot.

de Belg.)

Fr. Crépin

Fr. Crépin

Fr. Crépin

Fr. Crépin

Van den Born

Ind. vag. 1827 (Dumortier).

Ind. vag. 1827 (Dumortier).

Sagina maritima

Rosa micrantha

agrestis

Veronica opaca.

Epilobium collinum

Lamyi

⁽¹⁾ Prodr. III p. 800, lire 1860 et non 1830.

⁽²⁾ Id. III p. 629, lire 1861 et non 1851.

1863

Vicia tenuifolia Veronica longifolia [com. esp. indig.1 Chlora perfoliata

1864

Carex dioica. - paradoxa - depauperata Orchis laxiflora - palustris Adonis flammea Utricularia neglecta Asperula glauca Artemisia camphorata

Crepis tectorum

1865

Carex ornithopoda Atropis Borreri Luzula Forsteri Rumex aquaticus — maximus

Ranunculus Baudotii Polygala calcarea Callitriche obtusangula Potentilla supina

1866

Scirpus carinatus

Carex brizoides Spartina stricta Callitriche autumnalis

Rubus suberectus - hedycarpos (incl. R. macrostemon). Lathyrus palustris Erythraea linearifolia

1867

Utricularia intermedia Hieracium praealtum

1868

Rubus pallidus

A. Cogniaux

L. Piré et F. Muller Fr. Crépin

Ind. dout. 1814 (Hocquart).

Poncin J. E. Bommer Lelièvre

Plon Fr. Crépin A. Cogniaux A. Cogniaux Van den Borren et

Fr. Crépin Fr. Crépin et Guilmot

A. Cogniaux

Fr. Crépin Fr. Crépin Lelièvre Van Bastelaer Fr. Crépin et Van

Bastelaer Kickx père Fr. Crépin Scheidweiler Gilbert

Fr. Crépin et Baguet Ch. Delogne Gilbert Scheidweiler et Fr. Crépin

J. É. Bommer Wirtgen

Fr. Crepin Malaise et Eug. Coemans

Gilbert et Lenars Soc. roy. de bot. de Belgique

Martinis

Ind. vag. 1813 (Lejeune).

Ind. dout. 1845 (Westendorp). Ind. dout. 1814 (Dekin et Passy).

Ind dout. 1810 (Nyst).

Ind. dout. 1859 (Scheidweiler).

Ind. vag. 1827 (Dumortier). Ind dout. 1803 (Roucel).

Ind. dout. 1814 (Hocquart).

Ind. dout. 1813 (Lejeune).

1869		
Cynodon Dactylon	Dumoulin	Ind. vag. 1781 (Lestiboudois).
1870		
Trifolium subterraneum	De Keyser	Ind. vag. 1827 (Dumortier).
1872		•
Lathyrus niger	Chabaut et Hardy	
1873		(Strail).
Ranunculus coenosus	De Bullemont	
1875		
Rubus Schleicheri	Fréd. Louvat	
1877		
Rubus Leyi — festivus — fuscus — Lejeunei	Focke Focke Focke	
1880		
Circaea alpina	Schmidt	
1881		
Brunella grandiflora	Pierrot	Ind. dout. 1813 (Lejeune).
1882		
Ophrys aranifera	Arth. Wodon	Ind. dout. 1845 (Michot).
ISSA		
Cephalanthera rubra	J. Bodard et H. Legrand	
Silene Armeria (com. esp. indig.)	J. Cardot	
1885		
Agrostis nigra Polygala austriaca Rubus thyrsoideus — gratus — foliosus	J. G. Baker Fonsny et Collard Th. Durand Th. Durand Th. Durand	
1886		
Carex Davalliana Limodorum abortivum Rubus melanoxylon — pyramidalis — Menkei — obscurus — thyrsiflorus	Lemoine S. Determe Th. Durand J. G. Baker Th. Durand J. G. Baker J. G. Baker	Ind. vag. 1813 (Lejeune).

Rubus Koehleri — subcanus — serpentinus Galium boreale Alopecurus bulbosus	J. G. Baker Th. Durand Th. Durand Schmitz Van Wilder	Ind. dout. 1803 (Roucel) 1824 (Lejeune). Ind. dout. 1814 (Dekin et Passy).
1888		
Callitriche pedunculata	A. Rousseau	
1889		
Schoenus ferrugineus	Noppeney	
1890		
Carex cyperoides	Th. Gerard	Ind. dout. 1814 (Hocquart).
1898		
Tragopogon orientalis	Fr. Crépin	Ind. vag. 1827 (Decloet).

b) Espèces naturalisées ou introduites.

Les espèces naturalisées ou introduites en Belgique. — André Devos a publié, en 1870, sur ce sujet une étude intéressante et bien documentée (1). Nous y renvoyons tous ceux qui désirent approfondir la question. Devos comprend ces mots naturalisées ou introduites dans un sens beaucoup plus large que Fr. Crépin. Pour lui, non seulement toutes les espèces messicoles, mais les plantes croissant dans le voisinage des habitations de l'homme, telles que Chelidonium majus, Mespilus germanica, Conium maculatum, etc. ne sont pas indigènes. Il en arrive ainsi à établir le bilan de notre flore comme suit: Espèces 1629, dont 1117 indigènes et 512 probablement introduites (2). Fr. Crépin en donne le tableau suivant [les cryptogames déduits] (3).

1192 espèces indigènes

61 — naturalisées

125 — subspontanées.

Si nous laissons de côté les plantes cultivées en grand (arbres de rapport ou d'ornement, plantes fourragères ou d'ornement), il reste environ 140 plantes, plus ou moins bien naturalisées, que l'observateur a des chances de rencontrer dans ses excursions ; il nous a paru intéressant de les grouper chronologiquement en montrant leur date d'apparition ou mieux de première observation en Belgique.

⁽¹⁾ Bull. Soc. bot. Belg. IX (1870) pp. 5-122.

⁽²⁾ Idem. p. 25.

⁽³⁾ Manuel de la flore de Belgique, 5º édit. p. XXI.

1554. Antirrhinum majus, * (1) Artemisia Absinthium, Borrago officinalis, Cheiranthus Cheiri, Datura Stramonium, * Euphorbia Lathyris, Hyssopus officinalis, Melilotus albus, * Melissa officinalis, Oxalis corniculata, * Sempervivum tectorum, * Pyrethrum Parthenium, Ulex europaeus (Dodoens).

1600. Narcissus poeticus (Clusius).

1617. Linaria Cymbalaria (Haverlant).

1666. Amarantus retroflexus, Chenopodium capitatum, Plantago arenaria. (G. Pelletier).

1618-81. Xanthium Strumarium, Ruscus aculeatus (Cl. Lion).

1781. Lysimachia punctata (Lestiboudois).

1792. Helleborus niger, Onagra biennis (Roucel).

1803. Asperugo procumbens, Cochlearia Armoracia, Erigeron canadense, Mibora minima (2), Silybum Marianum, Spiraea salicifolia (Roucel).

1810. Lythrum virgatum (Lejeune).

1811. Avena strigosa, Chenopodium foliosum (Lejeune), Geranium macrorhizum (Davreux), Lappula Myosotis, Lysimachia ciliata, Mentha viridis, Myrrhis odorata, Peucedanum Ostruthium, Prunus insititia, Ribes alpinum. Salvia Selarea, Sedum dasyphyllum, S. maximum, Sempervivum Schnittspahni, Verbascum phlomoides (Lejeune).

1812. Allium Schoenoprasum, Asperula arvensis, Briza minor, Muscari race-

mosum (J. Kickx).

1813. Ammi majus (Lejeune), Colutea arborescens (Nyst), Doronicum Pardalianches, Echinops sphaerocephalus. Eranthis hyemalis (Lejeune), Erigeron annuum (Roucel), Erodium moschatum (Lejeune), Tragopogon porrifolius (Roucel), Trifolium elegans, Xanthium spinosum (Lejeune).

1814. Amelanchier vulgaris, Falcaria vulgaris, Lolium multiflorum (Hocquart), Scrophularia vernalis (Dekin et Passy), Veronica peregrina (ind. posit.

1836, Tinant).

1820. Foeniculum capillaceum (Dijon).

1821. Alchemilla alpina, Hesperis matronalis (Lejeune), Lolium remotum

(P. Michel), Omphalodes verna (Nyst).

1824. Aster leucanthemus, Bunias orientalis, Centaurea solstitialis, Geranium pyrenaicum, Myagrum perfoliatum, Potentilla recta, Rosa cinnamomea, Sanguisorba polygama (Lejeune).

1825. Anemone Hepatica (Lejeune).

1827. Aster Novi-Belgii (Olislagers), Centranthus ruber, Hieracium caespitosum, Lagurus ovatus, Rosa alpina (Ind. posit. 1899, Soc. roy. de bot. de Belg.), Valerianella coronata (ind. posit. 1870, Van Haesendonck).

1830. Erysimum repandum (Lejeune).

1836. Anchusa sempervirens, Crepis setosa (Lejeune), Ornithogalum nutans (Dreissen), Rosa blanda (Dijon), Erucastrum Pollichii (Lejeune).

1840. Sisymbrium Sinapistrum (Lejeune).

1845. Calendula arvensis, Nigella arvensis (Michot).

1846. Amarantus graecisans (Marissal).

1849. Rudbeckia laciniata (F. Mueller).

1851. Melilotus indicus (Eug. Coemans).

⁽¹⁾ Les espèces précédées d'un astérique figurent dans la liste des plantes, dont la culture dans les jardins des villes impériales était déjà recommandée dans les Capitulaires de Charlemagne.

⁽²⁾ En 1902, M. J. Massart a vu cette espèce croissant en nombreux exemplaires à Wetteren.

1855. Isatis tinctoria (Bellynck).

1859. Nicandra physaloides (Strail), Saxifraga hypnoides, Crepis nicaeensis (Crépin).

1860. Elodea canadensis (L. Bossaerts), Lens esculenta (Martinis), Onagra muricata (Vanden Born), Saxifraga rotundifolia (Cl. Determe).

1862. Bromus patulus (Demoor et Scheidweiler), Claytonia perfoliata (Wesmael), Ornithopus sativus (Martinis).

1863. Vicia varia (Dumortier).

1864. Alnus incana (Van Haesendonck), Salvia verbenaca (Hardy et Lebrun).

1965. Aster multiflorus (Hon. Dandois), Coronilla Emerus (Devos), Impatiens parviflora (Vander Donkt), Salvia verticillata (A. Cogniaux), Vicia villosa (Hon Dandois).

1866. Aster brumalis (Martinis), A. salignus (Hon. Dandois), Spiraea hypericifolia (Crépin), Lepidium heterophyllum (Delogne), L. perfoliatum (Defacqz et Eyben), Lilium Martagon (Chabaut), Senebiera didyma (Martinis).

1868. Petasites fragrans (Demaret et Defacqz).

1870. Spiraea tomentosa (Raguet et De Prins).

7871. Lythrum Graefferi (Seghers).

1872. Amsinckia lycopsoides (Él. Marchal).

1874. Scilla patula (H. Donckier et Th. Durand).

1878. Aster Tradescanti (Math. Michel), A. Novae-Angliae (M. Michel et N. Remacle).

1879. Eruca sativa, Salvia sylvestris (Ind. vag. 1836, Lejeune). (H. Vanden Broeck).

1881. Ornithopus compressus (A. Ghysebrechts), Primula vulgaris [peut-être indig. Wodon] (Ind. dout. 1803, Roucel).

1882. Hieracium amplexicaule (A. Devos).

1883. Lepidium virginicum, Sinapis juncea (Ch. Baguet).

1884. Amarantus albus (Ern. Sonnet, F. Collard), Ambrosia artemisiifolia (Bernimolin).

1885. Anthoxanthum aristatum (Ern. Sonnet), Geranium Endressi (Cercle des Naturalistes d'Andenne, Delhaise et Simon).

CHAPITRE III.

Régions botaniques et listes des espèces largement répandues.

A François Crépin revient le grand honneur d'avoir, dans le tableau de la distribution de nos espèces, substitué des divisions naturelles à la répartition par provinces. Avant lui on disait, par exemple : telle espèce est commune dans la province de Liége et rare dans le Brabant. Crépin fit encore usage de ces divisions politiques dans la première édition du Manuel de la flore de Belgique (1860), mais il y donnait déjà un aperçu sur la géographie botanique de notre pays. Il réunit, sans relâche, les données qui devaient lui permettre de modifier complètement les tableaux de dispersion dans la 2^{me} édition du Manuel (1866). Il préluda à ce grand travail par d'importantes études préliminaires, telles que l'Ardenne (1863), Matériaux pour servir à la géographie botanique de la Belgique (1864 et 1865), etc.

Du reste, cette question ne cessa jamais de l'intéresser et il s'en occupa activement encore, lors de la préparation de la 5^{mo} édition du Manuel (1885). De 1866 à 1878, il lui consacra une série d'articles, publiés dans le Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique et un chapitre du Patria Belgica. Le chapitre IX de la seconde partie du Guide du botaniste en Belgique (1878) contient un remarquable exposé de la question sous les rubriques suivantes : 1° Description des régions botaniques ; 2° Les régions botaniques comparées entre elles ; 3° Les rapports de la flore de la Belgique avec la flore des contrées voisines ; 4° Les groupes de distribution végétale ; 5° Quelques remarques sur l'étude approfondie de la géographie botanique de la Belgique.

Ces pages, écrites il y a près de trente ans, n'ont pas vieilli dans leurs grandes lignes; il était donc inutile de les refaire. Il faudra toujours les étudier et ne considérer les tableaux que nous donnons ici que comme des données complémentaires.

Nos listes des espèces qui se rencontrent, à la fois, dans toutes, ou presque toutes les régions, permettront de mieux se rendre compte du fond de la végétation de notre pays, car, ainsi que nous l'avons écrit, il y a bien des années déjà, « les espèces rares ne sont que des accidents de la flore (1) ».

⁽¹⁾ Bull. Soc. roy. bot. Belg. XX (1881) p. 9.

La Belgique, d'après Fr. Crépin, se divise en quatre régions botaniques distinctes; deux de ces régions se subdivisent en zones secondaires (1).

RÉGION SEPTENTRIONALE.

"La région septentrionale comprend toute la plaine basse de la Belgique, où le sol est principalement composé de sables campinien et maritime et de limon des polders. Elle est donc limitée: au nord par la Hollande, à l'est par le Limbourg hollandais, à l'ouest par la mer du Nord et au midi par le dépôt connu sous le nom de limon hesbayen. Les points de contact de celui-ci avec la région septentrionale décrivent une ligne trèssinueuse passant par Dixmude, Courtrai, Cruyshautem, Wetteren, Alost, Louvain et Bilsen (2) ».

Cette vaste région se divise en trois zones : la zone maritime, la zone poldérienne et la zone campinienne. Il n'y a qu'une espèce qui ait été trouvée dans ces trois zones et qui fasse complètement défaut dans le restant du pays, c'est : l'Agropyrum pungens.

Le Callitriche autumnalis manque aussi dans les autres régions, mais il n'a pas encore été observé dans la zone poldérienne.

Mais chacune des trois zones de la région septentrionale présente des espèces spéciales.

Zone maritime.

"La zone maritime est constituée par les bords immédiats de la mer, c'est-à-dire la plage et les dunes, avec les prairies et les bas-fonds qui touchent à celles-ci. Les deux rives du Bas-Escaut, jusqu'à Anvers, sont une dépendance de cette zone (3) ».

Espèces spéciales (4).

Zostera maritima. Carex divisa. Carex trinervis.

— extensa.

⁽¹⁾ Crépin, Manuel de la flore de Belgique, 5me édit. p. XIX.

⁽²⁾ Crépin, loc. cit. p. XX.

⁽³⁾ Crépin, l. c. p. XX.

⁽⁴⁾ L'Anmophila arenaria, si commun dans cette zone, se rencontre en dehors de cette zone dans les dunes de la Campine et sur quelques points du Hainaut.

Scirpus Holoschoenus. Alopecurus bulbosus. Phleum arenarium (Pold. ?). Agropyrum junceum.

acutum. Elymus arenarius. Juneus anceps. Asparagus officinalis (aill. nat.). Orchis palustris. Cerastium tetrandrum.

Sagina maritima.

Arenaria peploides.

Beta maritima (aill. nat.). Atriplex laciniatum (aill.?). Salsola Kali (aill. nat.). Hippophae rhamnoides. Euphorbia paralias. Eryngium maritimum. Bupleurum tenuissimum (Pold. ?). Thesium humifusum. Convolvulus Soldanella (Pold. ?).

Erythraea linearifolia. Gentiana amarella.

Espèces trouvées dans les zones maritime et poldérienne, mais faisant défaut dans les autres régions comme espèces indigènes.

Zostera nana.

Ruppia maritima. Triglochin maritima. Atropis distans.

maritima. Lepturus filiformis. Hordeum maritimum.

Juncus Gerardi.

- maritimus. Spergularia salina.

media. Atriplex litoralis.

- portulacoides.

 pedunculatus. Salicornia herbacea. Suaeda maritima.

Ranunculus Baudotii. Cochlearia danica.

Althaea officinalis (aill. nat.). Trifolium maritimum (aill. nat.).

Apium graveolens.

Petroselinum segetum (aill. nat.).

Oenanthe Lachenalii. Glaux maritima. Armeria maritima. Statice Limonium. Plantago maritima. Aster Tripolium. Artemisia maritima. Sonchus palustris (aill. ?).

Picris echioides.

Zone poldérienne.

" La zone poldérienne est constituée par la bande de limon poldérien qui longe le littoral et dont la largeur moyenne est de dix kilomètres, ainsi que par les alluvions argileuses qui existent au nord de la Flandre orientale et sur les deux rives de l'Escaut en aval d'Anvers (1) n.

Nous venons de donner une liste de trente espèces propres aux zones maritime et poldérienne. — Cette dernière ne possède que deux espèces spéciales:

Spartina stricta.

Atropis Borreri.

Zone campinienne.

" La zone campinienne est constituée par les parties du Limbourg, du Brabant, de la province d'Anvers et des Flandres, recouvertes par le sable campinien. La partie du Brabant, au midi d'Aerschot et de Diest, où le sol est formé de sables tertiaires, appartient à cette zone (1) ».

⁽¹⁾ Crépin, Man. de la flore de Belg., 5me édit., p. XX.

" C'est surtout dans la Campine anversoise et limbourgeoise que cette zone revêt son aspect le plus caractéristique, aspect dû à la présence de vastes landes, entrecoupées de marécages, de tourbières et d'étangs ». Ailleurs, " les cultures ont profondément modifié le sol; presque partout, les bruyères ont disparu et, avec elles, les associations végétales des lieux incultes ont été détruites (1) ».

Les modifications apportées par les cultures suffisent-elles à expliquer les profondes différences que l'on remarque entre la Campine limbourgeoise, par exemple, et la Campine flamande? Nous ne le croyons pas! Il faudra sans doute subdiviser cette zone.

Espèces spéciales.

Potamogeton gramineus (aill. ?).

— compressus (aill. ?).

Scirpus carinatus.

— pungens.
Carex cyperoides (aill.?).
Cynodon Dactylon (aill.?).
Spiranthes aestívalis.
Ranunculus coenosus.

Subularia aquatica.

Drosera anglica (aill. ?).

Callitriche obtusangula (aill. ?).

- hamulata (aill. ?).

— pedunculata (aill. ?). Primula vulgaris (aill. ?).

Naumburgia thyrsiflora (aill. ?). Veronica longifolia (aill. nat.).

Utricularia intermedia. Lobelia Dortmanna (aill. ?).

Les espèces suivantes, qui, dans les autres zones ou régions, ne se rencontrent qu'à l'état de raretés, plus ou moins grandes, y sont assez largement répandues:

Alisma natans.
Stratiotes aloides.
Sparganium natans.
Juncus tenuis.
Carex stricta.
Rhynchospora fusca.
Heleocharis multicaulis.
Scirpus fluitans.
Deschampsia discolor.

Myrica Gale.
Illecebrum verticillatum.
Spergula vernalis.
Ranunculus ololeucos.
Ludwigia palustris.
Cicuta virosa.
Peucedanum palustre.
Erica cinerea.

RÉGION MOYENNE.

" La région moyenne est comprise entre la région septentrionale et la région ardennaise. Sa limite au sud-est décrit une ligne assez régulière, passant par Goé, Heusy, Fraipont, Ferrière, Izier, Heyd, Soy, Hampteau, Harsin, Ambly, Bure, Tellin, Chanly, Honnay, Wancennes, Dion-le-Mont, Vaucelles, Olloy, Gonrieux, Forges et Monceaux-Imbrechies. Au sud-ouest, elle est bornée par la frontière du département du Nord ».

Fr. Crépin fait entrer, dans sa région moyenne, la zone argilo-sablonneuse et la zone calcareuse ou calcaire. — Cette région moyenne comprend dix

⁽¹⁾ Crépin, Guide du botaniste en Belgique, p. 333.

espèces communes aux deux zones et qui ne sont pas indiquées dans le reste du pays:

Carex strigosa.
Gagea spathacea.
Cephalanthera grandiflora.
Geranium rotundifolium.
Sedum rubens.

Veronica acinifolia.

— opaca.
Orobanche Hederae.
Inula Helenium (aill. nat.).
Hieracium praealtum.

mais cela ne signifie pas grand'chose. — Pour nous, la zone argilosablonneuse a bien plus d'affinités avec la zone campinienne, qu'avec la zone calcaire (voir ce dernier article). La région moyenne ne devrait, nous semble-t-il, comprendre que la zone argilo-sablonneuse ; la zone calcaire devrait former une région, car sa flore a bien plus de rapports avec celle des régions ardennaise et jurassique qu'avec la flore de la zone argilo-sablonneuse.

Zone argilo-sablonneuse.

" La zone argilo-sablonneuse comprend la partie méridionale des Flandres, le nord du Hainaut, presque tout le Brabant, et une portion des provinces de Namur, de Liège et de Limbourg. Sa limite méridionale, partant de Tournai, se dirige successivement vers Basècles, Stambruges, Baudour, Obourg, Thieu, Viesville, Mazy, Bovesse, Daussoulx, Marchovelette, Héron, Huccorgne, Horion, Ans, et suit, plus à l'est, la rive gauche de la Meuse jusque un peu en aval de Maestricht. Cette limite, souvent débordée par le limon hesbayen, exclut de cette zone les principaux affleurements de calcaire et de craie du Hainaut et de la rive gauche de la Meuse. Le sous-sol est presque partout recouvert de ce dépôt argilo-siliceux, connu sous le nom de limon hesbayen (1) ».

" La position intermédiaire occupée par cette zone, entre la zone campinienne et la zone calcareuse, de plus la nature arénacée du sol sur quelques points et l'élément calcaire, mêlé au limon, sur d'autres points, lui font partager plusieurs des caractères botaniques propres aux zones voisines. En effet, sa flore n'a pas de cachet bien tranché, elle se compose d'un fond d'espèces ubiquistes auxquelles viennent se joindre des espèces silicicoles de la zone campinienne, des espèces plus ou moins calcicoles de la zone calcareuse (2) ». Quelques espèces y semblent plus répandues qu'ailleurs:

Geranium phaeum. Herniaria hirsuta. Pulmonaria officinalis. Gagea spathacea. Scilla non-scripta. Carex strigosa.

et enfin trois espèces n'ont pas été observées ailleurs :

Najas major (aill. ?). Andropogon Ischaemum. Lathraea clandestina.

⁽¹⁾ Manuel de la flore de Belgique, 5^{me} éd. p. XX.

⁽²⁾ Crépin, Guide du botaniste en Belgique, p. 337.

Zone calcaire.

"La zone calcareuse ou calcaire embrasse la partie méridionale du Hainaut, presque toute la province de Namur, une notable portion de la province de Liège et entame légèrement le Luxembourg. Ses nombreux étages géologiques offrent une diversité d'autant plus grande, qu'ils viennent presque tous en affleurements. Dans le Hainaut, le limon hesbayen a envahi la zone, mais il a laissé à découvert plusieurs massifs calcaires ou crayeux. Ailleurs, la zone est sillonnée de bandes calcaires, alternant avec des bandes quartzo-schisteuses, dirigées du sud-ouest au nord-est et appartenant aux terrains devoniens et carbonifères (1) n.

"L'homme, dit encore Fr. Crépin (2), n'ayant pu utiliser au profit de l'agriculture les rochers, les pentes escarpées et les croupes des collines stériles, la végétation ancienne a mieux conservé son cachet primitif dans cette zone que dans la zone argilo-sablonneuse. D'autre part, la nature variée des roches et les nombreux accidents du relief ont créé des stations extrêmement favorables à une foule d'espèces qui n'existent pas sur le limon hesbayen ».

Nous avons déjà dit (3) que cette zone devrait plutôt former une région distincte de la région moyenne et que sa flore a surtout des affinités avec celle des régions ardennaise et jurassique. Les tableaux suivants feront clairement ressortir ces points :

1) Espèces spéciales (4).

Taxus baccata (aill. ?). Carex montana.

- depauperata.

- humilis (aill. ?).

Calamagrostis montana.

Ventenata dubia.

Bromus arduennensis (aill. accid. ?).

Festuca bromoides.

unilateralis.

Luzula Forsterii.

Allium carinatum (aill.?).

Scilla bifolia (aill. ?).

Ophrys fuciflora.

Orchis Rivinii (aill. ?).

- laxiflora.

Aceras anthropophora (aill. ?).

Loroglossum hircinum (aill. ?).

Cephalanthera rubra.

Limodorum abortivum.

Ulmus pedunculata (aill. ?). Rumex aquaticus (aill. ?).

— maximus (aill. ?).

Alsine verna.

Dianthus carthusianorum (aill. ?).

Polycnemum arvense (aill. *).

Adonis flammea.

Arabis pauciflora.

- muralis.

Sisymbrium austriacum.

Erysimum hieracifolium.

Biscutella laevigata.

Thlaspi alpestre.

Draba aizoides.

Camelina sylvestris (aill. *).

Viola lutea.

Helianthemum Fumana.

polifolium.

Elatine Hydropiper (aill. ?).

⁽¹⁾ Manuel de la flore de Belgique, 5^{me} éd. p. XXI.

⁽²⁾ Guide du Botaniste en Belgique 11818,339.

⁽³⁾ Vide supra, p. 29.

⁽⁴⁾ L'astérisque remplace, dans ces listes, le mot naturalisé.

Androsaemum officinale (aill. *). Althaea hirsuta. Geranium sanguineum. - pratense (aill. *). Linum tenuifolium. Polygala austriaca. Buxus sempervirens (aill. *). Daphne Laureola. Euphorbia stricta. Potentilla rupestris. Vicia tenuifolia (aill. ?). Lathyrus niger (aill. ?). Lythrum hyssopifolium (aill. ?). Epilobium Lamyi. Peucedanum Chabraei. Asarum europaeum (aill. ?). Armeria elongata (aill. *). Cynoglossum montanum.

Physalis Alkekengi (aill. ?).

Verbascum pulverulentum. Linaria arvensis (aill. *). Veronica Teucrium (aill. ?). Orobanche Teucrii. Picridis. Globularia vulgaris. Teucrium montanum (aill. ?). Melittis melissophyllum. Stachys germanica. Gentiana campestis. Aster Linosyris. Filago spathulata. - neglecta. Artemisia campestris. - camphorata. Scorzonera humilis (aill. ?). Tragopogon orientalis.

Hieracium Schmidtii.

Nous avons dit que la zone calcaire a plus de rapports avec les régions ardennaise et jurassique qu'avec la zone argilo-sablonneuse. Nous avons donné la liste de quelques espèces qui n'ont pas été jusqu'à ce jour observées en dehors des zones calcaire et argilo-sablonneuse : les listes suivantes montreront des affinités bien plus marquées.

Espèces propres à la zone calcaire et à la région jurassique.

Carex tomentosa. Alopecurus utriculatus (aill. *). Phleum Boehmeri (aill. ?). Avena pratensis (aill.?). Sesleria coerulea. Melica ciliata (Ard. ?). Polygonatum officinale (aill.?). Cerastium brachypetalum. Anemone Pulsatilla. Adonis aestivalis (aill. *). — autumnalis (aill. *). . Helleborus viridis (aill. *). Berberis vulgaris (aill. *). Sisymbrium supinum (aill. ?). Iberis amara (aill. *). Thlaspi perfoliatum (aill: *). Alyssum calycinum (1). Calepina Corvini. Draba muralis (aill. ?). Prunus Mahaleb (aill. *). Caucalis latifolia. Orlaya grandiflora (aill. *).

Bupleurum rotundifolium (aill. *). falcatum (aill. *). Bunium Bulbocastanum (aill. *). Linaria striata (aill. *). Veronica verna (aill. ?). Ajuga Chamaepitys (Ard. *). - genevensis (aill. * ou ?). Brunella laciniata (aill. *) - grandiflora Lamium maculatum (aill. *). Stachys recta (aill. *). Orobanche purpurea (1). caryophyllacea (1). Gentiana germanica. - cruciata (aill. *). - ciliata. Viburnum Lantana (aill. *). Lonicera Xylosteum (aill. *). Helichrysum arenarium. Inula salicina (aill. *). Lactuca perennis. - virosa (aill. *).

⁽¹⁾ Cette espèce fait partie de l'intéressant petit groupe d'espèces calcicoles qui se retrouvent dans les dunes.

Espèces propres à la zone calcaire et aux régions ardennaise et jurassique.

Carex umbrosa. Poa Chaixii. Festuca sylvatica. Elymus europaeus. Anthericum liliago. Ornithogalum pyrenaicum. Allium sphaerocephalum. Polygonatum verticillatum. Rumex scutatus. Viscaria vulgaris. Ranunculus platanifolius. Helleborus foetidus. Aquilegia vulgaris (aill, *). Actaea spicata. Cardamine Impatiens (aill. *). Tilia platyphyllos (aill. *). Geranium sylvaticum. Acer platanoides.

— Pseudo-platanus (aill. *). Ribes rubrum (aill. *). Sorbus torminalis.

Aria.
 Rubus saxatilis.

Fragaria collina. Potentilla verna (aill: ?). Rosa micrantha (aill.?). Genista germanica (aill. ?). — sagittalis (aill. ?). Trifolium agrarium (aill. *). — montanum (aill. ?). ochroleucum. Hippocrepis comosa (aill. ?). Lathyrus hirsutus (aill: *). Cornus mas (aill. *). Caucalis daucoides (aill. *). Thesium pratense. Pulmonaria tuberosa (aill. *). Digitalis lutea (aill. ?). Teucrium Chamaedrys (aill. ?) Botrys (aill. ?). Stachys alpina (aill.?). Galium sylvaticum (aill. ?). Sambucus racemosa.

Campanula Cervicaria.

Arctium tomentosum (aill. ?).

Espèces propres à la zone calcaire et à la région ardennaise.

Calamagrostis arundinacea.
Gymnadenia albida.
Dianthus caesius.
Aconitum lycoetonum.
Arabis arenosa.
Dentaria bulbifera.
Sinapis Cheiranthus.
Thlaspi montanum.
Lunaria rediviva.
Geranium lucidum (aill.?).

Saxifraga decipiens.
Cotoneaster integerrimus.
Circaea intermedia.
Seseli Libanotis.
Trientalis europaea (aill. ?).
Digitalis ambigua.
Ajuga pyramidalis.
Vincetoxicum officinale.
Centaurea nigra.
— montana (aill. *).

RÉGION ARDENNAISE.

" La région ardennaise est constituée par le Luxembourg, presque tout entier, par une portion des provinces de Liège et de Namur et par un lambeau du Hainaut. Au midi, sa limite est formée par la frontière des départements de l'Aisne et des Ardennes, puis par une ligne passant successivement vers Sainte-Cécile, Lacuisine, Rossignol, Habay-la-Neuve, Nobressart et Attert. Cette ligne marque la séparation entre les terrains anciens de l'Ardenne et les terrains plus modernes de la région jurassique. Les terrains de la région ardennaise sont siliceux ou alumineux; ils appar-

tiennent aux étages géologiques les plus anciens de la Belgique et sont principalement formés de grès, de schistes et de psammites » (1).

1) Espèces spéciales à cette région.

Carex pauciflora. Schoenus ferrugineus. Carex brizoides. Agrostis nigra. Corallorhiza innata.
Geranium palustre.
Circaea intermedia.
Meum athamanticum.

2) Espèces dont la présence en dehors de la Région ardennaise reste douteuse.

Carex ericetorum. Elatine triandra. Hypochoeris maculuta.

Nous avons déjà signalé les rapports de la Région ardennaise avec la Zone calcaire et la Région jurassique.

RÉGION JURASSIQUE.

" La Région jurassique est constituée par l'extrémité sud-est du Luxembourg et comprend les cantons de Virton, d'Etalle, ainsi qu'une partie de ceux d'Arlon et de Florenville. Elle est limitée au nord par la région ardennaise et au midi par la frontière française. Ses terrains appartiennent presque tous aux étages jurassiques et se composent principalement de sable, de grès, de calcaire et de marne (1) ».

Les espèces suivantes lui sont exclusives.

Eriophorum gracile (aill. ?). Carex Davalliana (aill. ?).

paradoxa.ornithopoda.

Aconitum Napellus.

Polygala calcarea. Thymelaea Passerina. Orobanche Epithymum (aill.?). Galium boreale (aill.?).

Les rapports de la Région jurassique avec la zone calcaire et la Région ardennaise ont été établis précédemment.

Quelques espèces, sans être spéciales, sont fort largement répandues; la plus caractéristique est l'Helichrysum arenarium, puis viennent les Veronica verna, Lonicera Xylosteum, Rubus saxatilis et Pulmonaria officinalis.

⁽¹⁾ Manuel de la flore de Belgique, 5^{me} édit. p. XXI.

Espèces indigènes observées dans toutes les zones et régions du pays.

(360 espèces).

Alisma Plantago, Sagittaria sagittifolia.

Potamogeton natans, alpinus, lucens, crispus, pusillus.

Typha angustifolia.

Sparganium ramosum.

Acorus Calamus.

Lemna minor.

Scirpus setaceus, lacustris, compressus, sylvaticus; Eleocharis palustris, Carex vulpina, muricata, disticha, acuta, Goodenowii, panicea, glauca, spadicea, hirta.

Panicum Crus-galli; Setaria viridis; Phalaris arundinacea; Anthoxanthum odoratum; Phleum pratense; Alopecurus agrestis; Agrostis alba, vulgaris; Calamagrostis epigeios, Apera Spica-venti, Holcus lanatus, Aira caryophyllea, Corynephorus canescens, Trisetum flavescens, Arrhenathenum elatius; Phragmites communis, Molinia coerulea, Koeleria cristata, Briza media, Dactylis glomerata, Cynosurus cristatus, Poa annua, trivialis, pratensis et compressa; Glyceria fluitans et aquatica, Festuca ovina, rubra et arundinacea; Bromus sterilis, tectorum, secalinus, racemosus et mollis; Brachypodium sylvaticum, Lolium perenne et temulentum; Agropyrum repens; Hordeum murinum.

Juncus bufonius, tenuis, effusus, Leersii, glaucus et lamprocarpus.

Iris Pseudo-Acorus.

Orchis maculata et latifolia ; Epipactis palustris et latifolia ; Listera ovata.

* *

Populus tremula; Salix amygdalina, fragilis, alba, aurita, caprea, cinerea, repens, viminalis et purpurea.

Betula verrucosa et pubescens; Alnus glutinosa.

Urtica dioica et urens.

Humulus Lupulus.

Rumex crispus, Hydrolapathum, conglomeratus, obtusifolius, Acetosa et Acetosella; Polygonum aviculare, amphibium, Persicaria, lapathifolium et Convolvulus.

Scleranthus annuus; Spergularia rubra, Spergula arvensis; Stellaria aquatica, media, Holostea et graminea; Sagina apetala et procumbens; Arenaria serpyllifolia; Agrostemma Githago; Silene venosa; Lychnis Flos-Cuculi; Melandryum album et diurnum; Saponaria officinalis; Chenopodium polyspermum et album; Atriplex hastata et patula.

Anemone nemorosa; Ranunculus hederaceus, foeniculaceus, aquatilis, fluitans, Flammula, Lingua, acris, repens, bulbosus, sardous, arvensis et Ficaria; Caltha palustris.

Ceratophyllum demersum.

Fumaria officinalis.

Papaver Rhoeas, dubium et Argemone; Chelidonium majus.

Nasturtium sylvestre; Cardamine pratensis; Sisymbrium officinale et Thalianum; Alliaria officinalis; Erysimum cheiranthoides; Diplotaxis tenuifolia; Sinapis arvensis; Raphanus Raphanistrum; Lepidium ruderale; Capsella Bursa Pastoris; Thlaspi arvense; Roripa palustris et amphibia; Draba verna.

Viola canina, sylvestris et tricolor.

Hypericum perforatum, tetrapterum et humifusum.

Malva moschata, sylvestris et rotundifolia.

Geranium columbinum, dissectum, pusillum, molle et Robertianum; Erodium cicutarium; Linum catharticum.

Polygala vulgaris.

Euphorbia helioscopia, Peplus et exigua; Mercurialis annua.

Callitriche verna et stagnalis.

Sedum Telephium.

Saxifraga tridactylites ; Parnassia palustris.

Mespilus monogyna; Rubus dumetorum; Fragaria vesca; Potentilla Anserina, reptans et procumbens; Geum urbanum; Ulmaria palustris; Alchemilla arvensis; Agrimonia Eupatoria; Rosa canina, rubiginosa et tomentosa; Prunus spinosa.

Ononis repens; Medicago Lupulina; Melilotus officinalis; Trifolium campestre, minus, repens, fragiferum, arvense et pratense; Lotus corniculatus et uliginosus; Vicia sepium, angustifolia, Cracca, tetrasperma et hirsuta; Lathyrus pratensis.

Lythrum Salicaria.

Epilobium hirsutum et parviflorum.

Myriophyllum spicatum et verticillatum.

Hedera Helix.

Hydrocotyle vulgaris, Chaerophyllum temulum; Anthriscus sylvestris; Conium maculatum; Apium nodiflorum; Pimpinella Saxifraga; Sium erectum; Oenanthe fistulosa et aquatica; Aethusa Cynapium; Angelica sylvestris; Heracleum Sphondylium; Daucus Carota:

* *

Pyrola rotundifolia.

Calluna vulgaris.

Primula officinalis; Hottonia palustris; Lysimachia Nummularia et vulgaris; Anagallis arvensis.

Convolvulus arvensis; Calystegia sepium; Cuscuta europaea, Epithymum et densiflora.

Cynoglossum officinalie; Symphytum officinale; Myosotis palustris, lingulata, intermedia, hispida et versicolor; Lithospermum arvense; Echium vulgare.

Hyoscyamus niger : Solanum Dulcamara et nigrum.

Verbascum Thapsus; Linaria minor, vulgaris et Elatine; Antirrhinum Orontium; Scrophularia nodosa; Veronica serpyllifolia, agrestis, hederaefolia, Beccabunga, Anagallis, Chamaedrys, officinalis et scutellata; Melampyrum pratense; Euphrasia officinalis et Odontites; Rhinanthus major.

Utricularia vulgaris et neglecta.

Plantago major, media et lanceolata.

Verbena officinalis.

Ajuga reptans, Scutellaria galericulata et minor; Glechoma hederacea, Brunella vulgaris; Galeopsis Tetrahit; Lamium amplexicaule, purpureum et album, Leonurus Cardiaca, Ballota nigra; Stachys sylvatica, palustris et arvensis; Satureia Acinos; Thymus Serpyllum; Lycopus europaeus; Mentha arvensis et aquatica.

Erythraea Centaurium: Menvanthes trifoliata.

Sherardia arvensis; Galium Mollugo, verum, palustre et Aparine.

Sambucus Ebulus; Lonicera Periclymenum.

Valerianella olitoria; Valeriana officinalis.

Knautia arvensis.

Campanula rotundifolia et Rapunculus ; Jasione montana.

Bryonia dioica.

Eupatorium cannabinum; Bellis perennis; Erigeron acre; Gnaphalium uligino-

sum; Pulicaria dysenterica; Anthemis arvensis et Cotula; Achillea Millefolium et Ptarmica; Matricaria Chamomilla et inodora; Chrysanthemum Leucanthemum et vulgare; Artemisia vulgaris; Tussilago Farfara; Petasites officinalis; Senecio vulgaris, Jacobaea, aquaticus et erucaefolius; Carlina vulgaris; Arctium minus; Carduus crispus; Cirsium lanceolatum, palustre et arvense; Centaurea Jacea; Lapsana communis; Hypochoeris radicata; Leontodon autumnalis et hirtus; Tragopogon pratensis; Taraxacum officinale; Sonchus oleraceus, asper et arvensis; Crepis taraxacifolia, virens et biennis; Hieraccim Pilosella, murorum et umbellatum.

Espèces existant dans toutes les zones et régions, LA RÉGION MARITIME EXCEPTÉE.

(115 espèces).

Juniperus communis.

Butomus umbellatus.

Potamogeton perfoliatus.

Typha latifolia.

Arum maculatum.

Eriophorum latifolium; Carex pilulifera, pallescens et sylvatica.

Alopecurus pratensis, geniculatus; Deschampsia caespitosa; Catabrosa aquatica; Poa nemoralis; Festuca gigantea; Bromus erectus, arvensis; Nardus stricta.

Juneus compressus.

Allium vineale.

: Convallaria majalis ; Paris quadrifolia.

Narcissus Pseudo-Narcissus.

Orchis Morio; Platanthera bifolia et montana.

* *

Moehringia trinervia; Dianthus Armeria.

Ranunculus auricomus.

Nymphaea alba; Nuphar luteum.

Barbarea vulgaris et intermedia ; Nasturtium officinale ; Cardamine amara ; Teesdalia nudicaulis ; Alyssum incanum.

Reseda lutea et Luteola.

Viola odorata.

Hypericum quadrangulum, pulchrum.

Evonymus europaeus.

Sedum reflexum.

Saxifraga granulata; Chrysosplenium alternifolium.

Mespilus germanica.

Potentilla sterilis, argentea et palustris; Sanguisorba minor; Rosa arvensis; Prunus Avium.

Genista tinctoria ; Ornithopus perpusillus ; Lathyrus Aphaca et montanus.

Peplis Portula.

Epilobinm angustifolium, montanum et roseum; Circaea lutetiana.

Cornus sanguinea.

Sanicula europaea; Scandix Pecten-veneris; Torilis Anthriscus; Pimpinella magna; Aegopodium Podagraria; Selinum earvifolia.

* *

Primula elatior; Lysimachia nemorum; Anagallis coerulea,

Scrophularia aquatica et umbrosa; Limosella aquatica; Veronica arvensis; Pedicularis sylvatica.

Orobanche Rapum-Genistae et minor.

Littorella lacustris.

Teucrium Scorodonia; Galeopsis Ladanum; Lamium Galeobdolon; Stachys officinalis; Satureia Clinopodium; Origanum vulgare; Mentha rotundifolia.

Vinca minor.

Galium cruciata.

Adoxa Moschatellina.

Valerianella dentata et Auricula; Valeriana dioica.

Campanula Trachelium rapunculoides, et persicifolia; Specularia Speculum; Phyteuma spicatum.

Filago germanica et minima; Antennaria dioica, Inula Conyza; Bidens tripartita et cernua; Chrysanthemum segetum; Senecio sylvaticus et nemorensis; Arctium majus; Carduus nutans; Cirsium oleraceum; Cichorium Intybus; Arnoseris minima; Picris hieracioides; Hieracium boreale.

Espèces observées dans toutes les zones et régions du pays, la région poldérienne et la zone maritime exceptée.

(103 espèces).

Sparganium simplex.

Cyperus fiavescens.

Eriophorum vaginatum; Scirpus caespitosus; Carex paniculata, leporina, echinata, canescens, remota, digitata et rostrata.

Milium effusum, Agrostis canina; Holcus mollis, Deschampsia flexuosa; Melica nutans, Poa palustris; Festuca duriuscula, et heterophylla, Bromus asper.

Juneus squarrosus, supinus et acutiflorus.

Narthecium ossifragum; Gagea arvensis et sylvatica.

Majanthemum bifolium (Pold. ?); Polygonatum multiflorum.

Orchis coriophora; Coeloglossum viride; Neottia Nidus-Avis.

. * .

Corylus Avellana ; Fagus sylvatica ; Quercus pedunculata et sessiliflora.

Ulmus scabra.

Polygonum dumetorum.

Herniaria glabra; Stellaria nemorum; Moenchia erecto; Sagina ciliata; Tunica prolifera; Vaccaria segetalis.

Cardamine sylvatica.

Drosera rotundifolia et intermedia.

Viola hirta.

Elatine hexandra.

Hypericum montanum et hirsutum.

Oxalis Acetosella.

Radiola linoides.

Impatiens Noli-tangere.

Ilex Aquifolium.

Rhamnus Frangula et cathartica.

Mercurialis perennes.

Sedum album et elegans.

Chrysosplenium oppositifolium.

Ribes Uva-crispa et nigrum.

Pyrus sylvestris et Aucuparia; Mespilus Oxyacantha; Rubus Idaeus; Fragaria elubor; Alchemilla vulgaria.

Genista anglica (Jur. ?) et pilosa; Trifolium striatum.

Epilobium aduatum et obscurum.

Carum Carvi.

Viscum album.

* *

Pyrola minor; Monotropa Hypopitys; Erica Tetralix; Vaccinium Myrtyllus. Atropa Belladona.

Verbascum nigrum et Lychnitis ; Gratiola officinalis ; Veronica montana ; Digitalis purpurea.

Nepeta Cataria; Galeopsis villosa; Salvia pratensis.

Asperula odorata; Galium sylvestre.

Viburnum Opulus.

Valerianella carinata.

Solidago Virga-aurea; Filago apiculata; Gnaphalium sylvaticum; Pulicaria vulgaris; Senecio viscosus et spathulaefolius; Scorzonera humilis; Lactuca muralis; Crepis foetida et paludosa; Hieracium sylvaticum.

Espèces observées dans toutes les régions sauf la région ardennaise.

(26 espèces).

Echinodorus ranunculoides.

Potamogeton pectinatus et densus; Zannichellia palustris.

Lemna trisulca.

Carex Pseudo-Cyperus et riparia.

Corynephorus canescens.

Hordeum secalinum (com. esp. ind.).

Juneus obtusifiorus.

Cerastium semidecandrum.

Ranunculus trichophyllus et sceleratus.

Ceratophyllum submersum.

Papaver dubium (douteux).

Medicago minima; Melilotus altissimus; Vicia lathyroides; Lathyrus tuberosus.

Hippuris vulgaris.

Sium latifolium; Pastinaca sativa (com. esp. ind.).

Lycopsis arvensis (com. esp. ind.).

Plantago coronopus.

Erythraea pulchella.

Gnaphalium luteo-album.

CHAPITRE IV.

Énumération complète des travaux publiés sur la flore belge (1) (avec répertoire).

Dans le Guide du botaniste, Fr. Crépin a dressé un tableau complet de l'œuvre des botanistes belges jusqu'à la fin de 1878. Nous le reprenons dans les pages suivantes, mais complété par la liste des travaux effectués, jusqu'à la fin de 1905, pour l'étude de la végétation de notre pays.

Une telle énumération, bien que concise, est assez difficile à consulter, aussi avons nous cru utile de la faire suivre d'un répertoire qui n'a pas la prétention de relever tout ce qu'elle contient, mais qui rendra, nous l'espérons, des services aux personnes eucore peu familiarisées avec la bibliographie de notre flore.

- 1 ABRAHAM (N.). Trois jours dans les Ardennes (Bull. Cercle Nat. Hutois 1888).
- 2 Adriaenssens (I.) et Haeck (P.). Lijst van meer of minder zeldzame planten uit de omstreken van Turnhout, eene bijdrage tot de kruidkundige kaart van Belgie (Bot. Jaarboek kruidkundig Genootschap, 1890).
- 3 AIGRET (Cl.). Note sur l'Helianthemum Fumana Mill. (B. S. B. XX, 2, 1881 et XXI, 2, 1882).
- 4 Compte rendu de la trentième herborisation générale de la Société royale de Botanique (1892) (B. S. B. XXXI, 2, 1892).
- 5 Coup d'œil sur la florule des environs de Villance (B. S. B. XL, 1903).
- 6 AIGRET et François. Herborisations dans la vallée du Viroin (B. S. B. XXIV, 2, 1885).
- 7 ANTOINE (I. M.). Liste de quelques plantes plus ou moins rares des environs de Jodoigne (B. S. B. XI, 1870).
- 8 Aubert (G.). Catalogue des Cryptogames récoltées aux environs de Louette-St Pierre (B. S. B. IV, 1865).
- 9 BAGUET (Ch.). Notes sur quelques espèces nouvelles ou rares de la flore belge (B. S. B. X, 1871).
- 10 Une herborisation hivernale (Idem, XII, 1873).
- 11 Note sur le Sedum rubens, croissant sur le massif silurien du Brabant (Idem, XIII, 1874).
- 12 Annotations nouvelles à la flore de la province de Brabant (Idem, XV, 1876).
- 13 Nouvelles acquisitions pour la flore belge et note sur des espèces d'introduction récente (*Idem*, XXII, 1883).
- 14 Notes sur quelques localités nouvelles de plantes rares ou assez rares de la flore belge (*Idem*, XXX, 1892).

⁽¹⁾ Cette énumération a été dressée par M. Ém. De Wildeman.

- 15 BAKER (J. G.). Notice sur les Rubus des environs de Spa (B. S. B. XXV, 2, 1886).
- 16 Bamps (C.). Plantes rares des environs de Hasselt (B. S. B. XII, 1873).
- 17 Notice sur le Chara aspera Willd. (Idem, 1874).
- 18 Synopsis de la flore du Limbourg belge. Cryptogames vasculaires et Characées (Hasselt 1895).
- 19 Barzin (J. B.), Colard (J.) etc. Catalogue des plantes peu communes recueillies dans les environs d'Andenne (Bull. Cercle Nat. Hutois, 1887).
- 20 BAUWENS (L.). Les Diatomées de Belgique (Bull. Soc. belg. microsc. 1877).
- 21 BEAUFAYS (G.). Flore verviétoise contenant la description de toutes les plantes qui croissent spontanément dans les environs de Verviers (Verviers 1857).
- 22 Beaujean (R.). Une nouvelle espèce subalpine (Corallorrhiza innata R. Br.) pour la flore des Ardennes (B. S. B. III, 1864).
- 23 Bellynck (A.). Catalogue des Cryptogames observées dans les euvirons de Namur (Bull. Acad. Belg. 1852).
- 24 Flore de Namur, 1 vol. (Namur, 1855).
- 25 Note sur un Orchis ustulata à fleurs doubles (B. S. B. VI, 1867).
- 26 Catalogue des plantes, soit spontanées, soit cultivées en grand, observées en Belgique à l'usage des herborisations (Namur, 1876).
- 27 Bernard (C.). Rapport sur les travaux de la Société Linnéenne, en 1875 (Bull. Soc. Linn, Brux. 1875).
- 28 Rapport sur les travaux de la Société Linnéenne, en 1877 (Idem, 1877).
- 29 Bernimolin (H.). Catalogue des plantes du Tournaisis, 1 vol. (Tournai, 1883).
- 30 Bodart (M.). Les Champignons comestibles des environs de Dinant (Bull. de l'Agriculture, XII, 1897).
- 31 Bodson (L.) et Devos (A.). Compte rendu de la neuvième herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique (B. S. B. X, 1871).
- 32 Compte rendu de la dixième herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique (Idem, XI, 1872).
- 33 Bommer (J. É.). Tableau analytique de la flore parisienne, par Bautier, mis en rapport avec la flore belge (Bruxelles, 1854).
- 34 Notice sur le Gagea spathacea, plante nouvelle pour la flore belge (Bull. Acad. Belg. 1856).
- 35 Bommer (É.) et Rousseau (M.). Catalogue des Champignons observés aux environs de Bruxelles (B. S. B. XVIII, 1879).
- 36 Florule mycologique des environs de Bruxelles (Idem, XXIII, 1884).
- 37 Contributions à la flore mycologique de Belgique (*Idem*, XXV, 1886).
- 38 Contributions à la flore mycologique de Belgique (Idem, XXVI, 1887).
- 39 Contributions à la flore mycologique de Belgique (Idem, XXVIII, 1891).
- 40 BOULAY (N.). Révision de la flore des départements du nord de la France. Lille 1878. (renferme p. 64 une liste de Mousses et Hépatiques observées à Angre).
- 41 Bris (A.) et Sladden (Ch.). Compte rendu de l'herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique en 1898 (B. S. B. XXXVII, 2).
- 42 CARDOT (J.). Notes bryologiques sur les environs d'Anvers (Revue bryol. 1882, 1883 et 1884).
- 43 et Piré (L.). Muscinées récoltées aux environs de Bouillon (B. S. B. XX, 1881).
- 44 Liste des Muscinées récoltées aux environs de Virton et dans les marais de Vance (B. S. B. XXII, 2, 1883).
- 45 et Marchal (Él.). Liste de Mousses, Hépatiques et autres Cryptog. des env. de Vireux et d'Olloy (B. S. B. XXI, 1882, pp. 234-36).
- 46 Sur l'Andraea commutata Limpr. (B. S. B. XXIII, 2, 1884).
- 47 Notice sur quelques Mousses de Belgique (Idem, XXIV, 2, 1885).
- 48 Quelques Mousses nouvelles pour la flore belge (B. S. B. XXIII, 2, 1884)
- 49 Note sur l'Orthotrichum Sprucci Mont., espèce nouvelle pour la flore belge (Idem, XXIV, 2, 1885).

- 50 Contributions à la flore bryologique de Belgique (B. S. B. XXV, 1886).
- 51 Les Sphaignes d'Europe. Révision critique des espèces et étude de leurs variations (Idem, XXV, 1886).
- 52 Contribution à la flore bryologique de la Belgique (Idem, XXVI, 1889).
- 53 CARLIER (L.). La Flore des commençants (Louvain, 1883).
- 54 La Flore des amateurs (Louvain, 1887).
- 55 CARRON (G.). Première excursion faite par la section de botanique de la Société Linnéenne (B. Soc. Linn. Brux. 1872).
- 56 Une herborisation à Bergh (Idem, 1878).
- 57 CARRON (G.) et ZWENDELAAR (H.). Florule des environs de Bruxelles (B. Soc. Linn. Bruπ, XIV, 1888 et XV, 1889).
- 58 CERF (Henriette). Notes on the Belgian Flora. A list of plants growing wild in Belgium (*The Phytologist*, III, Londres 1859).
- 59 Additionnal notes on the Flora of Belgium (Idem, IV, 1860).
- 60 Botany of the Meuse. Botany of the Fond de Leffe near Dinant (Idem IV, 1861).
- 61 CHARLET. Rapport sur l'excursion du 4 juin (Bull. Cercle Nat. Hutois, 1893).
- 62 CLERBOIS (P.) et Mansion (A.). Découverte du *Phascum Floerheanum* Web. et Mohr (B. S. B. XXXII, 2, 1894).
- 63 CLUYSENAAR (P. G.). Compte rendu de la vingt-septième herborisation de la Soc. roy. de Bot. (B. S. B. XXVIII, 2, 1888).
- 64 Note sur l'Androsaemum officinale All. (Bull. Cercle Nat. Hutois, 1884).
- 65 Rapport sur l'herborisation du 28 juin 1885 (Idem, 1885).
- 66 Note sur le Taxus baccata L. (Idem, 1886).
- 67 Découvertes botaniques faites aux environs de Huy en 1885-1886 (Idem, 1886).
- 68 Stations botaniques découvertes, en 1887, aux environs de Huy (Idem, 1887).
- 69 Stations botaniques découvertes, en 1888, aux environs de Huy (Idem, 1888).
- 70 Première liste des Mousses et des Sphaignes croissant aux environs de Huy (Idem, 1889).
- 71 Compte rendu d'une herborisation dans le Condroz (Idem, 1889).
- 72 Stations botaniques découvertes, en 1889, aux environs de Huy (Idem, 1889).
- 73 Florule de Huy et des environs (Idem, 1890).
- 74 COEMANS (Eug.). Notice sur quelques Cryptogames critiques de la Flore belge (Bull. Acad. Belg. 1858).
- 75 Observationes lichenologicae breves in fasciculos cryptogamicos ab orn. G. D. Westendorp editos (Gand, 1858).
- 76 Notice sur le Pilobolus crystallinus (Idem, 1859).
- 77 Recherches sur la genèse et les métamorphoses de la Peziza sclerotiorum Lib. (Idem, 1860).
- 78 Monographie du genre Pilobolus Tode, spécialement étudié au point de vue anat. et physiol. (Mém. Acad. Belg. 1862).
- 79 Notice sur les Ascobolus de la flore belge (B. S. B. I. 1862).
- 80 Note sur les Ozonium de la flore belge (Ibid. 1862).
- 81 Notice sur un Champignon nouveau: Kichxella alabastrina Coem. (Ibid. 1862).
- 82 Quelques Hyphomycetes nouveaux: I. Mortierella polycephala; II. Martensella pectinata (Bull. Acad. Belg. 1863).
- 83 De l'existence des conidies chez les Agaricinées (Idem, 1863).
- 84 Recherches sur le polymorphisme et les différents appareils de reproduction chez les Mucorinées (*Idem.*, 1863).
- 85 Révision des genres Gonatobotrys et Arthrobotrys Corda (B. S. B. II. 1863).
- 86 Cladoniae Belgicae exsiccatae, quae collegit et distribuit schedulis criticis additis (Gand, 1863 et 1866).
- 87 Cogniaux (Alf.). Notice sur le Nitella tenuissima Kuetz. (B. S. B. II. 1863).
- 88 Coup d'œil sur la végétation des environs de Visé (Idem, 1864).

- 89 Un an au Borinage; quelques matériaux pour la flore du Hainaut central (B. S. B. 1864).
- 90 Quelle est la nature du Festuca loliacea Huds, (Idem, IV. 1865).
- 91 Quelques observations botaniques sur les environs de Philippeville (Idem, V. 1866).
- 92 Note sur l'Asplenium viride Huds., fougère nouvelle pour la flore belge (Idem, VI. 1867).
- 93 Quelques observations faites en 1867 (Idem.).
- 94 Essai d'analyse des Mousses pleurocarpes de Belgique sans le secours des organes de fructification (*Idem*, VIII. 1869).
- 95 Petite Flore de Belgique (1º éd. Mons, 188, 2º éd. Mons, 1884, 3º éd. Bruxelles, 1895).
- 96 Les Glumacées de Belgique (coll. avec Él. Marchal) 1869-1871. [3 fasc. de plesèches avec d'intéressantes annotations].
- 96b Catalogue pour servir d'introduction à une monographie des Hépatiques de Belgique (B. S. B. XI. 1872).
- 97 COLARD (I.). Compte rendu de l'excursion à Avennes en 1887 (Bull. Cercle Nat. Hutois, 1887).
- 98 Colonval (C.). Liste de quelques plantes rares observées en 1882 (B. S. B. XXI, 2, 1882).
- 99 Courtois (R. I.). Choix de plantes de la Belgique (coll. avec Lejeune) 1825-1830.
- 100 Verslag van een plant- en landbouwkundig reisje, gedaan in Juli 1826, langs de oevers der Maas van Luik tot Dinant, in de Ardennen en het Groothertogdom Luxemburg (Bijdr. natuurh. wetensch. Amsterdam, 1827).
- 101 Aanteekeningen over eenige planten der Zuid-Nederlandsche Flora, en voornamelijk der Flora van de omstreken van Spa (coll. avec Lejeune) (Idem 1827).
- 102 Verhandeling over de Ranunculaceae der Nederlandsche Fiora (coll. avec Lejeune) (*Idem*, 1827).
- 103 Compendium florae Belgicae (coll. avec Lejeune) 3 v. (Liége 1828-1836).
- 104 Recherches sur la statistique physique, agricole et médicale de la province de Liége (Verviers, 1828).
- 105 Crépin (Fr.). Note sur le Galeopsis Ladano-ochroleuca (Bull. Acad. Belg. 1853).
- 106 Notice sur deux nouvelles hybrides (Mentha) (Idem, 1853).
- 107 Notes sur quelques plantes rares ou critiques de la Belgique (1859, 1862, 1863, 1864, 1865, 5 fasc.).
- 108 Manuel de la flore de Belgique (Bruxelles, éd. 1 1860, éd. 2 1866, éd. 3 1874, éd. 4, 1882, éd. 5 1885).
- 109 Note sur l'Elodea canadensis Rich (B. S. B. I. 1862).
- 110 Un coup d'œil sur la florule des environs de Han-sur-Lesse (Ibid. 1862). Deuxième édition, 1873.
- 111 Petites annotations à la flore de Belgique (B. S. B., I. 1862, II. 1863, III. 1864).
- 112 L'Ardenne au point de vue botanique (Bull. Fédération des Soc. d'horticulture de Belgique, 1863).
- 113 Considérations sur l'étude de la flore indigène (B. S. B. II. 1863).
- 114 Les Characées de Belgique (Idem.).
- 115 Les marais de Berlaere et l'abbaye d'Afflighem (Idem.).
- 116 Notes extraites d'un vieil herbier (Idem.).
- 117 Quelques mots sur la dispersion de l'Helichrysum arenarium en Belgique (Idem.).
- 118 Recueil de faits tératologiques (Idem, I. 1862, II. 1863, III. 1864).
- 119 Les fleurs du Bas-Luxembourg (Belg. hort. 1863).
- 120 Une herborisation dans la vallée du Bocq (Idem.).
- 121 Matériaux pour servir à l'histoire de la géographie botanique de Belgique (B. S. B. III. 1864, IV. 1865).

- 122 Une excursion dans la Campine limbourgeoise (Belg. hort, 1866).
- 123 Comptes rendus des 5°, 7° et 8° herborisations générales de la Société royale de botanique de Belgique (B. S. B. V. 1866, VIII. 1869).
- 124 Études sur les Roses (Idem, V. 1866).
- 125 Plateaux et vallées du Nord-Est de l'Ardenne (Ann. de la Soc. phyt. et micro-graph. d'Anvers 1866).
- 126 Coup d'œil sur la flore du département des Ardennes (B. S. B. VI. 1867).
- 127 Révision de l'herbier des Graminées, des Cypéracées et des Joncées, publié par P. Michel (*Idem*, VII. 1868).
- 128 Géographie botanique de la Belgique (Patria Belgica I, 1873).
- 129 Compte rendu de la Session extraordinaire de la Société royale de botanique de Belgique et de la Soc. botanique de France (B. S. B. XII. 1873).
- 130 Guide du botaniste en Belgique, 1 vol. (Bruxelles et Paris, 1878).
- 131 Observations sur quelques espèces devenues douteuses par la flore de Belgique (B. S. B. XX, 2, 1881).
- 132 Compte-rendu de la dix-neuvième herborisation de la Soc. roy. de Bot. de Belgique 1881 (Idem, XX, 2, 1881).
- 133 Compte-rendu de la vingt et unième herborisation de la Soc. roy. de Bot. de Belgique 1883 (Idem, XXII, 2, 1883).
- 134 Compte-rendu de la vingt-deuxième herborisation de la Soc. roy. de Bot. de Belgique 1884 (Idem, XXIII, 2, 1884).
- 135 Révision des Roses des herbiers de Lejeune et de M^{lle} Libert (*Idem*, XXXV, 1896).
- 136 Compte-rendu de l'herborisation générale de la Soc. roy. de Bot. de Belg. en 1899 (1dem, XXXVIII, 2).
- 137 Crépin (Fr.), Gravet (Fr.) et Delogne (C.). Catalogue de la flore de Belgique (Bruxelles 1872).
- 138 Dandois (H.). Florule nivelloise (B. S. B. II. 1863).
- 139 Additions à la florule des environs de Nivelles (Idem, 1865).
- 140 Note sur quelques espèces nouvelles pour la flore brabançonne (Idem, 1865).
- 141 Nouvelles annotations à la florule des environs de Nivelles (Idem, 1866).
- 142 DARDENNE (E.). Note sur deux *Plantago* atteints de monstruosité (B. S. B. VI. 1867).
- 143 DE BAUGNIES (I.). Rapport sur l'excursion du 29 août 1866 à la Baraque-Michel (Bull. Cercle Nat. Hutois, 1886).
- 144 DE BEUCKER (S. L.). Antwerpsche analytische Flora (avec H. Van Heurck).
- 145 DEBIENNE et Troch (P.). Compte rendu de l'herborisation de la Soc. roy. de Bot. de Belg. en 1897 (B. S. B. XXXVI, 2).
- 146 DEBY (J.). Liste complèmentaire aux Diatomées de Belgique (Ann. soc. belge de Microscopie III, 1877).
- 147 De Clort (I. J.). Aanteekeningen over de zigtbaar-bloeyende planten uit de omstreken van Freyr bij Dinant (Bydr. tot de natuurh. wetensch. Amsterdam 1828).
- 148 Dekin (A.). Florula Bruxellensis, seu Catalogus plantarum circa Bruxellas sponte nascentium (avec A. F. Passy) Bruxelles 1814.
- 149 Catalogue des plantes indigènes et naturalisées dans le département des Deux-Nèthes. (Statistique du dépt. des Deux-Nèthes, Paris, An X).
- 150 DE KEYSER (E.) et DELOGNE (C. H.). Liste des Mousses observées dans l'herborisation de Selzaete (B. S. B. XIII, 1874).
- 151 DE LATHAUWER (L. A.). Belgisch Kruidboek (Gand, 1849).
- 152 Delinise (H.) et Simon (F. I.). Florule de Marche-les-Dames (2º suppl.) (B. S. B. XXVIII, 2, p. 1888).
- 153 DE LIMMINGHE (A. M. A.). Flore mycologique de Gentinnes (Namur 1857).

- 154 DELOGNE (C. H.) et Gravet (F.). Les Mousses de l'Ardenne (5 fascicules 1868-1873).
- 155 Les Hépatiques de l'Ardenne (6 fascicules, 1868-1873).
- 156 Catalogue de la flore de Belgique (avec F. Crépin et F. Gravet) Bruxelles 1872.
- 157 Rapport sur l'excursion faite le 21 Juillet à Rochefort et à Han-sur-Lesse (B. S. B. Fr. 1873).
- 158 Contribution à la flore cryptogamique de Belgique (B. S. B. XIII, 1874).
- 159 Diatomées des environs de Bruxelles (B. S. B. de Microsc. 1877).
- 160 Trametes Kalchbrenneri Fr. Champignon nouveau pour la flore belge (B. S. B. XVIII, 2, 1879).
- 161 Tryblionella ovata Lah. (Ann. S. B. Microsc. V, 1879).
- 162 Flore cryptogamique de Belgique, 1º partie Muscinées (Idem VII, 1883 et IX, 1884).
- 163 Liste des deux premières séries de Diatomées (Idem VII, 1881, p. XXXII).
- 164 Pleurochisma deflexuur Dumort et Plagiochila spinulosa Dumort. (B. S. B. XX, 2, 1881).
- 165 Notes de Cryptogamie (Idem).
- 166 Compte rendu de l'excursion cryptogamique faite par la Soc. roy. de Bot. à Bergh en 1882 (Idem).
- 167 Note sur la découverte en Belgique du Catoscopium nigritum Brid. (Idem XXI, 2, 1882).
- 168 Note sur deux espèces nouvelles pour la flore bryologique de la Belgique-(Idem).
- 169 Note sur la dispersion en Belgique du Calypogeia arguta Mont. (Idem, XXI, 2, 1883).
- 170 Note sur quatre espèces nouvelles pour la flore bryologique de Belgique (Idem, XXI, 2, 1883).
- 171 Note sur le Jungermannia cordifolia Hook. (Idem, XXII. 2, 1883).
- 172 Note sur la découverte en Belgique du Dilaena Lyellii Dumort. (Idem XXII, 2, 1883).
- 173 Additions à la flore cryptogamique de la Belgique (Idem, XXII, 2, 1883).
- 174 Flore analytique de Belgique 1 vol. (Namur 1888).
- 175 Note sur le Paludella squarrosa Brid. (B. S. B. XXVII, 2, 1888).
- 176 Note sur le Polyporus incendiarius Bong. (Idem, XXVIII, 2, 1891).
- 177 Les Lactario-Russulées (Idem, XXX, 2, 1892).
- 178 Agaricinées nouvelles pour la flore belge (*Idem*, XXX, 2, 1892).
- 179 Champignons basidiomycêtes nouveaux ou rares pour la flore belge (Idem, XXXII, 2, 1894).
- 180 Note sur le Lejeunia calearea Lib. et L. Rosettiana Mass. (Idem, XXXII, 2, 1894).
- 181 Note sur le Lejeunia microscopica Tayl. (Idem XXXII, 2, 1894).
- 182 Note sur une Hépatique méconnue, Cephaloxia lunulaefolia Dumort. (Idem, XXXV. 2, 1896).
- 183 DELOGNE (C.) et DURAND (Th.). Les Mousses de la flore liégeoise (*Idem*, XXI, 2, 1882; XXII, 2, 1883).
- 184 Les Hépatiques et les Sphaignes de la flore liégeoise (Idem, XXII, 2, 1883).
- 185 Les Mousses du Brabant (Ibid.).
- 186 Tableau comparatif des Muscinées belges (Idem, XXIII, 2, 1884).
- 187 DE Moor (V. P. G.). Tableau analytique des familles naturelles de la flore belge, etc. (Bruxelles, sans date).
- 188 Tableaux analytiques des familles naturelles de la phanérogamie et de la cryptogamie belge etc., suivis du catalogue des genres de plantes vasculaires qui croissent naturellement sur le sol belge (Alost, 1847).

- 189 Synopsis analytique de la flore agrostologique belge ou tableaux dichotoniques de tous les genres et espèces de Graminées qui croissent et qui sont cultivées en Belgique (Alost, sans date).
- 190 Essai d'une monographie des Graminées de la Belgique (Bruxelles, 1854).
- 191 Deux mots sur le genre Michelaria (Bull. Acad. Belg. 1856).
- 192 Dens (C.) et Pietquin (F.). Catalogue annoté de Lichens observés en Belgique (B. S. B. XXIX, 1891).
- 193 Catalogue annoté, etc. (1º suppl.) (Idem, XXX, 1892),
- 194 Derive (Ch.). Flore veneneuse de la prov. de Liege ou description des plantes nuisibles ou suspectes qui croissent dans cette partie du royaume (Verviers, 1839).
- 195 Déseglisse (A.) et Durand (Th.). Descriptions de Menthes nouvelles (B. S. B. XVII, 1878).
- 196 Determe (Clem.). Catalogue des plantes rares croissant aux environs de Mariembourg (B. S. B. II. 1863).
- 197 Devos (A.) et Thielens (A.). Kickxia Belgica, Herbier des plantes rares et intéressantes de la Belgique (1865-1870).
- 198 Devos (A.). Observations sur la dispersion et les stations de quelques plantes rares de la vallée de la Meuse (B. S. B. V. 1866).
- 199 Deux jours d'herborisation dans la vallée de la Meuse aux environs de Givet et d'Hastiere (*Idem*).
- 200 Une herborisation estivale dans les terrains primaires de la vallée de la Meuse, aux environs de Givet, Vireux et Fumay (*Idem*, VI. 1867).
- 201 Compte-rendu de la sixième herborisation de la Société roy. de bot. de Belgique (Idem, VI. 1867).
- 202 Les plantes naturalisées ou introduites en Belgique (Idem, IX. 1870).
- 203 Étude sur l'aire d'extension de quelques plantes méridionales dans le bassin de la Meuse (Idem.).
- 204 Compte-rendu de la dixième herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique (Idem, XI. 1872).
- 205 Étude sur la naturalisation de quelques végétaux exotiques à la Montagne St Pierre (*Ibid.*).
- 206 Notes sur quelques plantes rares trouvées de 1871-1881 (Idem, XXI, 2, 1883).
- 207 Florule de Marche-les-Dames (Idem, XXII, 1883; XXIII, 2, 1884).
- 208 Notes extraites de l'herbier de G. Dinot, botaniste couvinois (*Idem*, XXII, 2, 1883).
- 209 La végétation du ravin de Bonneville (Idem, XXIV, 2, 1885).
- 210 Flore complète de la Belgique, (espèces indigènes et cultivées, 1 vol. (Mons 1885).
- 211 DE WEVRE (Alf.). Note sur quelques Mucédinées de la flore de Belgique (B. S. B. XXVIII, 2, 1888).
- 212 A propos d'un genre nouveau de Mucorinées (Ann. S. B. Miscrosc. XXI, 1896).
- 213 DE WILDEMAN (Em.). Contributions à l'étude des Algues de Belgique (B. S. B. XXIV, 2, 1885 et XXV, 2, 1886).
- 214 Desmidiées récoltées en Belgique en 1886 (Idem, XXV, 2, 1886).
- 215 Contributions à l'étude des Algues de Belgique (Idem, XXVI, 2, 1889).
- 216 Desmidiées récoltées en Belgique en 1887 (Ibid.).
- 217 Note sur le Nitella syncarpa Br. (Idem, XXVII, 2, 1888).
- 218 Sur l'Ulothrix flaccida Kütz. et le Stichococcus bacillaris Naeg. (Idem XXVII, 2, 1888).
- 219 Chytridiacées de Belgique (Mém. Soc. Belge de Microsc., XIV, 1890).
- 220 Contribution à l'étude des Algues de Belgique (B. S. B. XXVIII, 2, 1892).
- 221 Tableau comparatif des Algues de Belgique (Ibid.).
- 222 Sur quelques organismes inférieurs (Idem, XXX, 2, (1892).
- 223 Notes mycologiques (Ann. Soc. Belge de Microsc., XVII, 1893).

- 224 Contribution à l'étude des Algues de Belgique (B. S. B. XXXII, 2, 1894).
- 225 Tableau comparatif des Algues de Belgique (Idem, XXXIV, 1895).
- 226 Notes mycologiques (Ann. Soc. Belge de Microsc., XIX, 1895).
- 227 Notes mycologiques (Idem, XX, 1896).
- 228 Census Chytridinearum (B. S. B. XXXV, 1896).
- 229 Flore des Algues de Belgique, 1 vol. (Bruxelles, 1896).
- 230 Les Algues du Limbourg (Notes du laboratoire ambulant de biologie de l'Université de Bruxelles in Ann. Soc. Belge de Microsc., XXI, 1897).
- 231 Notes mycologiques (Ann. Soc. Belge de Microsc., XXI, 1897).
- 232 Notes mycologiques (Idem, XXII, 1898).
- 233 Une nouvelle Chytridinée (Micromyces Mcsocarpi) (Mém. de l'Herbier Boissier, 1900 n. 3).
- 234 Observations sur quelques Chytridinées nouvelles un peu connues (Idem; 1900 n. 15).
- 235 DONCKIER (A. H. C.) Notes sur les stations géologiques de quelques plantes rares un peu communes des env. de Limbourg (B. S. B. I, 1862 et XI, 1872),
- 236 Catalogue des plantes des env. de Goé classées d'après leurs altitudes (Idem, X, 1871).
- 237 DONCKIER (H.) et DURAND (Th.). Matériaux pour servir à la flore de la prov. de Liége (B. S. B. XIII, 1874, XIV, 1875 et XV, 1876).
- 238 Une herborisation estivale dans la basse-Ourthe et la basse-Vesdre (B. Soc. Linn. Bruw. 1878).
- 239 Dubois (F.). Essai de matière médicale belge, contenant la description des plantes médicinales qui croissent spontanément en Belgique, etc. (Tournai, 1837).
- 240 D'UDEKEM (G. I. M. G.) et GLUGE (G.). De quelques végétaux développés sur des animaux vivants (Bull. Acad. Belg. 1857).
- 241 Du Mortier (B. C.). Commentationes botanicae (Tournai, 1822).
- 242 Observations sur les Graminées de la flore de Belgique et Agrostographiae Belgicae tentamen (Tournai, 1823).
- 243 Florula Belgica, operis majoris prodromus (Tournai, 1827).
- 244 Sylloge Jungermannidearum Europae indigenarum, etc. (Tournai, 1831).
- 245 Notice sur les espèces indigènes du genre Scrophularia (Tournai, 1833).
- 246 Monographie des Saules de la flore belge (B. S. B. I, 1862).
- 247- Monographie du genre Batrachium (Idem, II, 1863).
- 248 Annales de la flore (Décade d'epèce nouvelle) (Idem, IV, 1865).
- 249 Monographie des Roses de la flore belge (Idem, VI, 1867).
- 250 Etude agrostographique sur le genre Michelaria (Idem, VII, 1868).
- 251 Bouquet du littoral belge (Idem).
- 252 Examen critique des Elatinées (Idem, XII, 1873).
- 258 Note sur le Scrophularia Tinantii (Idem, XIV, 1875).
- 254 DUMOULIN (L. I. G.). Guide du botaniste dans les env. de Maestricht en indication des phanérogames et des cryptogames vasculaires croissant dans ces environs (Maestricht, 1868).
- 255 DUPRÉ (F.). Interprétation du Rubus nuntanus Lib. (B. S. B. XXXVII, 2).
- 256 DURAND (Th.) et DONCKIER (H.). Matériaux pour servir à la flore de la prov. de Liége [avec H. Donckier] (Idem, XIH, 1874, XIV, 1875 et XV, 1876).
- 257 DURAND (Th.) (voir aussi DELOGNE Ch.). Reliquiae Dossinianae ou Catalogue des plantes observées dans la province de Liége par P. E. Dossin (*Idem*, XIV, 1875).
- 258 Coup d'œil sur la végétation de la vallée de la Vesdre entre Chaudfontaine et les Mazures (Feuill. jeun, Natur. Paris, 1877).
- 259 Recherches sur les Menthes de la flore liégeoise (B. S. B. XIV, 1875).
- 260 Descriptions de Menthes nouvelles (avec A. Déséglisse) (Idem, XVII, 1879).

- 261,- Catalogue de la flore liégeoise (Liége, 1878).
- 262 Note sur quelques plantes nouvelles ou rares pour la flore liégeoise (B. S. B. XVI, 1878).
- 263 Note sur l'existence en Belgique du Senecio Sadleri Lang (Idem, XVIII, 1879).
- 264 Additions ou catalogue de la flore liégeoise (Idem. XIX, 1880).
- 265 Annotations à la flore liégeoise (Idem, XX, 2, 1881).
- 266 Note sur l'existence en Belgique du Primula acaulis Iacq (Idem. XX, 2, 1881).
- 267 Note sur deux espèces nouvelles pour la flore belge (Idem, XXIV, 2, 1885).
- 268 Observations sur quelques plantes rares ou critiques de la flore belge (*Idem*, XX, 2, 1883).
- 269 Étude comparative sur la végétation de la vallée et la Vesdre avant et après 1840 (*Idem*, XXI, 2, 1883).
- 270 Découvertes botaniques faites pendant l'année 1882 (Idem, XXI, 2, 1883).
- 271 Idem, pendant l'annéee 1883 (Idem, XXIII, 2, 1884).
- 272 Idem, pendant l'année 1884 (Idem, XXIV, 2, 1885).
- 273 Les acquisitions de la flore belge en 1885 (Idem, XXIV, 2, 1885).
- 274 Note sur les récentes découvertes botaniques dans la vallée de la Vesdre (Idem, XXIV, 2, 1885).
- 275 Le Rubus tomentosus Borkh. existe-t-il en Belgique (Idem, XXV, 2, 1886).
- 276 Essai d'une monographie des Ronces de Belgique (Idem, XXVI, 1889).
- 277 Les acquisitions de la flore belge en 1886 (Idem, XXVI, 2, 1889).
- 278 Les acquisitions de la flore belge en 1887, 1888 (Idem, XXVIII, 1888).
- 279 Le Lencoium aestivum et l'Ophrys apifera trouvés dans la Flandre orientale (Idem, XXVIII, 2, 1891).
- 280 Notes rubologiques (Idem, XXVIII, 2, 1891).
- 281 Note sur les Stachys lanato × alpina Gravet mss. et alpino × lanata Rapin (B. S. B. XXVIII, 2, 1891).
- 282 DUTRANNOIT (G.). Compte-rendu de l'herborisation générale de la Soc. en 1891 (B. S. B. XXX, 2, 1892).
- 283 EDWARDS (G. F.). Tableau des plantes indigènes du départ de la Lys, à l'exception des arbres et des champignons (*Proc. verba*, Soc. d'Agricult. du départ. de la Lys, Bruges, 1808).
- 284 ENSCH (D. N.). Notes sur les Myxomycètes (Miscell. biologiques dédiées au prof. A. Giard, à l'occasion du 25ième anniversaire de la fondation de la station zoologique de Wimereux), (Paris, 1899).
- 285 Errera (L.). Indications concernant quelques espèces peu communes de la zone argilo-sablonneuse ou nouvelles pour cette zone (B. S. B. XIII, 1874).
- 286 Observations sur la flore de la zone maritime (B. S. B. XVIII, 2, 1889).
- 287 FONSNY (H.) et COLARD (F.). Florule de Verviers et de ses environs, 1 vol. (Verviers, 1885).
- 288 GERMAIN (F. I.). Essai sur les Lichens recueillis dans les env. de Bastogne (Public, Soc, Nat. Gr. Duché de Luxembourg, III, 1855).
- 289 GHYSEBRECHTS (L.). Additions à la florule des env. de Diest (B. S. B. XXIV, 1885).
- 290 Nouveaux renseignements sur la florule des env. de Diest (Idem, XXIV, 2, 1885).
- 291 Nouvelles additions à la florule des env. de Diest (Idem, XXVII, 1888).
- 292 Note sur la découverte du Carex limosa dans la Campine anversoise (Idem, XXX, 2, 1892).
- 293 Annotations à la florule des env. de Diest (Idem, XXXIX, 2, 1900).
- 294 GILBERT (Ch.). Note sur le Potentilla supina (B. S. B. V, 1866).
- 295 Compte-rendu de la Session extraord, de la Soc. roy, de bot. de Belgique et de la Soc. bot. de France du 15 au 22 juillet 1873 avec (Fr. Crepin et A. Baguet), (Idem, XIII, 1873).
- 296 GLUGE (G.). Voyez d'Udekem.

- 297 GOETSBLOETS (M.). Note sur le *Ledum palustre* L., plante signalée autrefois dans la Campine limbourgeoise (B. S. B. XXVIII, 2, 1889).
- 298 GRAVET (F.). Les Mousses de l'Ardenne (voyez Delogne).
- 299 Les Hépatiques de l'Ardenne (voyez Delogne).
- 300 Catalogue de la flore de Belgique (voyez Crépin et Delogne).
- 301 Barbula sinuosa Wils. (Rev. bryol. 1874).
- 302 Barbula nitida Lindb. (Rev. bryol. 1874).
- 303 Bryotheca Belgica ou Herbier des Mousses de Belgique, 8 fasc. (1874-1876).
- 304 Flore bryologique de Belgique. Description des Mousses qui croissent dans ce pays (B. S. B. XIV, 1875).
- 305 Sphagnotheca Belgica. In folio 80 nos (1877).
- 306 Revue de la flore bryologique de Belgique (Rev. bryol. 1874-1876).
- 307 Liste de Mousses rares ou nouvelles pour la flore belge (Idem. 1877).
- 308 Additions à la flore bryologique de Belgique (Rev. bryol. 1883).
- 309 GRAVIS (A.). Le Schinzia Alni (B. S. B. XVIII, 1879).
- 310 Note sur les excroissances des racines de l'Aune (Idem, XIX, 2, 1880).
- 311 Guibert (V.) et Van Heurck (H.). Flore médicale belge, 1 vol. (Louvain, 1864).
- 312 HANNON (J. D.). Flore belge, 3 vol. (Bruxelles, 1847).
- 313 HARDY (A.) et LEBRUN (H.). Florule des environs de Beaumont et Montbliart (B. S. B. V., 1866).
 - 314 Hardy (A.). Catalogue des plantes plus ou moins rares observées en Belgique (*Idem*, IX, 1870).
 - 315 Note sur l'Omphalodes verna Mönch (Idem).
 - 316 Notice sur les Calamintha menthaefolia Host. et C. officinalis Mönch (Idem, X, 1871).
 - 317 Monographie des Elatine de la flore belge (Idem, XI, 1872).
 - 318 Liste de plantes phanérogames (Idem, XXI, 2, 1882).
 - 319 Compte-rendu de la 15ème herborisation générale de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XVI, 1877).
 - 320 Hardy (A.) et Marchal (Él.). Catalogue des plantes plus ou moins rares de la vallée de la Meuse, de Liége à Maestricht (B. S. B. VIII, 1869).
 - 321 HÉCART (G. A.). Florula Hannonensis (Mém. Soc. agricult., des sciences et arts de l'arrondissement de Valenciennes, II, 1836).
 - 322 HECKING (O.). Note sur le *Viola lancifolia* Thore, plante nouvelle pour la flore belge (B. S. B. XVI, 1877).
 - 323 Compte-rendu de la 17ème herborisation générale de la Soc. roy. de bot. (1dem, XVII, 1878).
 - 324 HÉNEAU (Alph.). Flore élementaire de la Basse et de la Moyenne Belgique, 1 vol. (Bruxelles, 1889).
 - 325 HOCQUART (L. F. J.). Flore du département de Jemmape ou définition des plantes qui y croissent spontanément, 1 vol. (Mons, 1814).
 - 326 Kemna (Ad.). La biologie du filtrage au sable, avec une note additionnelle de M. H. Van Heurek (Bull. Soc. belge de géol., pal. et hydrol. XIII, 1899).
 - 327 Kickx (J.). Flora Bruxellensis, 1 vol. (Bruxelles, 1812).
 - 328 Relation d'un voyage fait à la grotte de Han au mois d'août 1822 (avec Ad. Quetelet) (Mém. Acad. Belg. in-4º 1822).
 - 329 Notice sur quelques plantes observées aux env. de Bruxelles depuis 1813 (Bull. Soc. Sc. méd. et nat. de Bruxelles, 1826).
 - 330 Notice sur une sorte de Verbascum (Messager des sc. et des arts, Gand, 1826).
 - 331 Une nouvelle espèce d'Agaric (Ann. Soc. Linnéenne, Paris, 1826).
 - 332 Relation d'une promenade botanique faite dans la Campine au mois de juillet 1832 (Bull. Soc. Sc. méd. et nat. de Bruxelles, 1833).
 - 333 Flore cryptogamique des env. de Louvain, description des plantes cryptogames

- et agames qui croissent dans le Brabant et dans une partie de la province d'Anvers (Louvain, 1835).
- 334 Notice sur quelques espèces peu connues de la flore belge (Ann. Soc. sc. méd. et nat. de Bruxelles, 1835).
- 335 Sur les plantes du littoral belge et surtout des env. de Nieuport (Bull. Acad. Belg. 1837).
- 336 Notice sur le Marchantia fragrans des auteurs belges (Idem).
- 337 Notice sur trois espèces peu connues du genre Sclerotium (Idem).
- 338 Recherches pour sorvir à la flore cryptogamique des Flandres (Mém. Acad. Belg. in-4°, 1841, 1843, 1846, 1849, 1855).
- 339 Essai sur les variétés indigènes du Fucus vesiculosus (Bull. Acad. Belg. 1856).
- 340 Les Renonculacées du littoral belge (B. S. B. IV, 1865).
- 341 Flore cryptogamique des Flandres, 2 vol. (Gand, 1867).
- 342 Monographie des Graphidées (Bull. Acad. Belg. 1865).
- 343 LAGERHEIM (G. de). Notes sur quelques Mucédinées de l'herbier de Westendorp (B. S. B. XXX, 2, 1892).
- 344 LAMBOTTE (E.). Flore mycologique belge, 3 vol. Liège, 1880.
- 345 Supplément à la Flore mycologique belge, I (Mém. Soc. roy. des sciences de Liège, XIV, 1887).
- 346 Supplément à la Flore mycologique, II (Idem, 1888).
- 347 LAURENT (Ém.). Apparition en Belgique du Peronospora viticola De Bary (Idem, XXII, 2, 1883).
- 348 Découverte en Belgique du Coniocybe pallida Fries (B. S. B. XXIII, 2, 1884).
- 349 LEBRUN (Fr.) (voir aussi HARDY A.). Florule des env. de Spa (Bull. Soc. bot. de France, 1873).
- 350 LEBURTON (D. F.). Catalogue de quelques cryptogames nouvelles pour la flore de Louvain (Bull. Acad. Belg. 1852).
- 351 LECOYER (C. I.). Notice sur la flore de Wavre et de ses environs (B. S. B. XII, 1873).
- 352 Liste de plantes observées dans les env. de Wavre (Idem, XVIII, 2, 1874).
- 353 LEJEUNE (A. L. S.). Flore des env. de Spa, 2 vol. (Liège 1811-1813).
- 354 De quarumdam indigenarum plantarum virtutibus commentatio (Liège 1820).
- 355 De Libertia, novo graminearum genere commentatio (Act. Acad. Caes.-Leop.-Car. Natur. Curios., 1820).
- 356 Revue de la flore des env. de Spa, 1 vol. (Liège, 1814).
- 357 Sur plusieurs espèces du genre Nasturtium qu'il convient d'ajouter à la Flore de Belgique (Bull. Acad. Belg. 1829).
- 358 Notice sur les espèces du genre Platanthera de la flore de Belgique (Idem. 1835).
- 359 Description d'une nouvelle espèce du genre Oxalis (Idem).
- 360 Notice sur deux espèces de Séneçon à ajouter à la Flore de Belgique (Idem, 1858).
- 361 LEJEUNE (A.) et COURTOIS (R.). Choix de plantes de la Belgique, 1825-1850.
- 362 Verhandeling over de Ranunculaceae der Nederlandsche Flora, 1827.
- 363 Compendium florae Belgicae 3 vol. (Liège et Verviers, 1828-1836).
- 364 Lemoine (E.). Compte-rendu de l'herborisation générale de la Société roy. de bot. en 1890 (B. S. B. XXVIII, 2, 1891).
- 365 Lestiboudois (Th.). Botanographie Belgique ou Flore du Nord de la France et de la Belgique proprement dite. Lille, éd. 1 (1781); éd. 2 (1799); éd. 3 (1827).
- 366 LOCHENIES (G.) Compte-rendu de la 27º herborisation de la Société roy. de bot. de Belgique (B. S. B. XXVII, 2, 1888).
- 367 Notice sur le Schænus ferrugineus L., espèce nouvelle pour la flore (Idem).
- 368 Lichens (B. S. B., XXIX, 1890).

- 369 Matériaux pour la Flore cryptogamique de Belgique (Lichens) (*Idem*, XXXIII, 1895).
- 370 Lichens récoltés par Ch. Delogne principalement dans les Ardennes belges (*Idem*, XXXV, 1896).
- 371 Florule des Muscinées et Lichens d'Angre et des env. in Riomet, Florule d'Angre etc. Mons 1891.
- 372 Lichens récoltés à l'herborisation de Malmédy, les 18, 19 et 30 juin 1896 (B. S. B. XXXVII, 2, 1898).
- 373 LEY (W.). Florule des env. d'Eupen (B. S. B. X, 1871).
- 374 LOUVEIGNIÉ (H.). Une herborisation aux env. de Lierre par la Société Linnéenne [avec L. Van der W.] (Bull, Soc. roy. Linn. de Brux. 1874).
- 375 Mac Leon (J.). De Flora van den Sasput bei Thourout (Bot. Jaarboek kruidkundig Genootschap Dodonaea 1890).
- 376 Mac Leod (S. M.) en Staes (G.). Geillustreerde Flora van Belgie (Gand 1892).
- 377 Malaise (C.). Quelques observations à propos de la Passerine : Stellera Passerina (B. S. B. III, 1864).
- 378 Maistriaux (C.) et Ronflette. Quelques plantes plus ou moins rares observées à Beloeil et dans les env. en 1884 (B. S. B. XXIII, 2, 1884).
- 379 Mansion (ARTH.). Sur l'herborisation dans le Fond d'Oxhe en 1888 (Bull. Cercle Nat. Hutois, 1888).
- 380 Note sur une nouvelle habitation d'Aceras anthropophora R. Br. (Idem, 1891).
- 381 Le Lycopodium alpinum retrouvé en Belgique (Idem).
- 382 Sur une excursion dans les Ardennes (Idem, 1891).
- 383 Découverte du Lycopodium complanatum à la Neuville-sous-Huy (Idem, 1893).
- 384 Première liste de Lichens observés aux environs de Huy (Idem, 1895).
- 385 Contributions à la flore bryologique belge (B. S. B. XXXVIII, 2, 1899).
- 386 Les Musinées d'Ath et des environs (Bull. Cercle Nat. Hutois, 1899).
- 387 Supplément à la florule bryologique d'Ath et des environs (Idem, 1899).
- 388 Mansion (Arth) et Clerbois (P.). Première liste d'Algues observées aux env. de Huy (Bull. Cercle. Nat. Hutois, 1893).
- 389 Les Algues Floridées des env. de Huy (Idem).
- 390 Les Muscinées de Huy et des env. (Idem, 1894).
- 391 Les Muscinées de Huy et des env. Suppl. (Idem, 1894).
- 392 MARCHAL (ÉL.) (voir aussi Cogniaux, A.). Catalogue des plantes plus ou moins rares de la vallée de la Meuse, de Liège à Maestricht (avec A. Hardy (B., S. B. VIII, 1869).
- 393 Les Muscinées des env. de Visé (Idem).
- 394 Compte-rendu de la 9^{me} herborisation générale de la Société royale de botanique de Belgique (avec L. Bodson) (B. S. B. IX, 1870).
- 395 Matériaux pour la flore cryptogamique de la Belgique (Idem, XXII, 2, 1883).
- 396 Mousses, Hépatiques et Lichens (Idem).
- 397 Compte-rendu de l'herborisation cryptogamique faite à Groenendael par la Soc. roy. de Bot. (*Idem*, XXI, 2, 1883).
- 398 Champignons coprophiles de la Belgique (Idem, XVIII, 2, et XXIV, 1385).
- 399 Bommerella, nouveau genre de Pyrénomycètes (Idem, XXIV, 1885).
- 400 Diagnoses de trois espèces nouvelles d'Ascomycètes coprophiles (*Idem*, XXV,
 2, 1886).
- 401 Champignons coprophiles de Belgique. Note sur le Bommerella trigonospora Él. March. (Idem, XXVIII, 1888).
- 402 Champignons coprophiles de Belgique. Mucorinées et Sphaeropsidées (*Idem*, XXX, 2, 1892).
- 403 Champignons coprophiles de Belgique (Idem, XXXIV, 1896).
- 404 MARCHAL El. et CARDOT J. Listes des Mousses. Hépatiques et autres cryptogames observées aux env. de Vireux et d'Olloy (B. S. B. XXI, 2, 1882).

- 405 MARCHAL (ÉM.). Syncephalastrum elegans (Bull. Soc. belge de microscopie XVIII, 1892).
- 406 Sur la production de l'ammoniaque dans le sol par les microbes (Bull. Acad. Belgique 3º sér. XXV, 1893 n. 6).
- 407 Rapport sur les maladies cryptogamiques étudiées au laboratoire de biologie de l'Institut agricole de Gembloux en 1894 (Bull. de l'Agriculture XI, 1895).
- 408 Idem en 1895 (ldem, XII, 1895).
- 409 Idem en 1896 (Idem. XIII, 1897).
- 410 Idem en 1897 (Idem. XIII, 1897).
- 411 Idem en 1897 (Idem. XIV, 1898).
- 412 Idem en 1898 (Idem. XV, 1899).
- 413 Idem en 1899 (Idem. XVI, 1900).
- 414 Observations sur la brûlure du lin (Bull. Soc. belge de microsc. XXIV, 1898).
- 415 Marissal (D. F.). Catalogue des phanérogames observées depuis 1862 dans les env. de Tournai (Mém. Soc. de litt. des sc. et beaux-arts de Tournai, 1846).
- 416 Catalogue des especes omises dans la flore du Hainaut et observées dans les env. de Tournai (Algues) Tournai 1830.
- 417 MARTENS (Ed.). Gomphidius glutinosus Fr. Agaricinée nouvelle pour la flore belge (B. S. B. II, 1862).
- 418 MARTINIS (ARTH.). Observations phytographiques sur quelques plantes de la flore de Belgique (B. S. B. II, 1863).
- 419 Note sur les Erodium pimpinellaefolium Sibth. et E. cicutarium L'Hérit. (Idem IV, 1865).
- 420 Note sur le Montia fontana L. (Idem, V, 1866).
- 421 Quelques mots sur l'Alsine pallida Dmrt. (Idem, XI, 1872).
- 422 Mathieu (C.). Flore générale de Belgique, contenant la description de toutes les plantes qui croissent dans ce pays. 2 vol. Bruxelles 1853.
- 423 Supplément à la Flore générale de Belgique. Bruxelles 1855. Obs. On ne peut extraire aucun renseignement sérieux de ces deux ouvrages; nous les signalons simplement pour mémoire.
- 424 Herbier général de la Belgique. Bruxelles, 1853. [Collection de planches].
- 425 Meisser (F. J.). Flore du Hainaut (in Dict. géographique de la prov. du Hainaut, par Van der Maelen, 1833).
- 426 Michel (M.). Flore de Fraipont, Nessonvaux et leurs environs y compris toute la vallée de la Vesdre etc. Verviers, 1877.
- 427 Note sur les plantes naturalisées ou introduites dans la vallée de la Vesdre (B. S. B. XXI, 2, 1882).
- 428 MICHEL (M.) et REMACLE (M.) Additions à la flore de Fraipont et Nessonvaux (B. S. B. XVIII, 2, 1879).
- 429 Michel (P. J.). Herbier des Graminées, des Cypéracées et des Joncées. 1823-1825.
- 430 Michor (N. L.). Flore du Hainaut. Mons, 1845.
- 431 Miller (H.). Matériaux pour la faune et la flore microscopiques de Belgique. (Ann. Soc. belge de microscopie, III, 1877).
- 432 MOERMAN (M.). De ziekte der Platanen te Gent (Gloeosporium Platani (Bot. jaarboek kruidkundig genootschap Dodonaea 1890).
- 433 Morren (Ch. F. A.). Mémoire sur un végétal microscopique d'un nouveau genre, proposé sous le nom de Crucigénie et sur un instrument que l'auteur nomme microsoter (Ann. sc. nat. 1830).
- 434 Recherches physiologiques sur les Hydrophytes de la Belgique (Bull. Acad. Belg. 1838 et 1841).
- 435 Mouton (V.). Ascomycètes observés aux env. de Liège (B. S. B. XXV, 1886).
- 436 Ascomycetes observés aux env. de Liège (B. S. B. XXVI, 1887).

- 437 Notice sur quelques Ascomycètes nouveaux ou peu connus (B. S. B. XXVIII, 2, 1888).
- 438 Troisième notice sur des Ascomycètes nouveaux ou peu connus (B. S. B. XXXVI, 2, 1897).
- 439 Quatrième notice sur des Ascomycètes nouveau ou peu connu (B. S. B. XXIX, 1900).
- 440 MULLER (F.). Spicilège de la flore bruxelloise (B. S. B. I, 1862 et III, 1864).
- 441 Une promenade à Bousval (B. S. B. IV, 1865).
- 442 Flore analytique du centre de la Belgique (avec L. Piré). Bruxelles, 1866.
- 443 Necker (N. S. de). Deliciae gallo-belgicae sylvestres, seu tractatus generalis plantarum gallo-belgicarum. Strasbourg 1768.
- 444 NIJPELS (P.). Bijdrage tot de mycologische flora van Belgie (Bot. Jaarboek hruidk. genootschap Dodonaea 1893).
- 445 Notes pathologiques (B. S. B. XXXVI, 2, 1897).
- 446 Maladies des plantes cultivées. III. Les arbres des promenades urbaines et les causes de leur dépérissement (B. Soc. belge de microsc. XXIII, Mém.).
- 447 Maladies de plantes cultivées. IV. Les parasites du Bois de la Cambre (Mém. Soc. belge de microsc. XXIV, 1899).
- 448 Maladies de plantes parasites. V. Une maladie de l'Aune commun (Alnus glutinosa Gartn.) (Bull. Soc. belge de microsc. XXV, 1899).
- 449 PAQUE (E.). Catalogue des plantes plus ou moins rares observées aux env. de Turnhout (B. S. B. XIX, 1889).
- 450 Herborisations de 1886 (Idem, XXI, 2, 1882).
- 451 Nouvelles recherches sur la flore belge (Idem, XXII, 1883).
- 452 Recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique. (Idem, XXIV, 1885).
- 453 Additions aux recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique. (*Idem*, XXV, 2, 1886).
- 454 Sur deux Ascomycetes nouveaux pour la flore belge. (Idem, XXV, 2, 1886).
- 455 Note sur le Splachnum sphaericum L. f. espèce nouvelle pour la flore belge. (Idem, XXIII, 2, 1884).
- 456 Notes sur quelques observations botaniques. (Idem, XXIII, 2, 1884).
- 457 Quelques observations botaniques faites en 1885. (Idem, XXV, 2, 1886).
- 458 Note sur le Splachnum mnioides Hedw. espèce nouvelle pour la flore belge. (Idem, XXVI, 1887).
- 459 Pero (P.). Contribution à l'étude de Diatomées de Belgique (Bull. Soc. belge de microscopie, XX, 1894).
- 460 PFAFF (E.). Asperula glauca Bess. (Bull. Cercle Natur Hutois. 1884).
- 461 PIERROT (Ph.). Notice sur quelques plantes rares trouvées dans le voisinage de la frontière franco-belge, aux env. de Virton et de Montmédy (B. S. B. XXI, 2, 1882).
- 462 Quelques annotations à propos des espèces signalées par M. Th. Durand dans son travail publié au Bull. de la Soc. roy. de Bot. en 1882 (*Idem*, XXI, 2, 1882).
- 463 Piré (L.). Compte-rendu de la 1^{ro} herborisation da la Soc. roy. de bot. de Belgique (B. S. B. I. 1862).
- 464 Notice sur l'Alsine pallida Dmrt. (Idem, II, 1863).
- 465 Compte-rendu de la 2^{mo} herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique. (*Idem*, II, 1863).
- 466 Compte-rendu de la 3^{mo} herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique. (Idem; III, 1864).
- 467 Flore analytique du centre de la Belgique avec F. Muller. Bruxelles, 1866.
- 468 Les Sphaignes de la flore de Belgique (B. S. B. VI, 1867).
- 469 Recherches bryologiques. Revue de quelques genres de Mousses pleurocarpes (*Idem*, VII, 1868).

. 4

- 470 Recherches bryologiques. Revue des Mousses acrocarpes de la flore belge. (*Idem*, VIII, 1869).
- 471 Les Mousses de la Belgique. Bruxelles 1870-1871, 100 mousses desséchées.
- 472 Nouvelles recherches bryologiques (B. S. B. X, 1871).
- 473 Notice sur l'Aceras anthropophora R. Br., espèce nouvelle pour la flore de Bruxelles (Bull. Soc. roy. Linnéenne de Bruxelles, 1873).
- 474 Note sur le genre Pancovia Neck. (Revue bryol. 1874).
- 475 PIRÉ (L.) et CARDOT (J.). Les Muscinées des env. de Spa (B. S. B. XXIV, 1885).
- 476 Piré (L.) et Miller (H.). Liste des Algues recueillies aux env. de Bruxelles. (Bull. Soc. belge de microscopie, IV, 1877).
- 477 PRÉAUX (A.). Notice sur la distribution du Fritillaria Meleagris L. en Belgique. (B. S. B. XXX, 2, 1892).
- 478 RIOMET (B.). Florule d'Angre et des environs (avec G. Lochenies (Mém. Soc. des sc. lettres et arts du Hainaut, 1891).
- 479 ROEMER (C.). Beitrage zur Laubmoosflora des oberen Weese und Göhlgebietes (Verhandl, d. naturhist. Ver. d. Preuss, Rheinlandes und Westfalens. Bonn, 1879).
- 480 Roucel (F. A.). Traité des plantes les moins fréquentes qui croissent naturellement dans les env. des villes de Gand, d'Alost, de Termonde et de Bruxelles. Paris et Bruxelles 1792, in-8°.
- 481 Flore du nord de la France ou description des plantes indigènes et de celles cultivées dans les départements de la Lys, de l'Escaut, de la Dyle et des deux Nèthes. Paris, an XI (1803).
- 482 ROUMEGUÈRE (C.). Note sur le Boletus ramosus Bull. récemment trouvé en Belgique (B. S. B. XX, 2, 1881).
- 483 Rozin (A.). Herbier portatif des plantes qui se trouvent dans les env. de Liège avec leur description et classification selon le système de Linné (Liège, 1791, in-8°).
- 484 P. A. SACCARDO et ÉL. MARCHAL. Reliquiae mycologicae Westendorpianae (Rev. mycolog. 1885).
- 485 SIMON (F. I.). Quelques plantes nouvelles pour la région jurassique (B. S. B. XXVIII, 2, 1889).
- 486 STAES (G.). Bijdrage tot de mycologische Flora van Belgie (Bot. Jaarboek kruidk. genootschap Dodonaea 1892).
- 487 Verslag over plantenziekten die in 1894 in Belgie waargenomen werden (Bot. Jaarboek kruidk. genootschap Dodonaea, 1895).
- 488 Eene nieuwe ziekte van den Wijnstok in Belgie (De Vriend der Natuur, 1894).
- 489 STOFFELS (L.). Description d'une espèce hybride du genre Renoncule (Ann. génér, des sc. phys., 1821).
- 490 STRAIL (CH.). Florule des environs de Chaudfontaine et de Magnée. (B. S. B. II. 1863).
- 491 Notice sur une nouvelle espèce de Cuscute. (Idem, II, 1863).
- 492 Monographie des Menthes qui croissent dans les env. de Liège. (*Idem*, III, 1864).
- 493 Essai de classification et description des Menthes qu'on rencontre en Belgique. (*Idem*, XXVI, 1887).
- 494 THIELENS (ARM.). Flore médicale belge. Bruxelles, 1882.
- 495 Notice sur l'Asparagus prostratus Dmrt (B. S. B. I, 1862).

SACCARDO (P. A.). — Miscellanea mycologica (Atti Ist. Veneto, t. II, ser. VI, 1884). Ce mémoire intéressant a été perdu de vue lors de la rédaction du Prodrome.

- 496 Annotation a la flore de la partie septentrionale du Brabant (avec A. Wesmael). B. S. B. I, 1862.
- 497 Herborisation dans les Campines brabançonne et anversoise. (Idem, II, 1863).
- 498 Nouvelles annotațions à la flore de la partie septentrionale du Brabant (*Idem*, III, 1864).
- 499 Les Ajuga pyramidalis et genevensis. (Idem, III, 1864).
- 500 Observation sur quelques plantes rares ou nouvelles de la flore de Belgique. (Idem, III, 1864).
- 501 Notice sur le Luzula Forsteri, espèce nouvelle pour la flore de Belgique. (Idem, IV, 1865).
- 502 Liste des plantes rares ou peu communes qui croissent aux env. de Thielt-Notre-Dame. (*Idem*, IV, 1865).
- 503 Compte-rendu de la 4^{me} herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique. (*Idem*, IV, 1865).
- 504 Kickxia Belgica ou Herbier des plantes rares et intéressantes de la Belgique. (avec A. Devos) (1865-1870).
- 505 Note sur l'Hieracium fallacinum F. Schultz, espèce nouvelle pour la flore de Belgique (B. S. B. VI. 1867).
- 506 Note sur la Cytisus decumbens Walp., espèce nouvelle pour la flore de Belgique. (Idem, VII, 1868).
- 507 Note sur le Myosotis Dumortieri Thiel. espèce inédite (Idem, VII, 1868).
- 508 Petites observations sur quelques plantes critiques (*Idem*, VII, 1868; VIII, 1869).
- 509 Note sur le Senecio barbareaefolius Reichb., espèce nouvelle pour la flore belge (Idem, VII, 1868).
- 510 Notice sur le Carex ligerina Bor. espèce nouvelle pour la flore belge (Idem).
- 511 Trois jours d'herborisation aux env. de Goé, Welkenraedt, et la forêt d'Hertogenwald. (Idem, IX, 1870).
- 512 Acquisitions de la flore belge depuis la création de la Société roy. de Bot. jusque et y compris l'année 1868. (Mém. et publ. de la Soc. des sc. arts et lettres du Hainaut, 1870).
- 513 Notice sur quelques plantes rares et nouvelles de la flore belge (B. S. B. X, 1871).
- 514 Compte-rendu de la 11^{me} herborisation générale de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XI, 1872).
- 515 Orchidées de la Belgique et du Grand-duché de Luxembourg (B. S. B. XII, 1873).
- 516 Acquisitions de la flore belge, comprenant les années 1869-1873 (*Idem*, XII, 1873).
- 517 THYS (I.). Notes sur la florule des env. de Jodoigne (B. S. B. VIII, 1869).
- 518 Tonglet (A.). Notice sur sept Lichens nouveaux pour la flore de Belgique (B. S. B. XXVIII, 2, 1891).
- 519 Notice sur six Lichens nouveaux pour la flore de Belgique (*Idem*, XXXI, 2, 1892).
- 520 Note sur quinze Lichens nouveaux pour la flore de Belgique (*Idem*, XXXIV, 2, 1895).
- 521 Les Lichens des env. de Dinant (Idem, XXVII, 1, 1888).
- 522 Troch (P.). Compte-rendu de l'herborisation générale de la Société roy. de bot. de Belgique en 1895 (B. S. B. XXXIV, 1895).
- 523 Sur la présence du *Tragopogon orientalis* L. 9 dans la vallée de la Meuse (B. S. B. XXXV, 2, 1896).
- 524 VAN BAMBEKE (Ch.). Sur une monstruosité du *Boletus luteus* L. suite de parasitisme (B. S. B. XXXIX, 1900).
- 525 Le Cocobotris xylophilus (Fr.) Boud. et Pat. (Idem, XXIX, 1900).

- 526 Quelques remarques touchant le *Lepiota meleagris* (Sow.) Sacc. (B. S. B. XXXIX, 1900).
- 527 VAN BASTELAER (D. A.). Herborisation dans un coin des Ardennes (B. S. B. III, 1864).
- 528 Etudes sur quelques Rumex de la section Lapathum (Idem, VI, 1867).
- 529 VAN BENEDEN (P. S.). Flore de la province d'Anvers (in Diction. géographique de la prov. d'Anvers publié par Ph. Van der Maelen, 1834).
- 530 Van den Berghe (Ad.). Bijdrage tot de studie der Belgische Kustflora, Salicornia herbacea (Bot. Jaarboek kruidk, genootschap Dodonaea, 1890).
- 531 VAN DEN BORM (H.). Catalogue des plantes croissant spontanément aux env. de Saint Trond (B. S. B. IV, 1865).
- 532 Sur l'Andropogon Ischaemum L. (Idem, XIV, 1875).
- 533 VAN DEN BROECK (E.). Les Diatomées recueillies en Belgique par Ehrenberg (Ann. Soc. belge de microscopie, IV, 1878).
- 534 Van den Broeck (Η.). Liste de quelques plantes observées aux env. d'Anvers (B. S. B. XVIII, 2, 1879).
- 535 Observations sur la flore de la zone maritime (B. S. B. XVIII, 2, 1879).
- 536 Note sur une nouvelle habitation de l'*Utricularia intermedia* et sur la découverte de l'*Ornithopus compressus* dans la zone campinienne (*Idem*, XXI, **2**, 1882).
- 537 Catalogue des plantes observées aux env. d'Anvers (B. S. B. XXIII, 1883, XXIII, 2, 1884).
- 538 Note sur la découverte du *Pseudoleskea attenuata* Br. et coup d'œil sur la flore bryologique de Han-sur-Lesse (*Idem*, XXV, 2, 1886).
- 539 Catalogue des plantes observées aux env. d'Anvers (2° suppl.) (Idem, XXVII, 1888).
- 540 VAN DER HAEGHEN (H.). Les Hyménomycètes signalés jusqu'à ce jour en Belgique (B. S. B, t. XXXVI, I, 1897).
- 541 VAN DER MEERSCH (E.). Notice sur la florule du Kraenepoel (B. S. B. XIII, 1874).
- 542 Compte-rendu de la 13^{me} herborisation générale de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XIII, 1874).
- 543 VANDERYST (H.). Quelques nouvelles stations d'Ustilaginées et d'Urédinées (1899).
- 544 Quelques nouvelles stations d'Urédinées (Revue générale agronomique 1899).
- 545 Quelques nouvelles stations de Péronosporées et d'Erysiphées (Revue générale agronomique 1899).
- 546 Quelques nouvelles stations d'Urédinées. Brecht, 1900.
- 547 Les Ustilaginées observées en Belgique. Brecht, 1900.
- 548 Les Péronosporées observées en Belgique. Brecht, 1900.
- 549 Catalogue des Urédinées signalées dans les différentes provinces en Belgique. Tongres, 1901.
- 550 VAN DE VYVERE (EM.). Plantes phanérogames indigenes et plantes les plus cultivées de la Flandre occidentale, avec leur usage, le temps de leur floraison et les lieux où on les trouve le plus communément. Bruges, 1857.
- 551 Catalogue des plantes qui composent l'herbarium offert à la Société (Ann. Soc. des sc. nat. de Bruges, 1839-1841, I et II).
- 552 Flore de la Flandre occidentale ou catalogue des plantes phanérogames indigènes et cultivées dans cette province (Ann. Soc. méd.-chirurg. de Bruges, 1850).
- 553 VAN HAESENDONCK (G. C.). Catalogue des Cryptogames observées depuis 1835, dans le Brabant et la prov. d'Anvers (avec Westendorp) (Ann. Soc. encyclographique des sc. médicales, 1838).
- 554 Prodrome de la flore des env. d'Anvers d'une partie de la Campine (Ann. Soc. de Médecine d'Anvers, 1841).

- 555 Herbier médical belge ou collection de plantes médicinales et nuisibles qui croissent ou sont cultivées en Belgique, 1863.
- 556 Florule des env. de Westerloo (B. S. B. VII, 1868).
- 557 Quelques mots sur le Thalictrum princeps Dmrt. (Idem, VIII, 1869).
- 558 Van Heurek (H.). Antwerpsche analytische Flora (avec I. Z. De Beucker).
 Anvers, 1861.
- 559 Prodrome de la flore du Brabant et catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans cette province et de celles qui y sont généralement cultivées (avec A. Wesmael). Louvain, 1861.
- 560 Herbier des plantes rares ou critiques de Belgique, 1861-1868 (avec A. Martinis).
- 561 Flore médicale belge (avec V. Guibert). Louvain, 1864.
- 562 Synopsis des Diatomées de Belgique. Anvers, 1885.
- 563 A Treatise of the Diatomaceae, London, 1896.
- 564 Traité des Diatomées, Anvers, 1899.
- 565 Van Hoorebere (C. I.). Mémoire sur les Orobanches, pour servir d'instruction à la culture du trèfie dans les communes où l'Orobanche nuit à sa culture. Gand, 1818.
- 566 VAN SEGVELT (ED.). Florule de Lanaeken (B. S. B. II, 1863).
- 567 VAN STERBEECK (G.). Theatrum fungorum, oft het toneel der Campernoelien. Anvers, 1875, in-4°.
- 568 VERBIST (A.). Florule des environs d'Hoogstraeten (B. S. B. XL, 2, 1902).
- 569 VERHEGGEN (H.). Mousses, Hépatiques et Lichens des env. de Neufchâteau (B. S. B. X., 1871).
- 570 Notice sur le Calepina Corvini Desv. (Idem, XIV, 1875).
- 571 Liste des plantes introduites des env. de Maeseyck (Idem, XIV, 1875).
- 572 Véro (J.). Liste de quelques espèces découvertes en Belgique (B. S. B. XVIII, 2, 1879).
- 573 WARNSTORF (C.). Zur Laub- und Lebermoosflora des Umgegend von Verviers (Bot. Centralbl. 1880, n. 12 p. 379).
- 574 WESMAEL (ALF.). Notice sur une hybride de Cirsium (Bull. Acad. Belg. 1860).
- 575 Prodrome de la Flore du Brabant (avec H. Van Heurck). Louvain, 1861.
- 576 Monographie botanique et horticole des Peupliers cultivés en Belgique (Bull. Fédération des Soc. d'horticulture, 1861).
- 577 Note sur quelques plantes rares, nouvelles ou critiques de la flore de Belgique (Bull. Acad. Belg. 1862).
- 578 Note sur une hybride de Ranunculus (Idem, 1862).
- 579 Notice sur une hybride de Cirsium (Idem, 1862).
- 580 Annotations à la flore de la partie septentrionale de Brabant (avec A. Thielens) (B. S. B. I, 1862).
- 581 Observations sur quelques plantes rares ou critiques de la flore de Belgique (Idem, I, 1862).
- 582 Herbier des Saules de Belgique, 1862.
- 583 Étude sur quelques Bouleaux de la flore belge (B. S. B. II, 1863).
- 584 Monographie des Saules hybrides de la flore belge (*Idem.* III, 1864).
- 585 Monographie des Saules de la flore belge (Bull. Fédér. des Soc. d'horticulture, 1864).
- 586 Flore forestière de Belgique, ou description et histoire des végétaux ligneux qui croissent spontanément en Belgique ou y sont cultivés dans les forêts (Bull. Fédér. des Soc. d'Hortic. 1865).
- 587 Compte-rendu de la 16^{me} herborisation générale de la Soc. de bot. de Belgique en 1877 (B. S. B. XVI).
- 588 WESTENDORP (G. D.). Sur une nouvelle espèce d'Épilobe voisine de l'Epilobium angustissimum et rosmarinifolium (Bull. Acad. Belg., 1836).

- 589 Catalogue des Cryptogames observées depuis 1835 dans le Brabant et la prov. d'Anvers (avec Van Haesendonck) (Ann. Soc. encycl. des sc. médicales, 1838).
- 590 Herbier cryptogamique ou collection des plantes cryptogames qui croissent en Belgique (avec Wallays) 1845-1860.
- 591 Description de quelques cryptogames inédites ou nouvelles pour la flore des deux Flandres (Bull. Acad. Belg. 1895).
- 592 Notice sur quelques cryptogames inédites ou nouvelles pour la flore belge (Idem, 1852).
- 593 Nouvelle notice sur quelques cryptogames récemment découvertes en Belgique (Idem, 1852).
- 594 Quatrième notice sur quelques cryptogames récemment découveries en Belgique (Idem, 1854).
- 595 Cinquième notice sur quelques Hypoxylées inédites ou nouvelles pour la flore de la Belgique (*Idem*, 1857).
- 596 Sixième notice sur quelques cryptogames inédites ou nouvelles pour la flore belge (*Idem*, 1859).
- 597 Sur quelques cryptogames nouvelles ou inédites de la flore belge (Idem, 1861).
- 598 Notice sur quelques espèces nouvelles et inédites pour la flore belge (B. S. B. II, 1863).
- 599 Sur une excursion cryptogamique à Blankenberghe et sur quelques cryptogames nouvelles ou inédites pour la flore belge (*Idem*, V, 1865).
- 600 Wirtgen (P.). Une petite excursion dans les terrains calaminaires de la Vieille Montagne (B. S. B. IV, 1865).

ADDENDA.

- 601 DUMORTIER. Monographie des Ronces de Belgique (B. S. B. II, 1863).
- 602 GILBERT. Note sur l'Utricularia intermedia Hayne (B. S. B. XXI, 2, 1882, p. 66).

ANONYMES.

- 603 Flore de l'arrondissement de Furnes et d'une partie de celui d'Ypres avec description géologique etc. (sans date). Attribué à De Tollenaere (A.).
- 604 Liste des plantes nouvelles ou des stations nouvelles pour la flore du centre de la Belgique (B. S. roy. Linn. 1875)
- 605 Liste des plantes rares trouvées par des membres du Cercle des Naturalistes Hutois en 1883 (Bull. du Cercle 1884).
- N. B. Cette bibliographie, déjà fort longue n'est pas encore complète, il y a plusieurs notices éparses, dont quelques-unes n'ont d'ailleurs qu'un intérêt historique. On trouvera l'indication de certaines d'entre elles dans le Bull. soc. roy. de bot. t. XXVII, le partie p. 68. On trouvera aussi, parmi ces travaux, un certain nombre de notes qui n'ont été relevées ni dans le Prodrome ni dans le Supplément, parce qu'elles ont paru postérieurement pendant l'impression.

RÉPERTOIRE.

Les chiffres, placés après un nom de plante ou de localité, renvoient aux numéros de la liste précédente. On consultera aussi, avec fruit, pour la dispersion des espèces, la Table des vingt cinq premières années du Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique.

Aceras anthropophora R. Br.: 380, 473.

Aeltre: 541. Afflighem: 115.

Ajuga genevensis et pyramidalis Linn.: 499.

Algues: 213, 215, 217, 218, 220, 221, 224, 225, 229, 230, 326, 339, 388,

389, 417, 431, 476.

Alost: 480.

Alsine pallida Dmrt.: 421, 464.

Amblève [vallée de l']: 1, 31, 41, 47, 394.

Andenne: 19, 209.

Andropogon Ischaemum Linn.: 532.

Angre: 40, 478.

Anvers: 42, 144, 149, 333, 482, 499, 529, 534, 535, 537, 539, 553, 554, 557, 558, 589.

Ardennes: 52, 100, 112, 123, 124, 125, 155, 323, 382, 527.

Arlon: 278, 364, 453.

Asparagus prostratus Dmrt.: 495.

Asperula glauca Bess.: 460. Asplenium viride Huds.: 92.

Ath: 325, 386. Avennes: 97.

Aywaille: 41. Baraque de Fraiture: 323.

Baraque Michel: 1, 123, 143, 573.

Bastogne: 288.

Batrachium *Dmrt*,: 247. Beaumont: 313, 466.

Belgique [ouvrages généraux]: 26, 33, 53, 54, 95, 103, 108, 127, 128, 130, 151, 174, 187, 188, 197, 202, 210, 221, 229, 239, 243, 311, 312, 324, 341, 344-347, 361, 363, 365, 376, 422-424, 429, 443, 467, 481, 540, 562, 586.

Belgique [travaux renfermant des renseignements sur des localités disséminées dans tout le pays]: 9, 13, 14, 58, 59, 93, 98, 107, 111, 112,

113, 121, 131, 197, 202, 206, 248, 263, 266, 267, 268, 270-273, 277-279, 314-318, 322, 334, 418, 422, 450-458, 498, 500, 504, 508, 512, 513, 516, 572, 577, 581.

Belgique [étude sur les plantes naturalisées]: 202, 205, 571.

Beloeil: 378. Bergh: 56, 166. Berlaere: 115.

Bocq [vallée du]: 120.

Borinage: 89.
Bossières: 116.
Bouillon: 43, 132.
Bousval: 442.

Brabant: 9, 10-12, 27, 28, 36, 37, 140, 185, 285, 333, 441-443, 467, 482, 496-498, 500, 502, 553, 559, 575, 580, 589, 604.

Bruxelles [et env.]: 35, 36, 37, 55, 57, 148, 159, 327, 329, 440-442, 472, 476, 480, 572, 604.

Calamintha [Tourn.] Lam.: 316.

Calepina Corvini Desv.: 570,

Campine: 9, 122, 332, 499, 500, 503, 555, 557.

Carex ligerina Bor.: 510.

Champignons: 37, 38, 39, 71, 76-88, 219, 222, 226-228, 231-234, 240, 284, 309, 310, 331, 337, 338, 343-348, 395-414, 418, 433, 435-439, 444-448, 453, 454, 482, 484, 486-488, 524-526, 540, 543-549, 553, 567, 589, 590-599.

Characées: 124. Charleroi: 466. Chaudfontaine: 490. Chimay: 466.

Chytridinées: 219, 228, 233, 234.

Ciney: 116.

Cirsium [Tourn.] DC: 574, 579.

Comblain-au-Pont: 41.

Condroz: 71. Couvin: 208. Curange: 129.

Cuscuta [Tourn.] Linn.: 491. Cytisus decumbens Walp.: 506.

Desmidiées: 214, 216, 432.

Diatomées: 20, 146, 432, 159, 163, 459, 533, 562-564.

Diest: 289-291, 293.

Dinant: 30, 58-60, 63, 100, 120, 147, 201.

Dolhain: 235.

Elatine Linn.: 252, 317.

Elodea canadensis Rich.: 109.

Epilobium Dill. ex Linn. 588.

Erodium L'Hérit.: 419.

Eupen: 32, 373.

Exsiccatas [Herbiers de plantes belges]: 86, 96, 99, 127, 154, 155, 197,

303, 305, 361, 429, 488, 504, 555, 560, 582, 590.

Flandres: 283, 338, 341, 482, 550-552, 591, 603.

Festuca loliacea Huds.: 90. Fraipont-Nessonvaux: 426-428.

Freyr: 147.

Fritillaria Meleagris Linn.: 477.

Furnes: 603.

Gagea spathacea Schult.: 34.

Gand: 480.

Gembloux: 116.

Genck: 129, 134, 453.

Gentinnes: 153. Givet: 199-201. Goé: 235, 236, 511.

Graminées: 96, 126, 189-191, 242, 250, 429.

Hainaut: 321, 325, 425, 430, 587.

Han-sur-Lesse: 4, 110, 129, 145, 157, 328, 538.

Hasselt: 16, 503. Hastière: 199, 201.

Hépatiques [voir Muscinées].

Helichrysum arenarium Moench.: 117.

Hertogenwald: 32, 237, 511.

Heure [Nr].: 93.

Hieracium fallacinum F. Sch.: 505.

Hoogstraeten: 568.

Huy: 61, 63-73, 387-391, 605.

Hydrophytes: 434.

Jodoigne: 7, 453, 517.

Kraenpoel: 541. Lanaeken: 566.

Ledum palustre Linn.: 597.

Lichens: 75, 85, 192, 193, 288, 338, 341, 342, 368-372, 384, 395, 396, 397, 404, 453, 518-521, 553, 569, 589.

Leucoium aestivum Linn.: 279.

Liége: 100, 104, 183, 184, 194, 198, 203, 206, 237, 238, 256, 257, 261, 262, 264, 265, 274, 320, 392, 427, 435-439, 479, 483, 573, 600.

Lierre: 374. Limbourg: 18.

Littoral: 14, 123, 251, 282, 286, 335, 340, 463, 530, 535, 599.

Louette-St-Pierre: 8.

Louvain: 9, 10, 14, 333, 350, 451, 452, 453, 454, 457, 458.

Luxembourg (Grand Duché): 123.

Luzula Forsteri DC.: 501.

Lycopodium alpinum Linn.: 381.

- complanatum Linn.: 383.

Maeseyck: 134, 571.

Maestricht: 254, 319, 320, 392, 515.

Magnée: 490-493.

Maladies cryptogamiques (Études sur les): 407, 413, 432, 445-448, 489, 490.

Marche-les-Dames: 152, 207.

Mariembourg: 6, 98, 196.

Médicinales (Plantes..... de la Belgique): 239, 311, 354, 494, 555, 561.

Modave: 63.

Menthes: 195, 259, 260, 492, 493.

Meuse: 106, 199, 200, 201, 203, 205, 237, 426.

Mons: 587.

Montbliart: 313.

Montia Mich. ex Linn.: 420.

Montagne St-Pierre: 205, 254, 320, 522.

Michelaria Dmrt.: 191, 250, 356.

Montbliart: 313. Moresnet: 600.

Muscinées: 47-49, 52, 94, 154-158, 162, 164-173, 176, 177, 180-186; 244, 298-308, 336, 338, 372, 385-387, 390, 391, 393, 395-397, 404, 453, 455, 458, 468-472, 475, 479, 538, 553, 569, 573, 589.

Myosotis Dumortieri Thiel.: 507.

Namur: 23, 24, 116, 152, 198, 201, 203, 207, 453.

Nasturtium Linn.: 357.

Neufchâteau: 93, 569.

Nivelles: 11, 138, 139, 141.

Olloy: 6, 404.

Omphalodes verna *Moench*: 315.

Orchidées: 358, 515.

Ornithopus compressus Linn.: 536.

Orobanchées: 565.

Ourthe: 31, 41, 47, 238, 394, 426.

Oxhe [Fond d']: 379.

Philippeville: 91.

Platanthera Rich.: 358.

Poix: 136.

Populus: 576.

Potentilla supina Linn.: 294.

Primula acaulis Hill.: 266,

Profondeville: 63.

Renonculacées: 340, 362, 489, 578.

Rochefort: 4, 129, 157.

Rosa Tourn. ex Linn. : 135, 249.

Rubus [Tourn.] Linn.: 255, 275, 276, 280, 601.

Rumex Linn.: 528. Saint-Hubert: 136. Saint-Trond: 531.

Salicornia [Tourn.] Linn.: 251, 530. Salix [Tourn.] Linn.: 246, 582, 584, 585.

Schoenus ferrugineus Linn.: 367.

Scrophularia Tourn. ex Linn.: 246, 258.

Selzaete: 150, 542.

Senecio [Tourn.] Linn.: 360.

- barbareaefolius Rchb.: 509.

— Sadleri Lang: 263.

Spa: 15, 58, 101, 349, 353, 356, 475.

Sphaignes: 51, 305, 468.

Stavelot: 1, 123.

Stellera Passerina Linn.: 377.

Taxus baccata Linn.: 66.

Termonde: 480.

Thalictrum princeps Dmrt.: 557.

Theux: 32.

Thielt N.-D.: 502.

Thourout: 375.

Thuin: 466.

Tongerloo: 556, 557. Tournai: 29, 415, 416.

Tragopogon orientalis Linn.: 523.

Turnhout: 2, 9, 449-452.

Utricularia intermedia Hayne: 537, 602.

Vance: 466.

Verbascum Tourn. ex Linn.: 330.

Verviers: 21, 32, 287, 354, 357, 522, 573.

Vesdre (vallée de la): 32, 238, 258, 269, 274, 427, 428, 479, 490-493, 522.

Viel-Salm: 323. Vierset-Barse: 65.

Villance: 5.

Viola lancifolia Thore: 322.

Vireux: 404.

Viroin (vallée du): 6, 404.

Virton: 44, 119, 133, 364, 461, 462, 466, 485.

Visé: 88, 93, 320, 392, 393, 522.

Wavre: 351, 352. Welkenraedt: 511. Westerloo: 556. Ypres: 603.



THALLOPHYTES.

MYCETOZOA.

MONADINEAE.

Monadineae azoosporaceae.

FAM. 1. VAMPYRELLACEAE.

1 LEPTOPHRYS Hertw. et Lesser; Schenk Handb. d. Bot. Bd III, 2, p. 109; Sacc. Syll. Fung. VII p. 458.

1 L. vorax (Cienk.) Zopf; Schenk Handb. d. Bot. Bd. III. 2 (1887) p. 109; Sacc. loc. cit.

Vampyrella - Cienk. in Max Schultze's Archiv I (1865) p. 223, pl. 13 fig. 64-73.

Bt : Etterbeek (J. M.).

MYXOMYCETES.

Plasmodiophorineae.

FAM. 2. PLASMODIOPHORACEAE.

- 1 PLASMODIOPHORA Wor. in Jahrb. für Wiss. Bot. XI (1878) p. 548; Sacc. Syll. Fung. VII p. 464.
- 1 P. Alni (Wor.) Möller in Ber. deutsch. Bot. Gesell. t. III (1885) p. 102; Sacc. Syll. Fung. VII p. 464.

Schinzia - Woron. in Mém. Ac. Sc. St Pétersb. Sér. VII t. X (1866).

Bt: Boitsfort (Gravis).

2 P. Brassicae Woron. in Jahrb. für Wiss. Bot. XI (1878) p. 548; Succ. Syll. Fung. VII p. 464; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 248.

Fl. occ.: St Michel près Bruges (Stues). — Fl. or.: Lemberge, Gand (Staes). — Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Lubbers). — Lg.: Env. de Liége (Gravis).

Myxogastrineae.

FAM. 3. PHYSARACEAE.

1 BADHAMIA Berk, in Ann. nat. Hist. IX (1853) p. 137; Sacc. Syll. Fung. VII p. 329.

1 B. hyalina (Pers.) Berk. in Trans. Linn. Soc. XXI (1854) t. 19 fig. 3; Sacc. Syll. Fung. VII p. 332; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245; Lamb. Fl. myc. III p. 16; Kicke Fl. crypt. II p. 24, sub. Badhausia err. cal.

Physarum - Pers. Tent. disp. method. Fung. (1797), t. 2 f. 4.

Bt: Groenendael, Josaphat, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Winxele (Paque). — Fl. or.: env. de Gand (Coem.).

2 B. utricularis (Bull.) Berk. Trans. Linn. Soc. XXI (1854) p. 153; Sacc. Syll. Fung. VII p. 331; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Sphaerocarpus - Bull. Herb. pl. (1788) t. 417, fig. 1.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 2 PHYSARUM Pers. in Usteri N. Ann. IX (1795) p. 5; Sacc. Syll. Fung. VII, p. 336.
- P. atrum (Pers.) Fr. Syst. Myc. III (1829) p. 147; Sacc. Syll. Fung. p. 351.

Lycogala - Pers. ined. ex Sacc. loc. cit.

Lambotte sine loc.

2 P. cinereum (Batsch) Pers. Syn. Fung. (1801) p. 170; Sacc. Syll. Fung. VII p. 344; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 244. Lycoperdon. — Batsch Elench. Fung. Cont. I p. 249, fig. 169 (1786). Didymium — Fr. Syst. myc. III (1829) p. 126; in Mém. Ac. Belg. (1843)

Badhamia — Kickw (sub. Badhausia err. cal.) Fl. crypt. II p. 25.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.), Uccle (Bm. et R.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Fl. occ.: Env. d'Ypres et de Menin (West.), Thourout (Kickx). — N.: Louette St Pierre (Aub.).

3 P. fimetarium Schum. Enum. plant. Saellandiae II (1803) p. 205; Sacc. Syll. Fung. VII p. 350.

Fl. occ.: Ostende (Él. M.). - Bt : Malaise (Él. M.).

4 P. sinuosum (Bull.) Rost. Sluzowce (Mycet. 1875-1876) p. 112 f. 91; Sacc. Syll. Fung. VII p. 347; Lamb. Fl. myc. III p. 10; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Reticularia — Bull. Herb. Fr. (1789) t. 446 f. 3.

Angioridium -- Grev. Scot. crypt. Fl. (1823-1829) t. 310.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). - Lg.: Liége (Lamb.).

5 P. virescens Ditmar in Sturm Deutschl. Fl. Abth. III (1813-1853) t. 61; Sacc. Syll. Fung. VII p. 341; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 244.

Physarum Ditmari Rost. Monog. App. (1875) p. 8. Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 3 FULIGO *Hall*. Helvet. III (1768) p. 110; Sacc. Syll. Fung. VII p. 353.
- F. septica (Link) Gmel. Syst. nat. (1767) p. 1466; Sacc. loc. cit. p. 353.
 Mucor L. Sp. pl. II (1763) p. 1656.

Aethalium — Fr. Syst. myc. III (1829) p. 93; Kicke Fl. crypt. II p. 20. Fuligo varians Sommerf. Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 231; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245; Lamb. Fl. myc. III p. 15.

Aethalium vaporarium Fr.; Berk. in Gard. Chron. (?) p. 409; Kickw Fl. crypt. II p. 20.

Fl. or.: env. de Wetteren, Jardin bot. de Gand (Kickx). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), Jardin bot. de Bruxelles, env. de Bruxelles (Bm. et R.), Jardin bot. de Louvain (Giele). — Lx.: Waltzing (Paque).

- 4 CRATERIUM Trent. in Roth Catal. bot. II (1800) p. 224; Sacc. Syll. Fung. VII p. 355.
- C. leucocephalum (Pers.) Rost. Monog. (1875) p. 123, fig. 98-100;
 Sacc. Syll. Fung. VII p. 356; Kickw Fl. crypt. II p. 24; Lamb.
 Fl. myc. III p. 12; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245.
 Stemonites Pers. in Gmel. Syst. I (1791) 464.

Fl. occ.: Wytschaete, env. de Courtrai (West.). — Fl. or.: Gontrode (Kickx). Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.).

2 C. minutum (Leers) Fr. Syst. myc. III (1829) p. 151; Sacc. Syll. Fung. VII p. 356; Kickæ Fl. crypt. II p. 23; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245; Lamb. Fl. myc. III p. 12.

Peziza — Leers Fl. Herbornensis (1775) n. 1085.

Flandres (Kick). — Bt: Watermael (Bm. et R).

3 C. pedunculatum Trent. in Roth Catal. bot. II (1800) p. 224; Sacc. Syll. Fung. VII p. 355.

Craterium vulgare Ditm. apud Sturm Deutsch. Fl. III (1813) pl. 9; Lamb. Fl. myc. III p. 12.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

- 5 LEOCARPUS Link in Berl. Mag. III (1809) p. 25; Sacc. Syll. Fung. VII p. 358.
- 1 L. fragilis (Dicks.) Rost. Monog. (1875) p. 132; Sacc. Syll. Fung. VII p. 358; Lamb. Fl. myc. III p. 14; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux., p. 245.

Lycoperdon - Dicks. Fl. Crypt. Brit. (1785) pl. 3 fig. 6.

Leocarpus vernicosus Link Diss. I (1795) 25; Kicka Fl. crypt. II p. 25. Diderma — Pers. Obs. myc. (1796) t. III f. 7.

Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx). — Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

- 6 TILMADOCHE Fr. Summa Veg. Scand. II (1849) p. 454; Sacc. Syll. Fung. VII p. 359.
- 1 T. nutans (Pers.) Rost. Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 127, f. 129; Sacc. Syll. Fung. VII p. 359; Lamb. Fl. myc. III p. 14; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Physarum — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 171.

Bit: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 T. viridis (Gmel.) Sacc. Mich. II (1881) p. 263 et Syll. Fung. VII p. 360; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Stemonitis - Gmel. Syst. nat. II (1767) 1469.

Physarum aureum Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. 1 f. 6.

Tilmadoche mutabilis Rost. Monog. (1875) p. 130, fig. 123, 127, 132;
Lamb. Fl. myc. III p. 13.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

FAM. 4. DIDYMIACEAE.

1 CHONDRIODERMA Rost. Monog. (1875) p. 167; Sacc. Syll. Fung. VII p. 362.

 C. calcareum (Link) Rost. Monog. (1875) p. 129; Sacc. Syll. Fung. VII p. 370.

Leocarpus - Link Diss. I (1795) p. 23.

Diderma liceoides Fr. Syst. myc. III (1829) p. 107.

Bt: Gentianes (de Limm.).

2 C. difforme (Pers.) Rost. Monog. (1875) p. 177, f. 137, 164-165; Sacc. Syll. Fung. VII p. 371; Lamb. Fl. myc. III p. 21; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Diderma - Pers. Tent. meth. disp. Fung. (1797) p. 9.

Diderma cyanescens Fr. Syst. myc. III (1829) p. 109.

Physarum album Fr. Syst. myc. III (1829) p. 147; Kicke Fl. crypt. II p. 22. Diderma nitens Klotzsch in Hook. Herb. Engl. Fl. V p. 312.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Louvain (Paque). — N.: Louette-S'-Pierre (Aub.). — Flandres (Kickx).

3 C. globosum (Pers.) Rost. Monog. (1875) p. 180, fig. 138; Sacc. Syll. Fung. VII p. 370; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 246; Lamb. Fl. myc. III p. 22.

Diderma — Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. 1 fig. 4-5; Kickx Fl. de Louvain p. 144; Kickx Fl. crypt. II, p. 21.

Fl.or.: Oostacker (Kickx). — Bt: Watermael (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.)

4 C. Michelii (Lib.) Rost. in Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 74; Sacc. Syll. Fung. VII p. 367; Bomm. et Rouss. Fl. myc. III p. 21. Didymium — Lib. Crypt. Ard. n. 180.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

5 C. testaceum (Schrad.) Rost. Monog. (1875) 177; Sacc. Syll. Fung. VII, p. 369.

Didymium - Schrad. Nov. gen. pl. (1797) p. 25 t. V fig. 1-2.

Diderma - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 166.

Bi: Bois de la Cambre (West. et Van Haes.).

- 2 DIDYMIUM Schrad. Nov. gen. pl. I (1797) p. 375; Sacc. Syll. Fung. VII p. 375.
- 1 D. clavus (Alb. et Schwein.) Rost. Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 153; Sacc. Syll. Fung. VII p. 377; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245; Lamb. Fl. myc. III p. 19.

Physarum — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) t. 2 f. 2.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

2 D. farinaceum Schrad. Nov. gen. plant. I (1797) t. 3 f. 6; Sacc. Syll. Fung. VII p. 381; Kickx Fl. crypt. II p. 22; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245; Lamb. Fl. myc. III p. 18.

Didymium melanopus Fr. Syst. myc. III (1829) p. 116; Kickw Fl. crypt. II p. 22.

D. hemisphaericum Fr. Syst. myc. III (1829) p. 115.

Fi. or.: env. de Gand (Coemans). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Corbeek-Loo, Pellenberg (Paque).

- 3 D. furfuraceum Fr. Syst. myc. III (1829) p. 116.

 Physrum Schum. Enum. plant. Saell. II (1803) p. 204.

 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 4 D. microcarpon (Fr.) Rost. Monog. (1875) p. 156 f. 133, 177; Sacc. Syll. Fung. VII p. 382; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245; Lamb. Fl. myc. III, p. 18.

Physarum microcarpon Fr. Symb. Gast. (1817-1818) p. 23.

Didymium Xanthopus Fr. Syst. myc. III (1829) p. 120; Kickv Fl. crypt. II p. 21.

Didymium nigripes Fr. Syst. myc. III (1829) p. 119; Kicke loc. cit. Flandres (Kicke). — Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 5 D. Serpula Fr. Syst. myc. III (1829) p. 126; Sacc. Syll. Fung. VII p. 376; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux., p. 245.
 - Didymium complanatum Rost. Sluzowce (Mycetozoa 1875-1876) p. 151. f. 166, 180; Lamb. Fl. myc. III, p. 20.

Bi: bois de la Cambre (Bm. et R.).

6 D. squamulosum (Alb. et Schwein.) Fr. Syst. myc. III (1829)

p. 118; Sacc. Syll. Fung. VII p. 377; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245; Lamb. Fl. myc. III p. 19.

Diderma - Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 88 pl. IV f. 5.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 3 LEPIDODERMA DBy in Rost. Monog. (1875) p. 188; Sacc. Syll. Fung. VII p. 387.
- L. carestiana (Rabenh.) Rost. Monog. (1875)p. 188; Sacc. Syll. Fung. p. 387.

Reticularia — Rabenh. in Fung. Eur. exsicc. n. 436; Lamb. Fl. myc. III, p. 36.

Lb.: Kerkhove (West. et Tosquinet).

FAM. 5. SPUMARIACEAE.

- 1 DIACHAEA Fr. Nov. fl. Suec. V (1819) p. 80; Sacc. Syll. Fung. VII p. 367.
- D. leucopoda (Bull.) Rost. Monog. (1875) p. 191, f. 158, 172, 175;
 Sacc. Syll. Fung, VII p. 387; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 246; Lamb. Fl. myc. III, p. 22.

Trichia - Bull. Herb. Fr. (1798) t. 502, f. 2.

Diachaea elegans Fr. Stirp. agri Femsoniensis (1825-1826) p. 84; Kickx Fl. crypt. II p. 27.

fl. occ.: Courtrai (Wall.). — Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 2 SPUMARIA Pers. Syn. Fung. (1801) p. 162; Sacc. Syll. Fung. VII p. 388.
- 1 S. alba (Bull.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 261; Sacc. Syll. Fung. VII p. 389; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 246; Lamb. Fl. myc. III, p. 24.

Reticularia alba Bull. Herb. Fr. (1786) t. 326.

Spumaria mucilago Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. 1, f. a, b, c. Kickw Fl. crypt. II, p. 20.

Bt: Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre (Bm. et R.); Héverlé (Paque).—Fl. occ.: entre Ostende et Nieuport (West.), Mariakerke (V. Bambeke). —Fl. or.: Destelbergen, Audenarde (Kickx).

FAM. 6. STEMONITACEAE.

- 1 LAMPRODERMA Rost. Vers. Syst. Mycet. (1873) p. 7; Sacc. Syll. Fung. VII p. 390.
- L. physaroides (Alb. et Schw.) Rost. Sluzowce (Mycet.) (1875-1876)
 p. 202; Sacc. Syll. Fung. VII p. 591; Lamb. Fl. myc. III p. 28.
 Stemonitis Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) t. 11, fig. 8; Kickw
 Fl. crypt. II, p. 28.

Fl. or .: Gand (Coemans).

- 1 COMATRICHA Preuss in Linnaea XXIV (1851) p. 140; Sacc. Syll. Fung. VII p. 394.
- C. Friesiana (DBy) Rost. Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 199,
 f. 51, 56; Sacc. Syll. Fung. VII p. 395; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 246. Lamb. Fl. myc. III p. 27.

Stemonitis - DBy in Rabenh. Fungi Eur. n. 568.

Stemonitis ovata Pers. Syn. Fung. (1801) p. 189; Kickv Fl. crypt. II, p. 18.

Stemonitis obtusata Fr. Symb. Gaster. (1817-1825) p. 17.

Flandres (Kickx). - Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 C. pulchella (Bab.) Rost. Monog. suppl. (1875) p. 27; Sacc. Syll. Fung. VII p. 395; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 146. Stemonitis — Bab. in Trans. Linn. Soc. (1839).

Bi: env. de Bruxelles, AC. (Bm. et R.).

3 C. typhina (Roth) Rost. Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 198, fig. 46-47; Sacc. Syll. Fung. VII p. 394; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 246; Lamb. Fl. myc. III p. 26.

Stemonitis - Roth Tent. Fl. germ. I (1783) p. 547.

Stemonitis typhoides DC. Fl. fr. II (1805) p. 257; Kickw Fl. crypt. II p.28. Flandres (Kickw). — Bt: Laeken, Boitsfort (Bm. et R.). — N.: Louette St Pierre (Aub.).

- 3 STEMONITIS *Gled.* in Mem. Ac. Berl. 1749 (1751) p. 135 et Meth. Fung. p. 140; Sacc. Syll. Fung. VII p. 397.
- 1 S. ferruginea Ehrenb. Sylv. myc. Berol. (1818) p. 20, f. VI A, B; Sacc. Syll. Fung. VII p. 398; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 246; Lamb. Fl. myc. III p. 25.

Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 S. fusca Roth Tent. Fl. Germ. I (1788) p. 448; Sacc. Syll. Fung VII p. 397; Kickw Fl. crypt. II p. 28; Lamb. Fl. myc. III p. 25; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 246.

Bt: La Hulpe, bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — N.: Champion (Bell.).

FAM. 7. AMAUROCHAETACEAE.

- 1 AMAUROCHAETA Rost. Vers. Syst. Mycet. (1873) p. 8; Sacc. Syll. Fung. VII p. 401.
- 1 A. atra (Alb. et Schwein.) Rost. Monog. (1875) p. 210 fig. 67; Sacc. Syll. Fung. VII p. 401; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 246; Lamb. Fl. myc. III p. 29.

Lycogala - Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 83.

Bt: Rhode St Genèse, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

FAM. 8. BREFELDIACEAE.

1 BREFELDIA *Rost.* Vers. Syst. Mycet. (1873) p. 8; Sacc. Syll. Fung. VII p. 402.

1 B. maxima (Fr.) Rost. Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 213; f. 60, 65-66, 69; Sacc. Syll. Fung. VII p. 402; Lamb. Fl. myc. III p. 30.

Reticularia - Fr. Syst. myc. III (1829) p. 85.

Bi: Boitsfort (Bm. et R.).

FAM. 9. LICEACEAE.

1 TUBULINA Pers. Syn. Fung. (1801) p. 197; Sacc. Syll. Fung. VII p. 406.

 T. eylindrica (Bull.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 249; Sacc. Syll. Fung. VII p. 406; Lamb. Fl. myc. III p. 31.

Sphaerocarpus -- Bull. Herb. Fr. (1789) t. 470 f. 3.

Bt: Gentinues (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). - N.: St Servais (Bell.).

FAM. 10. CLATHROPTYCHIACEAE.

- 1 CLATHROPTYCHIUM Rost. Monog. (1875); Sacc. Syll. Fung. VII p. 408.
- C. rugulosum (Wallr.) Rost. Monog. (1875) p. 225, fig. 25, 28-30;
 Sacc. Syll. Fung. VII p. 408; Lamb. Fl. myc. III p. 53.

Licea - Berk., cfr. Sacc. loc. cit.

Bt: La Hulpe (Bm. et R.).

- 2 ENTERIDIUM Ehrenb. Sylv. myc. Berol. (1818) p. 14; Sacc. Syll. Fung. VII p. 409.
- 1 E. olivaceum Ehrenb. Sylv. myc. Berol. (1818) p. 54, fig. 1, 5 A, E; Sacc. Syll. Fung. VII p. 409; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 246; Lamb. Fl. myc. III p. 32.

Reticularia applanata Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. t. II. f. 3.

Bt: Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

FAM. 11. CRIBRARIACEAE.

- 1 DICTYDIUM Schrad. Nov. gen. plant. I (1797) p. 11; Sacc. Syll. Fung. VII p. 410.
- 1 D. cernuum (Pers.) Nees Syst. d. Pilze (1816) p. 117; Succ. Syll. Fung. VII p. 411; Lamb. Fl. myc. III p. 34; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 246.

Cribraria cernua Pers. Obs. I (1796) 91.

Dictydium umbilicatum Schrad. Nov. gen. pl. I p. 11 (1797), t. 4 f. 1; Kickv Fl. crypt. 11. p. 25.

FI. or.: env. de Gand (Donkelaer). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Auderghem (Bm. et R.). — N: Louette St Pierre (Aub.).

- 2 CRIBRARIA Pers. Syn. Fung. (1801) p. 192; Sacc. Syll. Fung. VII p. 412.
- 1 C. aurantiaca Schrad. Nov. gen. pl. (1797) p. 5, t. 1 fig. 3-4; Sacc. Syll. Fung. VII p. 413; Lamb. Fl. myc. III p. 35.

 Bt: Héverlé (Paque).

FAN. 12. RETICULARIACEAE.

- 1 RETICULARIA Bull. Champ. p. 85; Sacc. Syll. Fung. VII p. 418.
- 1 R. Lycoperdon Bull. Champ. (anno?) p. 95, t. 446 f. 4 et t. 476 f. 1-3; Sacc. Syll. Fung. VII p. 418; Lamb. Fl. myc. III p. 36. Reticularia umbrina Fr. Syst. myc. III (1829) p. 87; Kickv Fl. crypt. II, p. 19; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux., p. 246.

Fl. or.: env. de Gand (Manderlier). — A.: Citadelle d'Anvers (West. et Van Haes.). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et B.), Corbeek-Dyle (Paque).

2 R. versicolor Fr. Syst. myc. III (1829) p. 90.

Fl. occ.; Menin (West.). - N.: Louette St Pierre (Aub.).

FAM. 43. PERICHAENACEAE.

- 1 PERICHAENA Fries Symb. Gaster. (1817) p. 9; Sacc. Syll. Fung. VII p. 420.
- 1 P. corticalis (Batsch) Rost. Monog. (1875) p. 293; Sacc. Syll. Fung. VII p. 420; Lamb. Fl. myc. III p. 37.

Lycoperdon - Batsch Elench. Fung. (1723) p. 155.

Licea circumscissa Pers. Syn. Fung. (1801) p. 196.

Perichaena populina Fr. Symb. Gast. (1817) 12; Kickv Fl. crypt. II p. 23; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 247.

Fl. occ.; Ypres (Kickx). — Fl. or.; env. de Gand (Kickx). — Bt; Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Forêt de Soignes (West. et Van Haes.).

FAM. 14. ARCYRIACEAE.

- 1 ARCYRIA Hill Hist. of pl. (1751) p. 47; Sacc. Syll. Fung. VII p. 425.
- 1 A. adnata (Batsch) Rost. Sluzowce Add. (1875-1876) p. 36; Succ. Syll. Fung. VII p. 428; Kickx Fl. de Louvain p. 142; Kickx Fl. crypt. II p. 26; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 247; Lamb. Fl. myc. III, p. 44.

Clathrus adnatus Batsch Elench. Fung. (1783) p. 141. Arcyria incarnata Pers. Obs. myc. I (1796) p. 58, t. 5, f. 4-5;

Fl. or.: Sleydinge (Kickx). - Bt: Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

2 A. cinerea (Bull.) Schum. Enum. Plant. Saell. (1801); Sacc. Syll. Fung. VII p. 427; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 247; Lamb. Fl. myc. III p. 45.

Trichia - Bull. Herb. Fr. t. 477 (1789) f. 3.

Bt: bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 3 A. Friesii Berk et Br. in Ann. Nat. Hist. n. 1602; Sacc. Syll. Fung. VII p. 432; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 247. Bt: Groenendael, Rixensart (Bm. et R.).
- 4 A. nutans (Bull.) Grev. Fl. Edinensis (1824) p. 455; Sacc. Syll. Fung. VII p. 429; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 247; Lamb. Fl. myc. III p. 44.

Trichia - Bull. Herb. Fr. (1790) t. 502, f. 3.

Arcyria straminea Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 383.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — N.: St Servais (Bell.).

5 A. punicea Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 10; Sacc. Syll. Fung. VII p. 426; Kickw Fl. de Louvain p. 142; Kickw Fl. crypt. II p. 26; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 247; Lamb. Fl. myc. III p. 43.

FI. or.: env. de Gand (Coemans). — Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N.: Amée (Bell.), Louette St Pierre (Aub.).

- 2 LYCOGALA Micheli Nov. pl. gen. (1729) p. 245; Sacc. Syll. Fung. VII p. 435.
- 1 L. epidendrum (Buxb.) Fr. Syst. myc. III (1829) p. 80; Kickx Fl. crypt. II p. 18; Sacc. Syll. Fung. VII p. 435; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 247; Lamb. Fl. myc. III p. 46.

Lycoperdon — Buxb. Enum. pl. Hall. (1721) p. 203.

Fl. occ.: Ypres (West.). — Fl. occ.: env. de Gand, d'Audenarde et d'Eccloo (Kickx). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenenduel, Uccle, Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — N.: St Servais (Bell.), Monceau (Aub.).

FAM. 15. TRICHIACEAE.

- 1 TRICHIA Haller Helv. III (1768) p. 114; Sacc. Syll. Fung. VII p. 439.
- 1 T. chrysosperma (Bull.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 250; Sacc. Syll. Fung. VII p. 443; Kickx Fl. crypt. II p. 17; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 247; Lamb. Fl. myc. III p. 40.

T. chrysosperma var. epiphylla Kicka loc. cit.

- Trichia turbinata With. Bot. Arr. IV 480; Kicka Fl. crypt. II p. 26; Bomm. et Rouss. Fl. myc. Brux. p. 247.
- N.: Salzinne (Bell.). Flandres (Kickx). Bi: env. de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Louvain. Fl. occ.: Menin (West.).
- 2 T. fallax Pers. Obs. I (1796) p. 59, t. III f. 4-5; Sacc. Syll. Fung. VII p. 439; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 246; Lamb. Fl. myc. III p. 38.
 - Bt: Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 3 T. fragilis (Sow.) Rost. Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1873) p. 246, f. 203-204, 225-226; Sacc. Syll. Fung. VII p. 440; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 246; Lamb. Fl. myc. III p. 39. Sphaerocarpus Sow. t. 279.
 - Bt: Env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 4 T. varia Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 10; Kickv Fl. crypt. II p. 26; Sacc. Syll. Fung. VII p. 442; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 249; Lamb. Fl. myc. III p. 39.
 - Fl. or.: env. de Gand (Kickx).—N.: Louette S^t Pierre (Aub.).— Bl: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Vieux-Héverlé (Paque).
 - var. fimicola El. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. XXXIV part. 1 (1896) p. 133.
 Bt: Limelette (Él. M.).
 - 2 HEMIARCYRIA Rostaf. Monog. (1875) p. 261; Sacc. Syll. Fung. VII p. 446.
- H. clavata (Pers.) Rostaf. Monog. (1875) p. 207; Sacc. Syll. Fung. VII p. 447; Lamb. Fl. myc. III p. 41.

Trichia - Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 11.

- A.: Citadelle d'Anvers (West. et Van Haes).
- 2 H. rubiformis (Pers.) Rost. Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 262 fig. 201, 230-231; Sacc. loc. cit. p. 447; Lamb. Fl. myc. III p. 41.

Trichia — Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. I f. 3, t. IV f. 3; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 247.

Trichia Neesiana Corda Icon. Fung. I (1837) f. 288 c.

- Bt: Notre-Dame-de-Bonne Odeur (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). N.: St Servais (Bell.). Fl. occ.: Bois St Anne près Courtrai (West.).
- 3 H. serpula (Scop.) Rost. Monog. (1875) p. 267; Sacc. loc. cit. p. 448; Lamb. Fl. myc. III p. 42.

Trichia - Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 10.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

Acrasiineae.

FAM. 16. DICTYOSTELIACEAE.

- 1 DICTYOSTELIUM Bref. in Abh. d. Senckenb. naturf. Ges. VII (1869); Sacc. Syll. Fung. VII p. 451.
- 1 D. sphaerocephalum (Oud.) Sacc. et March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. XXIV part. 1 (1885) p. 74; Sacc. Syll. Fung. VII p. 452.

Hyalostilbum — Oudem. Aanwinst. Fl. myc. v Nederland X (1885). Bi: Bruxelles (Él. M.).

2 D. mucoroides Bref. loc. cit. (1869) pl. IV fig. 27-29; Coem. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XVI; Sacc. loc. cit. Sur un Polyporus pourrissant (Él. M.).

ALGAE.

SCHIZOPHYTA.

SCHIZOPHYCEAE.

FAM. 1. CHROOCOCCACEAE.

1 CLATHROCYSTIS Henfrey in Micr. Journ. n. 16 (1856) p. 49; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 445.

1 C. roseo-persicinus Cohn Beitr. z. Biol. d. Pflanz. (1876) pl. 6, fig. 1-10; De Wild. loc. cit.

Pleurococcus — Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1864) p. 28.

Bt: Evere (Nob.).

2 C. aeruginosa (Kuetz.) Henfr. loc. cit. (1856) p. 53, pl. 4, fig. 28-36.
 Micraloa — Kuetz. in Linnaea VIII (1833) p. 371.
 Lb.: Kinroy (J. M.).

2 PORPHYRIDIUM Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849) p. 71; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 445.

1 P. cruentum Naeg. loc. cit. (1849) pl. 4 H; De Wild. loc. cit.

Palmella - Ag. Syst. Alg. (1824) p. 15.

Chaos sanguinarius - Bory (ubi?).

Ht: env. de Tournai (Marissal). — Bt: env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Nob.). — A.: Anvers (Jard. Bot.) (West. et Van Haes). — Lg.: Spa (Nob.), Liége (Lejeune).

3 COELOSPHAERIUM Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849) p. 54; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 446.

1 C. Kuetzingianum Naeg. loc. cit. (1849) p. 54, pl. 1 C; De Wild. loc. cit.

N.: Walzin (Él. M.). - Lb.: Genck (J. M.).

4 GOMPHOSPHAERIA Kuetz. in Linnaea XVII (1843) p. 84; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 446.

1 G. aponina Kuetz. Tab. Phyc. I (1845) pl. 81, fig. 3; De Wild. loc. cit. Bt: Bergh, Evere (Nob.).

- 5 MERISMOPEDIA Meyen in Wiegm. Arch. f. Naturg. II (1839) p. 67; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 446.
- 1 M. glauca Naeg. Einz. Alg. (1849) pl. 1 D 1; De Wild. loc. cit.

A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.).—Fl.or.: Kraenepoel (L. G.).—N.: Walzin, Leffe (Él. M.).— Lg.: env. de Spa, La Reid. Winamplanche, Polleur, Stavelot (Nob.).—Ht: Belæil (Nob.).—Bt: Bergh (Nob.).—Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

- 6 APHANOTHECE Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849) p. 59; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 447.
- 1 A. stagnina (Spreng.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. II (1864) p. 66; De Wild. loc. cit.

Coccochloris — Spreng. Syst. veg. IV (1829) p. 372; Kickx Fl. crypt. II, p. 438.

Fl. or. : entre Gand et Tronchiennes (Scheidweiler).

FAR. 2. OSCILLARIACEAE.

- 1 LYNGBYA Ag. Syst. Alg. (1824) p. XXV; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 463; Gomont Monog. Oscill. p. 139.
- 1 L. ochracea Thur. in Ann. sc. nat. ser. 6 Bot. I (1875) p. 279; De Wild. loc. cit.
 - Lieg.: Ardennes (coll. Libert), se trouve certainement dans la province de Liége.
 - 2 PHORMIDIUM Kuetz. Phyc. generalis (1843) p. 190; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 464; Gomont Monog. Oscill. p. 176.
- 1 P. autumnale (Ag.) Gomont Monog. Oscill. (1896) p. 208, pl. V fig. 23-24; De Wild. loc. cit. p. 465.

Oscillatoria — Ag. Dispositio Alg. Sueciae (1812) p. 36.

Chtonoblastus Vaucheri in West. et Wall. Herb. n. 598; Kicka Fl. crypt. II p. 436.

Belgique (West.). - N.: Gembloux (Él. M.).

2 P. favosum (Bory) Gomont Monog. Oscill. (1893) p. 200, pl. V fig. 14-15; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 464, fig. 108.

Oscillaria — Bory Dict. class. d'hist. nat. t. XII (1827) p. 466.

Lg.: Chaudfontaine (Bory).

- 3 P. inundatum Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 251; De Wild. loc. cit. p. 464; Gomont loc. cit. p. 192, pl. IV, fig. 31-32.
 Lg.: près de Spa (Bory).
- 4 P. uncinatum (Ag.) Gomont in Morot Journ. de Bot. IV (1890) p. 355; Monog. Oscill. p. 204, pl. V fig. 21-22; De Wild. loc. cit. p. 484.

- 3 OSCILLATORIA Vauch. Histoire des Conf. d'eau douce (1803) p. 165; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 465; Gomont Monog. Oscill. p. 218.
- 1 0. Boryanae Bory Dict. class. d'hist. nat. XII (1827) p. 465; De Wild. loc. cit. p. 467; Gomont Monog. Oscill. p. 255, pl. VII fig. 22-23.

Bt: St Josse ten-Noode (Bory).

2 0. formosa Bory Dict. class. d'hist. nat. XII (1827) p. 274; De Wild. loc. cit. p. 467; Gomont Monog. Oscill. p. 250, pl. VII fig. 16.

Lg.: Près de Liége (Bory).

- 3 0. limosa Ag. Disp. Alg. Suec. (1812) p. 25; De Wild. loc. cit. p. 466, fig. 109; Gomont Monog. Oscill. p. 230.

 Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).
- 4 0. Okeni Ag. in Flora X (1827) p. 633; De Wild. loc. cit. p. 467; Gomont Monog. Oscill. p. 252 pl. VII fig. 18.

 Lg.: Thermes près de Liége (Bory).
- 5 O. princeps Vauch. Hist. des Conf. d'eau douce (1803) p. 190 pl. fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 465; Gomont Monog. Oscill. p. 226.
 Lg.: Genck (J. M.). Bt: Bergh (Nob.).
- 6 0. tenuis Ag. Alg. decades II (1813) p. 25; De Wild. loc. cit. p. 466; Gomont Monog. Oscill. p. 240. Oscillatoria — Ag. in Flora X (1827) p. 631. Belgique (Bory).

FAM. 3. NOSTOCACEAE.

- 1 NOSTOC Vauch. Hist. des Conferves d'eau douce (1803) p. 203; De Wild. loc. cit. p. 455; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. 1V, p. 181.
- 1 N. caeruleum Lyngb. Hydrophyt. danicae (1819) p. 201 pl. 68 fig. B; Kickx Fl. crypt. II p. 430 et West. et Wall. Herb. n. 730; De Wild. loc. cit. p. 459; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. IV p. 213.

Fl. or.: env. de Gand (Scheidweiler).

2 N. carneum Ag. Syst. Alg. (1824) p. 22; De Wild. loc. cit. p. 457; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. IV p. 196.

N. verrucosum Vauch, ex West, et Wall. Herb. crypt, n. 787.

Fl. occ.: Ostende (Mac-Leod). - Fl. or.: Eyne (Nob.).

3 N. commune Vauch. Hist. d. Conf. d'eau douce (1803) p. 222, pl. 16 fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 458.

Bt: St Gilles (P. et M.), Eegenhoven, remparts de Louvain (Paque), Schaerbeek (Nob.). — Fl. or.: Eyne (Nob.). — Ht: env. de Charleroy (Tosquinet). — Lg.: Jehay-Bodegnée. Ahin, Tihange, Ombret, Clavier, Modave, Barse (M. et C.), Spa, Polleur, Tilf (Nob.). — N.: Yvoir (Nob.), env. de Namur (Bell.), Malonne (Nob.), Louette St Pierre (Gravet).

- 4 N. cuticulare Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. IV (1888) p. 187; De Wild. loc. cit. p. 456.
 - Fl. or.: Denderwindeke (V. W.). A.: Austruweel (Nob.).
- 5 N. humifusum Carm. sec. Harv. in Hook. Brit. Flora II (1833); De Wild. loc. cit. p. 457; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. IV p. 201.

N.: Vallée de la Lesse (Flahault).

- 6 N. Linckia Born. in Born. et Thuret Notes alg. (1880) p. 86, pl. 18 fig. 1-2; De Wild. loc. cit. p. 456; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér, IV p. 192.
 - A: Austruweel (Nob.). Fl. or.: Eyne (Nob.). Fl. occ.: Ypres (Flahault). Lb.: Kessenich (J. M.).
- 7 N. microscopieum Carm. ex Harv. in Hook. Brit. Fl. V (1835) p. 399; De Wild. loc. cit. p. 458; Born. et Fluh. Rev. Nost. Hétér. IV p. 210.

Bt.: env. de Bruxelles R. (Nob.).

- 8 N. muscorum Ag. Disp. Alg. Suec. (1812) p. 44; De Wild. loc. cit. p. 457; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. IV, p. 200. Recueilli par Scheidweiler, sans indication de localité.
- N. rivulare Kaetz. Tab. phyc. II (1850) p. 3, pl. 10 fig. III; De Wild. loc. cit. p. 456; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. IV p. 195.
 A.: Austruweel (Nob.). Fl. or.: Denderwindeke (V. W.).
- 10 N. sphaericum Vauch. Hist. des Conf. d'eau douce, (1803) p. 223 pl. XVI fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 458.

Nostoc lichenoides Desm. ex Kickw Fl. crypt. II p. 480 et West. et Wall. Herb. n. 730.

- Fl. occ.: Nieuport (West.). Bt: Neder-over-Heembeek (Nob.).
 - 2 ANABAENA Bory Diet. class. d'hist. nat. (1822) p. 307; De Wild. loc. cit. p. 459; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. IV p. 224.
- 1 A. oscillarioides Bory loc. cit. (1822) p. 308; De Wild. loc. cit. p. 459; Born. et Flah. loc. cit. p. 233.
 - Fl. or.: env. de Gand (Bory). Ht: Blicquy (G. L.). Lg.: Ru de Chefna (La Reid) (Nob.).

- 2 A. variabilis Kuetz. Phyc. general. (1843) p. 210; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 460; Born. et Flah. Nost. hétér. IV p. 226.

 Lg.: entre Winamplanche et Spa (Nob.).
 - 3 APHANIZOMENON Morren in Mém. Acad. Belgique XI (1838) p. 11; De Wild. Fl. Alg. Belg. 460; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. IV p. 241.
- 1 A. incurvuum Morren loc. cit. (1838); De Wild. loc. cit.; Born. et Flah. loc. cit.

Flandres (Morren).

- 4 NODULARIA Mertens in Jurgens Alg. aquatic. dec. XV (1822) n. 4; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 461; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. IV p. 243.
- 1 N. sphaerocarpa Born, et Flah. Rev. Nost. hétér. IV (1888) p. 245; De Wild, loc. cit.

Fl. or.: env. de Gand (Bory).

- 5 CYLINDROSPERMUM Kuetz. Phyc. general. (1843) p. 211; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 461.
- C. humicola Kuetz. Phyc. general. (1843) p. 212; De Wild. loc. cit. p. 462.
 - Bt: Louvain (Paque); Jardin bot.de Bruxelles (Nob.). FI. or.: Eyne (Nob.). Lg.: Spa (Nob.).
- 2 C. licheniforme Kuetz. in Bot. Zeit. (1847) p. 197; Kickx Fl. crypt. II p. 432; De Wild. loc. cit. p. 462; Born. et Fluh. Rev. Nost. hétér. IV p. 253.

Fl. occ.: Ostende (Mac-Leod). — Lg.: Tiége, Wayai (Nob.). — Lb.: Kessenich (J. M.).

- 3 C. majus Kuetz. Phyc. general, (1843) p. 212; De Wild. loc. cit p. 462; Born. et Flah. loc. cit. IV p. 252.
 Fi. or.: Eyne (Nob.).
- 4 C. muscicola Kuetz. Phyc. Germ. (1845) p. 173; De Wild. loc. cit. p. 462; Born. et Flah. loc. cit. IV p. 254.

 Bt: St Josse-ten-Noode (Nob.).
- 5 C. stagnale (Kuetz.) Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. IV (1388) p. 250; De Wild. loc. eit. p. 461.

Anabaena — Kuetz. Phycol. general. (1843) p. 210; Kicke Fl. crypt. II p. 431.

Cylindrospermum macrospermum Kuetz. Phyc. Germ. (1845) p. 173.

Bt: Etterbeek, Boitsfort (P. et M.). — Fl. or.: Leupeghem (Nob.). — Lg.: Stoumont, ru de Chefna (La Reid), Barisart, route de La Gleize (Spa) (Nob.).

FAM. 4. SCYTONEMACEAE.

- 1 SCYTONEMA Ag. Syst. Alg. (1824) p. 26; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 453; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. III p. 85.
- S. Hoffmanni Ag. Syn. Alg. Suec. (1817) p. 117; De Wild. loc. cit.
 p. 454; Born. et Flah. loc. cit. III p. 97.
 - N.: env. de Dinant (Gravet, Tonglet). Bi: Jard. bot. de Brux. (Nob.). Fl. or.: Jard. bot. de Gand (Nob.). Lg.: Jard. bot. de Liége (Nob.).
- 2 S. myochrous Ag. Disp. Alg. Succ. (1812) p. 38; De Wild. loc. cit. p. 453; Born. et Flah. loc. cit. III p. 104.
 Lg.: entre Spa et Malchamp (Nub.).
 - 2 TOLYPOTHRIX Kuetz. Phyc. general. (1843) p. 227; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 454; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér, III p. 118.
- T. distorta Kuetz. Phyc. general. (1843) p. 228; Born. et Flah. loc. cit. III p. 119.
 Lb.: Genck (J. M.).
- 2 T. lanata Wartm. in Rabenh. Alg. (1858) n. 768 et Fl. Eur. Alg. II p. 277; De Wild. loc. cit. p. 454; Born. et Flah. loc. cit. p. 120. A.: Calmpthout (Nob.). Ht. Belœil (Nob.). Lb.: Kessenich (J. M.).
- 3 T. tenuis Kuetz. Phyc. general. (1843) p. 228; De Wild. loc. cit. p. 455; Born. et Flah. loc. cit. p. 122.
 - Fl. or.: env. de Gand (Flahault). Fl. occ.: Ypres (Flahault). A.: env. d'Anvers (Nob.). Lb.: Genck (Nob.). Bt: Bergh, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). Lg.: entre Malchamp et Nivezé (Sart), ru de Chefna (La Reid) (Nob.).

FAM. 5. SIROSIPHONACEAE.

- 1 HAPALOSIPHON Naeg. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 894; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 452; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. III p. 54.
- 1 H. pumilus Kirchn. Kryptog. Fl. v. Schlesien (1878) p. 231; De Wild. loc. cit.; Born. et Flah. loc. cit. p. 61.
 - A.: Calmpthout (Nob.). Lb.: Genck (Nob.); Kinroy, Molenbeersel (J. M.). Lg.: entre Malchamp et Nivezé (Sart) (Nob.).
 - 2 STIGONEMA Ag. Syst. Alg. (1824) p. XX; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 452; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. III p. 62.
 - S. informe Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 319; De Wild. loc. cit. p. 452; Born. et Flah. loc. cit. p. 75.

N.: Vallée de la Lesse (Flahault).

- 2 S. ocellatum Thur. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 380; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 453; Born. et Flah. Rev. Nost.hétér. III. p. 69.
 - A.: Calmpthout (Nob.). Lb.: Genck (Nob.).
- 3 S. panniforme (Ag.) Born. et Flah. loc. cit. (1887) p. 71.

Scytonema - Ag. Syn. Alg. Scand. (1817) p. 116.

Lb. : Molenbeersel (J. M.).

FAM. 6. RIVULARIACEAE.

- 1 CALOTHRIX Ag. Syst. Alg. (1824) p. XXIV; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 448; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. I p. 345.
- C. fusca (Kuetz.) Born. et Flah. loc. cit. (1886) p. 364; De Wild. loc. cit. p. 449.

Mastichothrix — Kuetz. Phyc. general. (1843) p. 232.

- Bt: Bergh. (L. G.). Lt.: Genck (Nob.). Lg.: entre Malchamp et Nivezé (Sart), ru de Chefna (La Reid) (Nob.).
- 2 C. parietina (Naeg.) Thur. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 381; De Wild. loc. cit. p. 449; Born. et Flah. loc. cit. p. 366. Schizosiphon — Naeg. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 307.

Lx.: Maissin (A. D.), Villance (L. M.).

3 C. pulvinata Ag. Syst. Alg. (1824) p. 71; De Wild. loc. cit. p. 448; Born. et Flah. loc. cit. p. 356.

Calothrix pannosa West, et Wall. Herb. crypt. p. 734.

Fl. occ.; La Panne (West.).

4 C. scopulorum Ag. Syst. Alg. (1824) p. 70; De Wild. loc. cit. p. 449; Born. et Flah. loc. cit. p. 353.

FI. occ.: Ostende (Flahault).

- 2 RIVULARIA Ag. Syst. Alg. (1824) p. 19; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 450; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. II p. 345.
- 1 R. atra Roth Catal. bot. III (1806) p. 340; De Wild. loc. cit. p. 450; Born. et Fluh. loc. cit. p. 353.

Euactis atra West. in Herb. crypt. n. 726 et 785.

Fl. occ.: Blankenberghe (West.).

2 R. bullata (Pairet) Berk. Glean. of Brit. Alg. (1833) p. 8, pl. II, fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 450.

Ulva - Poiret Encyclop. méth. VIII (1808) p. 175.

- Physactis nitida West. et Wall. Herb. crypt. n. 1345.

Fl. occ. : sur les pierres, les balanes (P. Dumont).

3 R. nitida Ag. Disp. Alg. Sueciae (1817) p. 44; De Wild. loc. cit. p. 450; Born. et Flah. loc. cit. p. 357.

Fl occ.; Ostende (P. Dumont).

- 3 GLOIOTRICHIA J. Ag. Alg. maris Medit. et Adriatici (1842) p. 8; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 451; Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. II p. 365.
- G. natans Rabenh. Doutsch. Krypt. Fl. (1847) p. 90; De Wild. loc. cit. p. 451.

Rivularia gigantea Kicker Fl. crypt. II (1867) p. 429.

Rivularia Boryana West. in Herb. n. 723 et Kicka, loc. cit. p. 429.

Rivularia natans Marissal (1867) Cat. des esp. omises dans la Flore du Hainaut p. 46.

Ht: Maire (Marissal). -- Fl. occ.: Ostende (Mac-Leod). -- A.: Austruweel (Nob.). -- Lb.: Genck (Nob.), Kessenich (J. M.). -- Fl. or.: Eyne (Nob.), env. de Gand (Scheidweiler).

2 G. pisum (Ag.) Thur. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 382; De Wild. loc. cit. p. 451; Born. et Flah. loc. cit. p. 366.

Rivularia - Ag. Syst. Alg. (1824) p. 25.

Physactis mutila in Kicker Fl. crypt. 11, (1867) p. 426.

Rivularia parvula West. et Wall. Herb. n. 1345.

Lb.: Genck (Nob.). — F1 occ: fossés et marais (Flahault). — Bt.: Vilvorde (A. D.), Bergh (Nob.). — A.: entre Lierre et Emblehem (Nob.). — F1. or.: Eyne (Nob.), Termonde (West.).

BACTERIA VEL SCHIZOMYCETES.

FAM. 1. COCCACEAE.

- 1 STREPTOCOCCUS Billroth cfr Zopf Spaltpilze (1883) p. 51; Migula in Engl. et Prantl 1 Teil, 1 Abteil. a p. 15; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1054.
- 1 S. erysipelatos (Fehleisen) Zopf loc. cit. (1883).

Micrococcus — Fehleisen Die Actiologie des Erysipels. Berlin (1883);
Migula loc. cit. (1896) fig. 45.

Streptococcus pyogenes — Rosenbach.

Streptocoque de l'érysipèle.

2 S. mesenterioides (Cienk.) Migula loc. cit. (1896) p. 16.

Ascococcus — Cienk. in Arb. naturf. Gesells. a. d. Univ. Charkoff. X [1 (1878).

Leuconostoc mesenterioides Van Tieghem in Ann. Sc. nat. sér. 6 VII (1878).

Ht : Quiévrain (Ém. M.).

- 2 MICROCOCCUS (Cohn) Migula in Engl. et Prantl 1 Teil, 1 Abteil. a p. 16.
- M. aurantiacus Cohn Beitr. I, 2 (1875) p. 154; Migula loc. cit. p. 17.

Pediococcus aurantiacus Trev. Gen. e sp. Batter. (1889) p. 28.

N.: Gembloux (Ém. M.).

2 M. aquatilis Meade Bolton in Zeitschr. f. Hygiene Bd I, Heft I (1886) p. 94; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1885.

Bt.: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

3 M. candidus Cohn Beitr. I, 2 (1875) p. 160; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1084.

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

4 M. cereus albus Arloing.

Dans la péripneumonie du bœuf (Laboratoire de M. Gedoelst à l'école vétérinaire de Bruxelles).

5 M. cereus flavus Arloing.

Dans la péripneumonie du bœuf (Laboratoire de M. Gedoelst à l'école vétérinaire de Bruxelles).

- 6 M. concentricus Zimmermann Die Bakt. unserer Trink-und Nutzwasser, insb. d. Wassers der Chemnitzer Wasserleitung (1890) 8t.: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).
- 7 M. coronatus Fluegge Microorg. (1887) p. 136.

Streptococcus — Trev. gen. e sp. Batter. (1889) p. 31; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1065.

N.: Gembloux (Ém. M.).

- 8 M. cremoides Zimmermann Die Bakt. unserer Nutz- und Trinkwasser, insb. d. Wassers d. Chemnitzer Wasserleitung (1890). N.: Gembloux (Ém. M.).
- 9 M. flavus Fluegge; Trev. Gen. e sp. Batter. (1889) p. 34; Succ. Syll. Fung. VIII p. 1084.

Bt. : Bruxelles (Ém. M.).

10 M. gonorrhoeae Fluegge Microorg. (1887) p. 116; Migula in Engl. et Prantl 1 Theil, 1 Abtheil. a p. 16 fig. 9.

Neisseria — Trev. Caratt. p. 16 et Gen. e sp. Batter. (1889) p. 32; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1068.

Micrococcus Gonococcus *Neisser* in Centralb. f. med. Wissensch. (1879) p. 28. Dans la Gonorrhée.

11 M. luteus Fluegge Microorg. (1887) p. 254; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 993.

Gembloux, Bruxelles (Ém. M.).

12 M. prodigiosus (Ehrenb.) Cohn Beitr. I, 2 (1875) p. 153. Monas — Ehrenb. Monatsb. berlin. Ak. (1848). N.: Gembloux (Ém. M.). - Bt: Bruxelles (Ém. M.).

13 M. pyogenes var. aureus Rosenbach Mikroorg. b. d. Wundinf. d. Menschen. Wiesbaden (1884).

Staphylococcus - Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1073.

Microbe pathogène.

var. albus Rosenbach Mikroorg, bei d. Wundinf. d. Menschen. Wiesbaden (1884).

Staphylococcus — Sacc. Syll. Fung. VIII'p. 1073.

Microbe pathogène.

var. citreus Passet Unters. über die Aethiol. d. eiterigen Phlegmone d. Menschen. Berlin 1885.

Staphyloccoccus - Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1073.

Microbe pathogène.

14 M. roseus Fluegge Microorg. (1887) p. 145.

Neisseria - Trev. Gen. e sp. Batter. (1889) p. 32; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1072.

Bt: Bruxelles (Ém. M.).

- 15 M. tetragenus Gaffky in Mitth. k. Gesundh. Amt II (1887) p. 42. Gaffkia — Trev. Caratt. p. 27; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1643. Dans la phtisie (Gedoelst).
- 16 M. ureae Van Tiegh.; Eisenb. Bakteriol. Diagnostik n. 349. Commun, partout (Ém. M.).
- 17 M. versicolor Fluegge Microorg. (1887) p. 177; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1084.

N.; Gembloux (Ém. M.).

- 3 SARCINA Goodsir in Edinb. Med. and Surg. Journ. (1842) p. 430; Migula in Engl. et Prantl Pflanzenfam. 1 Teil 1 Abt. a p. 18; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1044.
- S. aurantiaea Fluegge Microorg. (1887) p. 141; Migula loc. cit. p. 19; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1047.

N.: Dans l'air à Gembloux (Ém. M.).

S. lutea Fluegge Microorg. (1887) p. 141 fig. 59-60; Migula loc. cit. p. 19; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1047.

N.: Dans l'air à Gembloux (Ém. M.).

- S. ventriculi Goodsir loc. cit. (1842); Falkenhaim Archiv. f. Exp. Path. und. Pharmak. Bd 19 p. 339; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1044. Dans l'estomac de l'homme et des animaux.
 - 4 PLANOSARCINA Migula in Engl. et Prantl Pflanzenfam. 1 Teil 1 Abt. a (1896) p. 19.
- P. violacea (Winogradsky) Migula loc. cit. (1896) p. 20.

Thiocystis - Winogradsky Beitr. I (1888) p. 60; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1040.

Bi: Auderghem (J. M.).

FAM. 3. BACTERIACEAE.

- 1 BACTERIUM Ehrenb. (1830); Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1020; Migula in Engl. et Prantl Pflanzonfam. 1 Teil 1 Abt. a p. 21.
- 1 B. anthracis (Koch et Cohn) Migula loc. cit. (1896) p. 21.
 Bacillus Cohn Beitr. I, 2 (1875) p. 177; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 955.
 Occasionne le charbon.
- B. cholerae gallinarum Fluegge Microorg. (1887) p. 215 fig. 89-90.
 Pasteurella Trev. Sul Microorg. della rabbia (1888) p. 7; Sacc. Syll. VIII p. 996.

Dans le choléra des poules (Gedoelst).

3 B. diphtheritidis (Klebs-Lößler) Migula loc. cit. (1896) p. 24.

Bacillus — Klebs-Lößler in Mitth. d. kaiserl. Gesundheits — Amt Bd
II (1884) p. 421.

Bacille de la diphthérie.

- 4 B. influenzae Pfeiffer; Migula loc. cit. p. 24. Bacille de l'influenza.
- 5 B. leprae (Arm. Hansen) Migula loc. cit. (1896) p. 23.
 Bacillus Arm. Hansen in Norsk. Mag. f. Laegevedensk. Christiania (1874) et in Virchow's Archiv v. 79 et 90; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 944.
 Bacille de la lèpre.
- 6 B. mallei (Löftler) Migula loc. cit. (1896) p. 21.

 Bacillus Löftler in Deutsch, med. Wochenschrift (1882) p. 52.

 Bacille de la morve.
- B. pneumoniae (Weichselbaum) Migula loc. cit. (1896) p. 22.
 Diplococcus Weichselbaum.
 Belg. (Gedoelst).
- 8 B. pneumonicum (Friedlander) Migula loc. cit. (1896) p. 22.
 Pneumococcus Friedlander (1863) ex Fluegge loc. cit. p. 166.
 Micrococcus Friedlanderi.
- Belg. (Gedoelst).
 B. syphilidis (Schroeter) Migula loc. cit. (1896) p. 23.
 Bacillus Schroeter Pilze Schlesien (1886) p. 165.
 Pacinia syphilitica Trev. Gen. e spec. Batter. (1889) p. 23; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1016.
 Bacille de la syphilis.
- 10 B. tuberculosis (Koch) Migula loc. cit. (1896) p. 23.

 Bacillus Koch Mitth. aus d. kaiserl. Gesundh. Amt Bd 1 (1896) et

Klin. Wochenschrift (1882); Sacc. Syll. Fung. VIII p. 943. Bacille de la tuberculose.

11 B. Zopfii Kurth Bot. Zeit. (1883); Fluegge Microorg. (1887) p. 293 fig. 144.

Dans l'intestin des poules (Gedoelst).

- 2 BACILLUS Cohn Beitr. I, 2 (1875) p. 173; Migula in Engl. et Prantl Pflazenfam. 1 Teil 1 Abt. a (1896) p. 25; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 943.
- 1 B. acidi-lactici (Zopf) Schroeter Pilze Schles. (1886) p. 161; Migula loc. cit. p. 25.

Bacterium - Zopf Spaltpilze (1883) p. 65.

N.: Gembloux (Ém. M.).

2 B. actinobacter Duclaux.

N.: Gembloux (Ém. M.).

3 B. albus Pagliani, Maggiora et Pratini in Giorn. della Soc. ital. d'Igiene IX (1887) p. 587; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 968.

Bi: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

4 B. amylobacter Van Tieghem in Bull. Soc. Bot. France XXIV (1877) 130; Migula loc. cit. p. 8, fig. 2 D,B. Dans les tissus pourissants.

5 B. aurantius Trev. Gen. e spec. Batter. (1889) p. 19; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 987.

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

6 B. aquatilis sulcatus n. 2 Weichselbaum Das oesterr. Sanitätswesen (1889) n. 14-23.

Bi: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

7 B. brunneus Schroeter Pilze Schles. (1886) p. 158; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 938.

Bt: Bruxelles (Ém. M.).

8 B. butyricus Hüppe Mittheil. a. d. kais. Gesundheits — Amt. Bd II (1884); Migula loc. cit. p. 18.

Dans le lait.

9 B. Chauvaei Arloing, Cornevin et Thomas Le charbon symptomatique du bœuf. Paris 1857.

Clostridium Feseri Trev. in Atti Ac. Fis.-Med. di Milano, ser. II vol. III (1885) p. 116; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1004.

Dans le charbon symptomatique du bœuf (Laboratoire de l'École vétérinaire à Bruxelles, Gedoelst).

10 B. coli Escherich Die Darmbakt, des Saüglings u. ihre Bezieh. z. Physiol. d. Verd. (1886) et Forstschr. d. Medecin (1885) n. 15; Migula loc. cit. p. 27. Bacillus Escherichii Trev. Gen. e sp. Batter. (1889) p. 15; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 955.

Bt: Très commun dans l'intestin. Dans le sol à Bruxelles (Ém. M.).

B. diarrhea viridis Lesage in Archiv. de physiol. norm. et pathol.
 t. 20 (1888) p. 212.

Diarrhée verte des enfants.

12 B. dysodes Zopf Spaltpilze 3 ed. (1885) p. 90; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 966.

Bacillus panificans Laurent in Bull. Soc. roy. de Bot. Belg. (1885) p. 175. Dans la fermentation du pain (Ém. Laurent).

13 B. figurans Orookshank.

Bt: Bruxelles (Ém. M.).

14 B. fluorescens liquefaciens Fluegge Microorg. (1887) p. 253.

Bacillus viridi-luteus Trev.; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 979.

Pseudomonas fluorescens Migula loc. cit. p. 29.

Bt: Bruxelles (Ém. M.). — N.: Gembloux (Ém. M.).

15 B. fluorescens putidus Fluegge Microorg. (1887) p. 252; Migula loc. cit.

Bacillus putidus *Trev.* Gen. e spec. Batter. (1889) p. 13; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 960.

Bt: Bruxelles (Ém. M.).

- 16 B. fluorescens tenuis Zimmerm. Bakt. unserer Trink- und Nutzwasser insb. des Wassers d. Chemnitzer Wasserleitung (1890). Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).
- 17 B. fulvus Zimmerm. Die Bakt. unserer Trink- und Nutzw. insb. des Wassers d. Chemnitzer Wasserleitung (1890).

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

18 B. lactis cyanogenus Hüppe Mitth. d. kaiserl. Gesundh. — Amt Bd II (1884) p. 355.

Bactérie du lait bleu.

19 B. liquefaciens bovis (Arloing).

Pneumobacillus — Arloing C. R. Ac. des Sciences Paris t. 106. Dans la péripneumonie du bœuf (Gedoelst).

- 20 B. megaterium DBy Vergl. Morph. und Biol. der Pilze (1884) p. 500; Migula loc. cit. p. 28.; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 992. Dans des infusions.
- 21 B. mycoides Fluegge Microorg. (1887) p. 290; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 972.

Bt: Bruxelles, Wolawe, Crainhem, Watermael, Wesembeek (Ém. M.). — N.: Gembloux (Ém. M.).

22 B. ochraceus Zimmerm. Die Bakter. unserer Trink- und Nutz-

wasser insb. des Wassers d. Chemnitzer Wasserleitung (1890). Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

- 23 B. oedematis maligni Koch Mith. d. kaiser. Gesundh.-Amt Bd I (1881) p. 54; Pasteur Bull. Ac. méd. (1887), p. 798.

 Bactérie de l'œdème malin des animaux.
- 24 B. radicicola Beyerinck in Bot. Zeit. (1888) p. 726, pl. XI fig. 9-13, 17; Migula in Engl. et Prantl. Teil 1 Abth. 1 a p. 28; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 983.

Dans les tubercules des Légumineuses, fréquent.

- 25 B. rubidus Eisenb. Bakteriol. Diagnostik (1891) n. 69. Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).
- 26 B. septicus Klein Mikroorg. and disease (1885); Sacc. Syll. Fung. VIII p. 970.
 Belgique (Gedoelst).
- 27 B. subtilis (Ehrenb.) Cohn Beitr. I, 2 (1875) p. 175 pl. 3 fig. 14; Migula loc. cit. p. 27 fig. 30; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 964. Vibrio — Ehrenb. (1832).
 - Bt: Dans l'air, l'eau, dans la terre à Bruxelles (Ém. M.). N.: Gembloux (Ém. M.).
- 28 B. synxanthus (Ehrenb.) Schroeter Pilze Schles. (1886) p. 157; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 979. Vibrio — Ehrenb. in Verhandl. d. Berl. Akad. (1840) p. 202.

Bacille du lait jaune (Gedoelst).

29 B. tenuis (Duclaux) Trev. Gen. e sp. Batter. (1889) p. 16; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 962.

Tyrothrix - Duclaux Le lait (1887) p. 218.

N.: Gembloux (Ém. M.).

- 30 B. termo Trev. Gen. e sp. Batter. (1389) p. 18.

 Bacterium Ehrenb. in Abhandl. Ak. Berl. 830; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1022.
 - N.: Gembloux (Ém. M.). Bt: Bruxelles (Ém. M.).
- 31 B. tetani Nicolaier Deutsche med. Wochenschrift (1884) n. 52; Migula loc, cit. p. 26, fig. 26.

 Dans le tétanos.
- 32 B. tuberculosis Koch in Klin. Wochenschrift (1882); Sacc. Syll. Fung. VIII p. 943.
 Bacille de la tuberculose.
- 33 B. typhi Eberth-Gaffky in Mittheil. d. Kaiserl. Gesundheits-Amt II (1884); Migula loc. cit. p. 26 et 28, fig. 1.

 Dans l'organisme atteint du typhus.

34 B. vulgatus Trev. Gen. esp. Batter. (1889) p. 19; Sacc. Sycc. Fung. VIII p. 985.

Bacillus mesentericus vulgatus Fluegge Microorg. (1887) p. 288.

Bi: Bruxelles (Ém. M., Gedoelst). - N.: Gembloux (Ém. M.).

35 B. Zenckeri (Hauser) Trev. Gen. e sp. Batter. (1889) p. 17; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 974.

Proteus - Hauser Ueber Faulnissbakt. (1885).

N.: Gembloux (Ém. M.).

- 3 PSEUDOMONAS Migula in Engl. et Prantl Pflanzenfam. 1 Teil 1 Abt. a (1896) p. 29.
- 1 P. Okenii (Ehrenb.) Migula loc. cit. (1896) p. 30, fig. 32.

Monas — Ehrenb. Infusionsth. als volk. Organismen (1838) p. 15.

Chromatium - Perty. Kl. Lebensf. (1852).

Bacterium — Trev. Batter. Ital. (1879); Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1007. Bt: Env. de Bruxelles (Nob.).

2. P. pyocyanea (Gessard) Migula loc. cit. (1896) p. 29.

Micrococcus — Gessard De la pyocyanie et de son microbe (1882).

Bacillus - Zopf Spaltpilze (1883) p. 57.

Bacille du pus vert.

3 P. syncyanea (Ehrenb.) Migula in Engl. et Prantl Pflanzfam. I Teil Abtheil. I a (1899) p. 29.

Vibrio - Ehrenb. in Verhandl. d. Berl. Ak. (1840) p. 202.

Bacillus — Schroeter Pilze Schles. (1886) p. 157; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 979.

Bactérie du lait bleu.

4 P. violaceus (Schoeter) Migula loc. cit. (1896) p. 29.

Bacillus — Schroeter Pilze Schles. (1886) p. 175; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 978.

Bi: Bruxelles (Ém. M.).

FAM. 3. SPIRILLACEAE.

- 1 MICROSPIRA Schroeter; Migula in Engl. et Prantl Pflanzenfam. 1 Teil 1 Abt. a (1896) p. 51.
- 1 M. comma (Koch) Schroeter Pilze Schles. (1886) p. 168; Migula loc. cit. p. 32.

Bacillus - Koch in Berl. Klin. Wochenschrift (1884) n. 31-31a.

Pacinia cholerae-asiaticae Trev. Il fungi del chol. asiat. p. 9; Sacc Syll. Fung. VIII p. 1018.

Bacille du choléra.

2 SPIRILLUM Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1830) p. 38; Migula in Engl. et Prantl Pflanzenfam. 1 Teil. 1 Abt. a (1896) p. 33; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1006.

1 S. serpens (Mueller) Winter Pilze (1884) p. 63; Migula loc. cit. p. 34; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 1010.

Vibrio - Muell. Inf. p. 44, pl. VI fig. 7-8.

N.: Gembloux (Ém. M.).

2 S. undula (Muell.) Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1830) p. 38; Migula p. 33.

Vibrio - Muell. Verm. Hist. p. 43.

Bt: Env. Bruxelles C.

FAM. 4. CHLAMYDOBACTERIACEAE.

1 RASMUSSENIA Trev.; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 930.

1 R. buccalis (Rob. et Leb.) Trev.; Sacc. loc. cit.

Leptothrix — Rob. et Leb. in Robin Hist. vég. parasites (1847) p. 345, pl. 1 fig. 1.2.

Dans la carie dentaire.

FLAGELLATA.

EU-FLAGELLATA.

Mastigidineae.

FAM. 1. OLIGOMASTIGIDACEAE.

- 1 MASTIGAMOEBA F. E. Schulze in Arch. f. mikr. Anatomie Bd XI (1875) p. 583.
- 1 M. lobata Stein; Bütschli in Bronn's Klassen und Ordn. d. Thier-Reichs II pl. XXXIX fig. a-b.

Bt: Env. de Bruxelles (J. M.).

- 2 ANTHOPHYSA Bory in Dict. class. d'hist. nat. (1824).
- 1 A. vegetans O. F. Müller; Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs pl. XLI fig. 5.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

- 3 RHIPIDODENDRON Stein Der Organismus d. Infusionsth. III (1878).
- 1 R. splendidum Stein loc. cit. (1878); Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs II pl. XLII fig. 9.
 Lb.: Kinroy (J. M.).

FAM. 2. HETEROMASTIGIDACEAE.

- 1. BODO Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1832).
- B. saltans Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1832); Stein Der Organismus d. Infusionsth. III pl. II.

Bt.: env. de Bruxelles (J. M.).

- 2 HETEROMITA Dujardin Hist. nat. des zoophytes inf. (1841).
- 1 H. lens Dujardin loc. cit. (1841).

FI. occ.: Middelkerke (J. M.).

FAM. 3. POLYMASTIGIDACEAE.

- 1 TETRAMITUS Perty zur Kenntnis Kl. Lebensf. (1851);
 Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs II p. 841.
- 1 T. rostratus Perty Zur Kenntnis Kl. Lebensf. (1851) pl. XIV fig. 4; Bütschli loc. cit. pl. XLV fig. 13 a-c. Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

Euglenineae.

FAM. 1. EUGLENACEAE.

- 1 EUGLENA Ehrenb. Die Infusionsth. als volkom. Organismen (1838).
- E. acus Ehrenb. loc. cit. (1838) p. 112, pl. VII fig. 15.
 Lb: Kinroy (J. M.).
- 2 E. deses Ehrenb. Infus. als volkom. Organismen (1838) p. 107, pl. VII fig. 8.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.). - Lb.: Kinroy (J. M.).

3 E. gracilis Klebs in Unters. Bot. Institut Tübingen (1883) p. 503, pl. III fig. 11.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.). - Lb.: Kinroy (J. M.).

- 4 E. oxyuris Schmarda Kl. Beitr. z. Naturgeschichte d. Inf. Wien (1846) p. 17, pl. 1 fig. II 1-7.
 Lb.: Kinroy (J. M.).
- 5 E. pisciformis Klebs Unters. Bot. Institut Tubingen (1883) p. 302 pl. III fig. 12.

Bi: env. de Bruxelles (J. M.).

- 6 E. sanguinea Ehrenb. Infusionsth. als volkom. Organismen (1838) p. 105 pl. VII fig. 6.
 - Bt: Bruxelles (Morren), env. de Bruxelles (J. M.). Lb.: Kinroy (J. M.).

- 7 E. Spirogyra Ehrenb. loc. cit. (1836) p. 110, pl. VII fig. 10. Bt: env. de Bruxelles (J. M.). Lb.: Kinroy (J. M.).
- 8 E. viridis Ehrenb. loc. cit. (1838) p. 107. pl. VII fig. 9. Bt env. de Bruxelles (J. M.). Lb.; Kinroy (J. M.).
 - 2 TRACHELOMONAS Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1833).
- 1 T. hispida Stein; Bütschli in Bronn's Klassen d. Thier-Reichs pl. XLVIII fig. 2.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.). - Lb.: Kinroy (J. M.).

- 2 T. volvocina Ehrenb.; Bütschli loc. cit. pl. XLVII fig. 21. Bt: env. de Bruxelles (J. M.). Lb.: Kinroy (J. M.).
 - 3 PHACUS Nitzsch Beitr. z. Infusorienkunde (1817).
- 1 P. pleuronectes Nitszch loc. cit.; Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs pl. XLVII fig. 19.

Euglena — Ehrenb. Infusionth. als volkom. Organismen (1838) p. 111 pl. VII fig. 12.

Lb.: Molenbeersel (J. M.).

2 P. pyrum (Ehrenb.) Stein Der Organismus d. Infusionsthiere (1878) pl. XIX fig. 51-54; Bütschli loc. cit. pl. XLVII fig. 18. Euglena—Ehrenb. Inf. als volkom. Organismen (1838) p. 110 pl. VII fig. 11. Lb.: Kinroy (J. M.).

Phytoflagellineae.

FAM. 1. CHROMOMONADACEAE.

- 1 CRYPTOMONAS Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1831).
- 1 C. erosa Ehrenb. die Infusionsth. als volkom. Organismen (1838). Bt: env. de Bruxelles (J. M.).
- 2 C. ovata Ehrenb.; Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs II pl. XLV fig. 10 a-b.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

- 2 CHILOMONAS Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1831).
- 1 C. Paramoecium Ehrenb. loc. cit.; Bütschli in Bronn's Klassen d. Their-Reichs, pl. XLV fig. 9.

Bi : env. de Bruxelles (J. M.).

- 3 CHROMOPHYTON Woronin in Bot. Zeit. (1880) p. 625; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 373.
- 1 C. Rosanoffii Woronin loc. cit. (1880) p. 625 pl. IX; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. III p. 599.

- Lg.: Fagne du Rosier, marais de la Poule (Spa) (Nob.).
 - 4 DINOBRYON Ehrenb. Die Infusionsth. als volkom. Organism. (1838).
- 1 D. sertularia Ehrenb. loc. cit. (1837); Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs pl. XLI fig. I et XLII.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

- var. divergens Imhof.
 - Lb.: Genck, Kinroy, Molenbeersel (J. M.).
 - 5 SYNCRIPTA Ehrenb. in Alhandl. Berl. Ak. (1833).
- 1 S. volvox Ehrenb. Die Infusionsth. als volkom. Organismen. (1838); p. 59 t. III fig. VII Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs pl. XLIII fig. 2; De-Toni Syll. Alg. III p. 598. tb.: Kinroy (J. M.).

FAM. 2. HYDRURACEAE.

- 1 HYDRURUS Ag. Syst. Alg. (1824) p. 24; De Wild. Fl. Alg. de Belg. p. 372.
- 1 H. penicillatus Ag. loc. cit. (1824) p. 24; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. III p. 596.

Lx.: Prairies derrière l'Hermitage (Houffalize) (J. M.). — N.: dans la Meuse (Bell.). — Lg.: Angleur (Ourthe) (Lejeune).

FAM. 3. POLYTOMACEAE.

- 1 POLYTOMA *Ehrenb*. Die Iufusionsth. als volkom. Organismen (1836).
- 1 P. uvella Ehrenb.; Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs pl. XLIII, fig. 4 a-h.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

- 2 CHLOROGONIUM Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1835).
- 1 C. euchlorum Ehrenb.; Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs pl. XLIV fig. 1 a.

Bt: env. de Bruxelles (S. M.).

DINOFLAGELLATA VEL PERIDINIA.

FAM. 4. PERIDINIACEAE.

1 PERIDINIUM Ehrenb. (1832); De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 374; Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs p. 1004.

1 P. tabulatum Clap. et Lachm.; De Wild. loc. cit.; Bülschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs pl. LII fig. 6.

Bt: Rouge-cloître (Nob.). - Lb.: Molenbeersel, Genck (Nob.).

- 2 CERATIUM Schrank Naturforscher (1793) p. 26-37; Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs p. 1005.
- C. tetraceros Schrank loc. cit. (1793); Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs pl. LIII, fig. 7.

Lb.: Genck, Kinroy (J. M.).

- 3 GLENODINIUM Ehrenb. Infusionsth. als volkom. Organismen (1838); Bütschli in Bronn's Klassen d. Thier-Reichs p. 1007.
- 1 G. cinctum Ehrenb. loc. cit.; Bütschli loc. cit. pl. LI fig. 10. Bt: env. de Bruxelles (Nob.).

ALGAE (sens. strict.).

ZYGOPHYCEAE.

Diatomineae.

FAM. 1. DIATOMACEAE.

Subfam. RAPHIDEAE.

TRIB. CYMBELLAE.

- 1 AMPHORA Ehrenb. in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 205; Van Heurck Syn. p. 35 et Treat. p. 125; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 183; De-Toni Syll. Alg. II p. 375.
- 1 A. acutiuscula Kuetz. Kiesel. Bacill. (1844) p. 108 pl. 5 fig. 32;
 Van Heurck Syn. p. 57, Atl. pl. I fig. 13; Treat. p. 134 pl. I fig. 5; De Wild. loc. cit. p. 185; De-Toni Syll. Alg. II p. 385.
 FI. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 2 A. angularis Greg. in Micr. Journ. III (1855) p. 39, pl. II fig. 6; Van Heurck Syn. p. 57, Atl. pl. I fig. 21 et Treat.p. 153 pl. I fig. 8; De Wild. loc. cit. p. 185; De-Toni Syll. Alg. II p. 393.
 - Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). -- A.: (V. H.).
 - var. hybrida Grun. in Van Heurck loc. cit. (1885) et Treat. loc. cit.; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). -- A.: Anvers (V. H.).

A. angularis var. lyrata (Greg.) Van Heurek Syn. p. 57 (1885) et Treat. p. 153 pl. I fig. 9; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 185.

Amphora - Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 57 pl. I fig. 22.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). -- A.: Anvers (V. H.).

3 A. arenicola Grun. ex Van Heurck Treat. (1896) p. 128. pl. 35 fig. 907.

A. marina var. arenicola Grun. in Cleve et Möll. Diat. n. 310.

Fl. occ. : Côtes de Belgique (V. H.).

- 4 A. commutata Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 58, Atl. pl. 1 fig. 14 et Treat. p. 132 pl. 1 fig. 13; De Wild. loc. cit. p. 187; DeToni Syll. Alg. II p. 402.
 - A.: Anvers (V. H). Fl. occ.: Blankenberghe, Heyst, Ostende (V. H.).
- 5 A. marina W. Sm. in Ann. Nat. Hist. vol. XIX (1857) p. 7 pl. 1, fig. 2; Van Heurck Atl. pl. 1 fig. 16 et Treat. p. 129 pl. I fig. 14; De-Toni Syll. Alg. II p. 410. Escaut (V. H.).
- 6 A. lineolata Ehrenb. Inf. (1838) pl. 14 fig. 4; Van Heurck Syn. p. 57, Atl. pl. 1 f. 23 et Treat. p. 138 pl. 1 fig. 10; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 186; De-Toni. Syll. Alg. II p. 394.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 7 A. monilifera Greg. Diat. of Clyde (1857) pl. IV fig. 69; Rabenh. Fl. Eur. Alg. vol. I p. 90; De Wild. loc. cit. p. 185; De-Toni Syll. Alg. II p. 388.
- FI. occ.: env. d'Ostende (Rabenh.).

 8 A. Normanii Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1869) p. 88; Van Heurck Syn. p. 56, Atl. pl. 1 fig. 12 et Treat. p. 128 pl. 1 fig. 4; De Wild. loc. cit. p. 184; De-Toni Syll. Alg. II p. 384.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

9 A. ocellata Donk. in Quek. Journ. Micr. Soc. (1861) p. 11 pl. I fig. 116; Van Heurek Syn. p. 56, Atl. pl. 1 fig. 26 et Treat. p. 130 pl. 1 fig. 3; De Wild. loc. cit. p. 184; De-Toni Syll. Alg. II p. 377.

FI. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 10 A. ostrearia Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 94; Van Heurck Syn. p. 55, Atl. pl. 1 fig. 25 et Treat. p. 139 pl. 1 fig. 1. De Wild. loc. cit.; p. 184; De-Toni Syll. Alg. II p. 376.
 - var. belgica Grun. in Van Heurck (1885) loc. cit. et Treat. loc. cit.; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. loc. cit.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

11 A. ovalis (Bréb.) Kuetz. Bacill. (1849) p. 107 pl. 5 fig. 35, 39;

Van Heurck Syn. p. 59, Atl. pl. 1 fig. 1 et Treat. p. 127 pl. I fig.
15; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 187; De-Toni Syll. Alg. II p. 411.
Cyclotella ovalis Bréb. Consp. Diat. (1838) p. 20.

Bt: Dieghem (Del.), Louvain (V. H.). — Lg.: env. de Spa (Nob.).

- A. ovalis var. gracilis Van Heurek loc. cit. (1885) Atl. pl.1 fig. 3 et Treat. Diat. p. 127 pl. I fig. 16; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. Amphora — Ehr. Verb. (1843) p. 122 pl. 31 fig. 43.
 - Bt: Louvain (V. H.).
- var. affinis Van Heurck loc. cit. (1885) pl. 1 fig. 2 et Treat. loc. cit. fig. 17.

Amphora -- Kuetz. Bacill. (1844) p. 107 pl. 30 fig. 66.

- Bt: Louvain (V. H.). Lg.: Winamplanche (Nob.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- var. pediculus Van Heurck Syn. loc. cit. (1885) pl. 1 fig. 5 et Treat loc. cit. fig. 19; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 188; De-Toni Syll. Alg. II p. 412.

Cymbella -- Kuetz. Bacill. (1854) p. 80 pl. 5 fig. 8, pl. 6 fig. 7.

- Bt: Louvain (V. H.), Jardin Bot. de Bruxelles, Dieghem, Rouge-Cloître (Del.). A.: Anvers (V. H.). -- Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 12 A. perpusilla Grun. Diat. Fr.-Jos. Land. (1884) p. 50 pl. 4 fig. 6;
 Van Heurck Syn. p. 58, Atl. pl. I fig. 11 et Treat. p. 127 pl. 1 fig. 12; De Wild. loc. cit. p. 186; De-Toni Syll. Alg. II p. 400.
 Bt: Jardin Bot. de Bruxelles (Del.).
- 13 A. Proteus Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 46 pl. 5 fig. 81; Van Heurck Treat. p. 129 pl. 24 fig. 671; De-Toni Syll. Alg. II p. 400. Côtes de Belgique (V. H.).
- 14 A. robusta Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 44 pl. 5 fig. 79; Van Heurek Treat. p. 129, pl. 24 fig. 670; De-Toni Syll. Alg. II p. 403. Escaut (V. H.).
- 15 A. salina W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 19 pl. 30 fig. 251;
 Van Heurck Syn. p. 57, Atl. pl. I fig. 19 et Treat. p. 134 pl. I fig. 6; De Wild. loc. cit. p. 185; De-Toni Syll. Alg. II p. 386.
 A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe, Heyst (V. H.).
 - var. minor Van Heurck loc. cit. Atl. pl. I fig. 20 et Treat. loc. cit. pl. I fig. 7; De-Toni loc. cit. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 16 A. veneta Kuetz. Bacill. (1844) p. 108 pl. 3 fig. 25; Van Heurck Syn. p. 58, Atl. pl. I fig. 17 et Treat. p. 134 pl. I fig. 11; De Wild. loc. cit. p. 186; De-Toni Syll. Alg. II p. 397.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). A.: Anvers (V. H.).

- 2 CYMBELLA Ag. Consp. (1830) p. 1; Van Heurek Syn. p. 60 et Treat. p. 140; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 188; De-Toni Syll. Alg. II p. 349.
- C. affinis Kuetz. Bacill. (1844) p. 80, pl. 6 fig. 15; Van Heurck Syn. p. 62, Atl. pl. 2 fig. 19 et Treat. p. 144 pl. 1 fig. 31; De Wild. loc. eit. p. 191; De-Toni Syll. Alg. II p. 352.
 Bt: Bruxelles, Louvain (V. H.). A.: Anvers (V. H.).
- 2 C. amphicephala Naeg. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 890; Van Heurck Syn. p. 61, Atl. pl. 2 fig. 6 et Treat. p. 142 pl. 1 fig. 28; De Wild. loc. cit. p. 189; De-Toni Syll. Alg. II p. 350. A.: Anvers (V. H.). — Lg.: Spa (Nob.).
- 3 C. anglica Lagerstedt Söttv. Diat. Spetsb. in Bih. K. Sv. Vet. Ak. Handl. I (1873) p. 42 pl. 2 fig. 18; Van Heurek Atl. pl. 2 fig. 4; De-Toni Syll. Alg. II p. 354; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 191. Lg.: Wayai, Winamplanche, Nivezé, env. de Stavelot (Nob.).
- 4 C. cistula (Hempr.) Kirchn. Alg. Schles. (1878) p. 189; Van Heurck Syn. p. 64, Atl. pl. 2 fig. 12-13 et Treat. p. 147 pl. 1 fig. 40; De Wild. loc. cit. p. 193; De-Toni Syll. Alg. II p. 365.

Cocconema — *Hempr*. (1828); cfr. De-Toni loc. cit. Assez commun (V. H.).

— var. maculata Grun. Diat. Fr.-Jos. Land. (1884) p. 45 pl. 1fig. 8; Van Heurck loc. cit. fig. 16-17 et Treat. loc. cit. fig. 41; De Wild. loc. cit.

Cymbella — *Kuetz*. Bacill. (1844) p. 79 pl. 6 fig. 2.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

5 C. cuspidata Kuetz. Bacill. (1844) p. 79 pl. 3 fig. 40; Van Heurck Syn. p. 61, Atl. pl. 2 fig. 3 et Treat. p. 142 pl. 1 fig. 23; De Wild. loc. cit. p. 189; De-Toni Syll. Alg. II p. 350.

Lg.: env. de Spa (Nob.). — Commun (V. H.).

- var. naviculiformis Auersw. in Rabenh. Alg. n. 1065; Van Heurch loc. cit. fig. 5 et Treat. loc. cit. pl. I fig. 24; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
 - $\mathsf{Lg.}:$ Winamplanche, Francorchamps, Jalhay, Bois Gossonfays, Coquaifange (Nob.).
- 6 C. cymbiformis (Kuetz.) Bréb. Alg. des env. de Falaise (1855) p. 49 pl. 7; Van Heurck Syn. p. 63, Atl. pl. 2 fig. 11 et Treat. p. 147 pl. I fig. 38; De Wild. loc. cit. p. 193; De-Toni Syll. Alg. II. p. 363.

Frustulia - Kuetz. in Linnaea (1838) fig. 10.

Peu commun (V. H.).

- C. cymbiformis var. parva Van Heurek Syn. (1885) p. 63 fig. 14 et Treat. p. 147 pl. 1 fig. 39; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 193. Cocconema W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p 76 fig. 222.
 Assez commun (V. H.).
- 7 C. delicatula Kuctz. Spec. Alg. (1849) p. 59; Van Heurek Syn. p. 62, Atl. pl. 3 fig. 6 et Treat. p. 143; De Wild. loc. cit. p. 190; De-Toni Syll. Alg. II, p. 352.

Lx.: Frahan (Del.). — Lg.: env. de Stavelot, Bois Gossonfays (Nob.).

- 8 C. Ehrenbergii Kuctz. Bacill. (1844) p. 79 pl. 6 fig. 11; Van Heurck Syn. p. 60, Atl. pl. 2 fig. 1-2 et Treat. p. 142 pl. I. fig. 22; De Wild. loc. cit. p. 188; De-Toni Syll. Alg. II p. 349. Commun (V. H.).
 - f. minor Van Heurek Syn. (1885) p. 60, Atl. pl. 2 fig. 2;
 De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 189.

Lg.: Bois des Minières (Wayai) (Nob.).

- 9 C. gastroides Kuetz. Bacill. (1844) p. 73 pl. 6 fig. 4 b; Van Heurck Syn. p. 63, Atl. pl. 2 fig. 8 et Treat. p. 146 pl. 1 fig. 35; De Wild. loc. cit. p. 192; De-Toni Syll. Alg. II p. 361.
 Assez commun (V. H.).
 - var. minor Van Heurck (1885) loc. cit. fig. 9 et Treat. loc. cit. pl. I fig. 37; De Wild. loc. cit.
 Moins commun que le type (V. H.).
- 10 C. helvetica Küetz. Bacill. (1844) p. 79 pl. 6 fig. 13; Van Heurck Syn. p. 64, Atl. pl. 2 fig. 15 et Treat. p. 148 pl. I fig. 43; De Wild. loc. cit. p. 194; De-Toni Syll. Alg. II p. 366.
 Bt; Bruxelles (Del.). Commun (V. H).
- 11 C. lanceolata (Ehrenb.) Kirchn. Alg. Schles. (1878) p. 188; Van Heurck Syn. p. 63, Atl. pl. 2 fig. 7 et Treat. p. 147 pl. I fig. 37; De Wild. loc. cit. p. 192; De-Toni Syll. Alg. II p. 362.
 Cocconema Ehrenb. Inf. (1838) p. 224 pl. XIX, fig. 6.
 Très commun (V. H.).
- 12 C. leptoceras (Ehrenb.) Rabenh. Süssw. Diat. (1853) pl. 7 fig. 14;
 Van Heurck Syn. p. 61, Atl. pl. 3 fig. 24 et Treat. p. 144 pl. I
 fig. 32; De Wild. loc. cit. p. 191; De-Toni Syll. Alg. II p. 353.
 Cocconema Ehrenb. Amer. (1843) p. 30 pl. I fig. 56.

Bt: Bruxelles (V. H.). -A.: Anvers (V. H.).

- var. elongata Van Heurck loc. cit. (1885) Atl. suppl. pl. A fig. 2 et Treat. loc. cit. pl. 1 fig. 33; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
 - Bt: Bruxelles, Louvain (V. H.). A.: Anvers (V. H.).

- 13 C. levis Naeg. ex Van Heurek Syn. (1885) p. 62, Atl. pl. 3 fig. 7 et Treat. p. 144 pl. I fig. 30; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 190. Lg.: env. de Stavelot (Nob.).
- 14 C. microcephala Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 63, Atl. pl. 8 fig. 36-39, et Treat. p. 145 pl. 1 fig. 34; De Wild. loc. cit. p. 191; De-Toni Syll. Alg. II p. 353.
 Bt: Bruxelles (Del.).
- 15 C. pusilla Grun. in A. Schm. Atl. pl. 9 (1875) fig. 36-37; Van Heurck Syn. p. 62, Atl. pl. 3 fig. 5 et Treat. p. 143 pl. 1 fig. 28; De Wild. loc. cit. p. 190; De-Toni Syll. Alg. II p. 351.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — Lg.: Francorchamps, Jalhay, ru de Barisart, Hockay (Nob.).

16 C. subaequalis Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 61, Atl. pl. 3 fig. 2 et Treat. p. 143 pl. 1 fig. 26; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 190; De-Toni Syll. Alg. II p. 351.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.). - Lg.: Spa (Nob.).

17 C. tumida (Bréb.) Van Heurck Syn. p. 64, Atl. pl. 2 fig. 10 et Treat. p. 148 pl. 1 fig. 42; De Wild. loc. cit. p. 194; De-Toni Syll. Alg. II p. 366.

Cocconema — Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 60.

- A : Anvers (V. H.). Bt : Louvain (V. H.). Fl. occ. : Ostende (V. H.).
 - 3 ENCYONEMA Kuetz. Syn. Diat. (1833) p. 61; Van Heurck Syn. p. 65 et Treat. p. 148; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 194; De-Toni Syll. Alg. II, p. 371.
- 1 E. caespitosum Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 61; Van Heurck Syn. p. 65, Atl. suppl. fig. 3 et Treat. p. 150. pl. 1. fig. 46; De Wild. loc. cit. p. 95; De-Toni Syll. Alg. II, p. 372.

Un peu partout (V. H.). — Lg.: env. de Stavelot (Nob.).

— var. Auerswaldii (Rabenh.) Van Heurck (1875) loc. cit. p. 66, Atl. pl. 3 fig. 14 et Treat. p. 150 pl. 1 fig. 47; De Wild. loce cit. De-Toni loc. cit.

Lg.: Bois Gossonfays, env. de Stavelot, Coquaifange (Nob.).

- 2 E. gracile Rabenh. Süssw. Diat. p. 25 pl. 18 fig. 791 bis b.
 - — var. scotica (W. Sm.) Van Heurck Treat. (1896) p. 151 pl. 28, fig. 791 bis a.

Cymbella scotica W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 68.

E. gracile Kuetz.; Van Heurck Atl. pl. 3 fig. 21; De Wild. loc. cit. p. 195. Lg.: La Reid (Nob.).

f. minor Van Heurck Atl. pl. 3 fig. 22 (1885).
 Lg.: Bois des Minières, Hockay, Francorchamps (Nob.).

3 E. prostratum (Berk.) Ralfs in Ann. and Mag. I (1845) p. 182 pl. 18 fig. 3; Van Heurek Syn. p. 75, Atl. pl. 3 fig. 9-11 et Treat. p. 149 pl. 1 fig. 44; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 194; De-Toni Syll-Alg. II p. 371.

Monema — Berk. Brit. Alg. (1832) pl. IV fig. 1.

Presque partout (V. H.).

4 E. ventricosum (Ag.) Grun. in Kirchn. Alg. Schles. (1878) p. 189; Van Heurck Syn. p. 66, Atl. pl. 3 fig. 17 et Treat. p. 150 pl. 1 fig. 49; De Wild. loc. cit. p. 195; De-Toni Syll. Alg. II p. 373. Cymbella — Ag. Consp. crit. Diat. I (1830) p. 9.

Bt: Bruxelles (Del.). - Lg.: env. de Spa (Nob.). - Assez commun (V. H.).

TRIB. NAVICULEAE.

- 4 MASTOGLOIA Thwaites in W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 63; Van Heurck Syn. p. 69 et Treat. p. 163; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 200; De-Toni Syll. Alg. II, p. 313.
- 1 M. Braunii Grun. in Verhandl. Wien (1863) p. 156 pl. 13 fig. 2;
 Van Heurck Syn. p. 71, Atl. pl. 4 fig. 21-22 et Treat. p. 166 pl. 2 fig. 66; De Wild. loc. cit. p. 201; De-Toni Syll. Alg. II p. 322.
 Fl. occ.: Heyst (V. H.).
- 2 M. Dansei Thwaites in W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 64 pl. 62 fig. 388; Van Heurck Syn. p. 70, Atl. pl. 4 fig. 18 et Treat p. 155 pl. 2 fig. 64; De Wild. loc. cit. p. 200; De-Toni Syll. Alg. II p. 315.

Fl. occ.: Blankenberghe, Heyst (V. H.). - Bt: Bergh (Del.).

- 3 M. exigua Lewis Notes on rare spec. (1861) p. 7 pl. II fig. 5;
 Van Heurck Syn. p. 70, Atl. pl. 4 fig. 25-28 et Treat. p. 155 pl. 2
 fig. 63; De Wild. loc. cit. p. 200; De-Toni Syll. Alg. II p. 322.
 A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 4 M. Grevillei W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 65 pl. 62 fig. 389;
 Van Heurek Syn. p. 71, Atl. pl. 4 fig. 20 et Treat. p. 155 pl. 2 fig. 64; De Wild. loc. cit. p. 201; De-Toni Syll. Alg. II p. 315.
 Lg.: Ru de Chawion (Nob.).
- 5 M. Smithii Thwaites in W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 65 pl. 59 fig. 351; Van Heurck Syn. p. 70, Atl. pl. 4 fig. 13 et Treat. p. 154 pl. 2 fig. 60; De Wild. loc. cit. p. 200; De-Toni Syll. Alg. II p. 313.
 - Bt: Bergh (Del.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). A.: Anvers (P. Gautier).
 - var. lacustris Grun. Kasp. Alg. (1878) p. 114; Van Heurck

Syn. p. 70, fig. 14 et Treat. p. 154 fig. 61; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 200; De-Toni Syll. II p. 314.
Bt: Bergh (Del.).

- 5 STAURONEIS Ehrenb. Amer. (1843) p. 134; Van Heurck Syn. p. 17 et Treat. p. 158; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 197. De-Toni Syll. Alg. II p. 204.
- 1 S. acuta W. Sm. Diat. I (1853) p. 59 pl. 19 fig. 187; Van Heurck Syn. p. 68, Atl. pl. 4 fig. 3 et Treat. p. 159 pl. 1 fig. 51; De Wild. loc. cit. p. 197.

Pleurostauron — Rabenh. in Hedwigia II (1860) pl. 1 fig. 13 et II fig. 13; De Toni Syll. Alg. II p. 222.

Partout (V. H.).

- 2 S. anceps Ehrenb. Amer. (1843) p. 134 pl. 2 I fig. 18; Van Heurck Syn. p. 68, Atl. pl. 4 fig. 4-5 et Treat. p. 160 pl. 1 fig. 55; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 198; De-Toni Syll. Alg. II p. 211.
 Lg.: env. de Spa (Nob.). Commun mais peu abondant (V. H.).
 - var. linearis (Ehrenb.) Rabenh. Süssw. Diat. (1853) p. 48; Van Heurck. loc. cit. fig. 8 et Treat. loc. cit. fig. 56; De Wild. loc. cit. p. 199; De-Toni loc. cit.

S. linearis Ehrenb. Amer. (1843) 1, 2 fig. 11.

Lg.: Ru de Chawion, Spa (Nob.). - Mêlé au type (V. H.).

- var. amphicephala (Kuetz.) Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 6 et 7 et Trent. loc. cit. fig. 57; De Wild. loc. cit.

Stauroneis - Kuetz. Bacill. (1844) pl. 30 fig. 25.

Lg.: Wayai, Jalhay, Coquaifange (Nob.). — Mêlé au type (V. H.).

3 S. gracilis Ehrenb. Amer. (1843) pl. I 2 fig. 14; Van Heurek Treat. p. 159 pl. 25 fig. 702.

S. gracilis W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 59 pl. 19 fig. 186; De-Toni Syll. Alg. II p. 207.

Belgique (V. H.).

- 4 S. Gregorii Ralfs in Pritch. Inf. (1845) p. 913; Van Heurck Syn. p. 68, Atl. suppl. fig. 4 et Treat. p. 160 pl. 1 fig. 52; De Wild. loc. cit. p. 198; De-Toni Syll. Alg. II p. 208.

 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 5 S. legumen Ehrenb. in Abhandl. Berl. Akad. (1834) p. 135 pl. 1 fig. 5; Van Heurck Syn. p. 19, Atl. pl. 4 fig. 11 et Treat. p. 161 pl. 1 fig. 59; De Wild. loc. cit. p. 199.

Pleurostauron — Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 259; De-Toni-Syll. Alg. II p. 222.

Rare (V. H.).

- 6 S. phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenb. Amer. (1843) t. II 5 fig. 1; Van Heurek Syn: p. 17, Atl. pl. 4 fig. 2 et Treat. p. 159 pl. 1 fig. 50; De Wild. loc. cit. p. 197; De-Toni Syll. Alg. II p. 204. Bacillaria Nitzsch Beitr. (1817) pl. III fig. 12 14.
 - Bt: Bruxelles (Del.). Lg.: Env. de Spa (Nob.). Assez commun (V. H.).
- 7 S. salina W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 60 pl. XIX fig. 188; Van Heurck Syn. p. 68, Atl. pl. 10 fig. 16 et Treat. p. 160 pl. 1 fig. 54. De Wild, loc. cit. p. 198; De-Toni Syll. Alg. II, p. 217.
 Fl. 0cc.: Blankenberghe (V. H.). A.: Anvers (V. H.).
- 8 S. Smithii Grun. in Verhandl. k. zool. bot. Gesell. Wien (1860) p. 564 pl. 4 fig. 16; Van Heurck Syn. p. 19, Atl. pl. 4 fig. 10 et Treat. p. 161 pl. 1 fig. 58; De Wild. loc. cit. p. 199.

 Cfr. Pleurostauron legumen Rabenh., De-Toni Syll Alg II p. 222.

Cà et là en petite quantité (V. H.).

- 9 S. spicula Dickie in Monthly Micr. Journ. XII (1873) p. 290; Van Heurck Syn. p. 68, Atl. pl. 4 fig. 1 et Treat. p. 160 pl. 1 fig. 513; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 198; De-Toni Syll. Alg. II p. 209. A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - 6 NAVICULA Bory Dict. Class. XI (1826) p. 472; Van Heurck Syn. p. 71 et Treat. p. 162; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 201; De-Toni Syll. Alg. II p. 6.
- 1 N. abrupta Donk. Nat. Hist. Brit. Diat. (1871) p. 13 pl. 2 fig. 6; Van Heurek Syn. p. 94, Atl. pl. 10 fig. 4 et Treat. p. 203 pl. 4 fig. 162; De Wild. loc. cit. p. 227; De-Toni Syll. Alg. II p. 96. N. lyra var. abrupta Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 14 pl. I fig. 14. Marin (Deby).
- 2 N. ambigua Ehrenb. Verb. (1843) p. 129 pl. 2 fig. 9; Van Heurck Syn. p. 100, Atl. pl. 12 fig. 5 et Trent. p. 214 pl. 4 fig. 192; De Wild. loc. cit. p. 234; De-Toni Syll. Alg. II p. 137. Commun (V. H.).
 - f. craticula Van Henrek loc. cit. (1885) fig. 6 et Treat. loc. cit. fig. 193; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. Bt: Louvain (V. H.). Ht: Manage (Gautier).
- 3 N. americana Ehrenh. Amer. (1843) p. 129; Van Heurch Syn. p. 103, Atl. pl. 12 fig. 37 et Treat. p. 223 pl. 5 fig. 221; De Wild. loc. cit. p. 241; De-Toni Syll. Alg. II p. 161.
 A.: Anvers (Belleroche).
- 4 N. Amphisbaena Bory Encycl. méth. (1824) t. 2; Van Heurek Syn. p. 102, Atl. pl. II fig. 7 et Treat. p. 219 pl. 5 fig. 203; De Wild. loc. cit. p. 237; De-Toni Syll. Alg. II p. 144.

- A.: Anvers (V. H.). Ht: env. de Tournai (Marissal). Bt: env. de Bruxelles (Del.), Zoetwater, Vaelbeek (Paque).
- N. Amphisbaena var. subsalina Van Heurck Syn. (1885) p. 102, fig. 6 et Treat. fig. 204; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 237.
 A.: Anvers (V. H.).
- f. major Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 4 et Treat. fig. 205; De Wild. loc. cit; De-Toni Syll. Alg. II p. 144.
 A.: Anvers (Escaut) (V. H.).
- 5 N. appendiculata (Ag.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 93 pl. 3 fig. 28 et pl. 4 fig. 1-2; Van Heurck loc. cit. p. 79 Atl. pl. 9 fig. 18-20 et Treat. p. 173 pl. 2 fig. 93; De Wild. loc. cit. p. 209; De-Toni Syll. Alg. II p. 28.

Frustulia - Ag. Icon. Alg. (1828) pl. 1.

- Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.), Lg.: Winamplanche, Francorchamps bois Gossenfays, Stoumont (Nob.).
- var. budensis Grun. in Van Heurek loc. cit. (1885) fig. 27-28; De-Toni loc. cit.; De Wild. loc. cit.
 - Lg.: Stoumont, bois Gossenfays, Barisart (Nob.).
- var. naveana Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 29; De Wild. loc. cit. p. 210.
 - Navicula Grun. in Verhandl. k. k. zool. bot. Gesell. Wien (1863) pl. 13 fig. 24.
 - Lg.: Winamplanche (Nob.).
- var. irrorata Grun. in Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 30; De-Toni loc. cit.; De Wild. loc. cit.
 - Lg.: Stavelot (Nob.).
- 6 N. aspera Ehrenb. Mikrogeol. (1854) pl. 35 A fig. 5; Van Heurck Syn. p. 94, Atl. pl. 10 fig. 13, suppl. fig. 17 et Treat. p. 205 pl. 4 fig. 165; De Wild. loc. cit. p. 228; De-Toni Syll. Alg. II p. 109. Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.).
- N. atomoides Grun. in Van Heurek Syn. p. 107 (1885) Atl. pl. 14 fig. 11 et Trent. 227 pl. 5 fig. 230; De Wild. loc. cit. p. 244; De-Toni Syll. Alg. II p. 166.
 A: Anvers (V. H.).
- 8 N. Atomus (Kuetz.) Grun. in Verhandl. Wien. (1860) p. 552 pl. 2 fig. 6 a-g; Van Heurek Syn. p. 107, Atl. pl. 14 fig. 24 et Treat. p. 227 pl. 5 fig. 231; De Wild. loc. cit. p. 244; De-Toni Syll. Alg. p. 166.
 - Bt: Bruxelles (Del.). A.: Anvers (V. H.).
- 9 N. bacilliformis Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 49 pl. 2 fig. 51; Van Heurck Atl. pl. 13 fig. 110 et Treat. p. 224 pl.

27 fig. 774; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 242; De-Toni Syll. Alg. II p. 161.

Lg.: Cour, Ru de Chawion, Hockay (Nob.).

- 10 N. bacillum Ehrenb. Verbr. (1843) p. 130 pl. 4, 5 fig. 8 ex p.; Van Heurck Syn. p. 205, Atl. pl. 13 fig. 5 et Treat. p. 224 pl. 5 fig. 222; De Wild. loc. cit. p. 242; De-Toni Syll. Alg. II p. 160. Bt: Groenendael (Del.). — Lg.: Stoumont (Nob.).
 - f. minor Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 10 et Treat. loc. cit. fig. 223; De Wild. loc. cit.

Bt: Jardin bot. Bruxelles (Del.).

— var. thermalis Grun. Van Heurck loc. cit. pl. 12 fig. 27; De Wild. loc. cit.

Lg.: Winamplanche (Nob.).

- N. Beyrichiana Schm. Atl. (1881) pl. 69 fig. 16-17; Van Heurck
 Treat. p. 192 pl. 25 fig. 728; De-Toni Syll. Alg. II p. 80.
 A.: Escaut (V. H.).
- 12 N. binodis Ehrenb. in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 18; Van Heurck Syn. p. 108, Atl. suppl. fig. 33 et Treat. p. 229 pl. 5 fig. 235; De Wild. loc. cit. p. 245; De-Toni Syll. Alg. II, p. 165.

Ht: Manage (Gautier). — Bt: Rouge-cloître (Del.). — A.: Anvers (V. H.).

13 N. bomboides Schm. N. S. Diat. (1872?) p. 85 pl. 1 fig. 2; Van Heurck Syn. p. 89, Atl. suppl. fig. 19 et Treat. p. 193; De Wild. loc. cit. p. 222; De-Toni Syll. Alg. II p. 71.
Fl. occ.: Ostende (Deby), Blankenberghe (V. H.).

14 N. bombus (Ehrenb.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 83; Van Heurck Syn. p. 90, Atl. suppl. fig. 22 et Treat. p. 194 pl. 3 fig. 149; De Wild. loc. cit. p. 223; De-Toni Syll. Alg. II p. 75.

Pinnularia - Ehrenb. in Ber. Berl. Ac. (1844) p. 30.

FI. occ.: Blankenberghe (V. H.).

15 N. borealis (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 96 t. 28 fig. 68, 72;
Van Heurck Syn. p. 76, Atl. pl. 6 fig. 3 et Treat. p. 170 pl. 2 fig. 77;
De Wild. loc. cit. p. 206; De-Toni Syll. Alg. II p. 20.

Pinnularia - Ehrenb. Verb. (1843) t. I, II fig. 6, IV fig. 5 et V fig. 4.

- A.: Anvers (V. H.). Lx.: Frahan (Del.). Lg.: Vallée de Tolifa, Winamplanche, Francorchamps (Nob.).
- 16 N. Braunii Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 79, Atl. pl. 6 fig. 21 et Treat. p. 173 pl. 2 fig. 95; De Wild. loc. cit. p. 210; De-Toni Syll. Alg. II p. 31.

Lx.: Liresse (Del.).

17 N. Brebissonii Kuetz. Bacill. (1844) p. 93 pl. 3 fig. 49, pl. 30 fig. 39;
Van Heurck Syn. p. 77, Atl. pl. 5 fig. 7 et Treat. p. 171 pl. 1 fig 82;

- De Wild. Fl. Alg. Belg, p. 207; De-Toni Syll. Alg. II p. 23. Bt: Lacken (Del.). Commun (V. H.).
- N. Brebissonii var. subproducta Van Heurek Syn. (1885) p. 77, pl. 5 fig. 9 et Treat. p. 171 fig. 83; De Wild. loc. cit.
 - Bt: Parc (V. H.). Lg.: Francorchamps, Ru de Chawion (Nob.).
- — diminuta Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 8 et Treat. loc. cit. fig. 84; De IVild. loc. cit.
- $\mathsf{Lx}.:$ Frahan (Del.). $\mathsf{Lg}.:$ Winamplanche, Wayai, Coquaifange, Stoumont (Nob.).
- 18 N. brevis Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 6 pl. 1 fig. 4; Van Heurek Syn. p. 97 Atl. pl. 11 fig. 19 et Treat. p. 209 pl. 4 fig. 180; De Wild. loc. cit. p. 231; De-Toni Syll. Alg. II p. 123. Lavage de moules (Deby).
- 19 N. Bulnheimii Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 108, Atl. pl. 14 fig. 6a; De Wild. loc. cit. p. 245; De-Toni Syll. Alg. II p. 167. Station non indiquée par M. Van Heurck.
 - var. belgica Grun. in Van Heurck loc. cit. (1885) et Treat. p. 228; De Wild. loc. cit.; De Toni loc. cit. Fl. occ.: Ostende (V. H.).
- 20 N. cancellata Donk. Nat. Hist. Brit. Diat. (1871) p. 55 pl. 8 fig. 4;
 Van Heurck Syn. p. 86, Atl. suppl. fig. 16; De Wild. loc. cit.
 - var. scaldensis Van Heurck loc. cit. fig. 17 et Treat. p. 183 pl. 3 fig. 129; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 49. A.: Anvers (V. H.).
 - var. ammophila Grun. Beitr. Kenntn. d. foss. Oest. Diat. (1882) p. 14 pl. 2 fig. 66, 67; Van Heurek Treat. p. 183 pl. 25 fig. 712; De-Toni loc. cit. p. 48.
 - A: : Anvers (V. H.).
- 21 M. cardinalis Ehrenb. in Abh. Berl. Ak. (1840) p. 19; Van Heurck Syn. p. 74, Atl. suppl. fig. 5 et Treat. p. 165 pl. 2 fig. 72; De Wild. loc. cit. p. 204; De-Toni Syll. Alg. II p. 12. Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).
- N. Cesatii Rabenh. Süssw. Diat. (1853) p. 39 pl. 6 fig. 89; Van Heurek Syn. p. 88, Atl. pl. 8 fig. 35 et Treat. p. 190 pl. 3 fig. 143; De Wild. loc. cit. p. 221; De-Toni Syll. Alg. II p. 59.
 Bt: Bergh (Del.).
- 23 N. cineta (Ehrenb.) Kuetz. ex Van Heurek Syn. p. 82, Atl. pl. 7 fig. 13-14 et Treat. p. 178 pl. 3 fig. 105; De Wild. loc. cit. p. 213; De-Toni Syll. Alg. II p. 89.
 Lg.: Jalhay, Winamplanche (Nob.).

- N. cincta f. minuta Van Heurek Syn. (1885) p. 82 et Treat. p. 178; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 214; De-Toni Syll. II p. 89. Fl. occ.: Ostende (V. H.).
- var. Heufleri Grun. in Van Heurck loc. cit. fig., 12, 15 et
 Treat. loc. cit. fig. 106; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. II p. 40.
 Navicula Grun. in Verhandl. Wien (1860) p. 518 pl. 7 fig. 12, 15.
 A.: Austruweel (Gautier).
- var. leptocephala Van Heurck loc. cit. fig. 16 et Treat. loc.
 cit. fig. 107; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. loc. cit.
 Navicula Bréb.
 - A.: Austruweel (Gautier).
- 24 N. contenta Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 109, Atl. pl. 14 fig. 31 sub n. N. trinodis et Treat. p. 230 pl. 5 fig. 239; De Wild. loc. cit. p. 246; De-Toni Syll. Alg. II p. 168.
 Lx.: Rochehaut (Del.).
 - var. biceps Van Heurck (1885) loc. cit. fig. 31b. et Treat. loc. cit. fig. 240; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

 Bt: Groenendael (Del.).
- 25 N. costulata Grun. in Cleve et Mæller Diat. n. 261 et Arct. Diat. p. 27; Van Heurck Syn. Atl. suppl. fig. 15 et Treat. p. 182 pl. 3 fig. 126; De Wild. loc. cit. p. 218; De-Toni Syll. Alg. II p. 47. Bt: Rouge-cloître (Del.).
- 26 N. crabro (Ehrenb.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 83; Van Heurek Syn. p. 89, Atl. pl. 9 fig. 1, 2 et Treat. p. 192 pl. 3 fig. 144; De Wild. loc. eit. p. 222; De-Toni Syll. Alg. II p. 66.

Pinnularia — Ehrenb. in Ber. Berl. Ac. (1844) p. 85.

Fi. occ.: Ostende, Blankenberghe (V. H.).

N. crucicula (W. Sm.) Donk. Brit. Diat. (1871) p. 44 pl. 6 fig. 14;
 Van Heurck Syn. p. 96, Atl. pl. 10 fig. 15 et Treat. p. 207 pl. 4 fig. 172; De Wild. loc. cit. p. 229; De-Toni Syll. Alg. II p. 115.

Stauroneis - W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 60 pl. 19 fig. 162.

A.: Anvers (V. H.). - Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- var. protracta Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 35 pl. 2 fig. 37; Van Heurck Syn. p. 96, Atl. suppl. fig. 27 et Treat. fig. 173; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
 - A.: Austruweel (V. H.). Lg.: env. de Spa (Nob.).
- 28 N. cruciformis Donk. in Micr. Journ. (1861) p. 10 t. 1 fig. 7; Van Heurck Syn. p. 74, Atl. supp. t. A fig. 8 et Treat. p. 166 pl. 2 fig. 75; De Wild. loc. cit. p. 205; De Toni Syll. Alg. II p. 14. Pinnularia Brebissonii var. Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 222.

FI. occ. : Blankenberghe (V. H.).

29 N. crucigerum (W. Sm.) Van Hearck Treat. (1896) p. 232 fig. 242. Schizonema — W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 74 pl. 56 fig. 354 et 57 fig. 356; Van Heurck Syn. p. 40, Atl. pl. 16 fig. 1; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 247.

Dickieia - De Toni Syll. Alg. II (1891) p. 209.

A.: Anvers (V. H.). - Fi. occ.: Blankenberghe (V. H.).

30 N. cryptocephala Kuetz. Bacill. (1844) p. 95 pl. 3 fig. 26; Van Heurck Syn. p. 84, Atl. pl. 8 fig. 5 et Treat. p. 180 pl. 3 fig. 122; De Wild. loc. cit. p. 216; De-Toni Syll. Alg. II p. 46.

Bt: Laeken (Del.). — A.: Anvers (V. H.). — Ht: env. de Tournai (Marissal). — Lg.: Ru de Chawion, Barisart, Winamplanche, Stavelot (Nob.).

— var. exilis Van Heurck Syn. p. 85 Atl. pl. 8 et Treat. loc. cit. fig. 124; De Wild. loc. cit. p. 217.

Bt: Bruxelles (V. H.).

- var. intermedia Van Heurck Atl. pl. 8 fig. 10.

Lg.: Bois des Minières (Spa), Barisart, Stavelot (Nob.).

31 N. cuspidata Kuetz. Bacill. (1844) p. 94 pl. 3 fig. 24, 37; Van Heurek Syn. p. 100 Atl. pl. 12 fig. 4 et Treat. p. 214; De Wild. loc. cit. p. 233; De-Toni Syll. II p. 136.

N. fulva Ehrenb. Inf. 1838 p. 177 pl. 13 fig. 7 ex p.

Bi: env. de Louvain (Paque). — A.: env. de Turnhout (Paque). — Commun (V. H.).

— var. halophila Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 100 Atl. suppl. fig. 30 et Treat. loc. cit. fig. 191; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

32 N. dicephala Ehrenb. Inf. (1838) p. 185; Van Heurek Syn. p. 87, Atl. pl. 8 fig. 33 et Treat. p. 188 pl. 3 fig. 138; De Wild. loc. cit. p. 221; De-Toni Syll. Alg. II p. 57.

Bt: Ixelles, Rouge-Cloître (Del.). - Lg.: Francorchamps (Nob.).

33 N. didyma Ehrenb. Kreideth. (1840) p. 75; Van Heurck Syn. p. 90, Atl. pl. 9 fig. 56 suppl. fig. 20 et Treat. p. 193 pl. 3 fig. 187; De Wild. loc. cit. p. 223; De-Toni Syll. Alg. II p. 71.

A.: Anvers (Ehrenberg). — Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (V. H.).

34 N. digito-radiata (Greg.) Ralfs in Pritch. Inf. (1852) p. 904; Van Heurek Syn. p. 86, Atl. pl. 7 fig. 4 et Treat. p. 184 pl. 3 fig. 130; De Wild. loc cit. p. 219; De-Toni Syll. Alg. II p. 51.

Pinnularia — Greg. in Micr. Journ. IV (1856) p. 9 pl. I fig. 32.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- var. cyprinus (W. Sm.) Van Heurek loc. cit. (1885) fig. 3 et Treat. fig. 131; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Ostende (Deby), Blankenberghe (V. H.).

- 35 N. distans (W. Sm.) Ralfs in Pritch. Inf. (1852) p. 907; Van Heurck Syn. p. 87, Atl. suppl. fig. 18 et Treat. p. 185 pl. 3 fig. 133;
 De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 220; De-Toni Syll. Alg. II p. 53.
 Pinnularia W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 56 pl. 18 fig. 169.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 36 N. divergens (W. Sm.) Ralfs in Pritch. Inf. (1852) p. 986; Van Heurck Treat. p. 170 pl. 85 fig. 706; De-Toni Syll. Alg. II p. 17. Pinnularia W. Sm. Br. Diat. I (1853) p. 57 pl. XIX fig. 178, pl. XVIII fig. 177.

Lg.: Ardennes Liégeoises (Nob.).

- 37 N. elliptica Kuetz. Bacill. (1844) p. 98 pl. 30 fig. 55; Van Heurck Syn. p. 92, Atl. pl. 10 fig. 10 et Treat. p. 201 pl. 4 fig. 156; De Wild. loc. cit. p. 225; De-Toni Syll. Alg. II p. 89.
 Bi: Bruxelles (Del.).
 - var. oblongella Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 12 et Treat. loc. cit. fig. 157; De Wild. loc. cit.

Navicala - Naeg. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 890.

Lg.: Stoumont (Nob.).

— var. minima Grun. in Van Heurek loc. cit. (1885) fig. 11 et Treat. loc. cit. fig. 158; De Wild. loc. cit.; De Toni loc. cit. sub n. minutissima.

Sine loc. (V. H.).

- 38 N. elongata Grun. in A. Schm. Atl. (1877) pl. 50 fig. 27-29; De Wild. loc. cit. p. 247; De-Toni Syll. Alg. II p. 189.
 Lg.: Barisart, Ru de Chawion (Nob.).
- 39 N. Eugeniae A. Schm. Atl. (1875) pl. 8 fig. 44-45; Van Heurek Treat. p. 196 pl. 26 fig. 740; De-Toni Syll. Alg. II p. 175.
 Fi. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 40 N. exilis Kuetz. Bacill. (1844) p. 95 pl. 4 fig. 6; Van Heurek Syn. p. 100, Atl. pl. 12 fig. 11-12 et Treat. p. 217 pl. 4 fig. 197; De Wild. loc. cit. p. 235; De-Toni Syll. Alg. II p. 142. Lg.: Wayai, Winamplanche, Stavelot, Francorchamps, Jalhay (Nob.).
- 41 N. exilissima Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 108, Atl. pl. 14 fig. 30 et Treat. p. 129 pl. 5 fig. 234; De Wild. loc. cit. p. 245; De-Toni Syll. Alg. II p. 167.
 Bt: Groenendael (Del.).
- 42 N. falaisensis Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 108, Atl. pl. 14 fig. 5 et Treat. p. 228 pl. 5 fig. 232; De Wild. loc. cit. p. 244; De-Toni Syll. Alg. II p. 166.

 Lx.: Bouillon (Del.).

- 43 N. firma Kuetz. Bacill. (1844) p. 92 pl. 21 fig. 10; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 241; De-Toni Syll. Alg. II p. 155.
 Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Dieghem (Del.).
- 44 N. Flotowii Grun. in Van Heurek (1885) Syn. p. 109, Atl. pl. 14 fig. 41 et Treat. p. 230 pl. 5 fig. 238; De Wild. loc. cit. p. 246; De-Toni Syll. Alg. II p. 168.
 Lx.: Frahan (Del.).
- 45 N. fontinalis Grun. in Van Heurek (1885) loc. cit. p. 103, Atl. pl. 12 fig. 33 et Treat. p. 220 pl. 6 fig. 211; De Wild. loc. cit. p. 239; De-Toni Syll. Alg. II p. 150.
 - Bt: Bruxelles (Del.). Lg.: env. de Spa (Nob.).
- 46 N. forcipata Grev. in Micr. Journ. VI (1859) p. 83 pl. 6 fig. 10-41;
 Van Heurck Syn. p. 94, Atl. pl. 10 fig. 3 et Treat. p. 203 pl. 4 fig. 163; De Wild. loc. cit. p. 227; De-Toni Syll. Alg. II p. 97.
 A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 47 N. formosa Greg. in Trans. Micr. Journ. IV (1856) p. 42 pl. 5 fig. 6;
 Van Heurek Syn. p. 102, Atl. pl. 11 fig. 11 et Treat. p. 218 pl. 5
 fig. 199; De Wild. loc. cit. p. 236; De-Toni Syll. Alg. II p. 142.
 A.: Anvers (V. H.).
- 48 N. fusca (Greg.) Ralfs in Pritch. Inf. (1852) p. 898; Van Heurck Syn. p. 91, Atl. suppl. fig. 24 et Treat. p. 198 pl. 4 fig. 153; De Wild. loc. eit. p. 224; De-Toni Syll. Alg. II p. 87.

N. Smithii var. fusca Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 14 pl. 1 fig. 15.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

var. hyperborea (Grun.) Van Heurek Treat. (1896) p. 199
 pl. 26 fig. 745.

N. hyperborea Grun. in Verhandl. zool. bot. Gesell. Wien (1860) p. 531 pl. I fig. 16.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

49 N. gallica (W. Sm.) Lagerst. Spetsb. Diat. (1873) p. 937; Van Heurck Syn. p. 108, Atl. pl. 14 fig. 29 et Treat. p. 229 pl. 5 fig. 237; De Wild. loc. cit. p. 246; De-Toni Syll. Alg. II p. 168.

Diadesmis — W. Sm. in Ann. Nat. Hist. ser. II vol. XIX (1858) p. 11 pl. 2 fig. 10.

Bt: Bruxelles (Del.).

- 50 N. gastrum Ehrenb. Amer. (1843) p. 133 pl. 3, VII fig. 23; Van Heurck Syn. p. 87, Atl. pl. 8 fig. 25, 27, 32 et Treat. p. 186 pl. 3 fig. 134; De Wild. loc. cit. p. 220; De-Toni Syll. Alg. II p. 53.
 A.: Anvers (V. H.).
 - var. placentula (Ehrenb.) Van Heurck loc. cit. (1885) fig.

26, 28 et Treat. p. 186 fig. 135; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 220.
N. placentula Kuetz. Bacill. (1844) p. 94 pl. 28 fig. 37.
Pinnularia — Ehrenb. Amer. (1843) p. 133 pl. 3, VII fig. 22.

A.: Anvers (V. H.).

51 N. gibba (Ehrenb.) Kütz. Bacill. (1844) p. 98 pl. 28 fig. 70; Van Heurck Syn. p. 78, Atl. suppl. fig. 12 et Treat. p. 172; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 208; De-Toni Syll. Alg. II p. 27.

Pinnularia — Ehrenb. Verb. (1843) p. 1 et fig. plur.

Bt: Eegenhoven (Gautier). — Lg.: Ru de Chawion, bois des Minières, Francorchamps, Stoumont (Nob.).

— var. brevistriata Grun. in Van Heurck loc. cit. (1885) Atl. pl. 6 fig. 5; De Wild. loc. cit.

Lg.: Vallée de Tolifa, Wayai, bois des Minières, Stoumont, Stavelot (Nob.).

52 N. globiceps Ralfs in Pritch. Inf. (1852), p. 897; Van Heurck Syn. p. 79, Atl. suppl. fig. 13 et Treat. p. 173 pl. 2 fig. 94; De Wild. loc. cit. p. 210; De-Toni Syll. Alg. II p. 31.

Pinnularia — Greg. in Micr. Journ. IV (1856) p. 10 t. 3 fig. 34.

A.: Anvers (Schyn) (V. H.).

- 53 N. gracilis Kuetz. Bacill. (1844) p. 91, pl. 3 fig. 48, pl. 30 fig. 57;
 Van Heurek Syn. p. 83, Atl. pl. 9 fig. 7-8 et Treat. p. 178 pl. 3 fig. 109; De Wild. loc. cit. p. 214; De-Toni Syll. Alg. II p. 40.
 A.: Anvers (V. H.). Lg.: Stavelot (Nob.).
 - var. schizonemoides Van Heurek loc. cit. (1885) Atl. pl. 7 fig. 9-10 et Treat. loc. cit. fig. 110; De Wild. loc. cit. p. 215. Bt: Louvain (Gautier).
- 54 N. granulata Bréb. in Donk. Trans. Micr. Soc. VI (1858) p. 17 pl. 3 fig. 19 a-b; Van Heurek Syn. p. 98, Atl. pl. 11 fig. 15 et Treat. p. 211 pl. 4 fig. 183; De Wild. loc. cit. p. 231; De-Toni Syll. Alg. II p. 127.

Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (V. H.).

55 N. gregaria Donk. in Micr. Journ. (1861) p. 10 pl. 6 fig. 10; Van Heurek Syn. p. 85, Atl. pl. 8 fig. 12-15 et Treat. p. 181 pl. 3 fig. 125; De Wild. loc. cit. p. 218; De-Toni Syll. Alg. II p. 46.

A.: Austruweel (V. H.). — Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

56 N. Grevillei (Ag.) Van Heurck Treat. (1896) p. 232 pl. 5 fig. 243.
Schizonema — Ag. Consp. (1830) p. 199; Van Heurck Atl. pl. 16 fig. 2;
De Wild. loc. cit. p. 248.

Libellus — Cleve Diat. of Arct. sea (1873) p. 18; De-Toni Syll. Alg. II p. 201.

Navicula Delognei Van Heurck Syn. (1885) Atl. pl. 11 fig. 3.

Fl. occ.: Ostende (West.), Blankenberghe (V. H.).

- 57 N. Hennedyi W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 93; Van Heurek Syn. p. 93, Atl. pl. 9 fig. 14 et Treat. p. 204 pl. 4 fig. 160; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 226; De-Toni Syll. Alg. II p. 103.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - var. clavata Van Heurck Syn. (1885) p. 93 et Treat. p. 204; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 102.
 Navicula Greg. in Micr. Journ. (1859) p. 46 pl. 5 fig. 17.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 58 N. Hilseana Janisch in Schm. Atl. (1876) t. 45 fig. 63, 73-74; Van Heurck Syn. p. 77, Atl. suppl. fig. 11 et Treat. p. 171 pl. 2 fig. 81; De Wild. loc. cit. p. 207; De-Toni Syll. Alg. II p. 22.
 - Lx.: Paliseul (Del.). Lg.: Wayai, bois des Minières, Jalhay, Stavelot, bois Gossonfays, ru de Chefna, ru de Chawion (Nob.).
- 59 N. humerosa Bréb. in W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 93; Van Heurck Syn. p. 98, Atl. pl. 11 fig. 20 et Treat. p. 211 pl. 4 fig. 182; De Wild. loc. cit. p. 231; De-Toni Syll. Alg. II p. 127.
 Fl. occ.: Blankenberghe (Petit.).
- 60 N. humilis Donk. Brit. Diat. II (1856) p. 67 pl. 10 fig. 7; Van Heurek Syn. p. 85, Atl. pl. 2 fig. 23 et Treat. p. 182 pl. 3 fig. 127; De Wild. loc. cit. p. 218.

Navicula hungarica var. humilis Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 27; De·Toni Syll. Alg. II p. 47.

Bt: Bruxelles (V. H.), St Josse-ten-Noode (Del.).

- 61 N. incerta Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 107, Atl. pl. 14 fig. 43 et Treat. p. 226 pl. 5 fig. 227; De Wild. loc. cit. p. 243, De-Toni Syll. Alg. II p. 165.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 62 N. inflata Kuetz. Bacill. (1844) p. 99 pl. 3 fig. 36; De Wild. loc. cit. p. 239; De-Toni Syll. Alg. II p. 149.
 Bt: env. de Bruxelles (Del.); env. de Louvain (Paque).
- 63 N. integra (W. Sm.) Ralfs in Pritch. Inf. (1853) p. 895; Van Heurck Syn. p. 96, Atl. pl. 11 fig. 22 et Treat. p. 208 pl. 4 fig. 174;
 De Wild. loc. cit. p. 230; De-Toni Syll. Alg. II p. 116.
 Pinnularia W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 96.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 64 N. interrupta (Bail.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 100 pl. 19 fig. 93;
 Van Heurek Syn. p. 89, Atl. pl. 9 fig. 7-8 et Treat. p. 192 pl. 3 fig. 145; De Wild. loc. cit. p. 222; De-Toni Syll. Alg. II p. 70.
 Fl. occ.: Ostende (Deby). A.: Anvers (V. H.).
- 65 N. Iridis Ehrenb. Verbr. (1843) p. 130. pl. 4, I fig. 2; Van Heurek

Syn. p. 103, Atl. pl. 13 fig. 1 et Treat. p. 220 pl. 5 fig. 212; DeWild. Fl. Alg. Belg. p. 239; De-Toni Syll. Alg. II p. 153.

Lx.: Plainevaux (Del.). — Lg.: Barisart (Nob.).

N. Iridis var. amphigomphus (Ehrenb.) Van Heurek Syn. (1885) p. 104, Atl. pl. 13 fig. 2 et Treat. fig. 213; De Wild. loc. cit. p. 240; De-Toni loc. cit. p. 154.

Navicula - Ehrenb. Verbr. (1843) p. 129 pl. 3 fig. 8.

Lg.: Wayai, bois des Minières, ru de Chawion, ru de Chefna, Coquaifange (Nob.).

— var. amphirhynchus (Ehrenb.) Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 5 et Treat. fig. 214; De Wild. loc. cit.

Navicula — Ehrenb. loc. cit. (1843) fig. 10.

Lg.: Bois des Minières, Coquaifange (Nob.).

- var. acuminata (Pero) De Wild. loc. cit. (1896) p. 240.
 N. amphirhynchus var. Pero ex Bull. Soc. belge de micr. t. XX p. 165.
 Lg.: Francorchamps (Nob.).
- var. dubia Van Heurck loc. cit. (1885) Atl. suppl. fig. 32 et Treat. fig. 215; De Wild. loc. cit.

Navicula - Ehrenb. loc. cit. (1843) p. 130 pl. 2, II fig. 8.

Bt: La Hulpe (Del.).

- var. undulata Grun, in Verhandl. k. k. bot.-zool. Gesell. Wien (1860) p. 541 pl. 3 fig. 6; Van Heurck loc. cit. Atl. pl. 13 fig. 6 et Treat, fig. 216; De Wild. loc. cit.
 - A.: Anvers (V. H.).
- var. affinis (Ehrenb.) Van Heurek loc. cit. (1885) fig. 4 et Treat. fig. 217; De Wild. loc. cit.

Navicula — Ehrenb. Amer. (1843) p. 129 et fig. plur.

Sine loco (V. H.).

- 66 N. Johnsonii (W. Sm.) O'Meara Irish. Diat. (1876) p. 373 pl. 31 fig. 46;
 Van Heurek Syn. p. 99, Atl. suppl. fig. 28; De Wild. loc. cit. p. 233.
 - var. belgica Van Heurek loc. cit. (1885) fig. 29 et Treat.
 p. 214 pl. 4 fig. 189.

Navicula scopulorum var. belgica De-Toni Syll. Alg. II (1891) p. 135. Fl. occ.: Ostende (Petit).

- 67 N. lacunarum Grun. in Van Heurck Atl. (1883) pl. 12 fig. 31; De Wild. loc. cit. p. 243; De-Toni Syll. Alg. II p. 165.
 Lg.: Bois des Minières (Spa) (Nob.).
- 68 N. lanceolata Kuetz. Bacill. (1844) p. 94 pl. 30 fig. 48, pl. 28 fig. 38; Van Heurck Syn. p. 88, Atl. pl. 8 fig. 16 et Treat. p. 186 pl. 3 fig. 139; De Wild. loc. cit. p. 221; De-Toni Syll. Alg. II p. 57. Bt: Louvain (Gautier).

N. lanceolata f. curta Van Heurek Syn. (1885) p. 88, Atl. pl. 7 fig. 8 et Treat. p. 186 pl. 3 fig. 140; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 221. N. lanceolata f. minuta Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 175; De-Toni Syll. Alg. II p. 58.

Bt: Louvain (Gautier).

- var. phyllepta Van Heurek Syn. (1885) p. 88 pl. 8 fig. 40 et Treat. loc. cit. fig. 141; De Wild. loc. cit.

N. phyllepta Kuetz. Bacill. (1844) p. 94 pl. 30 fig. 56.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

69 N. lata Bréb. in Kuetz. Bacill. (1844) p. 94 pl. 3 fig. 51; Van Heurck Syn. p. 76, Atl. pl. 6 fig. 1-2 et Treat. p. 169 pl. 2 fig. 76; De Wild. loc. cit. p. 205; De-Toni Syll. Alg. II p. 18.

Frustulia - Bréb. Consp. Diat. (1838) p. 38.

Lg.: Vallée de Tolifa (Winamplanche) (Nob.).

70 N. latissima Greg. in Trans. Micr. Journ. IV (1856) p. 40 pl. 5 fig. 4; Van Heurek Treat. p. 211 pl. 27 fig. 762; De-Toni Syll. Alg. II p. 132.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

71 N. latiuscula Kuetz. Bacill. (1844) p. 93 pl. 5 fig. 11; De Wild. loc. cit. p. 237; De-Toni Syll. Alg. II p. 145; Van Heurck Syn. Atl. suppl. pl. B fig. 29b et Treat. p. 218 pl. 5 fig. 200.

Bt: Héverlé (Paque). - A.: env. de Turnhout (Paque).

72 N. Legumen Ehrenb. Amer. (1843?) t. 4, I fig. 17 etc.; Van Heurck Syn. p. 80, Atl. pl. 6 fig. 16 et Treat. p. 174 pl. 2 fig. 98; De Wild. loc. cit. p. 211; De-Toni Syll. Alg. II p. 33.

N. legumen var. decrescens Van Heurck Atl. pl. 6 fig. 16.

 Lx .: Liresse (Del.). — Lg .: Wayai, Stavelot, Cour, Jalhay, ru de Chawion (Nob.).

73 N. lepidula Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 108, Atl. pl. 14 fig. 42 et Treat. p. 229 pl. 5 fig. 236; De Wild. loc. cit. p. 245; De-Toni Syll. Alg. II p. 167.

Bt: Groenendael (Del.).

74 N. levissima (Kuetz.) Grun.; Van Heurck Atl. (1880) pl. 13 fig. 13 et Treat. p. 225 pl. 27 fig. 775.

Lg.: env. de Spa (Nob.).

75 N. liber W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 48 pl. 16 fig. 133; Van Heurek Syn. p. 104, Atl. pl. 12 fig. 36 et Treat. p. 222 pl. 5 fig. 219; Syll. Alg. II p. 157.

Lavage de moules (Deby).

76 N. liburnica Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 547 pl. 1 fig. 15; Van Heurck Syn. p. 102, Atl. pl. 11 fig. 3 et

Treat. p. 218 pl. 5 fig. 201; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 236; De-Toni Syll. Alg. II p. 143.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 77 N. limosa Kuetz. Bacill. (1844) p. 101 pl. 3 fig. 50; Van Heurck Syn. p. 103, Atl. pl. 12 fig. 18 et Treat. p. 219 pl. 5 fig. 207; De Wild. loc. eit. p. 237; De-Toni Syll. Alg. II p. 147.
 - Bt: Louvain (Gautier). Lx.: Laviot (Del.). A.: Anvers (V. H.). Lg.: Winamplanche, Stavelot, Hockay (Nob.).
 - var. gibberula Grun. in Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 19 et Treat. loc. cit. fig. 208; De Wild. loc. cit.

Navicula — Kuetz. Bacill. (1844) p. 101 pl. 3 fig. 50; De-Toni loc. cit. p. 148.

Bt: Laeken, Ixelles, Hoeylaert, Rouge-Cloître (Del.).

var. curta Grun. in Van Heurek Atl. (1881) pl. 12 fig. 23;
 De Wild. loc. cit.

Lg.: Winamplanche (Nob.).

var. subinflata Grun. in Van Heurck loc. cit. (1881) fig. 20;
 De Wild. loc. cit.

Lg.: Jalhay, Coquaifange, Stavelot (Nob.).

78 N. littoralis Donk. Nat. Hist. Brit. Diat. (1871) p. 5 pl. 1 fig. 2;
Van Heurek Syn. p. 92, Atl. suppl. fig. 25 et Treat. p. 200 pl. 4 fig. 154; De Wild. loc. cit. p. 224.

Navicula ovum Grun.; De-Toni Syll. Alg. II p. 88.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 79 N. Lyra Ehrenb. Amer. (1843) p. 131 pl. 1 fig. 9; Van Heurek Syn. p. 93, Atl. pl. 10 fig. 12 et Treat. p. 202 pl. 4 fig. 161; De Wild. p. 226; De-Toni Syll. Alg. II p. 95.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 80 N. major Kuetz. Bacill. (1844) p. 97 pl. 4 fig. 19; Van Heurek Syn. p. 73, Atl. pl. 4 fig. 3-4 et Treat. p. 165 pl. 2 fig. 68; De Wild. loc. cit. p. 203; De-Toni Syll. Alg. II p. 10.

Pinnularia — Rabenh. Süssw. Diat. (1853) p. 42 pl. VI fig. 5.

Bt: Bruxelles (Del.). — Lg.: env. de Spa (Nob.). — Commun (V. H.).

81 N. marina Ralfs in Pritch. Inf. (1852) p. 903; Van Heurek Syn. p. 98, Atl. pl. 9 fig. 16 et Treat. p. 212 pl. 4 fig. 184; De Wild. loc. cit. p. 242; De-Toni Syll. Alg. II p. 128.

Lavage de moules (Deby).

82 N. mesolepta Ehrenb. Amer. (1843?) t. 4 II fig. 4; Van Heurek Syn. p. 79, Atl. pl. 6 fig. 10-l1 et Treat. p. 174 pl. 2 fig. 96; De Wild. loc. cit. p. 210; De-Toni Syll. Alg. II p. 32.

Lg.: Winamplanche, ru de Chawion, Stavelot (Nob.). — Presque partout (V.H.).

N. mesolepta var. termes (Ehrenb.) Van Heurek Syn. (1885) p. 80, Atl. pl. 6 fig. 12-13; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 211.

Pinnularia termes Ehrenb. Amer. (1843?) t. 2, VI fig. 22.

- A.: Anvers (V. H.). Bt: Louvain (V. H.). Lg.: Jalhay (Nob.).
- var. nodosa Brun Diat. des Alpes (1880) p. 87 t. 7 fig. 31;
 Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II. p. 33.
- A.: Canal entre Turnhout et Beersse (Paque).
- var. stauroneiformis Grun.; Van Heurck Atl. (1881) pl. 6 fig. 5; De Wild. loc. cit.
- Bt: St Josse-ten-Noode, Groenendael (Del.). Lg.: Wayai, Stavelot, Cour, ru de Chawion, Stoumont, Winamplanche, Jalhay (Nob.).
- 83 N. minima Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 107, Atl. pl. 14 fig. 15 et Treat. p. 227 pl. 5 fig. 229; De Wild. loc. cit. p. 244; De-Toni Syll. Alg. II p. 166.

Bt: Bruxelles (Del.).

- 84 N. minuscula Grun. in Van Heurek Atl. (1880) pl. 14 fig. 3; Van Heurek Treat. p. 228 pl. 27 fig. 777.
 A.: Kiel (Anvers) (V. H.).
- 85 N. mutica Kuetz. Bacill. (1844) p. 93 pl. 3 fig. 32; Van Heurck Syn. p. 95, Atl. pl. 10 fig. 17 et Treat. p. 206 pl. 4 fig. 167; De Wild. loc. cit. p. 228; De-Toni Syll. Alg. II p. 114.
 - A: Anvers (V. H.), env. de Turnhout (Paque). Fl. occ.: Ostende (Rabenh.). Bt: Laeken (Del.).
 - var. Goeppertiana Cleve et Grun. Arct. Diat (1880) p. 41; Van Heurck loc. cit. fig. 18 et Treat. loc. cit. fig. 168; De Wild. loc. cit.

Stauroneis — Bleisch in Rabenh. Alg. n. 1183 et Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 248. Bt: Laeken (Del.).

— var. quinquenodis (Grun.) Van Heurck Atl. (1881) fig. 21 et Treat. loc. cit. fig. 170; De Wild. loc. cit.; De Toni Syll. Alg. II p. 115.

Navicula — Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 522 pl. I fig. 33.

Bt: Groenendael (Del.).

86 N. nobilis (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 98 pl. 4 fig 24; Van Heurck Syn. p. 73, Atl. pl. 5 fig. 2 et Treat. p. 164 pl. 2 fig. 67; De Wild. loc. cit. p. 203; De-Toni Syll. Alg. II p. 9.

Pinnularia — Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 20.

- A.: Anvers (V. H.). Lg.: Jalhay, ru de Chawion (Nob.).
- var. dactylus Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 1 et Treat. loc. cit. fig. 68; De Wild. loc. cit.

Pinnularia — Ehrenb. Amer. (1843?) p. 132 t. 4 fig. 3. Navicula — Kuetz. Bacill. (1844) p. 98 pl. 28 fig. 59. Fl. occ.: Heyst (Deby).

- 87 N. oblonga Kuetz. Bacill. (1844) p. 97 pl. 4 fig. 21; Van Heurck Syn. p. 81, Atl. pl. 7 fig. 1 et Treat. p. 177 pl. 3 fig. 100; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 212; De-Toni Syll. Alg. II p. 37. Assez commun (V. H.).
- 88 N. oculata Bréb. in Desm. Crypt. de Fr. ed. nov. (1854) n. 110; Van Heurck Syn. p. 92, Atl. pl. 9 fig. 10 et Treat. p. 201 pl. 4 fig. 155; De Wild. loc. cit. p. 225; De-Toni Syll. Alg. II p. 89. Bt.: Jardin bot. de Bruxelles, Schaerbeek (Del.).
- 89 N. palpebralis Bréb. in Sm. Brit. Diat. (1853) p. 50 pl. 31 fig. 273;
 Van Heurck Syn. p. 96, Atl. pl. 11 fig. 9 et Treat. p. 208 pl. 4 fig. 175; De Wild. loc. cit. p. 230.
 - var. obtusa Van Heurck loc. cit. (1885) p. 97, Atl. loc. cit. fig. 8 et Treat. fig. 176; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 118.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- var. angulosa Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 10 et Treat. fig. 177; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Navicula - Greg. in Trans. Micr. Journ. IV (1856) p. 42 pl. 5 fig. 8.

A.: Anvers (V. H.). - Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

— var. minor (Grun.) Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 11 et Treat. fig. 178; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Ostende (V. H.).

— var. semiplena (Greg.) Van Heurck Treat. (1896) p. 209. Pinnularia — Greg.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 90 N. peregrina (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 97 pl. 28 fig. 52;
 Van Heurck Syn. p. 81, Atl. pl. 7 fig. 2 et Treat. p. 177 pl. 3 fig. 101; De Wild. loc. cit. p. 212; De-Toni Syll. Alg. II p. 38.
 A.: Anvers (V. H.).
 - var. Meniscus Grun. Arct. Diat. (1880) p. 33; Van Heurck Syn. p. 82, Atl. pl. 8 fig. 19 et Treat. loc. cit. fig. 102; De Wild. loc. cit. p. 213; De-Toni loc. cit.

Navicula — Schum. Preuss. Diat. (1867) p. 55 pl. 2 fig. 32.

- var. Menisculus Van Heurek loc. cit. (1885) fig. 20-22 et Treat. loc. cit. fig. 102; De Wild. loc. cit. Bt: Louvain (Gautier).
- f. upsaliensis Grun. in Van Heurek loc. cit. (1885) fig. 23-24

- et Treat. p. 177 fig. 104; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 212. Bt: Louvain (Gautier).
- 91 N. permagna (Bail.) Edw. in Micr. Journ. (1860) p. 129; Van Heurck Syn. p. 102, Atl. pl. 11 fig. 1 et Treat. p. 218 pl. 5 fig. 202;
 De Wild. loc. cit. p. 236; De-Toni Syll. Alg. II p. 143.
 Pinnularia Bail. Micr. observ. (1850) p. 40 pl. 2 fig. 28-38.
 A.: Anvers (V. H.).
- 92 N. perpusilla Grun. Ueber neue Alg. in Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 552 pl. 2 fig. 7; Van Heurck Treat. p. 229 pl. 35 fig. 911.

 Bt: Rouge-Cloître (Del.).
- 93 N. polyonca Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 85; Van Heurck Syn. p. 80, Atl. suppl. fig. 14 et Treat. p. 174 pl. 2 fig. 98; De Wild. loc. cit. p. 212; De Toni Syll. Alg. II p. 34.

 Lx.: Liresse (Del.).
- 94 N. praetexta Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 20; Van Heurck Syn. p. 92, Atl. pl. 9 fig. 13 et Treat. p. 204 pl. 4 fig. 159; Syll. Alg. II p. 102.
 - FI. occ.: Blankenberghe (V. H.). A.: Anvers (V. H.).
- 95 N. pseudo-bacillum Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 45 pl. 2 fig. 52; Van Heurck Syn. p. 106, Atl. pl. 13 fig. 9 et Treat. p. 224 pl. 5 fig. 224; De Wild. loc. cit. p. 242; De-Toni Syll. Alg. II p. 161.
 - Bt: Louvain (Gautier). Lg.: Coquaifange (Nob.).
- 96 N. pupula Kuetz. Bacill. (1844) p. 93 pl. 30 fig. 40; Van Heurck Syn. p. 106, Atl. pl. 13 fig. 15-16 et Treat. p. 225 pl. 5 fig. 226; De Wild. loc. cit. p. 243; De-Toni Syll. Alg. II p. 162.
 Bt: Louvain (Gautier). A.: Anvers (V. H.).
- 97 N. pusilla W. Sm. Brit. Diat. I (1852) p. 52 pl. 17 fig. 145; Van Heurck Syn. p. 99, Atl. pl. 11 fig. 17 et Treat. p. 213 pl. 4 fig. 186; De Wild. loc. cit. p. 232; De-Toni Syll. Alg. II p. 127.
 A.: Anvers (V. H.).
- 98 N. pygmaea Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 77; Van Heurck Syn. p. 94, Atl. pl. 10 fig. 7 et Treat. p. 203 pl. 4 fig. 164; De Wild. loc. cit. p. 227; De-Toni Syll. Alg. II p. 97.
 - A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). Bt: Dieghem, Groenendael, Hoeylaert, Rouge-Cloître (Del.).
- 99 N. radiosa Kuetz. Bacill. (1844) p. 91 pl. 4 fig. 23; Van Heurck Syn. p. 83, Atl. pl. 7 fig. 20 et Treat. p. 180 pl. 3 fig. 112; De Wild. loc. eit. p. 215; De-Toni Syll. Alg. II p. 42.

Bt: Rouge-Cloître (Del.). - Lg.: Stavelot (Nob.). - Assez commun (V. H.).

- N. radiosa var. acuta (W. Sm.) Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 524; Van Heurck Syn. p. 83, Atl. pl. 7 fig. 19; De-Toni Syll. II p. 42; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 215. Lg.: Jalhay (Nob.).
 - var. tenella (Bréb.) Van Heurck loc. cit. (1885) p. 80 fig.
 21-22 et Treat. fig. 114; De-Toni loc. cit.; De Wild. loc. cit.
 Navicula Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 79.

Bi: Bruxelles (V. H.).

- var. silesiaca (Bleisch) Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 214; De Wild. loc. cit. p. 216.

Pinnularia — Bleisch Ueber ein. Diat. (1862) p. 83 Navicula viridula var. — Grun.; De-Toni Syll. Alg. II p. 44.

Bt: Hoeylaert, Rouge-Cloître (Del.).

100 N. ramosissima (Ag.) Van Heurck Treat. (1896) p. 232 pl. 5 fig. 244.

Schizonema — Ag. Syst. (1824) p. 11; Van Heurck Syn. p. 110, Atl. pl. 15 fig. 4; De Wild. loc. cit. p. 248; De-Toni Syll. Alg. II p. 286.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

— var. setacea Van Heurck Syn. (1885) p. 111, Atl. pl. 15 fig. 13; De Wild. loc. cit.

Schizonema — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 117 pl. 25 fig. 2-3; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 288.

F1. occ.: Blankenberghe (V. H.).

101 N. rectangulata Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 7 pl. 1 fig. 7;
Van Heurck Syn. p. 74, Atl. suppl. t. A fig. 7 et Treat. p. 166 pl. 2
fig. 73; De Wild. loc. cit. p. 205; De-Toni Syll. Alg. II p. 13.
Pinnularia — Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 215.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

102 N. Reinhardtii Grun. Arct. Diat. (1880) p. 32; Van Heurek Syn. p. 86, Atl. pl. 7 fig. 5-6 et Treat. p. 85 pl. 3 fig. 132; De Wild. loc. cit. p. 219; De-Toni Syll. Alg. II p. 52.

A.: Anvers (V. H.). — Bt: Louvain, Bruxelles (V. H.), La Hulpe (Del.).

- var. gracilior Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 87 et Treat. loc. cit.; De Wild. loc. cit.; De Toni loc. cit. Bt: Rouge-Cloître (Del.).
- 103 N. retusa Bréb. Diat. Cherb. (1854) f. 6; Van Heurek Syn. p. 76, Atl. suppl. A fig. 9 et Treat. p. 170 pl. 2 fig. 78; De Wild. loc. cit. p. 206; De-Toni Syll. Alg. II p. 21.
 - var. subretusa Van Heurck loc. cit. fig. 10 et Treat. p. 171 pl. 2 fig. 80; De Wild. loc. cit.

Navicula subretusa Grun. in A. Schm. Atl. pl. 46 (1876) fig. 45-46. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- N. rhynchocephala Kuetz. Bacill. (1844) pl. 30 fig. 35; Van Heurck Syn. p. 84, Atl. pl. 7 fig. 31 et Treat. p. 181 pl. 3 fig.119; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 217; De-Toni Syll. Alg. II p. 44.
 A.: Anvers (V. H.).
 - var. amphiceros Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 33; Van Heurck loc. cit. fig. 30 et Treat. loc. cit. fig. 120; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 45.

Navicula - Kuetz. Bacill. (1844) p. 95 pl. 3 fig. 39.

A.: Anvers (V. H.).

var. rostellata Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880)
 33; Van Heurck loc. cit. fig. 23 et Treat. loc. cit. fig. 121; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Navicula - Kuetz. Bacill. (1844) p. 95 pl. 3 fig. 65.

A.: Anvers (V. H.). - Lg.: Jalhay (Nob.).

— f. minor Van Heurek loc. cit. (1885) fig. 34; De Wild. loc. cit.

Lg.: Jalhay (Nob.).

105 N. salinarum Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 33 pl. 2 fig. 34; Van Heurck Syn. p. 82, Atl. pl. 8 fig. 9 et Treat. p. 178 pl. 3 fig. 108; De Wild. loc. cit. p. 214; De-Toni Syll. Alg. II p. 80.

Fl. occ.: Heyst (Deby). - A.: Escaut (V. H.).

106 N. Sandriana Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1863) p. 153 pl. 13 fig. 5; Van Heurck Treat. p. 204 pl. 27 fig. 756; De-Toni Syll. Alg. II p. 105.

FI. occ.: Blankenberghe (V. H.).

107 N. Schumanniana Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 99, Atl pl. 11 fig. 21 et Treat. p. 213 pl. 4 fig. 187; De Wild. loc. cit. p. 232; De-Toni Syll. Alg. II p. 132.

A.: Anvers (Gautier). - Bt: Bruxelles (Del.).

108 N. sculpta Ehrenb. Mikrogeol. (1854) pl. 10 fig. 5 a-b; Van Heurek Syn. p. 100, Atl. pl.12 fig. 1 et Treat. p. 216 pl. 4 fig. 194; De Wild. loc. cit. p. 234.

Navicula rostrata Ehrenb.; De-Toni Syll. Alg. II p. 139.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.); entre Ostende et Nieuport (West. et Wall. ex Rabenh. Fl. Alg. Eur. I p. 192). — Bi: Perck (Gautier).

109 N. scutelloides W. Sm. in Micr. Journ. IV (1856) p. 4 pl. 1 fig. 15; De Wild. loc. cit. p. 232; De-Toni Syll. Alg. II p. 133. Bt: Zoetwater (Paque).

- 110 N. Scutum Schum. in Königsb. Schrift. (1863) p. 188 pl. 9 fig. 45; Van Heurck Syn. p. 98, Atl. pl. II fig. 14 et Treat. p. 213 pl. 4 fig. 185; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 232. Ht: Manage (Gautier).
- 111 N. Seminulum Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 552 pl. 2 fig. 2; Van Heurck Syn. p. 107, Atl. pl. 14 fig. 9 et Treat. p. 227 pl. 5 fig. 228; De Wild. loc. cit. p. 244; De-Toni Syll. Alg. II p. 166.

Bt: Bruxelles, Groenendael (Del.).

112 N. serians (Bréb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 92 pl. 18 fig. 43 pl. 30 fig. 22; Van Heurck Syn. p. 101, Atl. pl. 12 fig. 7 et Treat. p. 217 pl. 4 fig. 196; De Wild. loc. cit. p. 235; De-Toni Syll. Alg. II p. 140.

Frustulia — Bréb. mss.

- A.: Calmpthout (Deby). Fl. occ.: Tête-de-Flandre (V. H.). Lg .: Francorchamps, Stoumont (Nob.).
 - var. minima Grun. in Van Heurck Atl. pl. 30 (1885) fig. 8; De Wild. loc. cit.

Lx.: Bouillon (Del.).

- var.brachysira (Bréb.) Van Heurch loc. cit. (1885) Atl. suppl. fig. 126 et Treat. fig. 197; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. Navicula Bréb. in Rabenh. Süssw. Diat. (1853) p. 39 pl. 5 fig. 11.
 N.: Cornimont (Del.). Lx.: Bouillon (Del.).
- 113 N. Smithii Bréb. in W. Smith Brit. Diat. II (1856) p. 92; Van Heurck Syn. p. 91, Atl. pl. 9 fig. 12 suppl. fig. 23 et Treat. p. 197 pl. 4 fig. 151 a, b; De Wild. loc. cit. p. 224; De-Toni Syll. Alg. II p. 86.

A.: Anvers (V. H.). - Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

var. Scutellum Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 11 et Treat.
 p. 198 pl. 4 fig. 152; De Wild. loc. cit.

N. scutellum O'Meara Irish. Diat. (1876) p. 396 pl. 33 p. 14.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- N. sphaerophora Kuetz. Bacill. (1844) p. 95 pl. 4 fig. 7; Van Heurck Syn. p. 100, Atl. pl. 12 fig. 2-3 et Treat. p. 216 pl. 4 fig. 195; De Wild. loc. cit. p. 234; De-Toni Syll. Alg. II p. 140;
 Bt: Bruxelles, Ixelles, St Josse-ten-Noode, Laeken (Del.).
- 115 N. stauroptera Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 516 pl. 2 fig. 18; Van Heurek Syn. p. 77, Atl. pl. 6 fig. 7 et Treat. p. 171 pl. 2; fig. 85; De Wild. loc. cit. p. 208; De-Toni Syll. Alg. II p. 25.

Pinnularia — Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 222.

- ${\tt Bt:Eegenhoven}$ (Gautier), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). Lg.: Cour, ru de Chefna (Nob).
- N. stauroptera var. parva Grun. in Verh. zool.-bot. Gesells. Wien (1860) fig. 19; Van Heurck Atl. pl. 6 fig. 6 et Treat. p. 172 fig. 86; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 208; De-Toni Syll. II p. 25.
 Stauroptera Ehrenb. Verb. (1843) p. 136 pl. 3 fig. 19.

Fl. occ.: env. de Nieuport (West. et Wall.).

116 N. subcapitata (Greg.) Ralfs in Pritch. Diat. (1861) p. 902; Van Heurck Syn. p. 78, Atl. pl. 6 fig. 22 et Treat. p. 173 pl. 2 fig. 91; De Wild. loc. cit. p. 209; De-Toni Syll. Alg. II p. 28.

Pinnularia — Greg. in Micr. Journ. (1856) pl. 3 fig. 30.

Lx.: Noire-fontaine (Del.). - Ht.: Manage (Gautier).

- var. paucistriata Van Heurck Syn. (1885) p. 79 et fig. 23 et
 Treat. loc. cit.; De Wild. loc. cit.
 Sine loco (V. H.).
- var. stauroneiformis Van Heurck Atl. (1881) pl. 6 fig. 22;
 De Wild. loc. cit.

Lg.: Coquaifange, ru de Chawion, Jalhay, Stavelot (Nob.).

- N. subhamulata Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 106, Atl. pl. 13 fig. 14 et Treat. p. 224 pl. 5 fig. 224; De Wild. loc. cit. p. 243; De-Toni Syll. Alg. II p. 162.
 Bt: Bruxelles (Del.).
- 118 N. sublinearis Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 76, Atl. pl. 6 fig. 25-26 et Treat. p. 170 pl. 2 fig. 78; De Wild. loc. cit. p. 206; De-Toni Syll. Alg. II p. 21.

Lg.: Francorchamps, Stoumont, bois Gossonfays, bois des Minières (Nob.).

- N. suborbicularis Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 15 pl. 1 fig. 17;
 Van Heurck Treat. p. 199 pl. 26 fig. 748.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- N. Tabellaria Kuetz. Bacill. (1844) p. 98 pl. 18 fig. 79-30, pl. 80 fig. 20; Van Heurck Syn. p. 78, Atl. pl. 6 fig. 8 et Treat. p. 172 pl. 2 fig. 87; De Wild. loc. cit. p. 208; De-Toni Syll. Alg. I p. 26. Pinnularia Ehrenb. Verb. (1843) p. 134 et fig. plur.
 Bt: Eegenhoven (Gautier). Lg.: Stoumont (Nob.).
- 121 N. tortuosa Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1843) p. 271; De Wild. loc. cit. p. 247; De-Toni Syll. Alg. II p. 287.

Scoliopleura — Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 230; De-Toni Syll. Alg. II p. 267.

- A.: Anvers (Ehrenb. in Abhandl. Ak. Berl. (1843) p. 271).
- 122 N. Trevelyana Donk. in Quek. Journ. Micr. Sc. I (1861) p. 8 t. 1 fig. 2; Van Heurek Syn. p. 74, Atl. suppl. fig. 5-6 et Treat.p. 166

pl. 2 fig. 72; De-Wild, Fl. Alg. Belg. p. 204; De-Toni Syll. Alg. II p. 13.

Pinnularia — Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 210.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- N. Tuscula Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1840) p. 21; Van Heurck Syn. p. 95, Atl. pl. 10 fig. 14 et Treat. p. 256 pl. 4 fig. 166; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 228; De-Toni Syll. Alg. II p. 113.
 Lx.: Orval (Del.). Bt: Bergh (Del.). A.: Anvers (V. H.).
- 124 N. vacillans Schmidt Atl. (1875) pl. 8 fig. 61; Van Heurck Syn. p. 90, Atl. pl. 9 fig. 9 et Treat. p. 194 pl. 3 fig. 150; De Wild. loc. cit. p. 223; De Toni Syll. Alg. II p. 76.
 Fl. occ.: Ostende (V. H.).
- N. ventricosa Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ac. 1830 p. 67; Van Heurck Syn. p. 103, Atl. pl. 12 fig. 24 et Treat. p. 220 pl. 5 fig. 209; De Wild. loc. cit. p. 238; De-Toni Syll. Alg. II p. 148.
 A.: Anvers (V. H.). Lg.: Barisart, Spa (Nob.).
 - var. minuta Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 26 et Treat. loc. cit. fig. 210; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 149.

Bt: Bruxelles (Del.). — Lg.: Vallée de Tolifa, Coquaifange, Barisart (Nob.).

126 N. viridis (Nitzsch) Kuetz. Bacill. (1844) p. 97 pl. 4 fig. 18 pl. 30 fig. 12; Van Heurck Syn. p. 73, Atl. pl. 5 fig. 5 et Treat. p. 165 pl. 2 fig. 70; De Wild. loc. cit. p. 203; De-Toni Syll. Alg. II p. 11.

Bacillaria - Nitzsch Beitr. (1817) pl. 6 fig. 11-3.

Lg.: env. de Spa (Nob.). — Commun (V. H.).

- var. commutata Grun. in Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 6 et Treat. loc. cit. fig. 71; De Wild. loc. cit. p. 204; De-Toni loc. cit. Ht: Manage (P. Gautier). Lg.: Wayai, Winanplanche (Nob.).
- var. acuminata (W. Sm.) De Wild. loc. cit. Lg.: Barisart (Nob.).
- 127 N. viridula Kuetz. Syn. Diat. (1833) pl. 1 fig. 12; Van Heurck Syn. p. 84, Atl. pl. 7 fig. 25 et Treat. p. 179 pl. 3 fig. 115; De Wild. loc. cit. p. 216; De-Toni Syll. Alg. II p. 48.

Bt: Schaerbeek (vallée de Josaphat) (Del.). — Ht: env. de Tournai (Marissal).

var. avenacea Grun. Diat. Kasp. Meere (1878) p. 112 pl. 4 fig.
 Wan Heurek loc. cit. fig. 27 et Treat. p. 180 pl. 3 fig. 117;
 Wild. loc. cit.

Navicula - Bréb. mss.

Bt: Schaerbeek (Vallée de Josaphat) (Del.). — Lg.: Vallée de Tolifa (Nob.). — var. slesvicensis (Grun.) Van Heurek loc. cit. (1885) fig.

28-29 et Treat. p. 118 fig. 118; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 216. Navicula — Grun. in Möll. Typen Platten.

Bi: Louvain (Gautier). - A.: Anvers (V. H.).

128 N. vulpina Kuetz. Bacill. (1844) p. 92 pl. 3 fig. 43; Van Heurck Syn. p. 83, Atl. pl. 7 fig. 18 et Treat. p. 179 pl. 3 fig. 111; De-Toni Syll. Alg. II p. 41.

Pinnularia — Rabenh. Süssw. Diat. (1853) p. 43 pl. 6 fig. 38. Lg.: env. de Spa (Nob.).

- 129 N. Weissflogii Schm. Atl. (1875) pl. 12 fig. 26-52; Van Heurck Syn. p. 90, Atl. suppl. fig. 21 et Treat. p. 194 pl. 3 fig. 148; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 223; De-Toni Syll. Alg. II p. 75.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 130 N. zellensis Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 520 pl. 1 fig. 34; Van Heurek Atl. pl. 12 fig. 14; De Wild. loc. cit. p. 211; De-Toni Syll. Alg. II p. 34.
 Lg.: Bois Gossonfays (Nob.).
 - 7 VAN HEURCKIA Bréb. Essai monogr. Van Heurckia (1869) p. 3; Van Heurck Syn. p. 112 et Treat. p. 239; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 249.
- 1 V. rhomboides Bréb. Essai (1869) p. 11; Van Heurek Syn. p. 112, Atl. pl. 17 fig. 1-2 et Treat. p. 240 pl. 5 fig. 249; De Wild. loc. cit. p. 249.

Frustulia — De-Toni Syll. Alg. II (1891) p. 277.

Bt: Koekelberg, bois de la Cambre, Rouge-Cloître (Del.). — A.: Calmpthout (Deby). — Lg.: Bois des Minières, Jalhay, Stavelot, bois Gossonfays, ru de Chawion, Hockay, ru de Chefna (Nob.).

-- var. crassinervis (Bréb.) Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 4-5 et Treat. p. 240 pl. 5 fig. 250; De Wild. loc. cit.

Navicula — Bréb. in W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 48 pl. 31 fig. 271. Frustulia rhomboides var. saxonica De-Toni Syll. (1891) loc. cit.

Lg.: env. de Spa, Hockay, Stavelot (Nob.).

- V. viridula Bréb. Essai (1869) p. 3 fig. 1-4; Van Heurck Syn.
 p. 112, Atl. pl. 17 fig. 3 et Treat. 250; De Wild. loc. cit. p. 250.
 Frustulia De-Toni Syll. Alg. II (1891) p. 278.
 Lg.: Cour, Jalhay, bois des Minières (Nob.).
- 3 V. vulgaris (Thwaites) Van Heurck Syn. (1885) p. 112, Atl. pl. 17 fig. 6 et Treat. p. 240 pl. 5 fig. 252; De Wild. loc. cit. p. 250. Colletonema Thwaites in Ann. Nat. Hist. ser. 2 vol. I (1848) pl. 12. Frustulia De-Toni Syll. Alg. II (1891) p. 280.

A.: Anvers (V. H.). — Lx.: Rochehaut (Del.), env. d'Arlon (Paque). — Bt: env. de Louvain (Paque). — Fl. or.: env. d'Alost (Paque). — Lg.: Spa (Nob.).

- 8 AMPHIPLEURA Kuetz. Bacill. (1844) p. 103; Van Heurck Syn. p. 113 et Treat. p. 242; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 250; De-Toni Syll. Alg. II p. 226.
- 1 A. pellucida (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 103 pl. 30 fig. 52; Van Heurek Syn. p. 113, Atl. pl. 16 fig. 14-15 et Treat. p. 242 pl. 5 fig. 253; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 251; De-Toni Syll. Alg. II p. 227.

Navicula - Ehrenb. Inf. (1838) p. 176 pl. 13 fig. 3.

- A.: Anvers (V. H.). Bt: Bruxelles (V. H.), Bergh, Dieghem, Laeken, Hoeylaert, Rouge-Cloître (Del.). Ht: Fontaine du Saulchoir (Marissal).
 - 9 BERKELEYA Grev. Scott. Crypt. Flora (1827) pl. 294; Van Heurck Syn. p. 113 et Treat. p. 245; De-Toni Syll. Alg. II p. 294; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 251.
- 1 B. Dillwynii (Ag.) Grun. Alg. Novara (1868) p. 22; Van Heurck Syn. p. 113, Atl. pl. 16 fig. 15 et Treat. p. 245 pl. 5 fig. 255; De Wild. loc. cit.
 - B. rutilans var. Dillwynii Grun. in Bot. Centralblatt (1880) p. 1590; De-Toni Syll. Alg., II p. 308.
 - Fl. occ. : Ostende (West.).
 - 10 SCOLIOPLEURA Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien. X (1860) p. 554; Van Heurek Syn. p. 111 et Treat. p. 246; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 248.
- S. latestriata (Bréb.) Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 111, Atl. pl. 17 fig. 12 et Treat. p. 246 pl. 5 fig. 249; De Wild. loc. cit. p. 248.

Amphiprora - Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 93.

FI. occ.: Ostende (V. H.).

2 S. tumida (Bréb.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 229; Van Heurck Syn. p. 112, Atl. pl. 17 fig. 11 et Treat. pl. 18 fig. 791; De Wild. loc. cit. p. 249.

Navicula - Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 77.

- A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (V. H.).
 - 11 TOXONIDEA Donk. in Trans. Micr. Soc. VI (1858) p. 19; Van Heurck Syn. p. 14 et Treat. p. 247; De-Toni Syll. Alg. II p. 271; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 251.
- 1 T. insignis Donk. loc. cit (1858) p. 21 pl. 3 fig. 2; Van Heurck Syn. p. 114, Atl. pl. 17 fig. 10 et Treat. p. 247 pl. 5 fig. 256; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (Deby).

- 2 T. Gregoriana Donk. in Trans. Micr. Soc. VI (1858) p. 19 pl. 3 fig. 1; Van Heurck Treat. p. 247 pl. 28 fig. 792; De-Toni Syll. Alg. II. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - 12 DONKINIA Ralfs in Pritch. Inf. (1860) p. 921; Van Heurck Syn. p. 110 et Treat. p. 248; De-Toni Syll. Alg. II p. 273; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 258.
- 1 D. recta (Donk.) Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 119, Atl. pl. 17 fig. 19 et Treat. p. 248 pl. 5 fig. 286; De Wild. loc. cit. p. 258; De-Toni loc. cit.

Pleurosigma — *Donk*. in Micr. Journ. VI (1858) p. 23 pl. 3 fig. 6. Lavage de moules (V. H.).

- PLEUROSIGMA W. Sm. in Ann. Nat. Hist. ser. 2 vol. IX (1853) p. 5; Van Heurck Syn. p. 114 et Treat p. 249; De Wild. Fl. Ag. Belg. p. 252; De-Toni Syll. Alg. II p. 231.
- 1 P. acuminatum (Kuetz.) Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien. (1860) p. 561 pl. 4 fig. 8; Van Heurck Syn. p. 117, Atl. pl. 21 fig. 12 et Treat. p. 256 pl. 7 fig. 274; De Wild. loc. cit. p. 255; De-Toni Syll. Alg. II p. 252.

Frustulia — Kuetz. in Linnaea (1833) pl. XIV fig. 29.

Commun (V. H.).

— var. cuspidatum Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 239;
De Wild. loc. cit.

Bt: env. de Louvain (Paque).

- 2 P. affine Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 51; Van Heurck Syn. p. 115, Atl. pl. 18 fig. 9 et Treat. p. 252 pl. 7 fig. 263; De Wild. loc. cit. p. 253; De-Toni Syll. Alg. II p. 234. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - var. nicobaricum Van Heurck Syn. (1885) p. 115, Atl. suppl. fig. 34 et Treat. fig. 264; De Wild. loc. cit.

Pleurosigma — Grun. Alg. Novara (1868) p. 101.

Fl. occ.: Ostende (Kitton), Blankenberghe (V. H.).

3 P. angulatum (Quek.) W. Sm. in Ann. Nat. Hist. ser. 2 v. IX (1853) p. 7 pl. 1 fig. 8; Van Heurck Syn. p. 115, Atl. pl. 18 fig. 2 et 4 et Treat. p. 251 pl. 6 fig. 257; De Wild. loc. cit. p. 252 fig. 92.

Navicula — Quek. On Microscope (1848) p. 438 pl. 8 fig. 4-7.

A.: Anvers (V. H.). - Fl. occ..: Blankenberghe, Ostende (V. H.).

var. majus Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 1 et Treat. fig.
 260; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

4 P. attenuatum (Kuetz.) W. Sm. in Aun. Nat. Hist. (1852) p. 11 pl. 2 fig. 11; Van Heurck Syn. p. 117, Atl. pl. 21 fig. 11 et Treat. p. 255 pl. 7 fig. 270; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 254; De-Toni Syll. Alg. II p. 248.

Navicula - Kuetz. Bacill. (1844) p. 102 pl. 4 fig. 28.

- Bt: Bruxelles (Del.). Ht: Antoing, Hollain, Obigies (Marissal). Commun (V. H.).
- var. Agellus (Ehrenb.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 239;
 De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 254 De-Toni Syll. Alg. II p. 249.
 Navicula Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 18.
 Bt: Rouge-Cloître (Del.).
- 5 P. balticum (Ehrenb.) W. Sm. in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 8 t. 2 fig. 1; Van Heurck Syn. p. 117, Atl. pl. 20 fig. 1 et Treat. p. 256 pl. 7 fig. 272; De Wild. loc. cit. p. 254; De-Toni Syll. Alg. II p. 249.
 - A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.).
 - var. Brebissonii Van Heurck Syn. (1885) p. 167, Atl. pl. 21 fig. 6 et Treat. fig. 273; De-Toni loc. cit.; De Wild. loc. cit. p. 255. Pleurosigma Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 56.
 - F1. occ.: Ostende (Del.), Blankenberghe (V. H.). A.: Anvers (V. H.).
- 6 P. decorum W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 63 pl. 21 fig. 196; Van Heurek Syn. p. 116, Atl. pl. 19 fig. 1 et Treat. p, 255 pl. 6 fig. 269; De Wild. loc. cit. p. 253; De-Toni Syll. Alg. II p. 243.
 Lavage de moules (V. H.).
- 7 P. elongatum W. Sm. in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 6 pl. I fig. 4;
 Van Heurck Atl. pl. 18 fig. 7 et Treat. p. 253 pl. 6 fig. 262.
 Pleurosigma angulatum W. Sm. var. Van Heurck Syn. (1885) p. 115;
 De-Toni Syll. Alg. II p. 233; De Wild. loc. cit. p. 252.
 - A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- P. eximium (Thwaites) Grun. et Cleve Arct. Diat. (1868) p. 61; Van Heurck Syn. p. 119, Atl. pl. 21 fig. 2 et Treat. p. 259 pl. 7 fig. 283; De Wild. loc. cit. p. 257; De-Toni Syll. Alg. II p. 260.

 Schizonema Thwaites in Ann. Nat. Hist. (1848) p. 12.
 - A.: Anvers (V. H.).
- P. Fasciola (Ehrenb.) W. Sm.; Van Heurch Syn. p. 119, Atl. pl. II fig. 8 et Treat. p. 259 pl. 7 fig. 281; De Wild. loc. cit. p. 256.
 A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 10 P. formosum W. Sm. in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 5 pl. 1 fig. 1; Van Heurek Syn. p. 116, Atl. pl. 19 fig. 4 et Treat. pl. 6 fig. 268; De Wild. loc. cit. p. 253; De-Toni Syll. Alg. II p. 243. Lavage de moules (V. H.).

11 P. Hippocampus (Ehrenb.) W. Sm. in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 10 pl. 2 fig. 9-10; Van Heurek Syn. p. 117, Atl. pl. 20 fig. 3 et Treat. p. 255 pl. 7 fig. 270; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 254; De-Toni Syll. Alg. II p. 247.

Navicula - Ehrenb. Inf. (1838) p. 180 pl. XIII fig. 11.

- A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 12 P. macrum (Ehrenb.) W. Sm. in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 9 pl. 2 fig. 6; Van Heurek Syn. p. 119, Atl. pl. 21 fig. 9 et Treat. p. 259 pl. 28 fig. 800; De Wild. loc. cit. p. 257; De-Toni Syll. Alg. II p. 258.
 A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 13 P. naviculaceum Bréb. Diat. de Cherbourg (1867) p. 17 fig. 7; Van Heurek Syn. p. 116, Atl. suppl. fig. 35 et Treat. p. 252 pl. 6 fig. 266; De Wild. loc. cit. p. 253.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 14 P. Parkerii Harrison in Micr. Journ. (1860) p. 104 c. ic.; Van Heurck Syn. p. 118, Atl. pl. 21 fig. 10 et Treat. p. 258 pl. 7 fig. 280; De Wild. loc. cit. p. 256; De-Toni Syll. Alg. II p. 260.
 A.: Anvers (V. H.). Lb.: Hasselt (V. d. Born).
- 15 P. rigidum W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 64 pl. 20 fig. 198; Van Heurek Atl. pl. 19 fig. 3 et Treat. p. 251 pl. 6 fig. 265; De-Toni Syll. Alg. II p. 237.
 Côtes belges (V. H.).
- 16 P. scalproides Rabenh. Alg. n. 1101 et Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 241; Van Heurek Syn. p. 119, Atl. pl. 21 fig. 1 et Treat. p. 259 pl. 7 fig. 284; De Wild. loc. cit. p. 257; De-Toni Syll. Alg. II p. 261. Bt.: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).
- 17 P. sinuosum (Ehrenb.) Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 917; De Wild. loc. cit. p. 257; De-Toni Syll. Alg. II p. 262.
 Navicula Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 21.
 - A. : Anvers (Ehrenb.).
- 18 P. Spencerii (Quek.) W. Sm. in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 12 pl. 2 fig. 15; Van Heurck Syn. p. 118 et Treat. p. 257; De Wild. loc. cit. p. 255; De-Toni Syll. Alg. II p. 253.
 - var. Smithii Grun. in Grun. et Cleve Arct. Diat. (1880) p. 59; Van Heurck loc. cit., Atl. pl. 21 fig. 15 et Treat. pl. 7 fig. 276; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
 - A: Anvers (V.H.). Fl. or.: Tête de Flandre (Gautier). Bt: Bruxelles (Del.).
 - var. Kuetzingii Grun. in Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 14 et Treat. fig. 277; De-Toni loc. cit. p. 254.
 - Bt: Bruxelles (Del.).

- P. Spencerii var. acutiusculum Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 118 et Treat. p. 257; De-Toni Syll. Alg. II p. 253; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 255.
 - Bt: Bruxelles (Del.).
- var. nodiferum Grun. in Van Heurck loc. cit. (1885) Atl. pl. 21 fig. 13 et Treat. fig. 278; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. Bt: Bruxelles (Del.).
- var. curvulum (Kuetz.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 60; Van Heurck loc. cit. fig. 3 et 5 et Treat. p. 258 fig. 279; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Fl. or. : Tête de Flandre (Gautier).

- 19 P. strigile W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 61; Van Heurck Atl. pl. 20 fig. 2 et Treat. p. 256 pl. 7 fig. 275; De-Toni Syll. Alg. II p. 256.
 - A.: Escaut (V. H.).
 - 13 AMPHIPRORA Ehrenb. Verb. (1843) p. 113; Van Heurck Syn. p. 120 et Treat. p. 261; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 258; De-Toni Syll. Alg. II p. 328.
- A. alata Kuetz. Bacill. (1844) p. 107, pl. 3 fig. 63; Van Heurek Syn.
 p. 121, Atl. pl. 22 fig. 11-12 et Treat. p. 262 pl. 5 fig. 209; De Wild. loc. cit. p. 259; De-Toni Syll. Alg. II p. 331.
 - A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe, Heyst (V. H.).
- 2 A. lepidoptera Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 33 pl. 4 fig. 59 excl. c; Van Heurck Syn. p. 120, Atl. pl. 22 fig. 2-3 et Treat. p. 263 pl. 5 fig. 287; De Wild. loc. cit. p. 258; De-Toni Syll. Alg. II p. 328.

Lavage de moules (Deby).

var. pusilla (Greg.) Van Heurck loc. cit. (1885) et Treat.
 pl. 29 fig. 804; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Amphiprora — Greg. loc. cit. p. 504 pl. 12 fig. 56 et 56 b.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- A. ornata Bail. Micr. obs. made in S. Carolina (1850) p. 38 pl. 2 fig. 15,
 23; Van Heurck Syn. p. 121, Atl. pl. 12bis fig. 5 et Treat. p. 262
 pl. 5 fig. 293; De Wild. loc. cit. p. 259; De-Toni Syll. Alg. II p. 335.
 A.: Anvers (Gautier).
- 4 A. paludosa W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 44 pl. 31 fig. 269; Van Heurck Syn. p. 121, Atl. pl. 22 fig. 10 et Treat. p. 262 pl. 5 fig. 290; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 259; De-Toni Syll. Alg. II p. 331.

- A.: Anvers (V. H.), Austruweel (Del.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- A. paludosa var. duplex (Donk.) Van Heurek Syn. p. 121 (1885)
 Atl. pl. 22 fig. 15-16 et Treat. fig. 292; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 259.

Amphiprora — Donk. in Trans. Micr. Journ. VI (1858) p. 28 pl. 3 fig. 13. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- PLAGIOTROPIS Pfitzer Unters. Bacill. (1871) p. 93; Van Heurck Syn. p. 121; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 260; De-Toni Syll. Alg. II p. 343.
- 1 P. elegans (W. Sm.) Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 212, Atl. pl. 22 fig. 1-6 et Treat. p. 265 pl. 6 fig. 294; De Wild. loc. cit. p. 260; De-Toni loc. cit. p. 346.

Amphiprora — W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 92.

Lavage de moules (V. H.).

2 P. Van Heurckii Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 212, Atl. pl. 22bis fig. 6-8 et Treat. loc. cit. fig. 295; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 346.

FI. occ. : Blankenberghe (V. H.).

TRIB. GOMPHONEMEAE.

- 15 GOMPHONEMA Ag. Syst. Alg. (1824) p. 15; Van Heurck Syn. p. 112 et Treat. p. 268; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 260; De-Toni Syll. Alg. II p. 419.
- G. acuminatum Ehrenb. Inf. (1838) p. 217 pl. 18 fig. 4; Van Heurek
 Syn. p. 124, Atl. pl. 23 fig. 16 et Treat. p. 270 pl. 7 fig. 299;
 De Wild. loc. cit. p. 261; De-Toni Syll. Alg. II p. 423.
 - Lg.: Vallée de Tolifa, Stavelot, Spa, Cour (Nob.). Assez commun (V. H.).
 - var. coronatum (Ehrenb.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864)
 p. 290; Van Heurck Syn. p. 124, Atl. pl. 23 fig. 15 et Treat. fig. 300; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 424.
 Assez rare (V. H.).
 - var. laticeps Van Heurck Atl. (1881) pl. 23 fig. 17; De Wild. loc. cit.
 - Lg.: Vallée de Tolifa, Stavelot (Nob.):
 - var. Brebissonii Van Heurck loc. cit. (1881) fig. 23, 24;
 De Wild. loc. cit.
 - Lg.: Trou-Gonet (Spa), Barisart (Nob.).
- 2 G. angustatum Kuetz. Bacill. (1844) p. 83 pl. 8 fig. 4; Van Heurck Syn. p. 126, Atl. pl. 24 fig. 48-50 et Treat. p. 273 pl. 7 fig. 314;

De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 266; De-Toni Syll. Alg. II p. 429.

Bt: Schaerbeek (Del.). — Lg.: Winamplanche, Coquaifange (Nob.). — Commun (V. H.).

G. angustatum var. intermedium Van Heurck Atl. (1883) pl. 24 fig. 47; De Wild. loc. cit.

Lg.: Spa (Nob.).

— — var. angustissimum Van Heurck Atl. (1881) pl. 24 fig. 51; De Wild, loc. cit.

Lg.: Spa, Bois Gossenfays (Nob.).

var. sarcophagus (Greg.) Van Heurek Atl. (1881) pl. 25
 fig. 2; De Wild, loc. cit.

Gomphonema — Greg. in Micr. Journ. 1836 p. 13 pl. 1 fig. 42.

Lg.: Winamplanche (Nob.).

- var. producta Van Heurck Atl. (1881) pl. 24 fig. 52-55;
 De Wild, loc. cit.
 - Lx.: Vresse (Del.). Lg.: Stoumont, Stavelot, Coquaifunge (Nob.).
- var. obtusatum (Kuetz.) Van Heurck Atl. (1881) loc. cit. fig. 43-45; De Wild. loc. cit.

Sphenella - Kuetz. Bacill. (1844) p. 83 pl. 9 fig.

Lg.: Stoumont, Hockay (Nob.).

var. aequale (Greg.) Van Heurck Atl. (1881) pl. 25 fig. 3;
 De Wild. loc. cit.

Gomphonema — Greg. in Micr. Journ. (1856) p. 13 pl. 1 fig. 41. Lg.: Stavelot (Nob.).

- var. subaequalis Grun. in Van Heurck Atl. (1881) pl. 25 fig. 1; De Wild. loc. cit.
 - Lg.: Stavelot, Francorchamps (Nob.).
- 3 G. Augur Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 17; Van Heurck Syn. p. 124, Atl. pl. 23 fig. 29 et Treat. p. 271 pl. 7 fig. 301; De Wild. loc. eit. p. 262; De-Toni Syll. Alg. II p. 424.

Bt: Schaerbeek (Del.). — Assez commun (V. H.).

- var. Gautieri Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 28 et Treat. fig. 302; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 425.

 Bt: Louvain (Gautier).
- 4 G. constrictum Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 63; Van Heurck Syn. p. 123, Atl. pl. 23 fig. 6 et Treat. p. 270 pl. 7 fig. 296; De Wild. loc. cit. p. 261, De-Toni Syll. Alg. II p. 421.

Lg.: Cour, Stavelot (Nob.). — Assez commun (V. H.).

— var. capitatum (Ehrenb.) Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 7 et Treat. fig. 297; De Wild. loc. cit.

Gomphonema — Ehrenb. Inf. (1838) p. 217 pl. 18. fig. 2; De-Toni Syll. Alg.

II p. 422.

Lg. : Stavelot (Nob.). - Ht : env. de Tournai (Marissal).

- G. constrictum f. curta Van Heurek Syn. (1885) p. 123, Atl. pl. 23 fig. 8 et Treat. fig. 298; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 261.
 Lg.: ru de Chefna (Nob.). Assez fróquent (V. H.).
- 5 G. exiguum Kuetz. Bacill. (1844) p. 74. pl. 30 fig. 58; Van Heurck Syn. p. 126, Atl. pl. 25 fig. 34 et Treat. p. 275 pl. 7 fig. 317; De Wild. loc. cit. p. 207; De-Toni Syll. Alg. II p. 430.
 Fl. occ.: Ostende (West.).
 - var. minutissimum Van Heurek Syn. (1885) p. 127, Atl. pl. 25 fig. 38 et Treat. fig. 318; De Wild. loc. cit. p. 268; De-Toni loc. cit. p. 431.

Fl. occ.: Ostende (West.).

6 G. gracile Ehrenb. Inf. (1838) p. 217 pl. 18 fig. 3; Van Heurck Syn. p. 125, Atl. pl. 24 fig. 12-14 et Treat. p. 272 pl. 7 fig. 309; De Wild. loc. cit. p. 264; De-Toni Syll. Alg. II p. 426.

Lx.: Mozane (Del.). — Lg.: Winamplanche, Hockay (Del.).

— var. dichotomum (Kuetz.) Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 19-21 et Treat, fig. 310; De Wild, loc, cit.

Gomphonema — *Kuetz*. Syn. Diat. (1833) p. 569 fig. 98; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 926.

- Lg.: Winamplanche, bois des Minières, Spa, Stavelot, Hockay, Coquaifange (Nob.).
- var. auritum (Braun) Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 5 et Treat. p. 312; De Wild. loc. cit.

Gomphonema - Braun in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 68.

Lx.: Frahan (Del.).

— var. naviculoides (W. Sm.) Grun. in Van Heurck Atl. (1881) pl. 24 fig. 13; De Wild. loc. cit.

Gomphonema - W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 98.

Lg.: Francorchamps, Hockay, Spa (Nob.).

— - f. parvum Van Heurck Atl. (1881) pl. 24 fig. 14; De Wild. loc. cit.

Lg.: Hockay (Nob.).

7 G. intricatum Kuetz. Bacıll. (1844) p. 87 pl. 9 fig. 4; Van Heurck Syn. p. 126, Atl. pl. 24 fig. 28, 29 et Treat. p. 273 pl. 7 fig. 313; De Wild. loc. cit. p. 267; De-Toni Syll. Alg. II p. 428.

Lg.: Francorchamps, Jalhay, Stavelot, bois Gossonfays, Hockay (Nob.).

-- var. pulvinatum Grun. ex Van Heurck Atl. (1881) pl. 24 fig. 32; De Wild. loc. cit.

Lg.: Stavelot (Nob.).

- 8 G. micropus Kuetz. Bacill. (1844) p. 84 pl. 8 fig. 12; Van Heurck Syn. p. 125, Atl. pl. 25 fig. 4 et Treat. p. 273 pl. 7 fig. 312; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 265; De-Toni Syll. Alg. II p. 428.
 Lg.: Barisart (Nob.). Peu rare (V. H.).
 - var. minus Grun. ex Van Heurck Atl. (1881) pl. 25 fig. 5;
 De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 265.

Lg. : Vallée de Tolifa, Barisart (Nob.).

- 9 G. montanum Schum. Diat. Hohen Tatra (1887) p. 67 pl. 3 fig. 35b; Van Heurck Syn. p. 124, Atl. pl. 23 fig. 33, 36 et Treat. p. 271 pl. 7 fig. 303; De Wild. loc. cit. p. 263; De-Toni Syll. Alg. II p. 425.
 - N.: Alle (Del.). Lg.: Vallée de Tolifa, Hockay, Coquaifange (Nob.).
 - var. subclavatum Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 125, Atl. pl. 23 fig. 38 et Treat fig. 304; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
 - N.: Alle (Del.), Namur (Gautier). Lg.: Winamplanche, Coquaifange, Stavelot, Spa (Nob.).
 - var. commutatum Grun. in Van Heurck loc. cit. (1885), Atl. pl. 24 fig. 2 et Treat. fig. 305; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
 - Bt: Bruxelles (Del.). Lg.: Trou-Gonet (Spa), Barisart, Hockay (Nob.).
 - var. medium Grun. in Van Heurck Atl. (1881) pl. 23 fig. 37;
 De Wild. loc. cit.
 - Lg.: Spa, Stavelot, Jalhay (Nob.).
 - var. obliquum Grun.; De Wild. loc. cit.
 - Bt : Bruxelles (Del.).
- 10 G. olivaceum (Lyngb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 85 pl. 8 fig. 13, 15;
 Van Heurck Syn. p. 126, Atl. pl. 25 fig. 20a, b et Treat. p. 274 pl. 7 fig. 315; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 433.
 Echinella Lyngb. Hydr. Dan. (1819) t. 79 fig. 1-3.
 - Bi: Rouge-Cloître (Del.). Assez commun (V. H).
 - var. vulgare (Kuetz.) Grun. in Van Heurek loc. cit. (1885)
 fig. 21 et Treat. p. 275 fig. 316; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
 Gomphonema Kuetz. Bacill. (1844) p. 83 pl. 7 fig. 12.
 Commun (V. H.).
- 11 G. parvulum Kuetz. Bacill. (1844) p. 83 pl. 30 fig. 63; Van Heurek Syn. p. 125, Atl. pl. 25 fig. 9 et Treat. p. 272 pl. 7 fig. 306; De Wild. loc. cit. p. 264.
 - Lg.: Env. de Spa (Nob.). Commun (V. H.).
 - var. subcapitatum Van Heurck Syn. p. 125 (1885) Atl. pl. 25 fig. 11 et Treat. fig. 308; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 264.

- Lg.: Winamplanche, Spa, Barisart, Trou-Gonet (Spa) (Nob.).
- G. parvulum var. minus Grun.; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 264. Bt: Bruxelles (Del.).
 - 16 RHOICOSPHENIA Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien X (1860) p. 511; Van Heurek Syn. p. 126 et Treat. p. 275; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 268; De-Toni Syll. Alg. II p. 437.
- 1 R. curvata (Kuetz.) Grun. Alg. Novara (1868) p. 8; Van Heurck Syn. p. 127, Atl. pl. 26 fig. 1-3 et Treat. loc. cit. pl. 7 fig. 319; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. II p. 437. Commun (V. H.).
 - var. marina (W. Sm.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864)
 p. 113; Van Heurck loc. cit. fig. 4.
 Gomphonema W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p, 81 pl. 29 fig. 246.
 Sine loco (V. H.).
- 2 R. Van Heurckii Grun. in Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 5-9 et Treat. p. 276 pl. 7 fig. 321; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 438.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

TRIB. ACHNANTHEAE.

- 17 ACHNANTHIDIUM Kuetz. Bacill. (1844) p. 75; Van Heurck Syn. p. 127 et Treat. p. 276; De-Toni Syll. Alg. II p. 488; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 269.
- A. flexellum (Kuetz.) Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 54;
 Van Heurck Syn. p. 128, Atl. pl. 26 fig. 29-31 et Treat. p. 277
 pl. 8 fig. 322; De IVild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 488.
 Cymbella Kuetz. Bacill. (1844) p. 80 t. IV fig. 14.
 Bt: Bergh (Del.), env. de Louvain (V. H.).
 - 18 ACHNANTHES Bory Dict. class. I (1822) p. 79; Van Heurck Syn. p. 128 et Treat. p. 277; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 269; De-Toni Syll. Alg. II p. 469.
- 1 A. affinis Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 20; Van Heurck Syn. p. 130, Atl. pl. 27 fig. 39-40 et Treat p. 280 pl. 8 fig. 328; De Wild. loc. cit. p. 371; De-Toni Syll. Alg. II p. 478. Bt: Bruzelles (Del.).
- A. Biasolettiana (Kuetz.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880)
 p. 22; Van Heurck Syn. p. 130, Atl. pl. 27 fig. 27, 28 et Treat.

p. 281 pl. 8 fig. 231; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 272; De-Toni Syll. Alg. II p. 482.

Sans indication de localité (V. H.).

- A. Biasolettiana var. perminuta Van Heurck in Typ. Syn. n. 237; De Wild. Fl. Alg. Belg.; De-Toni Syll. Alg. II p. 482. Bt: Bruxelles (Del.).
- 3 A. brevipes Ag. Syst. Alg. (1824) p. 1; Van Heurck Syn. p. 129, Atl. pl. 26 fig. 10-12 et Treat. p. 279 pl. 8 fig. 324; De Wild. loc. cit. p. 269; De-Toni Syll. Alg. II p. 471.
 Fl. occ.: Ostende (V. H.).
- 4 A. coarctata (Bréb.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1888) p. 20; Van Heurek Syn. p. 130, Atl. pl. 26 fig. 17-20 et Treat. p. 280 pl. 8 fig. 327; De Wild. loc. cit. p. 271; De-Toni Syll. Alg. II p. 476.

Achnanthidium — $Br\acute{e}b$, in W.~Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 31 pl. 61 fig. 379. Lx.: Frahan (Del.). — Bt: Laeken (Del.).

5 A. delicatula (Kuetz.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 22; Van Heurek Syn. p. 131, Atl. pl. 27 fig. 3-4 et Treat. p. 281 pl. 8 fig. 330; De Wild. loc. cit. p. 272; De-Toni Syll. Alg. II p. 481.

Achnanthidium — Kuetz. Bacill. (1844) p. 75 pl. 3 fig. 21. Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

- 6 A. exilis Kuetz. Alg. aquae dulc. (1833) n. 12 et Bacill. (1844) p. 76 pl. 21 fig. 4; Van Heurek Syn. p. 131, Atl. pl. 27 fig. 16-19 et Treat. p. 281 pl. 8 fig. 332; De Wild. loc. cit. p. 273; De-Toni Syll. Alg. II p. 483.
 - Lx.: Virton (Del.). Bt: Schaerbeek, bois de la Cambre, Jardin bot. de Bruxelles (Del.), Wygmael, Vaelbeek, Corbeek-Dyle, Zoetwater (Paque).
- 7 A. hungarica Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 20;
 Van Heurck Syn. p. 130, Atl. pl. 27 fig. 1-2 et Treat. p. 280 pl. 8
 fig. 328; De Wild. loc. cit. p. 271; De-Toni Syll. Alg. II p. 478.
 A.: Austruweel, Wilryck (Gautier).
- 8 A. lanceolata (Bréb.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 23; Van Heurck Syn. p. 131, Atl. pl. 27, fig. 8-11 et Treat. p. 282 pl. 8 fig. 336; De Wild. loc. cit. p. 273; De-Toni Syll. Alg. II p. 486.
 - ' A.: Anvers (V. H.). Bt: St Josse-ten-Noode (Del.). Lg.: Winamplanche (Nob.).
 - var. dubia Grun. loc. cit. (1880) p. 23; Van Heurek Syn.
 p. 132, Atl. loc. cit. fig. 12-13 et Treat. loc. cit. fig. 337; De Wild.

- Fl. Alg. Belg. p. 273; De-Toni Syll. Alg. II p. 486. Bt: Bruxelles (Del.).
- A. linearis (W. Sm.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880)
 p. 23; Van Heurck Syn. p. 131, Atl. pl. 26 fig. 31-32 et Treat.
 p. 282 pl. 8 fig. 335; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 273; De-Toni Syll. Alg. II p. 484.

Achnanthidium — W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 31 pl. 61 fig. 381. Bt: Bruxelles (Del.).

- 10 A. longipes Ag. Syst. Alg. (1834) p. 1; Van Heurck Syn. p. 129, Atl. pl. 26 fig. 13-16 et Treat. p. 279 pl. 8 fig. 323; De Wild. loc. cit. p. 269; De-Toni Syll. Alg. II p. 470.
 Fl. occ.: Ostende (V. H.). A.: Anvers (Ehrenb.).
- 11 A. microcephala (Kuetz.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 22; Van Heurck Syn. p. 181, Atl. pl. 27 fig. 20-23 et Treat. p. 281 pl. 8 fig. 332; De Wild. loc. cit. p. 272; De-Toni Syll. Alg. II p. 483.

Achnanthidium - Kuetz. Bacill. (1844) p. 75 pl. 3 fig. 13-19.

- Bt: Groenendael (Del.). Lg.; Vallée de Tolifa (Winamplanche), Spa, Stoumont, Stavelot (Nob.).
- 12 A. minutissima Kuetz. Alg. aquae dulc. n. 75 et Bacill. (I844) p. 75 pl. 3 fig. 2; Van Heurck Syn. p. 131, Atl. pl. 27 fig. 37-38 et Treat. p. 282 pl. 8 fig. 334; De Wild. loc. cit. p. 273; De-Toni Syll. Alg. II p. 484.

Bt: Bruxelles, Schaerbeek (Del.). — Ht: Froyennes (Marissal). — Lg.: Spa, Stavelot (Nob.).

var. cryptocephala Grun. ex Van Heurck Atl. (1881) pl. 27 fig. 41-44; De Wild. loc. cit.

Bt: Bruxelles (Del.).

- 13 A. pachypus Mont. in Ann. sc. nat. sér. 2 t. VIII (1837) p. 848; De Wild. loc. cit. p. 270; De-Toni Syll. Alg. II. 472. Fl. occ.: Ostende (Rabenh.).
- 14 A. parvula Kuetz. Bacill. (1844) p. 76 pl. 21 fig. 5; Van Heurck Syn. p. 129, Atl. pl. 26 fig. 25-28 et Treat. p. 280 pl. 8 fig. 326; De Wild. loc. cit. p. 271; De-Toni Syll. Alg. II p. 474.
 Fl. occ.: Ostende (West.).
- 15 A. subsessilis Kuetz. Alg. aquae dulc. (1833) n. 42 et Bacill. (1844) p. 76 pl. 20 fig. 4; Van Heurck Syn. p. 129, Atl. pl. 26 fig. 12-24 et Treat. p. 279 pl. 8 fig. 325; De Wild. loc. cit. p. 270; De-Toni Syll. Alg. II p. 475.

A.: Anvers (V. H.). - Fl. occ.: Ostende (V. H.).

TRIB. COCCONEIDEAE.

- 19 COCCONEIS Ehrenb. Inf. (1838) p. 193; Van Heurck Syn.
 p. 132 et Treat. p. 286; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 274;
 De-Toni Syll. Alg. II p. 942.
- 1 C. costata Greg. in Quek. Micr. Journ. III (1855) p. 39 pl. 4 fig. 10;
 Van Heurck Atl. pl. 30 fig. 11-12 et Treat. p. 286 pl. 29 fig. 816.
 Campyloneis Lagerstedt Diat. f. Bohuslan (1876) p. 55; De-Toni Syll.
 Alg. II p. 441.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 2 C. dirupta Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 19 pl. 1 fig. 25; Van Heurck Syn. p. 133, Atl. pl. 29 fig. 13-15 et Treat. p. 290 pl. 8 fig. 343; De Wild. loc. cit. p. 275; De-Toni Syll. Alg. II p. 453. A.: Anvers (V. H.).
- 3 C. Pediculus Ehrenb. Inf. (1838) p. 194 pl. 21 fig. 11; Van Heurck Syn. p. 133, Atl. pl. 30 fig. 28-30 et Treat. p. 288 pl. 8 fig. 340; De Wild. loc. cit. p. 275; De-Toni Syll. Alg. II p. 452.

A.: Anvers (Del.). — Lg.: Stavelot, Stoumont, Coquaifange (Nob.). — Très commun (V. H.).

- 4 C. pinnata Greg. in Quek. Journ. Micr. Sc. (1859) VII p. 79 pl. 6 fig. 1; Van Heurck Atl. pl. 30 fig. 6-9 et Treat. p. 288 pl. fig. 818. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 5 C. placentula Ehrenb. Inf. (1838) p. 194; Van Heurck Syn. p. 131, Atl. pl. 30 fig. 26-27 et Treat. p. 288 pl. 8 fig. 341; De Wild. loc. cit. p. 275; De-Toni Syll. Alg. II p. 454.
 Commun (V. H.).
 - var. lineata (Ehrenb.) Van Heurek loc. cit. (1885) fig. 31, 32 et Treat. fig. 342; De Wild. loc. cit.

Cocconeis - Ehrenb. Amer. (1843) p. 81.

- A.: Anvers (V. H.). Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 6 C. Scutellum Ehrenb. Inf. (1835) p. 194 pl. 14 fig. 8; Van Heurck Syn. p. 132, Atl. pl. 29 fig. 1-3 et Treat. p. 287 pl. 8 fig. 338; De Wild. loc. cit. p. 274; De-Toni Syll. Alg. Il p. 444.
 Fl. occ.; Ostende (West.), Nieuport (Del.).
 - f. parva Van Heurck Syn. (1885) p. 133, Atl. pl. 29 fig. 8, 9 et Treat. fig. 339; De Wild. loc. cit. p. 275. Sine loco (V. H.).

SUB.-FAM. PSEUDO-RAPHIDIEAE.

TRIB. EPITHEMIEAE.

- 20 EPITHEMIA Kuetz. Bacill. (1844) p. 33; Van Heurck Syn. p. 138 et Treat. p. 298; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 280. Cystopleura Bréb. (1849); De-Toni Syll. Alg. II p. 777.
- E. Argus (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 35 pl. 29 fig. 55; Van Heurck Syn. p. 139, Atl. pl. 31 fig. 15-17 et Treat. p. 296 pl. 9 fig. 355; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 282.

Eunotia - Ehrenb. Verbr. (1843) p. 125 c. ic.

Cystopleura — Kunze Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; De-Toni Syll. Alg. II p. 783.

Lx.: Frahan (Del.).

- var. amphicephala Grun. ex Van Heurck Syn. (1885) p. 140 et loc. cit. fig. 19 et Treat. pl. 9 fig. 356; De Wild. loc. cit. Bt: Bergh (Del.).
- 2 E. gibba (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 35 pl. 4 fig. 22; Van Heurck Syn. p. 139, Atl. pl. 32 fig. 1, 2 et Treat. p. 296 pl. 9 fig. 352a, b; De Wild. loc. cit. p. 281.

Navicula - Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1830).

Cystopleura — Kunze Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; De-Toni Syll. Alg. II p. 786.

Très commun (V. H.).

- var. parallela Grun. ex Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 3 et Treat. fig. 353; De Wild. loc. cit.
 - Cystopleura gibba var. parallela De-Toni (1891) loc. cit.
- var. ventricosa (Ehrenb.) Grun.; Van Heurck loc. cit. fig. 4, 5 et Treat. fig. 354; De Wild. loc. cit.

Cystopleura gibba De-Toni Syll. Alg. II (1891) p. 781.

Commun (V. H).

- 3 E. gibberula Kuetz.; Van Heurck Syn. p. 140 et Treat. p. 297 pl. 30 fig. 825; De Wild. loc. cit. p. 283.
 - Fl. occ. : Ostende (Grun.). Bt : Ixelles (Del.).
 - var. producta Grun. in Van Heurek loc. cit. (1885), Atl. pl. 32 fig. 11 et 13 et Treat. pl. 9 fig. 361; De Wild. loc. cit. Bt: Bruxelles (Del.). A.: Anvers (V. H.).
- 4 E. Musculus Kuetz. Bacill. (1844) p. 33 pl. 30 fig. 6; Van Heurek Syn. p. 140, Atl. pl. 32 fig. 14, 15 et Treat. p. 297 pl. 9 fig. 359; De Wild: loc. cit. p. 283.

Cystopleura - Kunze Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; De. Toni Syll. Alg.

II p. 785.

Fl. occ. : Ostende (Grun.), Heyst (Deby).

E. Musculus var. constricta (Bréb.) Van Heurek Syn. p. 140 (1885)
Atl. pl. 32 fig. 16-18 et Treat. fig. 360; DeWild. Fl. Alg. Belg. p. 383.
Epithemia — Bréb. in W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 14 pl. 30 fig. 248.
Cystopleura Musculus var. — De-Toni Syll. Alg. II (1891) p. 785.

FI. occ.: Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.).

5 E. sorex Kuetz. Bacill. (1844) p. 33 pl. 5 fig. 12, 5a, b, c; Van Heurck Syn p. 131, Atl. pl. 32 fig. 6-10 et Treat. p. 295 pl. 9 fig. 351; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 281.

Cystopleura — Kunze Rev. gen. plant II (1891) p. 891; De-Toni Syll. Alg. II p. 780.

A.: Anvers (Del.). — Très commun (V. H.).

6 E. turgida (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 34 pl. 5 fig. 14; Van Heurck Syn. p. 138, Atl. pl. 31 fig. 1, 2 et Treat. p. 294 pl. 9 fig. 346; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 280.

Cystopleura — Kunze Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; De-Toni Syll. Alg. II p. 777.

Lb.: St Trond (Del.). - Très commun (V. H.).

— var. Westermannii (Ehrenb.) Grun.; Van Heurck loc. cit. fig. 8 et Treat. fig. 347; De Wild. loc. cit.

Navicula — Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 117.

Cystopleura turgida var. - Grun. ex De-Toni loc. cit. (1891) p. 778.

A.: Anvers (V. H.). — Bt: Zoetwater (Paque). — Ht: env. de Tournai (Marissal).

— var. granulata (Ehrenb.) Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 5, 6 et Treat. fig. 348.

Eunotia — Ehrenb. Inf. (1838) p. 191 pl. 21 fig. 20.

Cystopleura turgida Grun.; De-Toni loc. cit. (1891).

Bi: Schaerbeek (Del.). — A: Anvers (V. H.).

— var. Vertagus (Kuetz.) Grun. ex Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 7 et Treat. fig. 349; De Wild. loc. cit.

Epithemia Vertagus Kuetz. Bacill. (1844) p. 326.

Cystopleura turgida var. — Grun.; De-Toni loc. cit. (1891).

A.: Anvers (V. H.). — Bt : Schaerbeek (Del.).

7 E. Zebra (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 34 pl. 5 fig. 12bis et 30 fig. 5; Van Heurck Syn. p. 140, Atl. pl. 31 fig. 9, 11, 14 et Treat. p. 296 pl. 9 fig. 357; De Wild. loc. cit. p. 282

Eunotia — Ehrenb. Inf. (1838) p. 191 pl. 21 fig. 19.

Cystopleura — Kunze Rev. gen. plant. I (1891) p. 89; De-Toni Syll. Alg. II p. 784.

Commun (V. H.).

E. Zebra var. proboscidea (Kuetz.) Grun. in Verhandl. zool.-bot. gesellsch. Wien. (1862) p. 328 pl. 6 fig. 6; Van Heurck Syn. p. 140, Atl. pl. 31 fig. 10 et Treat. p. 297 fig. 358; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 282. Cystopleura zebra var. — De-Toni loc. cit. (1891).

Cystopieura zeora var. — De-Toni loc. cit. (1891).

Epithemia - Kuetz. Bacill. (1844) p. 35 pl. 5 fig. 13.

Lx.: Alle (Del.). — Lb.: St Trond (v. d. Born). — Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 21 EUNOTIA Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1837) p. 45;
 Van Heurck Syn. p. 141 et Treat. p. 298; De Wild.
 Fl. Alg. Belg. p. 283; De-Toni Syll. Alg. II p. 790.
- E. Arcus Ehrenb. Infus. (1838) p. 191 pl. 21 fig. 22; Van Heurck Syn. p. 141, Atl. pl. 34 fig. 2 et Treat. p. 299 pl. 9 fig. 362; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 284; De-Toni Syll. Alg. II p. 790.
 Lg.: Bois des Minières, Jalhay, Coquaifange (Nob.).
 - var. minor Van Heurck Syn. (1885) p. 142, Atl. pl. 34 fig. 3
 et Treat. fig. 363; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 791.
 Lg.: Wayai, bois Gossonfays, ru de Chawion, Hockay, Barisart (Nob.).
 - var. uncinata Grun. ex Van Heurek loc. cit. (1885) fig. 13 et
 Treat. fig. 364; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
 Lg.: Jalhay, Hockay (Nob.).
 - var. bidens Grun. ex Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 7 et Treat. fig. 365; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. Mêlé au type (V. H.).
 - var. tenella Grun. ex Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 5-6; De Wild. loc. cit.
 - Lg.: Wayai, bois des Minières, Jalhay, bois Gossonfays (Nob.).
- 2 E. exigua (Bréb.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. 1 (1864) p. 73; Van Heurck Syn. p. 142, Alt. pl. 34 fig. 11 et Treat. p. 300 pl. 9 fig. 369; De Wild. loc. cit. p. 285; De-Toni Syll. Alg. II p. 792.

Himantidium - Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 8.

Lx.: Paliseul, Noire-fontaine (Del.). — Lg.: Trou-Gonet (Spa), bois des Minières (Nob.).

— var. Nymanniana Grun. in Van Heurck Atl. (1881) pl. 34 fig. 10; De Wild. loc. cit.

Eunotia — Grun.; De-Toni Syll. Alg. II p. 807.

Lg.: Francorchamps, bois des Minières (Nob.).

— var. paludosa (Grun.) Van Heurck (1881) loc. cit. fig. 9; De Wild. loc. cit.

Eunotia — Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p 336 pl. 6 fig. 10; De-Toni Syll. Alg. II p. 798.

Lg.: Wayai, Jalhay, Hockay (Nob.).

E. exigua forma Van Heurck Atl. (1881) pl. 34 fig. 12; De Wild, Fl. Alg. Belg. p. 285.

Lg.: Cour (Nob.).

3 E. flexuosa Kuetz, Spec. Alg. (1849) p. 6; Van Heurck Syn. p. 144, Atl. pl. 35 fig. 9-10 et Treat. p. 304 pl. 9 fig. 387; De Wild, Fl. Alg. Belg. p. 288.

Pseudoeunotia — De-Toni Syll. Alg. II (1891) p. 809. Rare (V. H.).

- var. bicapitata Grun. in Van Heurck loc. cit. fig. 11 et Treat. fig. 388; De Wild. loc. cit. p. 289.

Bt: Wygmael (Paque). - Ht: env. de Tournai (Marissal).

- 4 E. gracilis (Ehrenb.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 72; Van Heurck Syn. p. 142, Atl. pl. 33 fig. 1, 2 et Treat. p. 300 pl. 9 fig. 268; De Wild. Fl. Alg. Belg p. 285; De-Toni Syll. Alg. II p. 791. Himantidium - Ehrenb. Verbr. (1843) p. 129 pl. 2, I fig. 9 pl. 3 I fig. 41. N.: Cornimont (Del.). Lg.: Bois des Minières, Jalhay, Stoumont, Hockay (Nob.).
- 5 E. impressa Ehrenb. Mikrogeol. (1854) t. 14 fig. 66; De-Toni Syll. Alg. II p. 800.
 - var. angusta Van Heurck Atl. (1881) pl. 33 fig. 22; De Wild. loc. cit. p. 289.

Lg.: Stavelot (Nob.).

6 E. lunaris (Ehrenb.) Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 144, Atl. pl. 33 fig. 3, 4 et Treat. p. 303 pl. 9 fig. 384; De Wild. loc. cit. p. 288.

Pseudoeunotia — De-Toni Syll. Alg. II (1891) p. 808. Synedra — Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 87.

Lg.: env. de Spa (Nob.). — Assez commun (V. H.).

- var. subarcuata Grun. in Van Heurck Atl. (1883) pl. 35 fig. 2 et Treat. fig. 385; De Wild. loc. cit.

Lg.: env. de Spa (Nob.).

- var. bilunaris (Ehrenb.) Grun. in Van Heurck loc. cit. (1885) Atl. pl. 35 f. 6b et Treat. fig. 386.
- var. excisa Grun. in Van Heurck Atl. (1883) pl. 35 fig. 6c. Lg.: Stavelot, Wayai (Nob.).
- f. major Van Heurck Atl. (1883) pl. 35 fig. 6a. Lg.: Trou-Gonet (Spa) (Nob.).
- 7 E. major (W. Sm.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 72, Van Heurck Syn. p. 142, Atl. pl. 34 fig. 14 et Treat. p. 300 pl. 9 fig. 366; De Wild. loc. cit. p. 285; De-Toni Syll. Alg. I p. 791.

Himantidium - W. Sm. Brit. Diat. II (I856) p. 14 pl. 33 fig. 286.

Lg.: Ru de Chefna (Nob.). — Rare (V. H.).

E. major var. bidens Van Heurck Syn. (1885) p. 142, Atl. pl. 34 fig. 7 et Treat, fig. 367.

Sine loco (V. H.).

 E. monodon Ehrenb.; Van Heurck Atl. (1881) pl. 33 fig. 3; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 289.

Lg. : Stavelot, Hockay (Nob.).

9 E. parallela Ehrenb. Verbr. (1843) p. 126; De-Toni Syll. II p. 796.
 — f. angustior Van Heurck Atl. (1881) pl. 34 fig. 16; De Wild. loc. cit. p. 289.

Lg.: Francorchamps, Jalhay, Hockay (Nob.).

10 E. pectinalis (Kuetz.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 73; Van Heurck Syn. p. 142, Atl. pl. 33 fig. 15-16 et Treat. p. 300 pl. 9 fig. 870, 371; De Wild. loc. cit. p. 286; De-Toni Syll. Alg. II p. 793.

Himantidium - Kuetz. Bacill. (1844) p. 39 pl. 10 fig. 11.

Fl. occ. : Bruges (Del.).

- var. minor (Kuetz.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 74; Van Heurek Syn. p. 142, Atl. pl. 33 fig. 20; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 286.
 Himantidium Kuetz. Bacill. (1844) p. 39 pl. 16 fig. X, 1-4.
- Lg.: Vallée de Tolifa, Winamplanche, Jalhay, Stoumont, Hockay (Nob.).
- var. stricta Rabenh. Fl. Eur. Alg. II (1864) p. 74; Van Heurck loc. cit. fig. 18; De Wild. loc. cit.

Himantidium - Rabenh. Süssw. Diat. (1853) p. 19. pl. 1.

Lg.: Francorchamps (Nob.).

— var. undulata (Sm.) Ralfs; Van Heurck loc. cit. (1889) fig. 17 et Treat. fig. 372; De Wild. loc. cit.

Himantidium - W. Sm. Brit. Diat. II (1856) f. 281.

Lg.: Stoumont, bois Gossonfays, Hockay (Nob).

- 11 E. praerupta Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1841) p. 414; Van Heurek Treat. p. 302.
 - var. bigibba (Kuetz.) Van Heurck (1896) loc. cit. pl. 9 fig. 380.
 Eunotia Kuetz. ex Van Heurck Syn. p. 144, Atl. pl. 34 fig. 26; De Wild. loc. cit. p. 287.

Lx.: Frahan (Del.).

12 E. Rabenhorstii var. monodon Cleve et Grun. ex Van Heurck Atl. (1883) pl. 35 fig. 12 b; De Wild. loc. cit. p. 389.

Lg.: Wayai, ru de Chawion (Nob.).

- 13 E. robusta Halfs in Pritch. Inf. (1861) p. 763; Van Heurck Syn. p. 144, Atl. pl. 33 fig. 12-13; De Wild. loc. cit. p. 287; De-Toni Syll. Alg. II p. 802.
 - var. tetraodon (Ehrenb.) Van Heurck loc. cit. (1885) fig.

· v,

11 et Treat. p. 303 pl. 9 fig. 382; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 287.
Eunotia — Ehrenb. Inf. (1838) p. 191 pl. 2 fig. 25.

Lx.: Liresse (Del.). - Lg.: Bois des Minières, ru de Chawion (Nob.).

- 14 E. tridentula Ehrenb. Verbr. (1843) p. 129 pl. 2, I, fig. 14;
 Van Heurck Syn. p. 143, Atl. pl. 34 fig. 31 et Treat. p. 301 pl. 9 fig. 375; De Wild. loc. cit. p. 286; De-Toni Syll. Alg. II p. 801.
 Lx.: Paliseul (Del.).
 - var. perminuta f. tetradentata Van Heurck Atl. (1881) pl. 34 cit. fig. 29b; De Wild. loc. cit. 287.

tg.: Jalhay, ru de Chawion, Barisart (Nob.).

— var. perpusilla Grun. in Van Heurck Atl. (1881) pl. 43 f. 31; De Wild. loc. cit.

Lg. : Jalhay, ru de Chawion (Nob.).

- 15 E. triodon Ehrenb. Inf. (1838) p. 192 pl. 21 fig. 24; Van Heurck Syn. p. 144, Atl. pl. 33 fig. 9-10 et Treat. p. 303 pl. 9 fig. 383; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 288; De-Toni Syll. Alg. II p. 801. tg.: Stoumont (Nob.).
 - 22 DESMOGONIUM Ehrenb. in Schomb. Reise (1848) p. 539; De-Toni Syll. Alg. II p. 680; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 301.
- D. Kuetzingii Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 142; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 680.

Synedra rumpens *Kuetz*. Bacill. (1844) p. 69 pl. 16 fig. VI, 4-5; *Van Heurck* Atl. pl. 40 fig. 14.

Lg.: Barisart (Nob.).

- 23 CERATONEIS Ehrenb. Leb. Kreideth. (1840) t. 4; Van Heurck Syn. p. 148 et Treat. p. 305; De-Toni Syll. Alg. II p. 814; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 293.
- C. Arcus (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 104 pl. 6 fig. 10; Van Heurek Syn. p. 148, Atl. pl. 37 fig. 7 et Treat. loc. cit. pl. 10 fig. 401; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Navicula - Ehrenb. Inf. (1838) p. 182 pl. XXI fig. 10.

tx.: Liresse, Rochehaut (Del.). — tg.: Liége (Verbeeck), Vallée de Tolifa, Wayai, Hockay, env. de Stavelot (Nob.).

TRIB. SYNEDREAE.

24 SYNEDRA Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1830) p. 40; Van Heurch Syn. p. 148 et Treat. p. 507; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 293; De-Toni Syll. Alg. II p. 631.

- S. acus Kuetz. Bacill. (1844) p. 68 pl. 15 fig. 7; Van Heurck Syn.
 p. 151, Atl. pl. 39 fig. 4 et Treat. p. 311 pl. 10 fig. 420; De-Toni
 Syll. Alg. II p. 656; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 151.
 - Bt: Bruxelles (Del.), Louvain (Paque). Ht: env. de la fontaine du Saulchoir, Tournai (Marissal).
 - var. delicatissima (W.Sm.) Grun. in Van Heurek loc. cit. (1885) fig. 7 et Treat. p. 312 pl. 10 fig. 421; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Synedra - W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 72 pl. 12 fig. 94.

- A.: Anvers (V. H.). Bt: Bruxelles (V. H.). Lg.: bois Gossonfays (Nob.).
- -- var. mesoleja Grun. in Van Heurek Atl. (1881) pl. 39 fig. 6; De Wild. loc. cit.

Lg.: Spa (Nob.).

- var. angustissima Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 151, Atl. pl. 39 fig. 10 et Treat. fig. 422.

 Sine loco (V. H.).
- f. brevis W. Sm. ex Van Heurck Atl. (1881) pl. 39 fig. 9;
 De Wild. loc. cit.

Lg.: Stoumont, Cour, Stavelot (Nob.).

- 2 S. affinis Kuetz. Bacill. (1844) p. 68 pl. 5 fig. VI, XI, pl. 24 fig. I, 5; Van Heurck Syn. p. 153, Atl. pl. 41 fig. 13 et Treat. p. 314 pl. 10 fig. 430; De Wild. loc. cit. p. 298; De-Toni Syll. Alg. II p. 661. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - var. tabulata (Ag.) Van Heurck Syn. p. 153 (1885) Atl. pl. 41 fig. 9a et Treat. fig. 431; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. Diatoma Ag. Consp. (1830) p. 50.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

— var. parva (Kuetz.) Van Heurek loc. cit. (1885) fig. 23 et Treat. fig. 432; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 299.

Synedra — Kuetz. Bacill. (1844) p. 67 pl. 15 fig. 9.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

— var. chilensis Grun. ex Van Heurch Atl. (1881) pl. 41 fig. 24; De Wild. loc. cit.

Lg.: Stavelot (Nob.).

- 3 S. amphicephala Kuetz. Bacill. (1844) p. 64 pl. 3 fig. 12; Van Heurck Syn. p. 153, Atl. pl. 39 fig. 14 et Treat. p. 313 pl. 10 fig. 429; De Wild. loc. cit. p. 298; De-Toni Syll. Alg. II p. 660. Lg.: Barisart, Trou-Gonet (Spa) (Nob.).
- 4 S. capitata Ehrenb. in Poggend. Ann. Phys. (1836) pl. 3 fig. 3; Van Heurck Syn. p. 152, Atl. pl. 38 fig. 1 et Treat. p. 313 pl. 10 fig. 427; De Wild. loc. cit. p. 298; De-Toni loc. cit. p. 659.

Bt: Bruxelles (Del.). - Assez commun (V. H.).

5 S. fulgens (Kuetz.) W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 74; Van Heurck Syn. p. 154, Atl. pl. 43 fig. 1-2 et Treat. p. 316 pl. 10 fig. 436; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 299.

Gomphonema — Kuetz. in Linnaea (1833) p. 272.

Ardissonia — Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 108; De-Toni Syll. Alg. II p. 675.

FI. occ.: Ostende (V. H.).

6 S. Hennedyana Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 60 pl. 6 fig. 108;
Van Heurck Syn. p. 154, Atl. pl. 42 fig. 3 et Treat. p. 317 pl. 10 fig. 484; De Wild. loc. cit. p. 299.

Toxarium — Grun. in Van Heurck Atl. (1883) loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 677.

Fl. occ.: Ostende (Deby).

- 7 S. investiens W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 98; Van Heurek Syn. p. 152, Atl. pl. 40 fig. 3 et Treat. p. 313 pl. 10 fig. 425; De Wild. loc. cit. p. 298; De-Toni Syll. Alg. II p. 638.
 Fl. occ.: Ostende (West.).
- 8 S. nitzschioides Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 403 pl. 5 fig. 18; Van Heurck Syn. p. 153 et Treat. p. 314 pl. 10 fig. 434; De Wild. loc. cit. p. 299.

 Thalassiothrix Grun. in Van Heurck Atl. (1881) pl. 43 fig. 7-10.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

9 S. pulchella (Ralfs) Kuetz. Bacill. (1844) p. 68 pl. 29 fig. 37; Van Heurck Syn. p. 149, Atl. pl 40 fig. 28-29 et Treat. p. 309 pl. 10 fig. 402; De Wild. loc. cit. p. 294; De-Toni Syll. Alg. II p. 651 Exilaria — Ralfs e f. De-Toni Syll. Alg. II p. 652.

A.: Anvers (V. H.). -- F1. occ.: Blankenberghe (V. H.). -- Bt: Wygmael (Paque). -- Lg.: Barisart (Nob.).

— var. Smithii (Ralfs) Van Heurck Syn. p. 150 (1885) pl. 41 fig. 3 et Treat. fig. 404; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 651.

Synedra — Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 786.

A.: Anvers (V. H.). - Ht: env. de Tournai (Marissal).

— var. lanceolata O'Meara ex Van Heurck loc. cit., Atl. pl. 41 fig. 7 et Treat. fig. 405; De Wild. loc. cit.

A.: Anvers (V. H.).

10 S. pusilla Kuetz. Bacill. (1849) p. 63 pl. 3 fig. XXIX; De Wild. loc. cit. p. 300; West. et Wall. Herb. crypt. n. 1350; De-Toni Syll. Alg. II p. 668.

Bt: env. de Bruxelles (Marissal). - Ht: env. de Tournai (Marissal).

- 11 S. radians Kuetz. Bacill. (1844) p. 54 pl. 14 fig. VII, 1-4; Van Heurek Syn. p. 151, Atl. pl. 39 fig. 11 et Treat. p. 312 pl. 10 fig. 423; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 297; De-Toni Syll. Alg. II p. 657.
 A.: Anvers (V. H.). Bt: Rouge-Cloître (Del.). Ht: Mont-St-Aubert (Marissal). Lg.: Spa, Trou-Gonet (Spa), Stavelot (Nob.).
- 12 S. Ulna (Nitzsch) Ehrenb. Inf. (1838) p. 211 pl. 17 fig. 1; Van Heurck Syn. p. 150, Atl. pl. 38 fig. 7 et Treat. p. 310 pl. 10 fig. 409; De Wild. loc. cit. p. 295; De-Toni Syll. Alg. II p. 653.
 Bacillaria Nitzsch Beitr. (1817) p. 99 pl. 5.

Commun (V. H.).

- var. splendens (Knetz.) Brun Diat. Alpes (1880) p. 126 pl. 5 fig. 1; Van Heurck Syn. p. 150, Atl. pl. 38 fig. 2 et Treat. fig. 410; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. Commun (V. H.).
- var. subaequalis (Grun.) Van Heurck Syn. (1885) p. 151, Atl. pl. 38 fig. 13 et Treat. fig. 411; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Bt: Bruxelles (Del.). - Lg.: Barisart, Jalhay, Stavelot (Nob.).

- var. longissima (W. Sm.) Brun Diat. des Alpes (1857) p. 126 pl. 5 fig. 8; Van Heurck Syn. p. 151, Atl. pl. 38 fig. 3 et Treat. fig. 412; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
- FI. occ.: entre Ostende et Blankenberghe (V. H.). Lg.: ru de Chefna (Nob.).
- var. spathulifera Grun. in Van Heurek Syn. p. 161 (1885) Atl. pl. 38 fig. 4 et Treat. fig. 413; De-Toni loc. cit. A.: Deurne (V. H.).
- var. amphirhynchus (Ehrenb.) Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 397; Van Heurek Syn. p. 151, Atl. pl. 38 fig. 5 et Treat. fig. 415; De-Toni loc. cit.; De Wild. loc. cit. p. 296 lg.: Barisart, Winamplanche, Vallée de Tolifa, Nivezé (Nob.).
- var. danica (Kuetz.) Van Heurck loc. cit. (1885) Atl. pl. 38 fig. 14a et Treat. fig. 416; De Wild. loc. cit.

Synedra — Kuetz. Bacill. (1844) p. 66 pl. 14 fig. 14.

Lg.: Spa, Stavelot, Vallée de Tolifa, Nivezé, Barisart, Francorchamps (Nob.).

— var.lanceolata (Kuctz.) Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 397; Van Heurck loc. cit., Atl. pl. 38 fig. 10 et Treat. fig. 417; De Wild. loc. cit.

Synedra — Kuetz. Bacill. (1844) p. 66 pl. 30 fig. 31.

Lg.: Winamplanche, Stavelot (Nob.).

— var. oxyrhynchus (Kuetz.) Van Heurck Syn. (1885) p. 151, Atl. pl. 39 fig. 1a et Treat. fig. 418; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Synedra—Kuetz. Bacill. (1844) p. 66 pl. 14 fig. VIII, 2.—Sine loco (V. H.).

S. Ulna var. vitrea (Bory) Van Heurck Syn. (1885) p. 151, Atl. pl. 39 fig. 11 et 12 et Treat. fig. 419; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 296; De-Toni Syll. Alg. II p. 653.

Echinella - Bory.

Lg.: Stavelot (Nob.).

var. bicurvata Grun. ex Van Heurck Atl. (1881) pl. 39 fig.
bicurvata Grun. ex Van Heurck Atl. (1881) pl. 39 fig.
bicurvata Grun. ex Van Heurck Atl. (1881) pl. 39 fig.

Lg.: Barisart (Nob.).

13 S. Vaucheriae Kuetz. Bacill. (1844) p. 65 pl. 14 fig. IV, 1-3; Van Heurek Syn. p. 150, Atl. pl. 40 fig. 19 et Treat, p. 310 pl. 10 fig. 406; De Wild. loc. cit. p. 294; De-Toni Syll. Alg. II p. 652.

Bt: Berchem, Héverlé (Paque). — Ht: env. de Tournai (Marissal).

- 25 ASTERIONELLA Hass. in Micr. exam. (1855) p. 10; Van Heurck Syn. p. 154 et Treat. p. 320; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 300; De-Toni Syll. Alg. II p. 678.
- A. formosa Hass. loc. cit. (1855) p. 10; Van Heurek Syn. p. 154, Atl. pl. 51 fig. 19, 20 et Treat. p. 321 pl. 11 fig. 439; De Wild. loc. cit. p. 300 fig. 93; De-Toni loc. cit.

Bt: Rouge-Cloître, Haeren (Del.).

— var. gracillima (Hantzsch) Grun. in Van Heurek Syn. p. 155, Atl. pl. 51 fig. 22 et Treat. fig. 440; De Wild. loc. cit.

Asterionella — *Heib.* Consp. Diat. (1863) p. 68 pl. 6 fig. 19; *De-Toni* Syll. Alg. I1 p. 659.

A.: Anvers (Del.).

TRIB. FRAGILARIEAE.

- 26 FRAGILARIA Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1818) p. 182; Van Heurck Syn. p. 155 et Treat. p. 323; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 301; De-Toni Syll. Alg. II p. 631.
- F. bidens Heib. Consp. Diat. (1863) p. 60 pl. 5 fig. 14; Van Heurck fig.
 6, Atl. pl. 45; De Wild. loc. cit. p. 304; De-Toni Syll. Alg. II p. 690.
 Lg.: Winamplanche, Stavelot (Nob.).
- 2 F. brevistriata Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 157, Atl. pl. 45 fig. 32 et Treat. p. 326 pl. 11 fig. 454; De Wild. loc. cit. p. 304; De-Toni Syll. Alg. II p. 690.

Bt: Bruxelles (Del.). - Lg.: Winamplanche, Barisart (Nob.).

— var. subcapitata Grun. in Van Heurek Atl. (1881) pl. 45 fig. 33; De Wild. loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.).

- 3 F. capucina Desm. Crypt. de France éd. 1 n. 453; Van Heurck Syn. p. 156, Atl. pl. 45 fig. 2 et Treat. p. 325 pl. 11 fig. 446; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 302; De-Toni Syll. Alg. I p. 688. Commun (V. H.).
 - var. mesolepta Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 118; Van Heurck loc. cit. fig. 3 et Treat. fig. 448; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Bt: Bruxelles (Del.). — Assez commun (V. H.).

— var. acuminata Grun. in Van Heurck Syn. p. 156 (1885) Atl. pl. 45 fig. 8 et Treat. fig. 449; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Lx.: Paliseul (Del.).

4 F. construens (Ehrenb.) Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 371; Van Heurck Syn. p. 156, Atl. pl. 45 fig. 26 e d et 27 et Treat. p. 325 pl. 11 fig. 450; De Wild. loc. cit. p. 303; De-Toni Syll. Alg. II p. 688.

Staurosira — Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 424. Assez commun (V. H.).

- var. venter Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 156, Atl. pl. 45 fig. 21, 24 et 26 sup. et inf. et Treat. fig. 450; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
 - Bt: Bruxelles (Del.).
- var. binodis (Ehrenb.) Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 156, Atl. pl. 45 fig. 24 et Treat. fig. 452; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Fragilaria — Ehrenb. Mikrogeol. (1854) pl. 3.

- A.: Anvers (V. H.). Lg.: Cour, Barisart (Nob.).
- var. pumila Grun. in Van Heurek Atl. (1881) pl. 45 fig. 21a; De Wild. loc. cit. p. 304.

Lg.: Barisart (Nob.).

- 5 F. crotonensis (Edw.) Kitton in Science Gossip (1869) p. 110 fig. 81; Van Heurck Syn. p. 156 et Treat. p. 324 pl. 11 fig. 444; De Wild. loc. cit. p. 302; De-Toni Syll. Alg. II p. 683. A.: Anvers (V. H.).
 - var. prolongata Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 156, Atl. pl. 40 fig. 10 et Treat. fig. 445; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

6 F. Harrisonii (W. Sm.) Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien

(1862) p. 368 pl. 12 fig. 35-36; Van Heurek Syn. p. 157, Atl. pl. 45 fig. 28 et Treat. p. 326 pl. 11 fig. 453; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 304.

Odontidium — W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 18 pl. 60 fig. 373; De-Toni Syll. Alg. II p. 639.

Lx.: Bouillon (Del.).

7 F. mutabilis (W. Sm.) Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 369; Van Heurck Syn. p. 157, Atl. pl. 45 fig. 12 et Treat. p. 326; De Wild. loc. cit. p. 304.

Odontidium — W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 17 pl. 34 fig. 290; De-Toni Syll. Alg. II p. 639.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.), Louvain (Gautier), Héverlé, Eegenhoven, Wygmael (Paque). — A.: env. de Turnhout (Paque). — Fl. or.: env. d'Alost (Paque). — Lg.: Wayai (Nob.).

var. intercedens Grun. in Van Heurek Atl. (1881) pl. 45 fig.
 13; De Wild. loc. cit.

Lg.: Barisart, Francorchamps, Jalhay (Nob.).

- 8 F. virescens Ralfs in Ann. and Magaz. XII (1844) pl. 2 fig. 6; Van Heurck Syn. p. 155, Atl. pl. 44 fig. 1 et Treat. p. 323 pl. 11 fig. 442; De IVild. loc. cit. p. 301; De-Toni Syll. Alg. II p. 681.
 - N.: Namur (Gautier). Lx.: Pieinevaux (Del.). Bt: env. de Louvain (Paque), Rouge-Cloître (Del.). A.: env. de Turnhout (Paque). Lg.: env. de Spa, Stavelot (Nob.).
 - var. exigua Grun. in Van Heurek Atl. (1881) pl. 44 fig. 22;
 De Wild. loc. cit. p. 302.

Lg.; Wayai (Nob.).

- var. oblongella Grun. in Van Heurck Atl. (1881) pl. 44 fig. 6; De Wild. loc. cit.

Lg.: Coquaifange, Cour, Spa (Nob.).

- var. producta (Lagerstedt) Van Heurck Atl. (1881) pl. 44 fig. 7; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 682.

Fragilaria aequalis var. — Lagerstedt Diat. Spetz. (1873) p. 15. Lg.: Winamplanche (Nob.).

- 27 CYMATOSIRA Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 377; Van Heurek Syn. p. 157 et Treat. p. 327; De-Toni Syll. Alg. II p. 697; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 305.
- C. belgica Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 157, Atl. pl. 45 fig. 38-41 et Treat. loc. cit. pl. 11 fig. 456; De Wild. loc. cit. p. 305; De-Toni Syll. Alg. II p. 698.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 28 CAMPYLOSIRA Grun. (1862) ex Van Heurck Syn. p. 157 et Treat. p. 327; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 305; De-Toni Syll. Alg. II p. 698.
- 1 C. cymbelliformis (Schum.) Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 158, Atl. pl. 45 fig. 43 et Treat. loc. cit. pl. 11 fig. 457; De Wild. loc. cit. p. 305; De-Toni loc. cit.

Synedra — Schum. Diat. Nords. (?) p. 93 pl. 2 fig. 13. Très commun sur nos côtes (V. H.).

TRIB. RAPHONEIDEAE.

- 29 RAPHONEIS Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1844) ρ. 74; Van Heurck Syn. p. 146 et Treat. p. 329; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 291; De-Toni Syll. Alg. II p. 699.
- 1 R. amphiceros Ehrenb. in Abhandl. Berl. Akad. (1844) p. 87;
 Van Heurck Syn. p. 147, Atl. pl. 36 fig. 22, 23 et Treat. p. 330 pl. 10 fig. 394; De Wild. loc. cit. p. 291; De-Toni loc. cit.

A.: Anvers (Ehrenb. Abh. Berl. Ak. 1844). — Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.).

- var. rhombica Grun. in Van Heurek loc. cit. (1885) Atl. pl. 36 fig. 20, 21 et Treat. fig. 395; De Wild. loc. cit. p. 292; De-Toni Syll. p. 700.

 Sine loco (V. H.).
- 2 R. belgica Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 147, Atl. pl. 36 fig. 25, 29, 30 et Treat. p. 330 pl. 10 fig. 396; De Wild. loc. cit. p. 292; De-Toni Syll. Alg. II p. 700.
 - FI. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 3 R. Caduceus (Ehrenb.) Van Heurck Syn. (1885) p. 147, Atl. pl. 37 fig. 5; De Wild. loc. cit. p. 292.

Sceptroneis — Ehrenb. in Berl. Ak. (1844) p. 264; Van Heurck Treat. p. 382 pl. 10 fig. 399; De-Toni Syll. Alg. II p. 646.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). - A.: Anvers (V. H.).

4 R. liburnica Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 283 pl. 4 fig. 7; Van Heurck Syn. p. 148, Atl. pl. 36 fig. 33 et Treat. p. 331 pl. 10 fig. 400; De Wild. loc. cit. p. 293.

Raphoneis nitida Grun. Alg. Novara (1867) p. 99; De-Toni Syll. Alg. II p. 700.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

5 R. rhombus Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1844) p. 87; De Wild. loc. cit. p. 293; De-Toni Syll. Alg. II p. 700.

Fl. occ.: Ostende (Rabenh.). — A.: Anvers (Ehrenb.).

6 R. Surirella (Ehrenb.) Grun. in Oleve et Moeller Diat. p. 208; Van Heurck Syn. p. 147, Atl. pl. 36 fig. 26 et 27a et Treat. p. 330 pl. 10 fig. 397; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 292.

Zygoceros - Ehrenb. Kreideth. (1840) pl. 4 fig. 12.

Dimerogramma — Grun. in Cleve Diat. fr. West. Ind. Arch. (1878) p. 11; De-Toni Syll. Alg. II p. 712.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- var. australis Van Heurck Syn. (1885) p. 147, Atl. pl. 36 fig. 27b et Treat, fig. 398; De Wild. loc. cit.

Dimerogramma Surirella var. — De-Toni Syll. Alg. II (1892) p. 713.

Fi. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 30 PERONIA Bréb. et Arn. in Micr. Journ. (1868) p. 16; Van Heurck Syn. p. 145 et Treat. p. 833; De-Toni Syll. Alg. II p. 649; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 289.
- 1 P. erinacea Bréb. et Arn. loc. cit. (1868) p. 16; Van Heurek Syn. p. 145, Atl. pl. 36 fig. 19 et Treat. pl. 10 fig. 389; De Wild. loc. cit. p. 290; De-Toni Syll. Alg. II p. 649. tx.: Cornimont (Del.).

TRIB. PLAGIOGRAMMEAE.

- 31 DIMEROGRAMMA Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 790; Van Heurck Syn. p. 146 et Treat. p. 335; De-Toni Syll. Alg. II p. 711; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 291.
- D. minor (Greg.) Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 790; Van Heurck Syn. p. 146, Atl. pl. 36 fig. 10, 11a et Treat. pl. 10 fig. 392; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Denticula - Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 22 pl. II fig. 35.

Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.).

var. nana (Greg.) Van Heurek Syn. (1885) p. 149, Atl.
 pl. 36 fig. 11b et Treat. fig. 393; De Wild. loc. cit.

Denticula - Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 23 pl. 2 fig. 34.

Dimerogramma — Ralfs; De-Toni Syll. Alg. II p. 711.

Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.).

- 32 PLAGIOGRAMMA Grev. in Micr. Journ. (1869) p. 208; Van Heurck Syn. p. 145 et Treat. p. 337; De-Toni Syll. Alg. II p. 716; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 290.
- P. Gregorianum Grev. Micr. Journ. VII (1869) p. 208 pl. 10 fig. 1-2;
 Van Heurck Syn. p. 145, Atl. pl. 36 fig. 2 et Treat. p. 338 pl. 10

fig. 390; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 290.

Plagiogramma staurophorum Heib. Consp. Diat. Dan. (1863) p. 55; De-Toni Syll. Alg. II p. 718.

Fi. occ.: Blankenberghe (V. H.).

2 P. Van Heurekii Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 145, Atl. pl. 36 fig. 4 et Treat. p. 338 pl. 10 fig. 391; De Wild. Fi. Alg. Belg. p. 290; De-Toni Syll. Alg. II p. 720.

Fl. occ.: Entre Heyst et Blankenberghe, Blankenberghe (V. H.).

TRIB. LICMOPHOREAE.

- 33 LICMOPHORA Ag. in Bot. Zeit. (1827) p. 628; Van Heurck Syn. p. 158 et Treat. p. 341; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 305; De-Toni Syll. Alg. II p. 731.
- L. anglica (Kuetz.) Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 158, Atl. pl. 46 fig. 14 et Treat. p. 343 pl. 11 fig. 458; De Wild. loc. cit. p. 306; De-Toni Syll. Alg. II p. 732.

Rhipidophora — Kuetz. Bacill. (1844) pl. 27 fig. 1-2-4.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 2 L. dalmatica (Kuetz.) Grun. in Hedwigia (1867) p. 35; Van Heurch Syn. p. 158, Atl. pl. 47 fig. 7 et Treat. p. 343 pl. 11 fig. 459a; De Wild. loc. cit. p. 306; De-Toni Syll. Alg. I p. 733.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - var. tenella (Kuetz.) Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 158, Atl. pl. 47 fig. 8 et Treat. fig. 459b; De Wild. loc. cit. Rhipidophora Kuetz. Bacill. (1844) p. 122 pl. 11 fig. 3.
 Sine loco (V. H.).
- 3 L. Lyngbyei (Kuetz.) Grun. in Hedwigia (1867) p. 35; Van Heurck Syn. p. 158, Atl. pl. 47 fig. 16 et Treat. p. 344 pl. 11 fig. 460; De Wild. loc. cit. p. 306; De-Toni Syll. Aig. II p. 734.
 Fl. occ.: Ostende (West.).

TRIB. MERIDIONEAE.

- 34 MERIDION Ag. Syst. Alg. (1824) p. XIV, 2; Van Heurck Syn. p. 161 et Treat. p. 347; De-Toni Syll. Alg. II p. 642; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 310.
- M. circulare (Grev.) Ag. Consp. (1830) p. 40; Van Heurek Syn.
 p. 161, Atl. pl. 51 fig. 10-12 et Treat fig. 474; De Wild. loc. cit.
 p. 310 fig. 95; De-Toni Syll. Alg. II p. 642.

Echinella - Grev. in Wernerian Soc. IV (?) p. 213 pl. 8 fig. 2.

Bt: Rouge-Cloître (Del.). - Assez commun (V. H.).

M. circulare var. constrictum (Ralfs) Van Heurck Syn. 1885) p. 161,
Atl. pl. 51 fig. 14-15, Treat. fig. 475; DeWild. Fl. Alg. Belg. p. 310.
Meridion — Ralfs in Ann. and Magaz. XII (1844) p. 458 pl. 18 fig. 2;
De-Toni Syll. Alg. II p. 643.

Lx.: Fays-les-Veneurs (Del.). — Lg.: Spa, Wayai, Coquaifange (Nob.).

Trib. DIATOMEAE.

- 35 DIATOMA DO. Fl. franç. II (1805) p. 48; Van Heurck Syn. p. 160 et Treat. p. 348; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 307; De-Toni Syll. Alg. II p. 634.
- D. anceps (Ehrenb.) Kirchn. Alg. Schles. (1878) p. 204; Van Heurck Syn. p. 161, Atl. pl. 51 fig. 5-8 et Treat. p. 350 pl. 11 fig. 472;
 De Wild. loc. cit. p. 309; De-Toni Syll. Alg. II p. 657.
 Odontidium Ehrenb. Verbr. (1843) p. 127.

Lx.: Mogimont (Del.).

- vor. anomalum Van Heurck Syn. (1885) p. 161, Atl. pl. 51 fig. 9 et Treat. fig. 473; De Wild. loc. cit.

 Lx.: Mogiment (Del.).
- 2 D. elongatum Ag. Syst. Alg. (1824) p. 4; Van Heurck Syn. p. 160, Atl. pl. 50 fig. 14e, 18-22 et Treat. p. 349 pl. 11 fig. 467; De Wild. loc. cit. p. 308; De-Toni Syll. Alg. II p. 636.
 Fl. occ.: Nieuport (West.).
 - var. tenue (Ag.) Van Heurck Syn. (1885) p. 160, Atl. pl. 50 fig. 14a, b et Treat. fig. 408; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. Diatoma Ag. Consp. (1880) p. 52.
 - Fl. occ.: Nieuport (West.).
 - var. hybridum Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 160, Atl. pl. 50 fig. 10-13 et Treat. fig. 469; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

A.: Anvers (V. H.).

3 D. hiemale (Lyngb.) Heib. Consp. Diat. Dan. (1863) p. 58; Van Heurck Syn. p. 160, Atl. pl. 51 fig. 1, 2 et Treat. p. 350 pl. 11 fig. 470; De Wild. loc. cit. p. 309; De-Toni Syll. Alg. II p. 636. Fragilaria — Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) pl. 63 E.

Lx.: Wiry (Del.). — Lg.: Winamplanche, Barisart (Nob.).

— var. mesodon (Ehrenb.) Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 357; Van Heurck Syn. p. 160, Atl. pl. 51 fig. 3, 4 et Treat. fig. 371; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 637. Lx.: Wiry (Del.).

- 4 D. vulgare Bory in Dict. d'Hist. nat. Bot. (1828) pl. XX fig. I; Van Heurck Syn. p. 160, Atl. pl. 50 fig. 1-6 et Treat. p. 348 pl. 11 fig. 465; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 308 fig. 94; De-Toni Syll. II p. 635. Ht: env. de Tournai (Del.), env. de Leuze (Goffart). Commun (V. H.).
 - 36 DENTICULA Kuetz. Bacill. (1844) p. 43; Van Heurch Syn. p. 159 et Treat. p. 351; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 306; De-Toni Syll. Alg. II p. 557.
- 1 D. elegans Kuetz. Bacill. (1844) p. 44 pl. 17 fig. 5; Van Heurck Atl. pl. 49 fig. 14, 15; De Wild. loc. cit. p. 307; De-Toni loc. cit. Non indiqué en Belgique.
 - var. Kittoniana Grun. in Van Heurck Atl. (1881) pl. 49 fig. 19-21; De-Toni loc. cit.
 - Lg.: Barisart, bois Gossonfays, Stavelot (Nob.).
- 2 D. tenuis Kuetz. Bacill. (1844) p. 43 pl. 17 fig. 8; Van Heurck Syn. p. 159, Atl. pl. 49 fig. 28-31 et Treat. p. 352 pl. 11 fig. 461; De Wild. loc. cit. p. 307.

Denticula frigida *Kuetz*. loc. cit. (1844) fig. 7; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 558. Bt: Bruxelles (Del.). — Lg.: Stavelot (Nob.).

var. inflata (W. Sm.) Van Heurck Syn. (1885) p. 159, Atl.
 pl. 49 fig. 32-34 et Treat. fig. 463; De Wild. loc. cit.

Denticula — W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 20 pl. 34 fig. 294. Denticula crassula Naeg.; De-Toni Syll. Alg. II p. 558.

Bt: Bruxelles (Del.).

TRIB. TABELLARIEAE.

- 37 GRAMMATOPHORA Ehrenb. Leb. Kreideth. (1840) p. 72; Van Heurck Syn. p. 163 et Treat. p. 353; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 312; De-Toni Syll. Alg. II p. 751.
- G. marina (Lyngb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 128 pl. 17 fig. XXIV,
 1-6; Van Heurck Syn. p. 103, Atl. pl. 53 fig. 10, 11; De Wild.
 loc. cit. p. 312; De-Toni loc. cit. p. 752.
 - var. vulgaris Van Heurck Syn. (1885) p. 163 et Treat.
 p. 354; De Wild. loc. cit.
 - Fl. occ.: Nieuport (West.), Ostende (P. Petit).
 - var. macilenta (W. Sm.) Van Heurek Syn. (1885) p. 164,
 Atl. pl. 53bis fig. 16 et Treat. p. 354 pl. 11 fig. 480a; De Wild. loc. cit.

Grammatophora — W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 43 pl. 61 fig. 382. Grammatophora oceanica var. — Grun, in Verhandl. zool.-bot. Gesell.

Wien (1862); De-Toni Syll. II p. 755.

Lavage de moules (Deby).

- 2 G. oceanica Ehrenb. Mikrogeol. (1854) pl. 19 fig. 36a, pl. 17 fig. 87 et pl. 39, fig. 72; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 314; De-Toni Syll. Alg. II p. 755.
 - A.: Anvers (Ehrenb.).
- 3 G. serpentina Ralfs in Ann. and Magaz. (1843) XI pl. IX fig. 5;
 Van Heurck Syn. p. 164, Atl. pl. 53 fig. 1, 3 et Treat. p. 355 pl. 11
 fig. 482a; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 757.
 A.: Escaut (Gautier). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - 38 TABELLARIA Ehrenb. in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 217; Van Heurck Syn. p. 152 et Treat. p. 336; De-Toni Syll. Alg. II p. 743; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 312.
- T. fenestrata (Lyngb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 127 pl. 17 fig. 22 pl. 18, fig. 2, pl. 30 fig. 73; Van Heurck Syn. p. 162, Atl. pl. 25 fig. 6-8 et Treat. loc. cit. pl. 11 fig. 477; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 743.

Diatoma — Lyngb. Hydrophyt. Danica (1819) pl. 61.

- A.: Weelde, Raevels, Schoorvoort (Paque). Bt: Louvain (Paque). Fl. or.: env. d'Alost (Paque). Lg.: Spa, Cour, Stoumont, Ru de Chefna (La Reid), Gossonfays (Nob.).
- 2 T. flocculosa (Roth) Kuetz. Bacill. (1844) p. 127 pl. 17 fig. 21; Van Heurck loc. cit., Atl. pl. 52 fig. 10-12 et Treat. p. 357 pl. 11 fig. 478; De Wild. loc. cit. fig. 96; De-Toni Syll. Alg. II p. 744. Conferva Roth Catal. I (1797) p. 292 pl. 4 fig. 4 pl. 5 fig. 6.
 - Bt: Louvain (Gautier). Lx.: Paliseul (Del.).. Lg.: env. de Spa, Hockay, Francorchamps, Cour, Stavelot, Ru de Chawion (Nob.). A.: Anvers (V. H.).
 - 39 TETRACYCLUS Ralfs in Ann. and Magaz. nat. Hist. v. XII (1844); Van Heurck Syn. p. 166 et Treat. p. 357; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 315; De-Toni Syll. II p. 746.
- 1 T. rupestris (A. Br.) Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 107, Atl. pl. 52 fig. 13-14 et Treat. pl. 11 fig. 489a; De Wild. loc. cit. p. 315; De-Toni loc. cit.

Gomphogramma — A. Br. in Rabenh. Süssw. Diat. (1853) p. 33 pl. 9 fig. 1. Lx.: Alle (Del.).

- 40 RHABDONEMA Kuetz. Bacill. (1844) p. 126; Van Heurck Syn. p. 165 et Treat. p. 360; De-Toni Syll. Alg. II p. 760; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 314.
- l R. arcuatum (Lyngb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 126 pl. 18 fig. 6;

Van Heurek Syn. p. 166, Atl. pl. 54 fig. 14-16 et Treat. p. 361 pl. 12 fig. 487a; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 315; De-Toni Syll. Alg. II p. 760.

Diatoma — Lyngb. Hydroph. Danica (1819) p. 180 pl. 62.

A.: Anvers (Belleroche).

2 R. minutum Kuetz. Bacill. (1844) p. 126 pl. 23 fig. 2, 4; Van Heurck Syn. p. 166, Atl. pl. 54 fig. 17-21 et Treat. p. 361 pl. 12 fig. 488a; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syl. Alg. II p. 763.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 41 STRIATELLA Ag. Consp. Diat. (1832) p. 60; Van Heurck Syn. p. 164 et Treat. p. 362; De-Toni Syll. Alg. II p. 766; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 314.
- S. delicatula (Kuetz.) Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 165, Atl. pl. 54 fig. 9, 6 et Treat. p. 362 pl. 12 fig. 483a; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 769.

Hyalosira — Kuetz. Bacill. (1844) p. 125 pl. 18 fig. III, 1.

Fl. occ.: Ostende (West.).

TRIB. SURIRELLEAE.

- 42 CYMATOPLEURA W. Sm. in Ann. and Magaz. of nat. Hist. (1851) p. 133; Van Heurck Syn. p. 167 et Treat. p. 366; De-Toni Syll. Alg. II p. 598; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 317.
- C elliptica (Bréb.) W. Sm. in Ann. and Magaz. of nat. Hist. (1851)
 p. 133 fig. 10-11; Van Heurck Syn. p. 168, Atl. pl. 55 fig. 1 et
 Treat. p. 307 pl. 22 fig. 480b; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
 Surirella Bréb. in Kuetz. Bacill. (1844) p. 61 pl. 28 fig. 28.

Lg.: Winamplanche, Wayai, Jalhay, Coquaifange, bois Gossonfays (Nob.). — Assez commun (V. H.).

2 C. Solea (Bréb.) W. Sm. in Ann. and Magaz. of nat. Hist. (1851) p. 12 pl. 3 fig. 9; Van Heurck Syn. p. 168, Ati. pl. 55 fig. 5-7 et Treat. p. 367 pl. 12 fig. 482b; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 599.

Surirella - Bréb. Consid. in Soc. Linn. Norm. (1872) p. 17.

Bt: Ixelles (Del.). — Assez commun (V. H.).

var. regula (Ralfs) Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell.
Wien (1862) p. 466; Van Heurck loc. cit. et Treat. p. 367; De Wild. loc. cit.

Cymatopleura — Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 793; De-Toni Syll. Alg. II p. 600.

Bt: Ixelles, Rouge-Cloître (Del.).

- C. Solea var. apiculata Ralfs in Pritch. Inf. (1861); De Wild, Fl. Alg. Belg. p. 318; De-Toni Syll. Alg. II p. 600.
 Ça et là (Del.).
 - 43 SURIRAYA Turp. in Mém. du Muséum t. XVI (1828) p. 362; Van Heurck Syn. p. 186 et Treat. p. 368; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 336; De-Toni Syll. Alg. II p. 367.
- S. biseriata Bréb. Alg. Falaise in Mém. Soc. Falaise (1835) t. VII;
 Van Heurck Syn. p. 186, Atl. pl. 72 fig. 1-3 et Treat. p. 369 pl. 12
 fig. 575; De Wild. loc. cit. p. 336; De-Toni Syll. Alg. II p. 567.
 Ht: Nimy (Michot). Lg.: Winamplanche, Barisart, bois des Minières (Nob.). Assez commun (V. H.).
 - var. minor Grun. in Van Heurck Atl. (1881) pl. 72 fig. 3; De Wild. loc. cit.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

- var. subacuminata Van Heurck Atl. (1881) pl. 72 fig. 1-2;
 De Wild. loc. cit.
 - Lg.: Bois des minières, Barisart, Trou-Gonet (Spa) (Nob.).
- 2 S. elegans Ehrenb. Verbr. (1843) p. 136 pl. 3 fig. 22; Van Heurck Syn. p. 187, Atl. pl. 17 fig. 3 et Treat. 370 pl. 31 fig. 866; De Wild. loc. cit. p. 337; De-Toni Syll. Alg. II p. 572.
 Lg.: Spa, Jalhay (Nob.). Bt: Bruxelles (Del.).
- 3 S. fastuosa Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 19; Van Heurck Syn. p. 188, Atl. pl. 73 fig. 18 et Treat. p. 372 pl. 13 fig. 583; De Wild. loc. cit. p. 338; De-Toni Syll. Alg. II p. 582. Lavage de moules (Deby).
- 4 S. Gemma Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 76 pl. 4 fig. 5; Van Heurck Syn. p. 187, Atl. pl. 74 fig. 1-3 et Treat. p. 372 pl. 13 fig. 582; De Wild. loc. cit. p. 338; De-Toni Syll. Alg. II p. 575. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — A.: Anvers (Ehrenb.).
- 5 S. helvetica Brun Diat. des Alpes (1880) p. 100 pl. 2 fig. 4 pl. 9 fig. 28; De Wild. loc. cit. p. 336; De-Toni Syll. Alg. II p. 570. Lg.: Spa (Nob.).
- 6 S. ovalis Bréb. sec. Kuetz. Bacill. (1844) p. 61 pl. 30 fig. 64; Van Heurek Syn. p. 188, Atl. pl. 73 fig. 2 et Treat. p. 373 pl. 13 fig. 585; De Wild. loc. cit. p. 338; De-Toni Syll. Alg. II p. 579.

 A.: Anvers (V. H.). Bt. St Josse-ten-Noode (Del.), Looz (Paque). Ht. Kain (Marissal).
 - var. crumeana (Bréb.) Van Heurek Syn. (1885) p. 183, Atl.
 pl. 73 fig. 1 et Treat. fig. 586; De Wild. loc. cit. p. 339; De-Toni

Syll. Alg. II p. 580.

Surirella — Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 33.

A.: Anvers (V. H.). — Bt: La Hulpe (Del.).

S. ovalis var. ovata (Kuetz.) Van Heurek Syn. (1885) p. 188, Atl. pl. 73 fig. 5-7 et Treat. fig. 587; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 338. De-Toni Syll. Alg. II p. 580.

Surirella — Kuetz. Bacill. (1844) p. 62 pl. 7 fig. 1-4.

Assez commun (V. H.).

var. minuta (Bréb.) Van Heurck Syn. (1885) p. 189, Atl.
73 fig. 9-10-14 et Treat. fig. 588; De Wild. loc. cit.
Surirella — Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 38.

Bt: Jardin bot de Bruxelles, Koekelberg, Laeken. Rouge-Cloître (Del.). — tg.: Wayai, Spa, Francorchamps, bois Gossonfays (Nob.).

var. salina (W. Sm.) Van Heurek Syn. (1885) p. 189, Atl.
 pl. 73 fig. 15 et Treat. fig. 589; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll.
 Alg. II p. 580.

Surirella - W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 34.

A.: Anvers (V. H.).

var. angusta (Kuetz.) Van Heurck Syn. (1885) p. 189, Atl.
 pl. 73 fig. 12 et Treat. fig. 590; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll.
 Alg. II p. 580.

Surirella - Kuetz. Bacill. (1844) p. 61 pl. 30 fig. 52.

Bt: Koekelberg (Del.). — Lg.: Spa, Stavelot, Coquaifange (Nob.).

var. pinnata (W. Sm.) Van Heurck Syn. (1885) p. 189, Atl.
 pl. 73 fig. 13 et Treat. fig. 591; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc.
 cit. p. 581.

Surirella - W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 34 pl. 9 fig. 72.

Bt: Laeken, Koekelberg (Del.). — Lg.: Stavelot, Coquaifange (Nob.).

7 S. robusta Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1840) p. 215; Van Heurck Syn. p. 187, Atl. pl. 71 fig. 1-2 et Treat. p. 371 pl. 12 fig. 577; De Wild. loc. cit. p. 337; De-Toni Syll. Alg. II p. 571.
Lg.: Winamplanche, Jalhay, Cour (Nob.).

var. splendida (Ehrenb.) Van Heurck Syn. (1885) p. 187,
 Atl. pl. 72 fig. 4 et Treat. fig. 578; De Wild. loc. cit.

Suriraya — (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 62 pl. 7 fig. 9; De-Toni Syll. Alg. II p. 571.

Navicula - Ehrenb. Inf. (1838) p. 186 pl. 14 fig. 1.

tg.: Jalhay (Nob.). — Assez commun (V. H.).

- var. tenera (Greg.) Van Heurck Syn. (1885) p. 187 et Treat.
 fig. 579; De Wild. loc. cit.

Suriraya — *Greg.* in Micr. Journ. IV (1856) p. 10 pl. 1 fig. 58. Lx.: Frahan (Del.).

- 8 S. spiralis Kuetz Bacill. (1844) p. 90 pl. 3 fig. 64; Van Heurck Syn.
 p. 189, Atl. pl. 74 fig. 4-7 et Treat. p. 374 pl. 13 fig. 592; De Wild.
 Fl. Alg. Belg. p. 340; De-Toni Syll. Alg. II p. 633.
 Bt: Dieghem (Del.). A.: Anvers (V. H.).
- 9 S. striatula Turp. in Mém. Muséum d'Hist. nat. XVI; Van Heurck Syn. p. 187, Atl. pl. 72 fig. 5 et Treat. p. 371 pl. 13 fig. 580; De Wild. loc. cit. p. 337; De-Toni Syll. Alg. II p. 573.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). - A.: Anvers (V. H.).

— var. biplicata Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 187, Atl. pl. 72 fig. 6 et Treat. fig. 581; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 573.

A.: Anvers (Gautier).

- 44 CAMPYLODISCUS Ehrenb. in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 11; Van Heurck Syn. p. 189 et Treat. p. 375; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 340; De-Toni Syll. Alg. II p. 603.
- 1 C. bicostatus W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 88; Van Heurck, Atl. pl. 75 fig. 2 et Treat. p. 379 pl. 14 fig. 599; De-Toni Syll. Alg. II p. 626.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).

- 2 C. Clypeus Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 201; Van Heurck Syn. p. 191, Atl. pl. 75 fig. 1 et Treat. p. 377 pl. 14 fig. 598; De Wild. loc. cit. p. 341; De-Toni Syll. Alg. II p. 615.
 - F1. occ.: Ostende (Grun.), Heyst (Deby), Blankenberghe (V. H.). A. : Anvers (V. H.).
- 3 C. decorus Bréb. Diat. de Cherbourg (1867) p. 13 fig. 2; Van Heurck Atl. pl. 75 fig. 3, et Treat. p. 376 pl. 14 fig. 596.
 - f. minima Van Heurck Treat. (1896) p. 376 pl. 14 fig. 597.
 Campylodiscus parvulus W. Sm. in Ann. nat. Hist. (1853) p. 7 pl. 1 fig. 14;
 Van Heurck Syn. p. 191, Atl. pl. 77 fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 341.

A.: Anvers (V. H.). - Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 4 C. Echeneis Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 206; Van Heurck Syn. p. 191, Atl. pl. 76 fig. 1, 2 et Treat. p. 377 pl. 14 fig. 600; De Wild. loc. cit. p. 341; De-Toni Syll. Alg. II p. 614.
 A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 5 C. hibernicus Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1845) p. 154; Van Heurck Syn. p. 190, Atl. pl. 77 fig. 3 et Treat. p. 378 pl. 15 fig. 593; De Wild. loc. cit. p. 340; De-Toni Syll. Alg. II p. 627.
 Bt: Louvain (Gautier). A.: Anvers (V. H.).
 - var. noricus (Ehrenb.) Van Heurck Syn. (1885) p. 190, Atl.
 pl. 77 fig. 4-6 et Treat. fig. 594; De Wild. loc. cit.

Campylodiscus — Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1891) p. 11; De-Toni Syll. Alg. II p. 627.

Bt: Rouge-Cloître (Del.).

6 C. Thuretii Bréb. Diat. Cherbourg (1867) pl. 1 fig. 3; Van Heurck Syn. p. 190, Atl. pl. 77 fig. 1 et Treat. p. 378 pl. 14 fig. 595; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 341; De-Toni Syll. Alg. II p. 622.
Fl. occ.: Blankenberghe (Deby).

TRIB. NITZSCHIEAE.

- 45 HANTZSCHIA Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat (1880) p. 103; Van Heurek Syn. p. 168 et Treat. p. 380; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 318; De-Toni Syll. Alg. II p. 561.
- H. amphioxys (Ehrenb.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880)
 p. 103; Van Heurck Syn. p. 168, Atl. pl. 56 fig. 1-2 et Treat.
 p. 381 pl. 15 fig. 483b; De Wild. loc. cit. p. 318; De-Toni Syll. Alg. II p. 622.

Eunotia — Ehrenb. Verbr. (1843) p. 125 pl. 1 fig. 26, pl. 2 fig. 15 etc.

Bt: Wygmael (Paque), Ixelles (Del.). — Lg.: Winamplanche, Spa, Vallée de Tolifa (Nob.). — Fréquent (V. H.).

2 H. marina (Donk.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1860) p. 105; Van Heurek Syn. p. 169, Atl. pl. 56 fig. 14, 15 et Treat. p. 382 pl. 15 fig. 489b; De Wild. loc. cit. p. 319; De-Toni Syll. Alg. II p. 564.

Epithemia — Donk. in Trans. Micr. Journal VI (1858) p. 29 pl. 3 fig. 11. Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (V. H.)

3 H. virgata (Roper) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 104;
Van Heurck Syn. p. 169, Atl. pl. 56 fig. 12-13 et Treat. p. 381 pl.
15 fig. 488b; De Wild. loc. cit. p. 319; De-Toni Syll. Alg. II
p. 563.

Nitzschia — Roper in Quart. Journ. Micr. Sc. VI (1858) p. 23 pl. 3 fig. 6. Fi. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 46 NITZSCHIA Hass. Brit. Freshw. Alg. (1845); Van Heurck Syn. p. 169 et Treat. p. 382; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 319; De-Toni Syll. Alg. II p. 493.
- 1 N. acicularis (Kuetz.) W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 43 pl. 13 fig. 122; Van Heurek Syn. p. 185, Atl. pl. 70 fig. 6 et Treat. p. 405 pl. 17 fig. 571; De Wild. loc. cit. p. 335; De-Toni Syll. Alg. II p. 549.

Synedra - Kuetz. Bacill. (1844) p. 63 pl. 4 fig. 3.

Bi: Bruxelles (Del.). - A.: Anvers (V. H.).

- N. amphibia Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862)
 p. 574 pl. 12 fig. 23; Van Heurek Syn. p. 184, Atl. pl. 68 fig. 15 17 et Treat. p, 403 pl. 17 fig. 563; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 333;
 De-Toni Syll. Alg. II p. 543.
 - Bt: Bruxelles (Del.). Lg.: Barisart (Nob.). Commun (V. H.).
 - var. acutiuscula Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 98; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 543. Bt: Bruxelles (Del.).
- 3 N. angularis W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 40 pl. 13 fig. 117; Van Heurek Syn. p. 177, Atl. pl. 62 fig. 11-14 et Treat. p. 393 pl. 16 fig. 521; De Wild. loc. cit. p. 321; De-Toni Syll. Alg. II p. 525.

Fl. occ.: Nieuport, Ostende (West.).

4 N. angustata (W. Sm.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 70; Van Heurek Syn. p. 172, Atl. pl. 57 fig. 22-24 et Treat. p. 385 pl. 15 fig. 498; De Wild. loc. cit. p. 321; De-Toni Syll. Alg. II p. 500.

Tryblionella - W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 36 pl. 30 fig. 262.

A.: Anvers (V. H.).

var. curta Van Heurek Syn. (1885). p. 172, Atl. pl. 57 fig.
25 et Treat. p. 386 fig. 499; De Wild. loc. cit.; De-Tmi Syll. Alg.
II p. 500.

Bt: Bruxelles (Del.).

5 N. apiculata (Greg.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 75; Van Heurck Syn. p. 173, Atl. pl. 58 fig. 26, 27 et Treat. p. 387 pl. 15 fig. 505; De Wild. loc. cit. p. 321; De-Toni Syll. Alg. II p. 505.

Tryblionella -- Greg. in Micr. Journ. V (1857) p. 79 pl. 1 fig. 43.

- A.: Anvers (V. H.).

 6 N. Brebissonii W. Sm. Brit. Diat. I (1888) p. 38 pl. 31 fig. 266;
- Van Heurek Syn. p. 178, Atl. pl. 64 fig. 4-5 et Treat. p. 396 pl. 16 fig. 530; De Wild. loc. cit. p. 326; De-Toni Syll. Alg. II p. 529. Fl. occ.: Heyst (Deby). A.: Anvers (V. H.).
- 7 N. circumsuta (Bail.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880)
 p. 77; Van Heurek Syn. p. 174, Atl. pl. 59 fig. 8 et Treat. p. 388
 pl. 15 fig. 507; De Wild. loc. cit. p. 322; De-Toni Syll. Alg. II p. 510.
 A.: Anvers (Gautier).
- 8 N. communis Rabenh. Alg. Sachs. et Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 159;
 Van Heurck Syn. p. 184, Atl. pl. 69 fig. 32 et Treat. p. 402 pl. 17

fig. 560; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 332; De-Toni Syll. Alg. II p. 542.

Commun (V. H.).

- N. communis var. abbreviata Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 93; Van Heurek Syn. p. 184, Atl. pl. 69 fig. 35 et Treat. fig. 561; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 543.

 A.: Anvers (V. H.).
- 9 N. debilis (Arn.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 68; Van Heurek Syn. p. 172, Atl. pl. 57 fig. 19-21 et Treat. p. 385 pl. 15 fig. 497; De Wild. loc. cit. p. 321; De-Toni Syll. Alg. II p. 498.

Tryblionella - Arn.

Lx.: Frahan (Del.). — Bt: Groenendael (Del.).

10 N. Delognei Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 184, Atl. suppl. pl. C fig. 38 et Treat. p. 403 pl. 17 fig. 567; De Wild. loc. cit. p. 334; De-Toni Syll. Alg. II p. 546.

Bt: Bruxelles (Del.).

11 N. denticula Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 492 fig. 68; Van Heurck Syn. p. 175, Atl. pl. 60 fig. 10 et Treat. p. 390 pl. 15 fig. 514; De Wild. loc. cit. p. 323; De-Toni Syll. Alg. II p. 518.

Sine loco (V. H.).

— var. Delognei Grun. in Van Heurck Syn. (1885) pl. 60 p. 176, Atl. fig. 9 et Treat. fig. 515; De Wild. loc. cit.; De Toni Syll. Alg. II p. 519.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

12 N. dissipata (Kuetz.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 90; Van Heurck Syn. p. 178, Atl. pl. 63 fig. 1 et Treat. p. 394 pl. 16 fig. 525; De Wild. loc. cit. p. 325; De Toni Syll. Alg. II p. 527.

Synedra — Kuetz. Bacill. (1844) p. 64 pl. 14 fig. 3 pl. 30 fig. 53.

A.: Anvers (V. H.). — Bt: Schaerbeek (Del.). — 1g.: Stoumont (Nob.).

— var. media (Hantzsch) Grun. ex Van Heurek Syn. (1885) p. 178, Atl. pl. 63 fig. 3 et Treat. fig. 526; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Nitzschia — Hantzsch in Hedwigia vol. II (1859) p. 40 pl. 6 fig. 9. Lg.: Barisart (Nob.).

13 N. dubia W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 41; Van Heurek Syn. p. 174, Atl. pl. 59 fig. 9-12 et Treat. p. 389 pl. 15 fig. 508; Do Wild. loc. eit. p. 322; De-Toni Syll. Alg. II p. 511.

- A.: Anvers (V. H.). Bt: Schaerbeek (Del.).
- 14 N. fasciculata Grun. Kasp. Alg. (1878) p. 119; Van Heurek Syn. p. 179, Atl. pl. A fig. 11-13 et Treat. p. 397 pl. 16 fig. 536; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 327; De-Toni Syll. Alg. II p. 532.
 Fl. occ.: Ostende (Grun.). A.: Anvers (V. H.).
- N. Frustulum (Kuetz.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880)
 p. 98; Van Heurck Syn. p. 184, Atl. pl. 68 fig. 28-29 et Treat.
 p. 403 pl. 17 fig. 564; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 333; De-Toni Syll. Alg. II p. 543.

Lg.: Vallée de Tolifa (Nob.).

— var. minutula Van Heurck Syn. (1885) p. 184, Atl. pl. 69 fig. 5 et Treat. fig. 565; De-Toni Syll. Alg. II p. 543; De Wild. loc. cit. p. 334.

Bt: Groenendael (Del.).

- var. perpusilla Rabenh. ex Van Heurek Syn. (1885) p. 185, Atl. pl. 69 fig. 8 et Treat. fig. 566; De Wild. loc. cit. Commun (V. H.).
- var. tenella Grun. in Van Heurck Atl. (1881) pl. 69 fig. 30;
 De Wild, loc. cit.

Bt: Bruxelles (Del.). - Lg.: Spa, Barisart, ru de Chawion, Jalhay (Nob.).

16 N. gracilis Hantzsch in Hedwigia II (1859) pl. 6 fig. 3; Van Heurek Atl, pl. 68 fig. 11-12; De Wild, loc. cit. p. 341; De-Toni Syll. Alg. II p. 540.

Lg.: Barisart, Jalhay, bois Gossonfays (Nob.).

- 17 N. Heufleriana Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 575; Van Heurek Atl. pl. 68 fig. 13; De Wild. loc. cit. p. 331; De-Toni Syll. Alg. II p. 540.
 Lg.: Barisart (Nob.).
- 18 N. hungarica Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 568 pl. 22 fig. 13; Van Heurek Syn. p. 173, Atl. pl. 58 fig. 19-22 et Treat. p. 387 pl. 15 fig. 504; De Wild. loc. cit. p. 321; De-Toni Syll. Alg. II p. 504.

A.: Anvers (Del.). — Bt: Schaerbeek (Del.).

- 19 N. intermedia Hantzsch in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 95; Van Heurek Atl. pl. 69 fig. 10-11; De Wild. loc. cit. p. 330; De-Toni Syll. Alg. II p. 539.
 Lg.: Stavelot (Nob.).
- 20 N. Kuetzingiana Hilse Diat. (1860) p. 67; Van Heurck Atl. pl. 69 fig. 24-26; De Wild. loc. cit. p. 332; De-Toni Syll. Alg. II p. 54. Lg.: Winamplanche (Nob.).

- 21 N. lanceolata W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 40 pl. 14 fig. 118;
 Van Heurek Syn. p. 182, Atl. pl. 68 fig. 1-2; De Wild. loc. cit.
 p. 329; De-Toni Syll. Alg. II p. 538.
 Sine loco (V. H.).
 - var. incrustans Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880)
 p. 95; Van Heurck Syn. p. 182, Atl. pl. 68 fig. 5, 6 et Treat.
 p. 401 pl. 17 fig. 651; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 329; De Toni Syll. Alg. II p. 538.

Fl. occ. : Ostende (Rabenh.).

22 N. Liebethruthii Grun. et Rabenh. in Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 157; Van Heurck Atl. pl. 68 fig. 25-26; De Wild. loc. cit. p. 334; De-Toni Syll. Alg. II p. 544.

Bt : Rouge-Cloître, St Josse-ten-Noode (Del.).

23 N. linearis (Ag.) W. Sm. Brit. Diat. (1853) p. 39 pl. 13 fig. 10; Van Heurck Syn. p. 181, Atl. pl. 67 fig. 13-15 et Treat. p. 399 pl. 16 fig. 542; De Wild. loc. cit. p. 328; De-Toni Syll. Alg. II p. 535.

Frustulia - Ag., vide Rabenh. Fl. Alg. eur. I p. 158.

- Bt: Bruxelles (Del.). Lg.: Barisart (Nob.). Assez commun (V. H.).
- var. tenuis (W. Sm.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 93; Van Heurek Syn. p. 181, Atl. pl. 67 fig. 16 et Treat. fig. 543; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 536.

Lg.: Stavelot, Hockay, vallée de Tolifa (Nob.). — Commun (V. H.).

- 24 N. longissima (Bréb.) Ralfs in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 100; Van Heurck Syn. p. 185, Atl. pl. 70 fig. 1-2; De Wild. loc. cit. p. 334; De-Toni Syll. Alg. II p. 547.
 - var. Closterium (Ehrenb.) Van Heurck Syn. (1885) p. 185,
 Atl. pl. 70 fig. 5-7-8 et Treat. p. 405 pl. 17 fig. 570; De Wild. loc. cit.

Ceratoneis — Ehrenb. Kreideth. (1840) p. 64.

Nitzschia curvirostris var. — De-Toni Syll. Alg. II (1891) p. 548.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

25 N. Lorenziana Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 101; Van Heurek Syn. p. 185, Atl. pl. 70 fig. 12; De Wild. loc. cit., p. 335.

Non signalé.

— var. incurva Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 185, Atl. pl. 70 fig. 13-14 et Treat. p. 406 pl. 17 fig. 573; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 550

Fl. occ. : Ostende (Grun.).

- 26 N. microcephala Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 96;
 Van Heurck Syn. p. 183, Atl. pl. 69 fig. 21, Treat. p. 402 pl. 17 fig. 558; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 332; De-Toni Syll. Alg. II p. 540.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - var. elegantula Van Heurck Syn. (1885) p. 183, Atl. pl. 69
 fig. 22a et Treat. fig. 559; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 332; De-Toni
 Syll. Alg. II p. 540.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 27 N. navicularis (Bréb.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 67; Van Heurck Syn. p. 171, Atl. pl. 57 p. 1 et Treat. p. 384 pl. 15 fig. 490; De Wild. loc. cit. p. 319; De Toni Syll. Alg. II p. 495.
 - Fl. occ.: Ostende (Deby). A.: Anvers (V. H.).
- 28 N. obtusa W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 39 pl. 13 fig. 109; Van Heurch Syn. p. 180, Atl. pl. 67 fig. 1 et Treat. p. 397 pl. 16 fig. 537; De Wild. loc. cit. p. 327; De-Toni Syll. Alg. II p. 533.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). Lg.: Jalhay (Nob.).
 - var. brevissima Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 180,
 Atl. pl. 67 fig. 4 et Treat. p. 398 fig. 540; De Wild. loc. cit.;
 De-Toni loc. cit. p. 534.

A.: Anvers (V. H.). - Lg.: Jalhay (Nob.).

- var. scalpelliformis Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 92; Van Heurck Syn. p. 180, Atl. pl. 67 fig. 2, Treat. fig. 538; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. Lg.: Francorchamps (Nob.).
- 29 N. Palea (Kuetz.) W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 89; Van Heurck Syn. p. 183, Atl. pl. 69 fig. 22 et Treat. p. 401 pl. 17 fig. 544; De Wild, loc. cit. p. 330; De-Toni Syll. Alg. II p. 540.

Synedra — Kuetz. Bacill (1844) pl. 3 flg. 27 pl. 4 fi5. 47.

Marais des Flandres (Rabenh.). — Très commun (V. H.).

- var. minuta Grun.; De Wild. loc. cit.
- Lx.: Bouillon (Del.).
- var. debilis (Kuetz.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 93; Van Heurck Syn. p. 183, Atl. pl. 69 fig. 20, 29 et Treat. fig. 555; De Wild. loc. cit. p. 331; De-Toni loc. cit. p. 541. Lg.: Spa, Coquaifange, Stavelot, Vallée de Tolifa (Nob.).
- var. tenuirostris Van Heurch Syn. (1886) p. 183, Atl. pl. 69 fig. 31 et Treat. fig. 556; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. Bt: St Josse-ten-Noode (Del.). Lg.: Jalhay, Hockay (Nob.).
- var. fonticola Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 183, Atl,

pl. 69 fig. 15-20et Treat. fig. 557; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 324; De-Toni Syll. Alg. II p. 541.

Bt: Bruxelles (Del.). — Lg.: Barisart (Nob.).

30 N. paradoxa Gmel. in Linné Syst. nat. ed. XIII (1788) v. VIII; Van Heurek Syn. p. 176, Atl. pl. 61 fig. 9 et Treat. p. 392 pl. 15 fig. 518; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 324.

Bacillaria — Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 85; De-Toni Syll. Alg. II p. 493.

- Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.). A.: Anvers (V. H.). Bt: Louvain (Gantier). Lg.: Ru de Chawion près de Spa (Nob.).
- 31 N. punctata (Sm.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 69;
 Van Heurck Syn. p. 171, Atl. pl. 57 fig. 2 et Treat. p. 384 pl. 15 fig. 491; De Wild. loc. cit. p. 319; De Toni Syll. Alg. II p. 496.
 A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Ostende (Deby).
 - var. elongata Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 68; Van Heurck loc. cit. fig. 13 et Treat. fig. 492; De Wild. loc. cit. p. 320; De-Toni loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (Deby).

- 32 N. Sigma (Kuetz) W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 39 pl. 13 fig. 108; Van Heurck Syn. p. 179, Atl. pl. 65 fig. 7-8 et Treat. p. 396 pl. 16 fig. 531; De Wild. loc. cit. p. 326; De-Toni Syll. Alg. II p. 530. Synedra — Kuetz. Bacill. (1844) p. 67 pl. 30 fig. 114.
 - A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - var. intercedens Grun. Alg. Kasp. Meere (1878) p. 119; Van Heurck Syn. p. 179, Atl. pl. 66 fig. 1 et Treat. fig. 432; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

A.: Anvers (Belleroche).

- var. rigidula Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 179, Atl. pl. 66 fig. 8; De-Toni loc. cit. p. 531. De Wild, loc. cit. Bt: Rouge-Cloître (Del.).
- var. curvula (Ehrenb.) Brun. Diat des Alpes (1880) p. 105;
 De Wild. loc. cit. p. 326; De Toni loc. cit.

Navicula — Ehrenb. Inf. (1838) p. 181 pl. 13 fig. 14.

N. Sigma var. sigmatella Grun. Kasp. Alg. (1878) p. 119; Van Heurck Syn. p. 179, Atl. pl. 66 fig. 6-7 et Treat. p. 397 pl. 16 fig. 535.

Fl. occ. : Ostende (Rabenh.).

- f. parva Rabenh. Alg. eur. dec. 1712; De Wild. loc. cit. p. 327. Fl. occ.: Ostende (Rabenh.).
- var. pusilla (Grun.) De Wild. Fl. Alg. Belg. (1896) p. 327.
 N. sigmatella vur. pusilla Grun.

Fl. occ.: Ostende (Grun.).

N. Sigma var. rigida (Kuetz.) Grun. Alg. Kasp. Meere (1878) p. 119; Van Heurek Atl. pl. 66 fig. 2 et Treat. fig. 533; De-Toni Syll. Alg. II p. 530.

Amphipleura - Kuetz. Bacill. (1844) p. 104 pl. 4 fig. 30.

Bt: Bruxelles (V. H.). - A.: (V. H.).

33 N. sigmoidea (Nitzsch) W. Sm. Brit. Diat. I (1833) p. 38 pl. 13 fig. 104; Van Heurck Syn. p. 178, Atl. pl. 63 fig. 5-7 et Treat. p. 395 pl. 16 fig. 528; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 325; De-Toni Syll. Alg. II p. 528.

Bacillaria - Nitzsch Beitr. (1817) p. 104.

Bt: Bruxelles (Del.). - Lg.: Liége, Barisart (Nob.). - Assez commun (V. H.).

- 34 N. sinuata (W. Sm.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 82; Van Heurck Syn. p. 176, Atl. pl. 60 fig. 11 et Treat. p. 390 pl. 15 fig. 516; De Wild. loc. cit. p. 323; De-Toni Syll. Alg. II p. 519. Denticula W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 21 pl. 34 fig. 295.
 Lx.: Frahan (Del.).
 - var. Tabellaria (Grun.) Van Heurck Syn. (1885) p. 176, Atl. pl. 60 fig. 12-13 et Treat. p. 391 fig. 517; De Wild. loc. cit. Nitzschia — Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 82; De-Toni Syll. Alg. II p. 519.

Bt: Bruxelles (Del.).

35 N. spathulata Bréb. in W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 40 pl. 31 fig. 268; Van Heurck Syn. p. 177, Atl. pl. 62 fig. 7-8 et Treat. p. 393 pl. 16 fig. 523; De Wild. loc. cit. p. 324; De-Toni Syll. Alg. II p. 526.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

— var. hyalina (Greg.) Van Heurck Syn. (1885) p. 177, Atl. pl. 62 fig. 9 et Treat. p. 394 fig. 524; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Nitzschia — Greg. Diat. of the Clyde (1857) pl. 14 fig. 104.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

36 N. spectabilis (Ehrenb.) Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 782; Van Heurck Syn. p. 180, Atl. pl. 67 fig. 8 et 9 et Treat. p. 398 pl. 16 fig. 541; De Wild. loc. cit. p. 328; De-Toni Syll. Alg. II p. 535.
Synedra — Ehrenb. Verb. (1843) pl. I fig. 19.
A.: Anvers (V. H.).

N. subtilis (Kuetz.) Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 95;
 Van Heurck Syn. p. 183, Atl. pl. 68 fig. 7-8 et Treat. p. 401 pl. 17
 fig. 552; De Wild. loc. cit. p. 330; De-Toni Syll. Alg. IIp. 539.
 Synedra — Kuetz. Bacill. (1844) p. 64 pl. 15 fig. 2a.

Lg.: Stoumont, Stavelot (Nob.). — Assez commun (V. H.).

- N. subtilis var. paleacea Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 95; Van Heurek Syn. p. 183, Atl. pl. 68 fig. 9-10, Treat. fig. 353; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 330; De Toni Syll. Alg. II p. 539.

 Lg.: Wayai (Nob.). Commun (V. H.).
- 38 N. thermalis (Ehrenb.) Auersw. in Rabenh. Alg. n. 1064; Van Heurek Syn. p. 174, Atl. pl. 59 fig. 20 et Treat p. 389 pl. 15 fig. 509; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 322; De-Toni Syll.Alg. II p. 512. Pinnularia Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 21.

Lg.: Winamplanche, Barisart, Wayai (Nob.).

var. minor Hilse (1860) p. 67.; Van Heurck Atl. pl. 59 fig.
 22; De-Toni Syll. Alg. II p. 512; De Wild. loc. cit.

Lg.: Barisart, Winamplanche (Nob.).

- var. intermedia Van Heurek Syn. (1885) p. 175, Atl. pl. 59 fig. 15-17 et Treat. fig. 510; De Wild. loc. cit. p. 323.
 Lg.: Ru de Chawion, Barisart (Nob.).
- 39 N. Tryblionella Hantzsch in Rabenh. Alg. n. 984; Van Heurck Syn. p. 171, Atl. pl. 57 fig. 9, 10 et Treat. p. 385 pl. 15 fig. 493; De Wild. loc. cit. p. 320; De-Toni loc. cit. p. 498.

 Non encore indiqué en Belgique.
 - var. levidensis (W. Sm.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 70; Van Heurek Syn. p. 171, Atl. pl. 58 fig. 15 et Treat. fig. 494; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 499. Tryblionella W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 89.

A.: Anvers (V. H.). - Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

var. calida (Grun.) Van Heurck Syn. (1885) p. 171, Atl.
 pl. 59 fig. 4, 5 et Treat. fig. 495; De Wild. loc. cit.
 Nitzschia — Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 82.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

- var. littoralis Grun. ex Van Heurck Syn. (1885) p. 172, Atl. pl. 59 fig. 1-3 et Treat. fig. 496; De Wild. loc. cit. A.: Anvers (V. H.).
- 40 N. tubicola Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 97; Van Heurck Atl. pl. 69 fig. 14; De Wild. loc. eit. p. 333; De-Toni Syll. Alg. II p. 542.
 Lg.: Bois Gossonfays (Nob.).
- 41 N. vermicularis (Kuetz.) Hantzsch in Rabenh. Alg. n. 889; Van Heurek Syn. p. 178, Atl. pl. 64 fig. 1-2 et 'Creat. p. 395 pl. 16 fig. 529; De Wild. loc. cit. p. 325; De-Toni Syll. Alg. II p. 529. Synedra Kuetz. Bacill. (1844) pl. 4 fig. 35.

Bi: Jardin bot. de Bruxelles, Dieghem, Rouge-Cloître (Del.).

- 42 N. vitrea Norm. in Micr. Journ. IX (1861) p. 7 pl. 2 fig. 4; Van Heurck Syn. p. 181, Atl. pl. 67 fig. 10 et Treat. p. 399 pl. 16 fig. 544; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 328; De-Toni Syll. Alg. II p. 536.
 A.: Anvers (V. H.). Lg.: Ru de Chawion, Jalhay (Nob.).
 - var. salinarum Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 566; Van Heurek Syn. p. 181, Atl. pl. 67 fig. 2, Treat. fig. 546; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 329; De-Toni Syll. Alg. II p. 536. Fl. occ.: Ostende (Grun.).
 - var. recta (Hantzsch) Van Heurek Syn. (1885) p. 182, Atl.
 pl. 67 fig. 17-18 et Treat. fig. 547; De Wild. loc. cit.

Nitzschia - Hantzsch in Rabenh. Alg. n. 1283.

Lg.: Cour, Jalhay, Francorchamps (Nob.).

TRIB. CYLINDROTHECEAE.

- 47 CYLINDROTHECA *Babenh*. Alg. n. 801 (1859) et Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 145; *Van Heurck* Syn. p. 186 et Treat. p. 409; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 566; *De Wild*. Fl. Alg. Belg. p. 335.
- 1 C. gracilis (Bréb.) Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 186, Atl. pl. 80 fig. 2 et Treat. loc. cit. pl. 17 fig. 574 et ic. 132; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Bt: Bruxelles (Del.). — A.: Anvers (V. H.).

SUDFAM. CRYPTO-RAPHIDEAE.

- 48 RHIZOSOLENIA Ehrenb. Amer. (1843) p. 134; Van Heurck Syn. p. 194 et Treat. p. 413; De-Toni Syll. Alg. II p. 823; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 345.
- R. setigera Brightw. in Micr. Journ. (1853) p. 96 pl. 5 fig. 7; Van Heurck Syn. p. 194, Atl. pl. 78 fig. 6-8 et Treat. p. 414 pl. 17 fig. 602; De IVild. loc. cit. p. 345; De-Toni Syll. p. 827.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 2 R. styliformis Brightw. loc. cit. (1858) p. 95 pl. 5 fig. 5a, b, d; Van Heurck Syn. p. 194, Atl. pl. 78 fig. 1-5, pl. 79 fig. 1, 2, 4, Treat. loc. cit. pl. 17 fig. 601; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 826. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - 49 CHAETOCEROS Ehrenb. in Ber. Berl. Akad. (1844) p. 198; Van Heurck Syn. p. 195 et Treat. p. 421; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 346; De-Toni Syll. Alg. II p. 989.
- 1 C. armatus West in Trans. Micr. Soc. VIII (1860) p. 151 pl. 7

fig. 12; Van Heurek Syn. p. 195, Atl. pl. 81 fig. 1-4 et Treat. p. 421 pl. 18 fig. 603; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 346; De-Toni Syll. Alg. II p. 989.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

2 C. varians (Lauder) Van Heurek Syn. (1885) p. 195, Atl. pl. 80 fig. 3-5 et Treat. p. 422 pl. 18 fig. 605; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 346.

Bacteriastrum — Lauder in Trans. Micr. Soc. XII (1863) p. 8 pl. 3 fig. 1-6. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 3 C. Wighamii Brightw. in Micr. Journ. (1856) p. 108, pl. VII fig. 19-36; Van Heurck Syn. p. 195, Atl. pl. 82 fig. 1 et Treat. p. 422 pl. 18 fig. 604; De Wild. loc. cit; De-Toni Syll. Alg. II p. 990. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - 50 DITYLUM Bail. in Bost. Journ. Nat. Hist. (1861) p. 322; Van Heurck Syn. p. 196 et Treat. p. 424; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 346; De-Toni Syll. Alg. II p. 1017.
- 1 D. Brightwellii (West) Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 196, Atl. pl. 114 fig. 4, 8, 9 et Treat. p. 424 pl. 17 fig. 606; De Wild. loc. cit. p. 347; De-Toni Syll. Alg. II p. 1017.

Triceratium — West in Trans. Micr. Soc. VIII (1860) p. 149 pl. 8 fig. 1, 5, 8. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

2 D. intricatum (West) Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 196, Atl. pl. 114 fig. 2 et Treat. p. 424 pl. 17 fig. 607; De Wild. loc. cit.
 Triceratium — West loc. cit. (1860) p. 148 pl. 7 fig. 5.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

TRIB. MELOSIREAE.

- 51 MELOSIRA Ag. Syst. Alg. (1824) p. 14; Van Heurek Syn. p. 198 et Treat. p. 438; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 348; De Toni Syll. Alg. II p. 1332.
- 1 M. arenaria Moore in Ralfs Ann. Nat. Hist. XII (1844) pl. IX fig. 4; Van Heurck Syn. p. 200, Atl. pl. 90 fig. 1-3 et Treat. p. 443 pl. 19 fig. 821; De Wild. loc. cit. p. 351; De-Toni Syll. Alg. II p. 1338.

N.: Alle (Del.). - A.: Schooten (V. d. Broeck).

2 M. Borreri Grev. in Hooker Brit. Fl. II (1832) p. 401; Van Heurek Syn. p. 199, Atl. pl. 85 fig. 5-8 et Treat. p. 451 pl. 18 fig. 610; De Wild. loc. cit. p. 349. Lysigonium moniliforme (Muell.) Link; De-Toni Syll. Alg. II p. 1328. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 3 M. crenulata (Ehrenb.) Bacill. (1844) p. 35 pl. 2 fig. 8; Van Heurck Syn. p. 199, Atl. pl. 88 fig. 3-5 et Treat. p. 443 pl. 19 fig. 618; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 350; De-Toni Syll. Alg. II p. 1334. Gallionella Ehrenb. Verbr. (1843) pl. 2 fig. 41, pl. III fig. 28, pl. IV fig. 31.
 - Bt: Rouge-Cloître (Del.)
 - f. Binderiana (Kuetz.) Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 200, Atl. loc. cit. fig. 16 et Treat fig. 619; De Wild. loc. cit. p. 351; De-Toni loc. cit. p. 1835.

Melosira — Kuetz. Bacill. (1844) pl. 2 fig. 1.

Bt: Rouge Cloître (Del.).

- 4 M. Dickiei (Thwaites) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 889; Van Heurck Syn. p. 200, Atl. pl. 90 fig. 10-12, 15, 16 et Treat. p. 444 pl. 19 fig. 623; De Wild. loc. cit. p. 352; De-Toni Syll. Alg. II p. 1340. Orthosira Thwaites in Ann. Nat. Hist. (1848) p. 168 pl. 12 E fig. 1-7. Lx.: Frahan (Del.).
- 5 M. distans (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) pl. 2 fig. 12; Van Heurck Syn. p. 199, Atl. pl. 66 fig. 21-23 et Treat. p. 442 pl. 19 fig. 616; De Wild. loc. cit. p. 350; De-Toni Syll. Alg. II p. 1333.
 Gellionella Ehrenb in Bor Borl Ak (1836)

Gallionella — Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1836). Lx.: Hatrival (Del.). — Lg.: Coquaifange, Barisart (Nob.).

- 6 M. granulata (Ehrenb.) Ralfs. in Pritch. Inf. (1861) p. 820; Van Heurck Syn. p. 200, Atl. pl. 87 fig. 10-12 et Treat. p. 444 pl. 19 fig. 621; De Wild. loc. cit. p. 351; De-Toni Syll. Alg. II p. 1334. Gallionella Ehrenb. Verbr. (1843) p. 127.
 - Bt: Bruxelles (Del.). A.: Anvers (V. H.). Lg.: Stoumont, Coquaifange (Nob.).
 - var. curvata Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 200, Atl.
 pl. 87 fig. 18 et Treat. fig. 623; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll.
 Alg. II p. 1334.

A.: Anvers (V. H.).

7 M. Jurgensii Ag. Syst. (1824) p. 9; Van Heurek Syn. p. 199, Atl. pl. 86 fig. 1-3, 5 et Treat. p. 442 pl. 18 fig. 612; De Wild. loc. cit. p. 349.

Lysigonium — Trev. Monog. Alg. cocc. (1848); De-Toni Syll. Alg. II p. 1330.

- A.: Anvers, Austruweel (V. H.). Lg.: Stavelot (Nob.).
- var. octogona Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 199, Atl.
 pl. 85 fig. 9 et Treat. p. 442, pl. 18 fig. 613.

Lysigonium Juergensii var. subangulare De-Toni Syll. Alg. II (1894) p. 1330.

A.: Austruweel (V. H.).

8 M. nummuloides (Dillw.) Ag. Syst. (1824) p. 8; Van Heurck Syn. p. 198, Atl. pl. 85 fig. 1, 2 et Treat. p. 440 pl. 18 fig. 608; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 348.

Conferva — Dillw. Conf. (1809) p. 43.

Gallionella - Bory Dict. class. (1825); De-Toni Syll. Alg. II p. 1331.

Fi. occ.: Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.).

9 M. Roeseana Rabenh. Alg. 382 (1852) et Süssw. Diat. (1853) p. 13 pl. 10 suppl. fig. 5; Van Heurck Syn. p. 199, Atl. pl. 88 fig. 1 6 et Treat. p. 442 pl. 19 fig. 614; De Wild. loc. cit. p. 350; De-Toni Syll. Alg. II p. 1337.

Lx.: Frahan (Del.).

var. spiralis (Ehrenb.) Grun. in Van Heurek Syn. (1885)
 p. 199, Atl. pl. 89 fig. 7-8 et Treat. fig. 616; De Wild. loc. cit.
 Liparogyra — Ehrenb. Microgeol. (1854) pl. 34.

Lx.: Frahan (Del.).

10 M. sulcata (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 55 pl. 2 fig. 7; Van Heurck Syn. p. 204, Atl. pl. 91 fig. 16 et Treat. p. 444 pl. 19 fig. 623; De Wild. loc. cit.

Gallionella - Ehrenb. Ber. Berl. Ak. (1840) pl. 3 fig. 5.

Paralia — Cleve Arct. Diat. (1873) p. 7; De-Toni Syll. Alg. II p. 1349.

Fi. occ.: Blankenberghe, Ostende (Rabenh.). - A.: Anvers (V. H.).

11 M. varians Ag. Consp. Diat. (1830) p. 64; Van Heurek Syn. p. 198, Atl. pl. 85 fig. 10, 11, 14, 15 et Treat. p. 441 pl. 18 fig. 611; De Wild, loc. cit.

Lysigonium — De-Toni Alg. Abyss. (1891) et Syll. Alg. II p. 1329.

Bt: Bruxelles (Del.). — Très-commun (V. H.).

12 M. Westii W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 59 pl. 52 fig. 333; Van Heurck Syn. p. 198, Atl. pl. 91 fig. 11, 12 et Treat. p. 441, 332 pl. 18 fig. 609; De Wild. loc. cit. p. 348.

Gallionella — De-Toni in Bull. Soc. Impér. Nat. Moscou (1892) n. I et Syll. Alg. II p. 1332.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). -- A.: Anvers (V. H.).

- 52 CYCLOTELLA Kuetz. Syn. Diat. (1833) p. 7; Van Heurck Syn. p. 213 et Treat. p. 445; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 365; De-Toni Syll. Alg. II p. 1351.
- 1 C. comta (Ehrenb.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 21; Van Heurck Syn. p. 214, Atl. pl. 92 fig. 16-22 et Treat. p. 446 pl. 22 fig. 653;

De Wild. loc. cit. p. 365; De-Toni Syll. Alg. II p. 1353. Discoplea — Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1842) p. 267.

A.: Anvers (V. H.). - Lg.: Barisart, Wayai (Nob.).

2 C. Kuetzingiana Thwaites in Ann. and Mag. of nat. Hist. (1848) p. 169 pl. 11 D fig. 1; Van Heurek Syn. p. 214, Atl. pl. 94 fig. 1, 4, 6 et Treat. p. 447 pl. 22 fig. 657; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 366; De-Toni Syll. Alg. II p. 1358.

A.: Anvers (V. H.). - Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

- 3 C. Meneghiana Kuetz. Bacill. (1844) p. 50 pl. 30 fig. 68; Van Heurck Syn. p. 214, Atl. pl. 94 fig. 12-13 et Treat. p. 447 pl. 22 fig. 658; De Wild. loc. cit. p. 366; De-Toni Syll. Alg. II p. 1354.
 A.: Anvers (V. H.). Bt: St Josse-ten-Noode (Del.).
- 4 C. operculata (Ag.) Kuetz. Syn. Diat. (1833) p. 7 fig. 1; Van Heurck Syn. p. 214, Atl. pl. 93 fig. 22, 24 et Treat. p. 447 pl. 22 fig. 655; De Wild. loc. cit. p. 366; De-Toni Syll. Alg. II p. 1354.

Pyxidicula — Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1834).

Lg.: Francorchamps, Barisart (Nob.).

5 C. striata (Kuetz.) Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 119; Van Heurck Syn. p. 213, Atl. pl. 92 fig. 6-10 et Treat. p. 446 pl. 22 fig. 651; De Wild. loc. cit. p. 365; De-Toni Syll. Alg. II p. 1352. Coscinodiscus — Kuetz. Bacill. (1844) p. 131.

A.: Anvers (V. H.).

- 53 HYALODISCUS Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1845) p. 78; Van Heurck Syn. p. 213 et Treat. p. 448; De-Toni Syll. Alg. II p. 1365; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 365.
- 1 H. stelligera Bail. New Spec. (1843?) p. 10; Van Heurek Syn. p. 213, Atl. pl. 84 fig. 1, 2 et Treat. p. 449 pl. 22 fig. 650; De Wild. loc. cit. p. 365; De-Toni loc. cit. p. 1367.

Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende, Heyst (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).

2 H. subtilis Bail. New. Spec. (1843?) p. 10 pl. fig. 12; Van Heurck Treat. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 1366.

FI. occ.: Blankenberghe (∇ . H.).

TRIB. BIDDULPHIEAE.

- 54 ISTHMIA Ag. Consp. crit. Diat. (1830) p. 55; Van Heurck Syn. p. 202 et Treat. p. 451; De-Toni Syll. Alg. II p. 833; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 353.
- I. enervis Ehrenb. Inf. (1838) p. 209 pl. 16 fig. 6; Van Heurek Syn.
 p. 202, Atl. pl. 96 fig. 1-3 et Treat. p. 451 pl. 19 fig. 625;

- De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 353 fig. 97.
- Isthmiella Oleve Arct. Diat. (1873) p. 10; De-Toni Syll. Alg. II p. 834. Lavage de moules (Deby).
 - 55 ANAULUS Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1844) p. 198; Van Heurck Syn. p. 202 et Treat. p. 454; De-Toni Syll. Alg. II p. 869; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 354.
- 1 A. debilis (Grun.) Van Heurck Syn. (1885) p. 202 et Treat. p. 454 pl. 19 fig. 626; De Wild. loc. cit.

Eunotogramma — Grun. in Van Heurck Atl. (1883) pl. 126 fig. 17-18; De-Toni loc. cit. p. 893.

Fl. occ.: Ostende (Grun.).

- 56 EUCAMPIA Ehrenb. Kreideth. (1839) p. 74; Van Heurck Syn. p. 203 et Treat. p. 461; De-Toni Syll. Alg. II p. 982; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 354.
- 1 E. Zodiacus Ehrenb. Kreideth. (1839) p. 71 pl. 4 fig. 8; Van Heurck Syn. p. 203, Atl. pl. 95 fig. 17, 18 pl. 95bis fig. 1, 2 et Treat. loc. cit. pl. 19 fig. 628; De-Toni loc. cit.; De Wild. loc. cit. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - 57 BELLEROCHEA Van Heurck Syn. (1885) p. 203 et Treat. p. 465; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 355; De-Toni Syll. Alg. II p. 984.
- 1 B. malleus (*Brightw.*) Van Heurck Syn. (1885) p. 203, Atl. pl. 114 fig. 1 et Treat. p. 465; De Wild. loc. cit.

Triceratium — Brightw. in Micr. Journ. VI (1858) p. 154 pl. 8 fig. 6-7. A.: Anvers ? (Belleroche).

- 58 LITHODESMIUM Ehrenb. Leb. Kreideth (1840) p. 75; Van Heurck Syn. p. 202 et Treat. p. 465; De-Toni Syll. Alg. II p. 985; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 354.
- 1 L. undulatum Ehrenb. Leb. Kreideth. (1840) p. 75 pl. 4 fig. 13; Van Heurck Syn. p. 202, Atl. pl. 116 fig. 8-11 et Treat. loc. cit. pl. 19 fig. 627; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 985. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
 - 59 BIDDULPHIA Gray Arrang. Brit. Plants I (1831) p. 294;
 Van Heurck Syn. p. 203 et Treat. p. 466; De Wild. Fl.
 Alg. Belg. p. 355; De-Toni Syll. Alg. II p. 860
- 1 B. alternans (Bail.) Van Heurck Syn. (1885) p. 208, Atl. pl. 113

fig. 4-5-7 et Treat. p. 475 pl. 21 fig. 644; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 359.
Triceratium — Bail. Micr. Obs. (1860) p. 40 fig. 55-56; De-Toni Syll. Alg. II p. 941.

Fi. occ.: Blankenberghe (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).

B. aurita (Lyngb.) Bréb. Consid. Diat. in Soc. Linn. Norm. (1872)
 p. 12; Van Heurck Syn. p. 205, Atl. pl. 98 fig. 4-9 et Treat. p. 471
 pl. 20 fig. 631; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 356.

Diatoma - Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1859) p. 182 pl. 62 fig. D.

Odontella — Ag. Consp. Diat. (1830) p. 56; De-Toni Syll. Alg. II p. 862. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).

var. minima Grun. in Van Heurek Syn. (1885) p. 205, Atl.
 pl. 99 fig. 1-3 et Treat. p. 471 pl. 20 fig. 632; De Wild. loc. cit.
 Odontella aurita var. — De-Toni Syll. Alg. II (1892) p. 863.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- var. minuscula Grun. ex Van Heurck Treat. (1896) pl. 20 fig. 633. Fl. occ. Blankenberghe (V. H.).
- 3 B. Baileyi W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 50 pl. 45 fig. 322; Van Heurck Syn. p. 205, Atl. pl. 101 fig. 46 et Treat. p. 473 pl. 20 fig. 636; De Wild. loc. cit. p. 357.

Denticella mobiliensis (Bail.) Grun. Diat. Fr. Jos. Land. p. 7; De-Toni Syll. Alg. II p. 882.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

4 B. favus (Ehrenb.) Van Heurck Syn. (1885) p. 208, Atl. pl. 107 fig.
1-4 et Treat. p. 475 pl. 21 fig. 643; De Wild. loc. cit. p. 359.
Triceratium — Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1839) pl. 4 fig. 10; De-Toni Syll. Alg. II p. 917.

Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.). - A.: Anvers (V. H.).

- 5 B. granulata Roper in Trans. Micr. Soc. (1859) p. 13 pl. 1 fig. 1011, pl. 2 fig. 12; Van Heurek. Syn. p. 206, Atl. pl. 99 fig. 7-8 pl. 101 fig. 4 et Treat. p. 473 pl. 20 fig. 637; De Wild. loc. cit. p. 357.
 A.: Anvers (V. H.).
- 6 B. levis Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1843) p. 122; Van Heurck Syn. p. 206, Atl. pl. 104 fig. 3, 4 et Treat. p. 474 pl. 20 fig. 639; De Wild. loc. cit. p. 358.

Cerataulus — Ralfs in Pritch Inf. (1861) p. 847 pl. 6 fig. 7; De-Toni Syll. Alg. II p. 1074.

A.: Auvers (V. H.).

7 B. pulchella Gray Arrang. of Brit. Plants I (1831) p. 294; Van Heurck Syn. p. 204, Atl. pl. 97. fig. 1-3 et Treat. p. 470 pl. 20 fig. 630; De Wild. loc. cit. p. 355; De-Toni Syll. Alg. II p. 870. Lavage de moules (V. H.).

B. Rhombus (Ehrenb.) W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 49 pl. 45 fig. 320; Van Heurck Syn. p. 205, Atl. pl. 99 fig. 1, 3 et Treat. p. 472 pl. 20 fig. 634; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 356.

Denticella — Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1844) p. 79; De-Toni Syll. Alg. II p. 882.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). - A.: Anvers (V. H.).

var. trigona Cleve ex Van Heurek Syn. (1885) p. 205, Atl. pl. 99 fig. 2 et Treat. fig. 635; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). - A.: Anvers (V. H.).

B. sculpta (Shadb.) Van Heurch Syn. (1885) p. 208, Atl. pl. 109 fig.
7-9 et Treat. p. 476 pl. 21 fig. 645; De Wild. loc. cit. p. 359.
Triceratium — Shadb. in Trans. Micr. Soc. II (1854) p. 15 pl. 1 fig. 4.
Triceratium punctatum Brightw.; De-Toni Syll. Alg. II p. 944.
A.: Anvers (V. H.).

B. Smithii (Ralfs) Van Heurck Syn. (1885) p. 207, Atl. pl. 105 fig.
 1, 2 et Treat. p. 474 pl. 21 fig. 641; De Wild. loc. cit. p. 358.
 Cerataulus — Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 847; De-Toni Syll. Alg. II p. 1074.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). - A.: Anvers (V. H.).

11 B. turgida W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 50 pl. 62 fig. 384; Van Heurek Syn. p. 206, Atl. pl. 104 fig. 1-2 et Treat. p. 473 pl. 21 fig. 638; De Wild. loc. cit. p. 358.

Odontella - De-Toni Syll. Alg. II (1892) p. 864.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). - A.: Anvers (V. H.).

TRIB. EUPODISCEAE.

- 60 AULISCUS Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1843) p. 270; Van Heurch Syn. p. 209 et Treat. p. 482; De-Toni Syll. Alg. II p. 1025; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 360.
- A. sculptus (W. Sm.) Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 845 pl. 6 fig. 3;
 Van Heurck Syn. p. 209, Atl. pl. 117 fig. 1, 2 et Treat. p. 482 pl.
 21 fig. 646; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. II p. 1042.
 A.: Anvers (V. H.). Fl. occ.: Bruges (Deby), Blankenberghe (V. H).

- var. coelata Van Heurek Treat. (1896) p. 482.

A.: Anvers (V. H.). - Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 61 EUPODISCUS Ehrenb. in Monatsb. Berl. Ak. (1844) p. 1080; Van Heurek Syn. p. 209 et Treat. p. 487; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 361.
- 1 E. Argus Ehrenb. Kreideth. (1839) p. 77; Van Heurck Syn. p. 209,

Atl. pl. 117 fig. 3-6 et Treat. p. 487 pl. 21 fig. 647; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 361.

Aulacodiscus — Schm. Atl. (1886) pl. 107 fig. 4; De-Toni Syll. Alg. II p. 1121.

FI. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).

- 62 MICROPODISCUS Grun. Diat. Fr. Jos. Land. (1884) p. 79; Van Heurck Syn. p. 210 et Treat. p. 492; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 361.
- 1 M. Weissflogii Grun. ex Van Heurck Syn. (1885) p. 210 et Treat. loc. cit. fig. 231; De Wild. loc. cit. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

TRIB. HELIOPELTEAE.

- 63 ACTINOPTYCHUS Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1839) p. 137; Van Heurck Syn. p. 210 et Treat. p. 492; De-Toni Syll. Alg. II p. 1372; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 361.
- 1 A. splendens (Ehrenb.) Shadb. in Pritch. Inf. (1861) p. 840; Van Heurck Syn. p. 121, Atl. pl. 119 fig. 1, 2, 4 et Treat. p. 497 pl. 22 fig. 649; De Wild. loc. cit. p. 362; De-Toni Syll. Alg. II p. 1385. Halionyx Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1844).

Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.). - A.: Anvers (V. H.).

2 A. undulatus (Bail.) Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 839 pl. 5 fig. 88; Van Heurck Syn. p. 220, pl. 122 fig. 1, 3 pl. 22b fig. 4 et Treat. p. 497 pl. 22 fig. 649; De-Toni Syll. Alg. II p. 1372; De Wild. loc. cit.

Actinocyclus — Bail. in Amer. Journ. Sc. (1842) pl. 2 fig. 11.

F1. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.), Ostende (Rabenh.). — A.: Anvers (Ehrenb.).

TRIB. COSCINODISCEAE.

- 64 STEPHANODISCUS Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1845) p. 80

 Van Heurck Syn. p. 216 et Treat. p. 520; De-Toni Syll.

 Alg. II p. 1151; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 367.
- 1 S. Hantzschii Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 115 pl. 7 fig. 131; Van Heurek Syn. p. 216, Atl. pl. 95 fig. 10 et Treat. loc. cit. pl. 22 fig. 662; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. Bt: Bruxelles (Del.). A.: Anvers (V. H.).

- 65 ACTINOCYCLUS Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1837) p. 61; Van Heurck Syn. p. 215 et Treat. p. 522; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 306; De-Toni Syll. Alg. II p. 1163.
- 1 A. crassus Van Heurck Syn. (1885) p. 215, Atl. pl. 124 fig. 6-8 et Treat. p. 523 pl. 23 fig. 660; De Wild. loc. cit. p. 367; De-Toni Syll. Alg. II p. 1169.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 2 A. Ehrenbergii Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 834; Van Heurck Syn. p. 213, Atl. pl. 123 fig. 7 et Treat. p. 523 pl. 23 fig. 659; De Wild. loc. cit. p. 367; De-Toni Syll. Alg. II p. 1177.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 3 A. Ralfsii (W. Sm.) Rulfs in Pritch. Inf. (1861) p. 835 pl. 5 fig. 84;
 Van Heurck Syn. p. 215, Atl. pl. 123 fig. 6 et Treat. p. 523 pl. 23
 fig. 658; De Wild. loc. cit. p. 366; De-Toni Syll. Alg. II p. 1170.
 Eupodiscus W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 68.

Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).

- 66 COSCINODISCUS Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1838) p. 128; Van Heurck Syn. p. 216 et Treat. p. 525; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 367; De-Toni Syll. Alg. II p. 1200.
- 1 C. excentricus Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1839) p. 146; Van Heurck Syn. p. 217, Atl. pl. 130 fig. 47, 8 et Treat. p. 531 pl. 23 fig. 666; De IVild. loc. cit. p. 368; De-Toni Syll. Alg. II p. 1210. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.). A.: Anvers (Rabenh., V. H.).
- C. lacustris Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 114; Van Heurck Syn. p. 218, Atl. suppl. fig. 42 et Treat. p. 533 pl. 23 fig. 669; De Wild. loc. cit. p. 369; De-Toni Syll. Alg. II p. 1290.
 A.: Deurne (Gautier).
- 3 C. lineatus Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1838) p. 129; Van Heurck Syn. p. 217, Atl. pl. 131 fig. 3, 5, 6 et Treat. p. 532 pl. 23 fig. 665; De Wild. loc. cit. p. 368; De-Toni Syll. Alg. II p. 1216. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 4 C. nitidus Greg. Diat. of the Clyde (1857) p. 27 pl. 2 fig. 45; Van Heurck Syn. p. 218, Atl. suppl. fig. 41 et Treat. p. 532 pl. 23 fig. 667; De Wild. loc. cit. p. 368; De-Toni Syll. Alg. II p. 1221.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 5 C. radiatus Ehrenb. Mikrogeol. (1854) pl. 21 fig. 1; Van Heurck Syn. p. 216, Atl. pl. 129 fig. 5 et Treat. p. 530 pl. 23 fig. 663; De

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 268.

Coscinodiscus Argus Ehrenb.; De-Toni Syll Alg. II p. 1253.

Fl. occ.: Blankenberghe (V.H.), Ostende (Rabenh). - A.: Anvers (Rabenh.).

C. radiatus var. concinnus (W. Sm.) Van Heurek Treat. (1896) p. 531.
Coscinodiscus — W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 85; De-Toni Syll. Alg.
II p. 1256.

FI. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- var. Oculus-Iridis Ehrenb.; Van Heurck Treat. p. 530.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). - A.: Anvers (V. H.).

var. Asteromphalus (Ehrenb.) Van Heurck Atl. (1883) pl. 130 fig. 1, 2, 5 et Treat. pl. 23 fig. 664.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 6 C. subtilis Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 412, pl. 1, III fig. 18 pl. 3, VII fig. 4; Van Heurck Syn. p. 218 et Treat. p. 532 pl. 34 fig. 901; De Wild. loc. cit. p. 368; De-Toni Syll. Alg. II p. 1232.
 - var. Normanii (Greg.) Van Heurek Syn. (1885) p. 218 Atl.
 pl. 231 fig. 1 et Treat. fig. 668; De Wild. loc. cit. p. 369.

Coscinodiscus Normanii *Greg.* in Quart. Journ. Micr. Sc. (1859) p. 80 pl. 6 fig. 3; *De-Toni* loc. cit. p. 1235.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.). — A.: Anvers (Ehrenb., V. H.).

var. Rothii (Ehrenb.) Van Heurch Syn. (1885) p. 218 et Treat.
 p. 533; De Wild. loc. cit.

Coscinodiscus — *Grun.* Diat. Fr. Jos. Land (1884) p. 29 pl. 3 fig. 20 α·b, 22; De-Toni Syll. Alg. II p, 1236.

Heterostephania - Ehrenb. in Mikrogeol. (1854).

A. : Anvers (V. H.).

Conjugatineae.

FAM. DESMIDIACEAE.

SUBFAM. DIDYMIOIDEAE.

TRIB. SPIROTAENIEAE.

- 1 SPIROTAENIA Bréb. in Ralfs Brit. Desmid. (1848) p. 178; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 122; De-Toni Syll. Alg. I p. 807.
- 1 S. condensata Bréb. in Ralfs. Brit. Desmid. (1848) p. 179 pl. XXXIV fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 122 fig. 56; De-Toni loc. cit.

Lg.: Spa, Malchamp, Ru du fond de Polleur, Cour, Stoumont, Hockay, Berinsenne, Francorchamps, Barisart, Jalhay (Nob.). — Lx.: Libin, Villance (L. M.), Seviscourt (L. D.). — Lb.: Genck (Nob.).

- 2 S. obscura Ralfs Brit. Desmid. (1848) p. 179 pl. XXXIV fig. 2; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 123; De-Toni Syll. Alg. I cit. p. 809. Lg.: Ru de Polleur, Ru de Chefna, Francorchamps, Barisart, Préfayhay (Nob.).
- 3 S. truncata Arch. in Micr. Journ. (1862) p. 253 pl. XII fig. 28-31; De Wild. loc. cit. p. 122 fig. 55; De-Toni Syll. Alg. I p. 808. Lg: Ru de Chefna (La Reid), Cour, Francorchamps, Barisart, Ruy (Nob.).
 - 2 MESOTAENIUM Naeg. Einz. Alg. (1840) p. 109; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 123; De-Toni Syll. Alg. I p. 811.
- 1 M. Braunii De Bary Conjug. (1858) p. 74 pl. VII fig. 1-8; De Wild. loc. cit. p. 123; De-Toni loc. cit.

Bt: Vollezeele (V. W.). - Lb.: Genck (Nob.).

- 2 M. Endlicherianum Naeg. Einz. Alg. (1840) p. 109 pl. VI B; De Wild. loc. cit. p. 124; De-Toni Syll. Alg. I p. 814.
 Lx.: Villance, Opont (L. M.).
- 3 M. violascens De Bary Conjug. (1858) p. 75 pl. VII D; De Wild. loc. cit. p. 123; De-Toni Syll. Alg. I p. 812.

 A.: Calmpthout (Nob.).

TRIB. CLOSTERIEAE.

- 3 CLOSTERIUM Nitzsch N. S. n. G. (1817); De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 124; De-Toni Syll. Alg. I p. 817.
- I C. acerosum (Schrank) Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1831); Kickw Fl. crypt. II p. 445; De Wild. loc. cit. p. 126; De-Toni Syll. Alg. I p. 824.

Vibrio - Schrank Fauna Boica III (1803) p. 47.

- Bt: Watermael (Dewèvre); entre Eppeghem et Elewyt (Sonnet), Rouge-Cloître (A. D.); Ganshoren, Anderlecht, Woluwe-St-Pierre, bois de la Cambre, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.), Vollezeele (V.W.).—A.: Lierre (Nob.).—Fl. or.: Denderwindeke, Meerbeke (V. W.), Neder-Eenaeme (Nob.).—Lb.: env. de Maeseyck (J. M.), Genck (Nob.).—Fl. occ.: Nieuport (West.), entre Assenede et Philippine (Kickx).—Ht.: Blicquy (G. L.), Belœil (Nob.).—Lg.: entre Marteau et Winamplanche, entre Spa et Polleur, Vallée de Tolifa, Marteau, Ruy, Desniez, ru de Turon (La Reid) (Nob.), Tihange, Marchin (M. et C.)—Lx.: Libin, Transinne (L. M.), Villance (A. D.).
- 2 C. aciculare West in Micr. Journ. VIII (1860) p. 153 pl. 7 fig. 16;
 De Wild. loc. cit. p. 130; De-Toni Syll. Alg. 3 p. 837.
 Lb.: Genck (Nob.).
- 3 C. acutum (Lyngb.) Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1818) p. 177 pl. XXX fig. 5 XXXIV fig. 5; De Wild. loc. cit. p. 129; De-Toni Syll. Alg. I p. 836.

Echinella — Lyngb. Hydr. dan. (1819) p. 209 pl. 69 G.

Bt: Anderlecht (Nob.). - Ht: Belæil (Nob.). - N.: Walzin (Él. M.). -

- Lb: Genck (Nob.). Lg.: env. de Spa. Hockay, Francorchamps, Stavelot, Cour, Ruy, Bois Gossonfays (Nob.), Tihange (M. et C.). Lx.: Transinne (L. M.), Villance (A. D.), env. de Houffalize (J. M.).
- 4 C. angustatum Kuetz. Phycol. germ. (1845) p. 132; De Wild. loc. cit. p. 125; De-Toni Syll. Alg. I p. 821.
 - Lb.: Genck (Nob.). Lg.: entre Marteau et Winamplanche, Stoumont (Nob.). Lx.: Seviscourt (L. D.).
- 5 C. attenuatum Ehrenb. Inf. (1838) p. 94 pl. VI fig. 4; De Wild. loc. cit. p. 128; De-Toni Syll. Alg. I p. 829.
 - Lg.: Ru de Chefna (La Reid), Préfayhay (Nob.). Lb.: Genck (Nob.). Lx.: Libin (L. M.).
- 6 C. cornu Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1850); De Wild. loc. cit. p. 129; De-Toni Syll. Alg. I p. 835.

Closterium tenne Kuetz. in Linnaea (1833) p. 595 f. 78.

- Bt: Woluwe-St-Pierre (Nob.). Ht: Obigies (Marissal). Lg.: route de la Gleize (Spa), entre Roanne et Coo, ru de Chawion, Ruy, Hockay (Nob.). A.: env. de Turnhout (Paque).
- 7 C. costatum Corda in Almanach de Carlsb. (1835) pl. V. fig. 61-63;
 De Wild. loc. cit. p. 128; De-Toni Syll. Alg. I p. 833.
 - Lg.: Ru de Chawion (Nob.). A.: Calmpthout (Nob.). Lb.: Kinroy (J. M.).
- 8 C. Dianae Ehrenb. Inf. (1838) p. 92 pl. V fig. XVII; De Wild. loc. cit. p. 130; De-Toni Syll. Alg. I p. 838.
 - Bt: Tervueren, Bergh, Woluwe-St-Pierre, Anderlecht (Nob.). A.: Lierre, Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). Ht: Belœil (Nob.). Lh: Genck (Troch), Kinroy (J. M.). Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). N.: Vierves (M. et F.). Lg.: Env. de Spa, entre Roanne et Coo, Polleur, La Reid (Nob.), Marchin (M. et C.). Lx.: Villance, Libin, Opont, Transinne (L. M.), Maissin (A. D.), Presseux (L. D.).
- 9 C. didymotocum Corda Almanach de Carlsbad (1835) p. 125 pl. V fig. 64-65; De Wild. loc. cit. p. 126; De-Toni Syll. Alg. I p. 822.

 A.: Wuestwezel (Nob.). Ht: Camp de Casteau (Nob.). Lg.: Ruy (Nob.). Lb.: Kinroy, Molenbeersel (J. M.).
- 10 C. Ehrenbergii Menegh in Linnaea (1840) p. 232; De Wild. loc. cit. p. 131 fig. 60; De-Toni Syll. Alg. I p. 844.
 - Bt: Bois de la Cambre (Ém. M.). A.: Lierre (Nob.). Fl. occ.: Nieuport (West.). Fl. or.: Neder-Eenaeme (Nob.). Ht: Deurbes (L. et F.). Lg.: Winamplanche (Nob.), Vierset (M. et G.). Lx.: env. d'Houffalize (J. M.). Lb.: Genck (Troch), Molenbeersel (J. M.).
- 11 C. gracile Bréb. Liste Desm. de la Basse Normandie in Mém. Soc. des Sc. de Cherbourg (1856) p. 156 pl. II fig. 45; De Wild. loc. cit. p. 125; De-Toni Syll. Alg. I p. 818.
 - A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). Lx.: Villance, Anloy (L. M.).
- 12 G. intermedium Ralfs Brit. Desmid. (1848) p. 171 pl. 29 fig. 3;
 De Wild. loc. cit. p. 129; De-Toni Syll. Alg. I p. 834.
 Lg.: Wayai (Nob.). Lb.: Genck (J. M.).

- 13 C. Jenneri Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 167 pl. XXVIII fig. 6;
 De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 131; De-Toni Syll. Alg. I p. 843.
 - Bt: Neder-over-Heembeek (Nob.). A.: Calmpthout (Nob.). N.: Walzin (Él. M.). Lg.: env. de Spa, Stoumont, Tihange (Nob.). Lx.: Paliseul (A. D.), Opont, Libin (L. M.), Libramont (A. D.). Lb.: Genck (Nob.), env. de Maeseyck (J. M.).
- 14 C. juncidum Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 172 pl. XXIX fig. 6; De Wild. loc. cit. p. 125; De-Toni Syll. Alg. I p. 820.
 - A.: Calmpthout (Nob.). Lb.: Genck (Nob.). Lg.: Ru du fond de Polleur, entre Roanne et Coo, Spa, Ru de Chefna (La Reid) (Nob.).
- 15 C. Leibleinii Kuetz. Syn. in Linnaea (1833) p. 596; De Wild. loc. cit. p. 132; De-Toni Syll. Alg. I p. 846.
 - Bt: Vaelbeek, Zoctwater, Wygmael (Paque), Jardin bot. de Bruxelles, Woluwe-St-Pierre, Rouge-Cloître, Neder-over-Heembeeck, Anderlecht (Nob.), St-Gilles (Miller), entre Eppeghem et Elewyt (S.). A.: Tongerloo (L. G.). Ht: Blicquy (G. L.), Obigies (Marissal), Camp de Casteau, Beloül (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). Lg.: Env. de Spa, Bois Gossonfays, Jalhay, Cour, Francorchamps, Stavelot, Ruy, Hockay, Tihange (Nob). Lx: Env. de Houffalize (J. M.).
- 16 C. lineatum Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 238; De Wild. loc. cit. p. 130; De-Toni Sylf. Alg. I p. 838.
 - A.: Weelde, Raevels (Paque). Ht: Nimy (Michot). Lx.: Libin (L. M.).
- 17 C. Lundellii Lagerh. Bid. till Sveriges Algflora (1883) p. 53; De-Toni Syll. Alg. I p. 818.
 - Lb.: Genck (J. M.).
- 18 C. lunula (Mueller) Nitzsch Beitr. II (1817); Kickx Fl. crypt. II p. 144; De Wild. loc. cit. p. 128; De-Toni Syll. Alg. I p. 831. Vibrio Mueller Naturf. XX (1784) p. 142.
 - Bt: Zoetwater, Eegenhoven (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.). Ht: env. de Tournai (Marissal). Fl. or.: Melle (Morren), Schelderode (Scheidweiler). Lg.: env. de Spa, Charneux, Stoumont, Stavelot (Nob.), Marchin (M. et C.). Lx.: Libin (L. M.), Libramont, Seviscourt (L. D.).
- 19 C. moniliferum (Bory) Ehrenb. Inf. (1838) p. 91 p. p. pl. 5 fig. 16; Kickw Fl. crypt. II p. 445; De Wild. loc. cit. p. 132; De-Toni Syll. Alg. I p. 845.
 - Fl. occ.: Nieuport (West.). Lg.: Creppe (Nob.). Lb.: Kinroy (J. M.).
- 20 C. obtusum Bréb. Liste Desm. de la Basse Normandie in Mém. Soc. des Sc. de Cherbourg (1856) p. 154 pl. II fig. 46; De Wild. loc. cit. p. 185; De-Toni Syll. Alg. I p. 819.
 - Lb.: Genck (Nob.). Lg.: Cour, bois Gossonfays, Hockay, Desniez, ru de Chefna (Nob.); Gives (M. et C.). Ht: Camp de Casteau (Nob.). Lx.: Libramont (L. D.).
- 21 C. parvulum Naeg. Einz. Alg. (1849) p. 106 pl. VI, C fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 131; De-Toni Syll. Alg. I p. 841.
 Lb.: Genck (Nob.).

- 22 C. rostratum Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 67; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 133; De-Toni Syll. Alg. I p. 851.
 - Bt: Anderlecht, Boitsfort, Bergh, Woluwe St-Pierre, Evere (Nob.), entre Eppeghem et Elewyt (Sonnet). A.: Lierre, Calmpthout (Nob.). Ht: Blicquy (G. L.), Belœil, Camp de Casteau (Nob.). Lg.: env. de Spa, entre Roanne et Coo, Ruy, Hockay, Jalhay, Francorchamps, Coquaifange, Stoumont, (Nob.), Marchin, Gives, Ahin, Tihange, Ombret (M. et C.). Lx.: Presseux (L. D.), Opont (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).
- 23 C. setaceum Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1833); De Wild. loc. cit. p. 133 fig. 58; De-Toni Syll. Alg. I p. 850.
 - A.: Calmpthout (Nob.). Bt: Bergh (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). Lg.: Ru de Chefna (La Reid) (Nob.). Lx.: Opont (L. M.).
- 24 C. strigosum Bréb. Liste des Desm. de Basse Normandie in Mém. Soc. Sc. de Cherbourg (1856) p. 153 pl. II fig. 43; De Wild. loc. cit. p. 127; De-Toni Syll. Alg. I p. 829.

 Lg.: Entre Spa et Polleur (Nob.).
- 25 C. striolatum Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 68; De Wild. loc. cit. p. 127; De-Toni Syll. Alg. I p. 826.
 - Bt: Zoetwater, Vaelbeek, Corbeek-Dyle (Paque). A.: Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). Lb.: Genck (Nob.). Lx.: Presseux (L. D.). Lg.: env. de Spa, Stoumont, entre Roanne et Coo, Hockay, Francorchamps (Nob.).
- 26 C. turgidum Ehrenb. Inf. (1838) p. 95 pl. VI fig. 7; De Wild. loc. cit. p. 127; De-Toni Syll. Alg. I p. 827.

Bt: Zoetwater (Paque).

- 4 PENIUM Bréb. ex Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 167; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 133; De-Toni Syll. Alg. I p. 855.
- P. Brebissonii (Menegh.) Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 153 pl. XXV fig. 6; De Wild. loc. cit. p. 136.

Cylindrocystis — Menegh. Cenni sull' organogr. Alg. (1838) p. 5.

- $\tt Lg.: Ruy \, (Nob.). Lb.: Genck \, (Nob.). Lx.: Presseux \, (L. D.), \, Villance Maissin \, (A. D.).$
- P. closterioides Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 152 pl. XXXIV fig. 4; De Wild. loc. cit. p. 135; De-Toni Syll. Alg. I p. 860.
 Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). - Lg.: Jalhay (Nob.).
- 3 P. cylindrus Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 150 pl. XXV fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 134.

Closterium - Ehrenb. Inf. (1838) p. 95 pl. VI fig. 7.

- Disphynctium Naeg. Einz. Alg. (1849) p. 111; De-Toni Syll. Alg. I p. 868.
- Lb.: Genck (Nob.). Lg.: Stoumont, Cour, Hockay, bois Gossonfays (Hockay), bois des Minières (Spa), Stavelot, ru de Chawion et Berinsenne (Spa) (Nob.).
- 4 P. digitus (Ehrenb.) Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 150 pl. XXV f. 3b; De Wild. loc. cit. p. 134; De Toni Syll. Alg. I p. 860.

Closterium - Ehrenb. Inf. (1838) p. 94 pl. VI fig. 3.

- A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). Ht: Nimy (Michot). Lg.: entre Spa et Malchamps, entre Roanne et Coo, Spa, Tiége, Sart, Marteau, Stoumont, ru de Chefna, Desniez, Cour, Francorchamps, Jalhay, ru de Chawion, Wayai, Berinsenne (Nob.). Marchin (M. et C.). Lx.: Libin (L. M.), Transinne, Redu (L. M.), Libramont (L. D.). Lb.: Genck (Nob.).
- 5 P. interruptum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 151 pl. XXV fig. 4; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 135; De-Toni Syll. Alg. I p. 860. tg.: Stoumont, ru de Chefna (La Reid), Desniez, Francorchamps, Berinsenne (Nob.). tb.: Genck (J. M.).
- 6 P. lamellosum Bréb. Liste in Mém. Soc. des Sc. de Cherbourg (1856) p. 146 pl. 2 fig. 34; De Wild. loc. cit. p. 136; De-Toni Syll. Alg. I p. 864.

Closterium — Bréb. Alg. Falaise in Mém. Soc. Acad. Falaise (1835) p. 59 pl. VII; Kickw Fl. crypt. II p. 445.

Fl. or.: Gand et Tronchiennes (Kickx).

7 P. margaritaceum (Ehrenb.) Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 149 pl. XXV fig. 1, XXXIII fig. 3; De Wild. loc. cit. p. 134. Closterium — Ehrenb. Inf. (1838) p. 95 pl. VI fig. 13.

Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — Lg.: entre Spa et Polleur, ru de Chefna (La Reid), Desnicz, Ruy, Hockay, Stavelot, Jalhay, Wayai (Nob.). — Lx.: Libramont, Seviscourt (L. D.), Transinne (L. M.), Villance (A. D.).

8 P. Naegelii Bréb. in Pritch Inf. (1861) 751; De-Toni Syll. Alg. I p. 861.

Lb.: Genck (J. M.).

- 9 P. Navicula Bréb. Liste in Mém. Soc. des Sc. de Cherbourg (1856) p. 146; De Wild. loc. cit. p. 135; De-Toni Syll. Alg. I p. 861.
 - A.: Calmpthout (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). Lg.: Ru de Polleur, entre Spa et Nivezé, ru de Chefna, Desniez, Ruy, Hockay. Wayai, bois Gossonfays, Spa, Francorchamps, Cour, Jalhay, ru de Chawion (Nob.). Lx.: Presseux (L. D.), Transinne (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).
- 10 P. truncatum (Bréb.) Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 152 pl. XXV fig. 5; De Wild. loc. cit. p. 136; De-Toni Syll. Alg. I p. 862.
 Lb.: Genck (Nob.). Lg.: Ruy, bois Gossonfays (Nob.).

TRIB. DOCIDIEAE.

- 5 TETMEMORUS Ralfs in Trans. Edinb. Soc. II (1845) p. 133; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 137; De-Toni Syll. Alg. I p. 866.
- 1 T. Brebissonii Ralfs in Ann. Nat. Hist. V (1850) p. 14 pl. VIII fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 137; De-Toni Syll. Alg. I p. 866. Closterium — Menegh. in Linnaea (1840) p. 236.
 - A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). Lg.: Ru de Chefna, Cour (Nob.). Ht: Nimy (Michot), Belœil (Nob.).

- 2 T. granulatus (Bréb.) Ralfs in Ann. Nat. Hist. II p. 134 pl. XII fig. 2; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 138; De-Toni Syll. Alg. I p. 867. Closterium Bréb. in Menegh. Syn. in Linnaea (1840) p. 236.
 - A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). Lg.: Ru du fond de Polleur, entre Spa et Malchamp, Sart, Stoumont, Desniez, Ru de Chawion, Berinsenne, Ruy, Cour, Francorchamps, Jalhay (Nob.), Vierset (M. et C.). Lx.: Villance, Libin (L. M.), Maissin (A. D.), Seviscourt (L. D.). Lb.: Kinroy, Molenbeersel, Genck (J. M.).
- 3 T. levis (Kuetz.) Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 146 pl. XXIV fig. 3 c; De Wild. loc. cit. p. 137; De-Toni Syll. Alg. I p. 868. Closterium — Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 132.
 - A.: Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). Lg.: entre Malchamp et Nivezé (Sart), ru de Chefna (La Reid), Ruy, bois Gossonfays (Nob.), Vierset (M. et C.). Lx.: Seviscourt (L. D.).
 - 6 DOCIDIUM Bréb. in d'Orbigny Dict. IX (1841) p. 711; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 138; De-Toni Syll. Alg. I p. 871.
- 1 D. Baculum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 158 pl. XXXIII fig. 5; De Wild. loc. cit. p. 138; De-Toni Syll. Alg. I p. 872. Pleurotaenium DBy Conj. (1858) p. 75.

Closterium — Bréb. Alg. Falaise in Mém. Soc. Acad. Falaise (1835) p. 59 pl. 8.

- A.: Weelde, Raevels (Paque). Lb.: Genck (Nob.).
- 2 D. clavatum Kuetz. in Ralfs Brit. Desm. (1843) p. 156 pl. XXIV fig. 9; De Wild. loc. cit. p. 139.

Pleurotaenium — DBy Conj. (1858) p. 75; De-Toni Syll. Alg. I p. 897. Lg.: Tihange (Nob.).

3 D. Ehrenbergii Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 157 c. p. pl. XXIV fig. 4a, c; De Wild. loc. cit. p. 139.

Pleurotaenium trabecula Naeg. Einz. Alg. (1840) p. 104 pl. VI A; De-Toni Syll. Alg. I p. 895.

Bi: Bergh, Woluwe-St-Pierre (Nob.). — A.: Lierre, Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — Lg.: Ru de Chefna (La Reid), Spa (Nob.). — Lb.: Genek (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — Lx.: Libin, Anloy (L. M.).

4 D. minutum Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 158 pl. XXIV fig. 5; De Wild. loc. cit. p. 139.

Pleurotaenium — Delponte Specim. Desm. subalp. (1873) p. 227 pl. 20 fig. 17-21; De-Toni Syll. Alg. I p. 904.

Lb.: Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.).

5 D. nodulosum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 155 pl. VI fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 139.

Pleurotaenium — De Bary Conj. (1858) p. 75; De Toni Syll. Alg. I p. 900. Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.).

6 D. truncatum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 156 pl. XXVI fig. 2; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 140.

Pleurotaenium - Naeg. Einz. Alg. (1849) p. 104.

Bt: Evere (Nob.).

7 DISPHINCTIUM Naeg. Gatt. Einz. Alg. (1849) p. 109; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 140; De-Toni Syll. Alg. I p. 877.

1 D. connatum (Bréb.) DBy Conf. (1858) pl. VI fig. 87; De Wild. loc. cit. p. 140; De-Toni Syll. Alg. I p. 884.

Cosmarium — Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1846) p. 108 pl. XVII fig. 10. Calocylindrus — Kirchner Alg. Schles. (1878) p. 142,

Bt: Bergh (Nob.). - Lb.: Genck (Nob.). - Lx.: Anloy (L. M.).

2 D. Cucurbita (Bréb.) Reinsch Algenfl. Mittl. Th. Franken (1867) p. 178; De Wild. loc. cit. p. 141; De-Toni Syll. Alg. I p. 881. Cosmarium — Bréb. in Desmaz. Crypt. de France éd. I n. 1103.

Calocylindrus — De Bary Conj. (1858) p. 72.

Bt: Bruxelles (A.D.), Schaerbeek (Nob.). — Fl. or.: Denderwindeke (V.W.). — A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.), Nimy (Michot). — Lg.: Spa, entre Spa et Malchamp, Stoumont, Cour, ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — Lx.: Paliseul (A.D.), env. de Houffalize (J.M.).

3 D. pseudarctoum (Nordst.) De-Toni Syll. Alg. I (1889) p. 879; De Wild. loc. cit. p. 141.

Cosmarium - Nordst. ex Wittr. et Nordst. in Bot. Notiser (1879).

Ht: Camp de Castean (Nob.). - Lg.: Francorchamps, Stavelot (Nob.).

4 D. Ralfsii (Kuetz.) Hansg. Prodr. einer Algenfl. Böhmen (1886) p. 186; De Wild. loc. cit. p. 140; De-Toni Syll. Alg. I p. 889. Penium — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 167.

Calocylindrus cylindricus Cooke Brit. Desm. (1887) p. 122 pl. 43 fig. 1-4.

Lg.: Ru de Chefna (La Reid) (Nob.). - Lb.: Kinroy, Genck (J. M.).

5 D. Thwaitesii (Ralfs) De-Toni Syll. Alg. I (1889) p. 890; De Wild. loc. cit. p. 141.

Cosmarium — Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 109 pl. XVII fig. 8. Lx.: Seviscourt (L. D.).

TRIB. MICRASTERIEAE.

- 8 PLEUROTAENIOPSIS Lund. Desmid. quae in Suec. inv. sunt (1871) p. 51; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 142; De-Toni Syll. Alg. I. p. 906.
- 1 P. De Baryi (Arch.) Lund. Desmid. Suec. (1871) p. 52 De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Calocylindrus - Cooke Brit. Desm. (1887) p. 128 pl. 44 fig. 4.

Cosmarium — Arch. in Pritch. Inf. (1861) p. 735.

Fl. or.: Kraenepoel (L. G.).

- 9 XANTHIDIUM Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 317; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 142; De-Toni Syll. Alg. I p. 916.
- 1 X. armatum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 112 pl. XVIII; De Wild. loc. cit. p. 143; De-Toni loc. cit.
 - Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J.M.). A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). Lg.: Stoumont, ru de Chefna (La Reid) (Nob.).
- 2 X. cristatum Bréb. in Ralfs. Brit. Desm. (1848) p. 115, pl. XIX fig. 3a; De Wild. loc. cit. p. 144; De-Toni Syll. Alg. I p. 923.

 Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). Lx.: Opont (L. M.).
- 3 X. fasciculatum Ehrenb. Inf. (1838) p. 146 pl. X fig. 24a; De Wild. loc. cit. p. 144; De-Toni Syll. Alg. I p. 918.
 - Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). Lg.: ru de Chefna (La Reid), ru du fond de Polleur (Nob.). Lx.: Libin (L. M.).
 - 10 COSMARIUM Corda Almanach de Carlsb. (1835) p. 205; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 144; De-Toni Syll. Alg. I p. 931.
- 1 C. anceps Lund. Desm. Suec. (1873) p. 48 pl. 3 fig. 4; De Wild. loc. cit. p. 146.

Disphinctium — Hansg. Prodrom. einer Algenfl. v. Böhmen (1888) p. 278; De-Toni Syll. Alg. I p. 893.

Lx.: Libramont (L. D.).

2 C. ansatum (Ehrenb.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 174; De Wild. loc. cit. p. 156; De-Toni Syll. Alg. I p. 948.

Euastrum — Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 82.

- A.: Calmpthout (Nob.). Ht: env. de Tournai (Marissal).
- 3 C. bioculatum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 95 pl. XV fig. 5; De Wild. loc. cit. p. 148 fig. 70g; De-Toni Syll. Alg. I p. 933.
 - Bt: La Hulpe (Él. M.). tg.: env. de Spa, Hockay, Ruy, Cour, Francorchamps, Jalhay, Tihange (Nob.).
- 4 C. biretum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 102 pl. XVI fig. 5; De Wild. loc. cit. p. 153 fig. 75; De-Toni Syll. Alg. I p. 1018. Bt: Entre Eppeghem et Elewyt (Sonnet).
- 5 C. Botrytis (Bory) Menegh. in Linnaea (1840) p. 220; De Wild. loc. cit. p. 153; De-Toni Syll. Alg. I p. 979.

Heterocarpella - Bory Dict. class. (1823) pl. 8.

Bt: Laeken (A. D.), Uccle (L. G.), Bergh, Woluwe-St-Pierre, Jardin bot. Bruxelles, Etterbeek, Tervueren, Woluwe-St-Lambert (Nob.), entre Eppeghem et Elewyt (Sonnet).—Ht: Belceil, Camp de Casteau (Nob.)—Fl. or.: Kraenepoel (L. G.).—Lb.: Genck (Nob.), Kinroy, env. de Maeseyck (J. M.).—N.: Hastières, Leffe (Él. M.).—Lx.: Opont, Presseux, Transinne (L. M.), Maissin, Anloy, Viliance (A. D.), Libramont (L. D.), env. de Houffalize (J. M.).—Lg.: env. de Spa, Francorchamps, La Reid, Stavelot, Ruy, Jalhay, Tihange (Nob.).

- 6 C. Brebissonii Menegh. in Linnaea (1840) p. 219; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 151 fig. 72; De-Toni Syll. Alg. I p. 893.
 - Lg.: Stoumont, Cour, Wayai, ru de Chefna (La Reid) (Nob.). Lx.: Seviscourt (L. D.).
- C. Broomei Thwaites in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 103 pl. XVI fig.
 6; De Wild. loc. cit. p. 153 fig. 76; De Toni Syll. Alg. I p. 1026.
 Bt: Woluwe-St-Pierre, Jardin bot. de Bruxelles, Anderlecht (Nob.). —
 A.: Calmpthout (Nob.). N.: Dourbes (M. ct F.). Lg.: Hockay (Nob.). —
 Lb.: Molenbeersel (J. M.).
- 8 C. calcareum Wittr. Om. Gotl. och Oelands Söttvattens Alg. in Bih. Kongl. Vet. Ak. Handl. I (1872) p. 58 pl. 4 fig. 13; De-Toni Syll. Alg. I p. 1047.

 Lb.: Kessenich (J. M.).
- 9 C. coelatum Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 183 pl. XVII fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 154; De-Toni Syll. Alg. I p. 1007.
 - Bt: Saint-Gilles (Miller). Lx.: Libramont, Seviscourt (L. D.), Redu, Libin (L. M.).
- 10 C. confusum Cooke Brit. Desm. (1887) p. 110 pl. 42 fig. 9; De Wild. loc. cit. p. 154.
 Lb.: Genck (Nob.).
- 11 C. conspersum Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 101 pl. XVI fig. 4;
 De Wild. loc. cit. p. 152; De-Toni Syll. Alg. I p. 997.
 - FI. or.: Kraenepoel (L. G.). Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). Lx.: Transinne (L. M.).
- 12 C. crenatum Ralfs in Trans Bot. Soc. of Edinb. II, I (1849) p. 150 pl. XVI fig. 6; De Wild. loc. cit. p. 150; De-Toni Syll. Alg. I p. 941.
 - Lg.: Winamplanche, Berinsenne, Jalhay, Stavelot (Nob.). Ht: Vierves (M. et F.). Lx.: env. d'Houffalize (J. M.).
- 13 C. Cucumis *Oorda* Almanach de Carlsbad (1835) p. 121 fig. 27; *De Wild*, loc. cit. p. 146 fig. 70e.
 - Pleurotaeniopsis Lagerh. Alg. Bidrag II p. 197; De-Toni Syll. Alg. I p. 910.
 - Lb.: Genck (Nob.). Lg.: Marteau (Spa), Coquaifange, Jalhay, Vallée de Tolifa, Winamplanche (Nob.). Ht: Nimy (Michot). Lx.: Libramont, Presseux (L. D.).
- 14 C. granatum Bréb. Liste in Mém. Soc. Sc. de Cherbourg (1856) p. 126; De Wild. loc. cit. p. 146; De-Toni Syll. Alg. I p. 931.
 - ${\tt Bt}: {\tt Anderlecht}, \ {\tt Bergh} \ ({\tt Nob.}). \ ---- {\tt A.}: {\tt Calmpthout} \ ({\tt Nob.}). \ ---- {\tt Lb.}: {\tt Genck} \ ({\tt Nob.}).$
- 15 C. Kjellmanni Wille Ferskvandsalger fr. Nov. Semlja (1885) p. 42 pl. XII fig. 31; De Wild. loc. cit. p. 155; De-Toni Syll. Alg. I p. 1026.
 - Lb. : Genck (Nob.).

16 C. margaretiferum Menegh. Syn. in Linnaea (1840) p. 219; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 152; De-Toni Syll. Alg. I p. 979.

Ursinella - Turp. Dict. Sc. nat. (1820) fig. 23.

Bt: Woluwe-St-Pierre, Anderlecht, Bergh (Nob.), St-Gilles (Miller). — A.: Tongerloo (L. G.), Oosthoven, entre Turnhout et Beersse (Paque), Calmpthout (Nob.). — Fl. Or.: Kraenepoel (L. G.). — Ht: Brenze (Marissal). — Lb.: Genck (Nob.). — Lg.: entre Spa et Polleur (Nob.), Jehay (M. et C.). — Lx.: Libramont (L. D.), Presseux, Opont, Anloy (L. M.), Villance (A. D.).

17 C. Meneghini Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 96 pl. XV fig. 6; De Wild. loc. cit. p. 149 fig. 70h; De-Toni Syll. Alg. I p. 937.

Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). -- A.: Calmpthout (Nob.). -- Bt: Bergh, Beggynendyk (Sonnet), Anderlecht (Nob.). -- Fl. or.: Denderwindeke (V. W.), Kraenepoel (L. G.). -- N.: Hastières, Walzin (Él. M.). -- Lx.: Villance, Opont, Libin, Anloy (L. M.), Libramont, Presseux (L. D.), Redu (L. M.). -- Lg.: env. de Spa, La Reid, Stoumont, Charneux, Jalhay, Francorchamps, Stavelot, Ruy (Nob.), Sollières (Ahin), Jehay, Yernée (M. et C.).

18 C. moniliforme (Turp.) Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 107; De Wild. loc. cit. p. 156; De-Toni Syll. Alg. I p. 932.

Tessarthonia — Turp. Mém. du Mus. d'Hist. nat. t. XVI (1828) p. 310 pl. XIII fig. 18,

Scenedesmus — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 185; Kickx Fl. crypt. II p. 156. Fl. or.: env. de Gand (Morren). — Lb.: Genck (Nob.).

- 19 C. Naegelianum Bréb. Liste des Desm. de basse Normandie in Mém. Soc. Sc. de Cherbourg (1856) p. 127; De Wild. loc. eit. p. 149; De-Toni Syll. Alg. I p. 942. Lx.: Villance (L. M.).
- 20 C. Nymannianum Grun. in Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 166;
 De-Toni Syll. Alg. I p. 964.
 Lb.: Genck (J. M.).
- 21 C. ochtodes Nordst. Desm. arct. in Oefvers. K. Vet. Akad. Forhandl. (1875) p. 17 pl. 6 fig. 3; De-Toni Syll. Alg. I p. 992.
 Lb.: Molenbeerşel (J. M.).
- 22 C. orbiculatum Ralfs in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II, I (1845) p. 148 pl. XVI fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 155; De-Toni Syll. Alg. I p. 962.
 Lg.: entre Spa et Polleur (Nob.). Lb.: Genck (J. M.).
- 23 C. ornatum Ralfs in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II (1845) p. 148 pl. XVI fig. 3; De Wild. loc. cit. p. 154; De-Toni Syll. Alg. I p. 1025.

A.: Calmpthout (Nob.). — Lg.: Ru du fond de Polleur (Nob.). — Lx.: Anloy, Libin (L. M.), Libramont (L. D.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.).

- 24 C. ovale *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 98 pl. XV fig. 9; *De Wild*. Fl. Alg. Belg. p. 151.
 - Pleurotaeniopsis Lund. Desmid. Suec. (1871) p. 53: De-Toni Syll. Alg. I p. 912.
 - Bt: Bergh (L. G.).
- 25 C. Phaseolus Bréb. ex Menegh. Syn. in Linnaea (1840) p. 220; De Wild. loc. cit. p. 148; De-Toni Syll. Alg. I p. 1001.
 - FI. or.: Kraenepoel (L. G.). A.: Wuestwezel, Calmpthout (Nob.).
- 26 C. Portianum Arch. in Micr. Journ. VIII (1866) p. 235 pl. XI fig. 8-9; De Wild. loc. cit. p. 152; De-Toni Syll. Alg. I p. 986.
 Lb.: Genck (Nob.).
- 27 C. pseudo-pyramidatum Lund. Desmid. Suec. (1871) p. 41 pl. II fig. 18; De-Toni Syll. Alg. I p. 946.
 Lb.: Molenbeersel (J. M.).
- 28 C. pygmaeum Arch. in Micr. Journ. IV (1864) p. 174 pl. 6 fig. 45-49; De Wild. loc. cit. p. 149; De-Toni Syll. Alg. 1 p. 1046. Lg.: Hockay, Cour (Nob.).
- 29 C. pyramidatum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 94 pl. XV fig. 4; De Wild. loc. cit. p. 147 fig. 70 f; De-Toni Syll. Alg. I p. 969.

 A.: Calmpthout (Nob.). Lg.: Ru du fond de Polleur, entre Malchamp et Nivezé (Sart), Stoumont, ru de Chefna (La Reid), Tihange (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kessenich, Kinroy (J. M.). Lx.: Libin (L. M.).
- 30 C. quadratum Ralfs in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II (1845) p. 151 pl. XVI fig. 9; De Wild. loc. cit. p. 145 fig. 70a-b.

 Disphinctium Hansg. Prodr. einer Algenfl. Böhmen (1848) p. 244.

 Lx.: Villance (A. D.).
- 31 C. smolandicum Lund. Desmid. Suec. (1873) p. 38 pl. 2 fig. 17; De Wild. loc. cit. p. 151; De-Toni Syll. Alg. I p. 984.
 Lb.: Genck (Nob.).
- 32 C. sublobatum (Bréb.) Arch. in Pritch. Inf. (1861) p. 731; De Wild. loc. cit. p. 145; De-Toni Syll. Alg. I p. 1041.

 Euastrum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) 91 pl. XXXI fig. 4.
 A.: Calmpthout (Nob.).
- 33 C. taxichondrum Lund. Desmid. Suec. (1873) p.39 pl. 2 fig. 13; De Wild. loc. p. 147; De-Toni Syll. Alg. I. p. 990. Lb.: Genck (Nob.).
- 34 C. tetraopthalmum (Kuetz.) Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 98 pl. XVII fig. 11; De Wild. loc. cit. p. 148; De-Toni Syll. Alg. I p. 981.
 - Bt: Anderlecht (Nob.). Lb.; Genck (Nob.). Lg.: entre Malchamp et Nivezé, ru de Chefna (La Reid), Ruy, Bois Gossonfays, Coquaifange, Spa (Nob.). Ht.: Camp de Casteau, Belœil (Nob.).

- 36 C. trafalgaricum Wittr. in Grevillen IX (1880) p. 16; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 147; De-Toni Syll. Alg. I p. 1054. Lq.: Tihange (Nob.).
- 37 C. tumidum Lund. Desmid. Suec. (1873) p. 45 pl. 3 fig. 15; De Wild. loc. cit. p. 147; De-Toni Syll. Alg. I p. 955.
 A.: Calmpthout (Nob.).
- 38 C. undulatum Corda Almanach de Carlsb. (1839) p. 243 pl. Vfi g. 29;
 De Wild. loc. cit. p. 150 fig. 70k; De-Toni Syll. Alg. I p. 972.
 - Bt: La Hulpe (El. M.). A.: Calmpthout (Nob.). Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). Ht: Camp. de Casteau (Nob.). Lx.: Presseux, Seviscourt (L. D.), Trausinne (L. M.). Lg.: env. de Spa, Desniez, Ruy, La Reid, Hockay, Cour, Tihange (Nob.), Ahin, Grand Marchin (M. et U.). Lb.: Genck (Nob.), env. de Maeseyck (J. M.).
- 39 C. variolatum Lund. Desmid. Suec. (1873) p. 41 pl. 2 fig. 19; De-Toni Syll. Alg. I p. 954.
 Lb.: Genck (J. M.).
 - 11 ARTHRODESMUS Ehrenb. Inf. als volk. Organ. (1838); De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 156; De-Toni Syll. Alg. I p. 1856.
- 1 A. convergens Ehrenb. Inf. als volk. Organ. (1838) p. 152 pl. X fig. 18; De Wild. loc. cit. p. 157 fig. 77b; De-Toni loc. cit. p. 1038. Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.).
- A. ineus (Bréb.) Hass. Freshw. Alg. (1852) p. 357 pl. 85 fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 156 fig. 77c; De-Toni loc. cit. p. 1057.
 Cosmarium Bréb. ex Menegh. Syn. in Linnaea (1840) p. 228.
 - A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). Lb.: Genck (Nob.). Kinroy, Molenbeersel (J. M.). Lg.: Ru du fond de Polleur, Sart, Bois des minières, Francorchamps, Hockay (Nob.), Vierset (M. et C.). Lx.: Anloy, Libin (A. D.).
- 3 A. octocornis Ehrenb. Inf. als volk. Organ. (1838) p. 152; De Wild. loc. cit. p. 157 fig. 77a; De-Toni loc. cit. p. 1063.
 - A.: Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), Kinroy; Molenbeersel (Nob.). Lx.: Anloy (L. M.).
 - 12 EUASTRUM *Ehrenb*. Infus. (1831) p. 162; *De Wild*. Fl. Alg. Belg. p. 158; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1065.
- E. affine Ralfs. in Trans. of the Bot. soc. of Edinb. II, 1 (1845)
 p. 128 pl. XI fig. 3; De Wild. loc. cit. p. 161; De-Toni Syll. Alg. I p. 1091.
 - A.: Calmpthout (Nob). Ht: Nimy (Michot). Lb.: Kinroy (J. M.).
- 2 E. ampullaceum Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 83 pl. XIII fig. 4; De Wild. loc. cit. p. 162; De-Toni Syll. Alg. I p. 1091.

- A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). Lg : Ru de Chefna (La Reid), Berinsenne (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.).
- 3 E. ansatum Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 85 pl. XIV fig. 2; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 163 fig. 78; De-Toni Syll. Alg. I p. 1096.
 - A.: Calmpthout, Nieuwmoer (Nob.). Lg.: entre Spa et Polleur, Spa et Malchamp, Stoumont, ru de Chefna, ru de Chawion (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.). Lx.: Libin (L. M.), Seviscourt (L. D.).
- 4 E. binale (Turp.) Ralfs in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II, I (1849) p. 130 pl. XI fig. 7; De Wild. loc. cit. p. 159; De-Toni Syll. Alg. I p. 1084.
 - Lg.: env. de Spa, Stoumont, Francorchamps, Stavelot, La Reid, Ruy (Nob.). Lx.: Presseux, Seviscourt (L. D.), Libin (L. M.). Lb.: Genek (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.).
 - var. insulare Wittr. Om Gothlands och Oelands Söttvatt. Alg. (1872) p. 49 pl. 4 fig. 7; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 1085.
 - Lg.: Coquaifange, Hockay (Nob.).
 - var. denticulatum Kirchn. Alg. Schlesien (1878) p. 159; De Wild. loc. cit. p. 160.
 - A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). Lx.: Anloy (L. M.), Ru de Chefna (Nob.). Lb.: Genck (J. M.).
- 5 E. compactum Wolle Desm. United States (1884) p. 107 pl. XXVII fig. 28-29; De-Wild.loc. cit. p. 164; De-Toni Syll. Alg. I p. 1105; tx.: Transinne (L. M.).
- 6 E. crassum (Bréb.) Kuetz. Phycol. germ. (1845) p. 135; De Wild. loc. cit. p. 161; De-Toni Syll. Alg. I p. 1088.

Cosmarium — Bréb. ex Menegh. in Linnaea (1840) p. 222.

- A.: Wuestwezel (Nob.). Lb.: Genck (Nob.).
- var. scrobiculatum Lund. Desmid. Suec. (2873) p. 18 pl. 2
 fig. 1; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 1089.
 A.: Wuestwezel (Nob.).
- 7 E. didelta (Turp.) Ralfs in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II (1849) p. 127 pl. XI fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 162; De-Toni Syll. Alg. I p. 1093.

Heterocarpella - Turp. in Mém. du Mus. d'Hist.' nat. (1828) p. 295.

- A.: Calmpthout (Nob.). Lg.: entre Roanne et Coo, entre Spa et Malchamp, ru de Chawion, Berinsenne, Hockay, Stoumont (Nob.). Lx.: Libin (L. M.), Seviscourt (L. D.).
- 8 E. elegans (Bréb.) Kuetz. Phyc. germ. (1846) p. 135; De Wild. loc. cit. p. 163; De-Toni-Syll. Alg. I p. 1101.

Cosmarium — Bréb. ex Menegh. in Linnaea (1840) p. 222.

Bt: Beggynendyck (Sonnet). — Fl. or.: Kraenepoel (L.G.). — A.: Wuestwezel, Nieuwmoer, entre Lierre et Emblehem (Nob.). — Lx.: Seviscourt (L. D.), Villance (A. D.), Libin, Anloy (L. M.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). —

Lg.: entre Malchamp et Nivezé (Sart), entre Spa et Polleur, entre Spa et Malchamp, Stoumont, Cour, Hockay, Francorchamps, ru de Chefna (Nob.), Marchin (M. et C.).

- 9 E. Gayanum De-Toni Syll. Alg. I (1889) p. 1075.
 - E. formosum F. Gay Essai d'une monographie des Conjuguées (1884) p. 55 pl. fig. 9; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 159.

Lx.: Presseux (L. D.).

- 10 E. inerme (Ralfs) Lund. Desm. Suec. (1873) p. 20 pl. 2 fig. 3; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 164; De-Toni Syll. Alg. I p. 1103. Euastrum elegans var. - Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 89 pl. XIV fig. 7e. A.; Calmpthout (Nob.).
- 11 E. insigne Hass. Brit. Freshw. Alg. II (1852) p. 21 pl. 91 fig. 2;
 De Wild. loc. cit. p. 162; De-Toni Syll. Alg. I p. 1092.
 A.: Calmpthout (Nob.), Raevels, Weelde (Paque).
- 12 E. Lundellii Bennett in Journ. roy. Micr. Soc. (1886) p. 9 fig. 1-13;
 De Wild. loc. cit. p. 159; De-Toni Syll. Alg. I p. 1080.

Euastrum binale var. elobatum Lund. Desmid. Suec. (1873) p. 23 pl. II fig. 7.

A.: Wuestwezel (Nob.). - Lg. Coquaifange, Hockay (Nob.).

13 E. oblongum (Grev.) Ralfs in Trans. of the Bot. Soc. Edinb. III, (1849) p. 126 pl. X fig. 4; De Wild. loc. cit. ρ. 160 De-Toni Syll. Alg. I p. 1086.

Echinella - Grev. in Hook. Brit. Fl. II (1833) p. 398.

Bt.: Héverlé, Blanden (Paque). — Lb.: Genck (Nob.), Kınroy (J. M.). — Lg.: entre Malchamp et Nivezé (Sart), Tiége, entre Spa et Polleur, Préfayhay, ru de Chefna (La Reid), Wayai, Berinsenne, Stoumout, Desniez, ru de Chawion (Nob.), Vierset (M. et C.). — Lx.: Seviscourt (L. D.), Villance (A. D.).

- 14 E. pectinatum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 86 pl. XVI fig.
 5; De Wild. loc. cit. p. 158; De-Toni Syll. Alg. I p. 1068.
 - Bt: St-Gilles (Miller). Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). A.: Calmpthont, Nieuwmoer (Nob.). Lg.: Ru du fond de Polleur, Tiége, Ru de Chefna (La Reid), Stoumont (Nob.), Vierset (M. et C.). Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.).
- 15 E. pinnatum Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 81 pl. XIII fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 163; De-Toni Syll. Alg. I p. 1099.
 Lb.: Kinroy (J. M.).
- 16 E. rostratum Ralfs in Ann. nat. Hist. XIV (1848) p. 192 pl. 7 fig. 5; De Wild. loc. cit. p. 163; De-Toni Syll. Alg. I p. 1099.
 Bt: St-Gilles (Miller). A.: Calmpthout (Nob.). Lg.: Tihange (M. et C.). Lb.: Kinroy (J. M.).
- 17 E. subspinosum Turn. Alg. Ind. or. (1892) p. 184 pl. 10 fig. 17.
 Lb.: Kinroy, Genck (J. M.).
- 18 E. venustum Bréb. Liste des Desm. de Basse-Norm. in Mém. Soc. Sc. Cherbourg (1856) p. 124 pl. I fig. 3.

Cosmarium — Arch. in Pritch. Inf. (1861) p. 732; De Toni Syll. Alg. I p. 945.

Lb.: Molenbeersel (J. M.).

- E. verrucosum Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 247; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 158; De-Toni Syll. Alg. I p. 1066.
 - Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). Lg.: entre Marteau et Rainonfosse (Nob.). Lg.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). Lx.: Libin (L. M.).
 - 13 MICRASTERIAS Ag. in Flora (1827) p. 642; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 164; De-Toni Syll. Alg. I p. 1109.
- 1 M. angulosa Hantzsch in Rabenh. Alg. n. 1407; De Wild. loc. cit. p. 165; De-Toni Syll. Alg. I p. 1133.
 Lg.: Stoumont (La Fange) (Nob.).
- 2 M. apiculata (Ehrenb.) Menegh. in Linnaea (1840) p. 216; De Toni Syll. Alg. I p. 1135.

Euastrum — Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 245.

Lb.: Kinroy (J. M.).

- 3 M. crenata Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 75 pl. 7 fig. 2 pl. 10 fig. 4; De Wild. loc. cit. p. 168.
 - Lg.: Ru de Chawion (Nob.). Lb.: Molenbeersel, Kinroy, Genck (J. M.).
- 4 M. denticulata (Bréb.) Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 70 pl. 7 fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 167; De-Toni Syll. Alg. I p. 1130. Lb.: Kinroy (J. M.); Genck (Nob.).
 - f. Thomasiana Jacobs. Aperçu in Bot. Tidsskr. Kjobenhaven (1874) p. 187; De Wild. loc. cit.

Micrasterias — Arch. in Micr. Journ. (1862) p. 239 pl. XII fig. 1-10; De-Toni Syll. Alg. I p. 1134.

Lg.: Stoumont, Ruy, Préfayhay, Ru de Chefna, Hockey (Nob.).

5 M. fimbriata Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 71 pl. VIII fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 167; De-Toni Syll. Alg. I p. 1131.

Lg.: entre Spa et Polleur (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.). — Lx.: Libin (L. M.).

- 6 M. furcata Ag. in Flora (1827) p. 643; De-Toni Syll. Alg. I p. 1114.
 Lb.: Genck (J. M.).
- 7 M. Jenneri Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 76 pl. XI fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 166; De-Toni Syll. Alg. I p. 1125.
 - A.: Calmpthout (Nob.). Lg.: Ru de Polleur, entre Roame et Coo, Tiége, Berinsenne. Préfayhay, Wayai, Francorchamps (Nob.). Lx.: Seviscourt, Libin (L. M.). Lb.: Genck (Nob.).
- 8 M. oscitans (Hass.) Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 76 pl. X fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 165; De-Toni Syll. Alg. I p. 1110.

Holocystis - Hass. Freshw. Alg. (1852) p. 387 pl. XC fig. 4.

A.: Wuestwezel (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.).

M. oscitans var. pinnatifida (Kuetz.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 189; De Wild. Fl. Alg. Belg.; De-Toni Syll. Alg. I p. 1111.

Micrasterias - Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 171.

Lb.: Genck (Nob.).

- 9 M. papillifera Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 72 pl. IX fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 168; De-Toni Syll. Alg. I p. 1132.
 Lg.: Hockay, Préfayhay, Francorchamps (Nob.).
- 10 M. radiosa Ag. in Flora (1827) p. 623; De-Toni Syll. Alg. I p. 1131.
 Lb.: Genck (J. M.).
- 11 M. rotata (Grev.) Ralfs in Aun. nat. Hist. XIV (1844) p. 259 pl. 6 fig. 1; De-Toni Syll. Alg. I p. 1126.
 Lb.: Molenbeersel, Kinroy, Genck (J. M.).
- 12 M. truncata (Corda) Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 75 pl. VIII fig. 4 X fig. 5; De Wild. loc. cit. p. 166; De-Toni Syll. Alg. I p. 1115.

Cosmarium — Corda in Almanach de Carlsbad (1835) pl. II fig. 23. Micrasterias rota Menegh. Syn. in Linnaea (1840) p. 251; Kickv Fl. crypt. II p. 446.

- A.: Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). Lg.: entre Spa et Polleur, Stoumont (Nob.), Marchin (M. et O.). Lx.: Libin (L. M.). Lb.: Genck (Nob.). Fl. or.: env. de Gand (Scheidweiler).
 - 14 STAURASTRUM Meyen in Nova Act. Ac. Leop. Nat. Cur. XIV 2 (1829) p. 277; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 169; De-Toni Syll. Alg. I p. 1136.
- S. aculeatum (Ehrenb.) Menegh. in Linnaea (1840) p. 236; De Wild. loc. cit. p. 179; De-Toni Syll. Alg. I p. 1216.
 Lb.: Genck (Nob.).
- 2 S. alternans Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 132 pl. 21 fig. 7;
 De Wild. loc. cit. p. 176; De-Toni Syll. Alg. I p. 1193.
 - Bt: St-Gilles (Miller). Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). Ht: Belouil, Camp de Casteau (Nob.). Lg.: env. de Spa, Francorchamps, Hockay, Cour, Ruy, Coquaifange, Stavelot, Jalhay, Tihange (Nob.), Gives (M. et C.). Lx.: Presseux (L. D.). Lb.: Kessenich (J. M.).
- 3 S. arachne Ralfs in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II, 1 (1849) p. 143 pl XIV fig. 6; De Wild. loc. cit. p. 181; De-Toni Syll. Alg. I p. 1229.
 - Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.).
- 4 S. aristiferum Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 123 pl. XXI fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 170; De-Toni Syll. Alg. I p. 1141.
 Lx.: Anloy (L. M.). Lb.: Genck (J. M.).

- 5 S. asperum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 139 pl. XII fig. 6
 pl. XXIII fig. 12; De-Wild. Fl. Alg. Belg. p. 174; De-Toni Syll. Alg. I p. 1175.
 Lx.: Libin (L. M.). Lb.: Kinroy (J. M.).
- 6 S. Avicula Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 140 pl. XXIII fig. 11; De Wild. loc. cit. p. 170; De-Toni Syll. Alg. I p. 1153.
 Lb.: Genck (Nob.).
- 7 S. brachiatum Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 131 pl. XXIII fig. 9;
 De Wild. loc. cit. p. 177; De-Toni Syll. Alg. I p. 1202.
 Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.). Lg.: Ru de Polleur (Nob.).
- S. Brebissonii Arch. in Pritch. Inf. (1861) p. 739; De Wild. loc. cit.
 p. 172; De-Toni Syll. Alg. I p. 1106.
 N.: Walzin (Él. M.).
- 9 S. controversum Bréb. in Menegh. Syn. in Linnaea (1840) p. 228; De Wild. loc. cit. p. 179; De-Toni Syll. Alg. I p. 1216. Lg.: Coquaifange, Berinsenne (Nob.). — Lx.: Libin (L. D.).
- 10 S. cuspidatum Bréb. in Menegh. Syn. in Linnaea (1840) p. 226;
 De Wild. loc. cit. p. 109; Be-Toni Syll. Alg. I p. 1140.
 Bt: St-Gilles (Miller.). Lb.: Kinroy, Genck (J. M.).
- 11 S. cyrtocerum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 139 pl. 22 fig. 10; De Wild. loc. cit. p. 178; De-Toni Syll. Alg. I p. 1207.

 Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). Ht. Beloeil (Nob.). Lg.: Fumal (M. et C.).
- 12 S. dejectum Bréb. in Linnaea (1840) p. 227; De Wild. loc. cit. p. 169; De-Toni Syll. Alg. I p. 1137.
 A.: Nieuwmoer (Nob.). Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). Lb.: Genck (Nob.). Lg.: env. de Spa, Ruy, Hockay, Cour, Francorchamps, Tihange (Nob.). Lx.: Opont, Libin, Anloy (L. M.).
- 13 S. Dickiei Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 123 pl. 21 fig. 3; De-Toni Syll. Alg. I p. 1139.
 Lb.: Genck (J. M.).
- 14 S. dilatatum Ehrenb. Inf. (1838) p. 143 pl. X fig. 13; De Wild. loc. cit. p. 176; De-Toni Syll. Alg. I p. 1193.

 Lg.: Marteau, Coquaifange, Cour (Nob.). Lb.: Kessenich (J. M.).
- 15 S. elongatum Bark. in Micr. Journ. IX (1869) p. 424; De-Toni Syll. Alg. I p. 1212.
 Lb.: Kinroy (J. M.).
- 16 S. furcigerum Bréb. in Menegh. Syn. in Linnaea (1840) p. 228;
 De Wild. loc. cit. p. 180; De-Toni Syll. Alg. I p. 1224.
 Bt: Woluwe-St-Pierre (Nob.). Lb.: Genck (Nob.).
- 17 S. gracile Ralfs in Ann. nat. Hist. XV (1845) p. 155 pl. XI fig. 3;

- De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 178; De-Toni Syll. Alg. I p. 1209. Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.).
- 18 S. hexacerum (Ehrenb.) Wittr. Om Gotl. och Oelands Sötvattensalgen (1872) p. 51; De Wild. loc. cit. p. 177; De-Toni Syll. Alg. I p. 1206.

Desmidium - Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1832).

Staurastrum tricorne (Bréb.) Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 134.

- Lg.: entre Roanne et Coo, entre Marteau et Winamplanche, route de la Gleize (Spa), entre Spa et Malchamp (Spa) (Nob.). Lx.: Libin (L. M.), Villance (A. D.).
- var. B Brit. Desm. (1848) p. 135; De Wild. loc. cit. p. 178. Staurastrum tricorne var. B Ralfe.
 - A.: Nieuwmoer (Calmpthout) (Nob.).
- 19 S. hirsutum (Ehrenb.) Bréb. in Raifs Brit. Desm. (1848) p. 127 pl. XXII fig. 3; De Wild. loc. cit. p. 171; De-Toni Syll. Alg. I p. 1164. Xanthidium Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 318.
 - A.: Calmpthout (Nob.). Lb.: Genck (Troch), Kinroy (J. M.). Lg.: env. de Spa, Cour, Stoumont, Francorchamps, Stavelot, Desniez, Ruy (Nob.), Gives, Ahin (M. et C.). Lx.: Opont, Libin, Anloy (L. M.), Libramont, Presseux (L. D.), env. de Houffalize (J. M.).
- 20 S. hystrix Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 128 pl. XXII fig. 45; De Wild. loc. cit. p. 173; De-Toni Syll. Alg. I p. 1167.
 A.: Wuestwezel (Nob.). Lb.: Molenbeersel, Kinroy (J. M.).
- 21 S. inconspicuum Nordst. Bidr. t. Kännedomen o. Sydlig. Norges Desm. (1873) p. 26 fig. 11; De Wild. loc. cit. p. 175; De-Toni Syll. Alg. I p. 1183.
 Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.).
- 22 S. leve Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 131 pl. XXIII fig. 10; De Wild. loc. cit. p. 181; De-Toni Syll. Alg. I p. 1227.
 Lb.: Genck (Nob.).
- 23 S. margaritaceum (Ehrenb.) Menegh. in Linnaea (1840) p. 227; De Wild. loc. cit. p. 181; De-Toni Syll. Alg. I p. 1227. Pentasterias — Ehrenb. Inf. (1830) p. 144 pl. X fig. 15.
 - **Lb.**; Genck (Nob.). Lg.: entre Spa et Polleur, entre Spa et Malchamp, Ru de Chefna (La Reid), Coquaifange, Cour (Nob.).
- 24 S. monticulosum Bréb. ex Menegh. Syn. in Linnaea (1810)
 p. 226; De Wild. loc. cit. p. 171; De-Toni Syll. Alg. I p. 1156.
 A.: Calmpthout (Nob.).
- 25 S. muricatum Bréb. ex Menegh. Syn. in Linnaen (1840) p. 226; De Wild. loc. cit. p. 175; De-Toni Syll. Alg. I p. 1189.
 - Ht: Nimy (Michot). A.: Wuestwezel (Nob.). Lg.: Hockay (Nob.). Lx.: Presseux (L. D.).
- 26 S. muticum Bréb. ex Menegh. Syn. in Linnaea (1840) p. 228; De

- Wild. Fl. Alg. Belg. p. 174; De-Toni Syll. Alg. I p. 1177.
- A.: Calmpthout (Nob.). Ht: Camp de Casteau (Nob.). Lx.: Opont (L. M.).
- 27 S. Ophiura Lund. Desmid. Suec. (1871) p. 69 pl. 4 fig. 7; De-Toni
 Syll. Alg. I p. 1212.
 Lb.: Genck (J. M.).
- 28 S. orbiculare (Ehrenb.) Ralfs in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. (1845) p. 138 pl. XIII fig. 4; De Wild. loc. cit. p. 174; De-Toni Syll. Alg. 1 p. 1180.

Desmidium - Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1832) p. 292.

- Lg.: env. de Spa, Desniez, Ruy, Cour, bóis Gossonfays, Jalhay, Stavelot, Tihange (Nob.). Lx.: Libin, Anloy, Maissin, Transinne (L. M.), Presseux (L. D.), env. de Houffalize (J. M.).
- 29 S. paradoxum Meyen in Nova Acta Ac. Nat. Cur. XIV (1828) 777 pl. 3 fig. 3-38; De Wild. loc. cit. p. 179; De-Toni Syll. Alg. I p. 1211.

Ht: Obigies (Marissal).

- 30 S. polymorphum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 135 pl. XXII fig. 9 et XXXIV fig. 6; De Wild. loc. cit. p. 178; De-Toni Syll. Alg. I p. 1208.
 - Bt: St-Gilles (Miller). Ht: Camp de Casteau (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.). Lx.: Presseux, Seviscourt (L. D.).
- 31 S. polytrichum Perty Zur Kenntniss kl. Lebensf. (1852) p. 210 pl. XVI fig. 34; De Wild. loc. cit. p. 173; De-Toni Syll. Alg. I p. 1169. Didimium Pringsheimii Reinsch Algenfl. v. Franken (1867) p. 172. Lb.: Genck (Nob.).
- 32 S. punctulatum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 133 pl. XXII fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 175; De-Toni Syll. Alg. I p. 1190.
 - Bt: Beggynendyk (Sonnet). N.: Walzin (Él. M.), Vierves (M. et F.). Lg.: env. de Spa, Desniez, Ruy, Hockay, Jalhay (Nob.), Bas-Oha (M. et L.). Lx.: Villance (A. D.), Libramont, Presseux, Seviscourt (L. D.), Anloy (L. M.), env. de Houffalize (J. M.). Lb.: Genck (Nob.), Kinroy, env. de Maeseyck, Molenbeersel (J. M.).
- 33 S. pungens Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 130 pl. XXXIV fig. 10; De Wild. loc. cit. p. 170; De-Toni Syll. Alg. I p. 1148. Lb.: Genck (Nob.).
- 34 S. pygmaeum Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 213; pl. XXXVI fig. 26; De Wild. loc. cit. p. 175; De-Toni Syll. Alg. I p. 1181. Lb.: Presseux (L. D.), Anloy (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).
- 35 S. quadrangulare Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 128 pl. XXII fig. 7; De Wild. loc. cit. p. 176; De-Toni Syll. Alg. I p. 1199.
 - Lb.: Genck (Nob.).

- 36 S. saltans Joshua Burmese Desm. in Journ. Linn. Soc. Bot. V, XX1 (1886) p. 641;
 - var. belgicum De Wild, in Mém. Soc. belge de microscopie t. XXI (1897) p. 65 c. ic.
 Lb.: Genck (J. M.).
- 37 S. Sebaldi Reinsch Algenfl. v. Franken (1867) p. 175 pl. XI fig. 1; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 180; De-Toni Syll. Alg. I p. 1222. Lb.: Genck (Nob.).
- 38 S. sexangulare (Bulnh.) Lund. Desmid. Suec. (1871) p. 71 pl. IV fig. 9; De-Toni Syll. Alg. I p. 1224.

 Didymocladon Bulnh. in Hedw. (1863) p. 51 pl. IX A fig. 1

 Lb.: Genck (J. M.).
- 39 S. spinosum Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 143 pl. XXII fig. 8;
 De Wild. loc. cit. p. 171.

Staurastrum furcatum var. armigerum Bréb.

- tg.: Ru de Chefna (La Reid), Hockay, bois Gossonfays, bois des Minières, Spa, Winamplanche, Berinsenne (Nob.). tb.: Genck (Nob.).
- 40 S. spongiosum Bréb. ex Menegh. Syn. Desm. in Linnaea (1840) p. 229; De Wild. loc. cit. p. 173; De-Toni Syll. Alg. I p. 1174. Lg.: entre Malchamp et Nivezé (Sart) (Nob.).
- 41 S. teliferum *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 128 pl. XXII fig. 4 et XXXIV fig. 14; *De Wild.* loc. cit. p. 172, fig. 89; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1167.
 - Lg.: entre Spa et Polleur, Tiége, entre Roanne et Coo, ru de Chefna (La Reid), Ruy, Hockay, Cour, Berinsenne, Tihange (Nob.). Lx.: Seviscourt (L. D.), Anloy, Opont, Libin (L. M.). Lb.: Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.).
- 42 S. tetracerum (Kuetz.) Ralfs in Ann. Nat. Hist. XV (1845) p. 150 pl. X; De Wild. loc. cit. p. 182; De-Toni Syll. Alg. I p. 1232. Micrasterias Kuetz. Syn. Diat. (1833) p. 602 fig. 83, 84.
 - A.: Calmphout (Nob.). Lb .: Genck (Nob.). Lg .: Ru de Polleur, ru de Chefna (La Reid) (Nob.).
- 43 S. vestitum Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 143 pl. XXIII fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 180 fig. 91; De-Toni Syll. Alg. I p. 1218.
 - A.: Calmpthout (Nob.). Lg.: Ru du fond de Polleur, Coquaifange (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.), Auloy (L. M.).

SUBFAM. EUDESMIDIEAE.

- 15 DESMIDIUM Ag. Syst. Alg. (1824) p. 9; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 116; De-Toni Syll. Alg. I p. 779.
- 1 D. cylindricum Grev. Sc. Crypt. Fl. (1829) pl. 293; De Wild. Fl.

- Alg. Belg. p. 116; De-Toni Syll. Alg. I p. 783. Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — Lx.: Anloy (L. M.).
- 2 D. Swartzii Ag. Syst. Alg. (1824) p. 9; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 116; De-Toni Syll. Alg. I p. 780.

Lg.: entre Spa et Polleur (Nob.), Vierset (M. et C.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — A.: Calmpthont (Nob.). — Bt: Bergh (Nob.). — Lg.: Libin, Villance, Anloy (L. M.).

- 16 HYALOTHECA Ehrenb. in Monatsb. Berl. Ak. (1840); De Wild. loc. cit. p. 117; De-Toni Syll. Alg. I p. 785.
- 1 H. dissiliens (Smith) Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 51 pl. 1 fig. 1; De Wild. loc. cit. fig. 52; De-Toni Syll. Alg. I p. 785. Conferva Smith Engl. Bot. (1842) pl. 2464.

Bt: Bergh (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — A.: Lierre, Calmpthout. Nieuwmoer, Wuestwezel (Nob.). — Lg.: env. de Spa, Stavelot (Nob.), Marchin (M. et C.). — Lx.: env. de Libramont (L. et A. D.), env. de Houffalize (J. M.).

2 H. mucosa (Mert.) Ehrenb. Monatsb. Berl. Ak. (1840) p. 212; De Wild. loc. cit. fig. 51; De-Zoni loc. cit. p. 787.
Conferva — Mertens (1809).

Lb.: Genck (Nob.). - Lg.: Ru de Chefna (Nob.). - Lx.: Villance (L. M.).

- 17 SPHAEROZOSMA Corda in Almanach de Carlsbad (1835) p. 788; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 118; De-Toni Syll. Alg. I p. 789.
- S. excavatum Ralfs in Ann. nat. Hist. (1850) p. 15 pl. III fig.
 B; De Wild. loc. cit. p. 119 fig. 53; De-Toni Syll. Alg. I p. 790.
 Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). Lg.: entre Spa et Polleur, Malchamps et Nivezé (Sart), Vallée de Tolifa. Hockay, Berinsenne, Stavelot, Ru de Chefna (La Reid). Ru de Chawion (Nob.); Mares de Gives (M. et C.). Lb.: Molen-
- 2 S. pulchellum (Arch.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 153;
 De Wild. loc. cit. p. 119; De-Toni Syll. Alg. I p. 792.
 Spondylosium Arch. in Pritch. 1nf. (1861) p. 724 pl. III fig. 10.
 Lb.: Genck (Nob.).

beersel, Kinroy (J. M.). — Lx.: Anloy, Libin (L. M.).

S. pygmaeum (Arch.). Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 150;
 De Wild. loc. cit p. 118.
 Cosmarium — Arch. in Micr. Journ. (1864) p. 174 pl. VI fig. 45-49.

Lg.: Bois Gossonfays (Nob.).

4 S. vertebratum (Bréb.) Ralfs Brit. Desm. 1843 p. 65 pl. VI fig. 1 pl. XXXII fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 118; De-Toni Syll. Alg. Ip. 789. Desmidium — Bréb. Alg. Falaise (1855) p. 65 pl. II.
Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — Lb.: Genck (Nob.).

- 18 ONYCHONEMA Wallich in Ann. Nat. Hist. ser. III vol. V (1860) p. 194; De-Toni Syll. Alg. I p. 795.
- 1 0. leve Norstedt in Warm. Symb. ad Fl. Bras. centr. V (1869) Desmidiaceae p. 202 pl. III fig. 34; De-Toni Syll. Alg. I p. 796. Lb.: Genck (J. M.).
 - 19 GYMNOZYGA Ehrenb. in Monatsber. Berl. Ak. (1840) p. 212; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 119; De-Toni Syll. Alg. f p. 797.
- 1 G. moniliformis Ehrenb. in Monatsber. Berl. Ak. (1840) p. 212; De Wild. loc. cit. p. 120; De-Toni Syll. Alg. I p. 797.

Didymoprium Borreri Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 58 pl. III. Bambusina Brebissonii Kuetz. Phycol. germ. (1845) p. 140.

Lg.: Ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — A.: Calmpthout (Nob.). — Lx.: Anloy (L. M.). — Lb.: Genck (Nob.); Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

- 20 GONATYZOGON De Bary Conjugaten (1856) p. 77; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 120; De-Toni Syll. Alg. I p. 801.
- G. Brebissonii De Bary Conjug. (1856) p. 77 pl. 4 fig. 26-27; De Wild. loc. cit.
 - G. asperum Cleve Sver. Desm. (1864) p. 496.
 - Lg.: entre Malchamp et Nivezé (Sart), Berinsenne, Jalhay, Francorchamps, Stavelot, Cour, Hockay, ru de Chefna (La Reid) (Nob.). Lb.: Genck (Nob.).
- 2 G. Ralfsii De Bary Conjug. (1856) p. 76 pl. 4 fig. 23-25; De Wild. loc. cit. p. 121; De-Toni Syll. Alg. I p. 801.
 - Bt: Bergh (L. G.). Lg.: entre Roanne et Coo, Spa, ru de Creppe, entre Spa et Tiége, Stoumont (Nob.).

FAM. ZYGNEMACEAE.

- 1 ZYGNEMA Ag. Syst. Alg. (1824) p. 77; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 101; De-Toni Syll. Alg. I p. 727.
- 1 Z. cruciatum (Vauch.) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 77; De Wild. loc. cit. p. 102; De-Toni Syll. Alg. I p. 732.

Zygnema Dillwynii *Kuetz*. Tab. Phyc. V (1852) pl. 17 fig. III; *Kickw* Fl. crypt. II p. 407.

Bt: env. de Louvain (Paque), La Hulpe (Él. M.), env. de Bruxelles (Nob.). — Fl. occ.: Ostende (Kickx). — Fl. or.: env. de Renaix (Coppin), Eyne (Nob.). — Lx.: Maissin (L. M.), Villance, Transinne (A. D.). — Lg.: Gives, Fumal, (M. et C.), Spa, Malchamp (Nob.). — N.: Vierves (M. et F.), env. de Dinant (Él. M.). — A.: Gierle (Paque). — Lb.: Kinroy, Genck (J. M.).

2 Z. ericetorum (Kuetz.) Hansg. Prodr. einer Algenfl. Böhmen (1886) p. 155; De Wild. loc. cit. p. 103; De-Toni Syll. Alg. I p. 737. Zygogonium — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 446.

Zygogonium torulosum Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 280; Kickw Fl. crypt. II p. 407.

A.: Campine C. — Lb.: Campine C. — Fl. or.: Jardin zoologique de Gand (Demey). — Fl. occ.: Gheluvelt (West.). — Lg.: Marchin (M. et C.), env. de Spa C. (Nob.), — Lx.: Presseux (L. D.).

3 Z. lutescens (Vauch.) De-Toni Syll. Alg. I p. 740; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 104.

Zygogonium — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 447.

Conjugata - Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) pl. 6 fig. 3.

Lb.: env. de Tongres (Paque). — A.: env. de Turnhout (Paque). — Bt: env. de Louvain (Paque).

4 Z. pectinatum (Vauch.) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 78; De Wild. loc. cit. p. 102; De-Toni Syll. Alg. I p. 736.

Zygogonium pectinatum Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 447.

Bi: Bergh (L. G.). — Fi. or.: Eyne (Nob.). — Lb.: entre Lierre et Emblehem (Nob.). — Lg.; Spa (Nob.).

5 Z. Ralfsii (Hass.) De Bary Conjug. (1858) p. 77; De Wild. loc. cit. p. 103; De-Toni Syll. Alg. I p. 738.

Tyndaridea — Hass. Freshw. Alg. (1852) p. 165 pl. XXXIX fig. 4, 5.

Zygogonium tenue Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 449; Kicker Fl. crypt. II p. 407.

Bi: Bergh (L. G.), Ganshoren (Nob.). — Fl. or.: Gand (West.). — A.: Gierle (Paque). — Lg.: Spa (Nob.), Yernée, Ahin, Marchin (M. et C.). — Lx.: Seviscourt (L. D.), Maissin (A. D.).

6 Z. stellinum (Vauch.) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 77; De Wild. loc. cit. p. 101; De-Toni Syll. Alg. I p. 730.

Bt: Beggynendyck (Sonnet).—A.: Lierre (Nob.).—Lg.: entre Roanne et Coo, Spa et Tiége (Nob.), Tihange (M. et C.).—Lx.: Libramont (L. D.), Villance, Opont, Libin (L. M.).

7 Z. Vaucheri Ag. Syst. Alg. (1824) p. 77; De Wild. loc. cit. p. 102. Zygnema stellinum var. — Kirchn. Alg. Schles. (1878) p. 126; De-Toni Syll. Alg. I p. 731.

Lb.: Genck (Nob.).

- 2 SPIROGYRA Link in Nees Horae phys. Berol. (1830) p. 5; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 104; De-Toni Syll. Alg. I p. 741.
- 1 S. catenaeformis (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 438; De Wild. loc. cit. p. 108.

Zygnema - Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) pl. XXX fig. 3-4.

Spirogyra arcta var. — Kirchn. Alg. Schles. (1878) p. 121; De-Toni Syll Alg. I p. 745.

Rhynchonema malleolus Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 444; Kickx Fl. crypt. II p. 108.

A.: Gierle (Paque). — Bt: Beggynendyck (Sonnet), Forest (Piré et Miller). — Lg.: env. de Spa (Nob.). — Fl. or.: Leupeghein, Eyne (Nob.), Neder-Hasselt

- (V. W.). N.: Olloy (M. et F.). Fl. occ.: env. de Bruges (West.). Lx.: Villance, Libin (L. M.).
- 2 S. communis (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 439; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 108; De-Toni Syll. Alg. I p. 747. Zygnema Hass. Brit. Freshw. Alg. (1862) p. 148 pl. 28 fig. 5-6. Lg.: Desniez (Nob.).
- 3 S. condensata (Vauch.) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 223 pl. 22 fig.
 3; De Wild. loc. cit. p. 110; De-Toni Syll. Alg. I p. 747.
 Conjugata Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 67 pl. 5 fig. 2.
 Spirogyra Flechsigii Rabenh. in Hedwigia I (1852) p. 46 pl. VIII fig. 3.
 Bt: St-Gilles (Piré et Miller). Fl. or.: Eyne (Nob.).
- 4 S. crassa Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 280 pl. 14 fig. 4; De Wild. loc. cit. p. 114; De-Toni Syll. Alg. I p. 757.
 - Bt: Anderlecht (Nob.), Laeken (L. Errera). A.: Tongerloo (L. G.). Ht: Leuze (G. L.). Lg.: Fumal (M. et C.).
- 5 S. dubia Kuetz. Tab. Phyc. v. (1853) pl. 24; De Wild. loc. cit. p. 111; De-Toni Syll. Alg. I p. 764.
 Fl. or.: Eyne (Nob.).
 - var. longiarticulata Kuetz. Tab. Phyc. V (1853) p. 8 pl. 25 fig. 1; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

 Bt: Rouge-Cloître (A. D.).
- 6 S. elongata (Berk.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 440; Kicka Fl. crypt. II p. 405; De Wild. loc. cit. p. 106; De-Toni Syll. Alg. I p. 771.

Zygnema — Berk. Glean. Brit. Alg. (I832) p. 33 pl. XII fig 2. Fl. occ.: Bruges (West.).

- 7 S. gallica Petit Spirog. env. Paris (1880) p. 23 pl. 6 fig. 1-3; De Wild. loc. cit. p. 111; De-Toni Syll. Alg. I p. 748.
 Fl. or.: Eyne (Nob.).
- 8 S. gracilis (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 438; De Wild. loc. cit. p. 107; De-Toni Syll. Alg. I p. 759.

Zygnema - Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 148 pl. 30 fig. 5-6.

- Bt: Bergh (L. G.), Woluwe-St-Pierre (Nob.). A.: Lierre, Austruweel (Nob.). Lg.: Gives, Marchin (M. et C.), env. de Spa (Nob.). Lb.: Genck (Nob.) Lx.: Opont, Libin (L. M.), Villance (A. D.).
- 9 S. Grevilleana (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 438; De Wild. loc. cit. p. 106; De-Toni Syll. Alg. I p. 769.

Zygnema — Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 149 pl. 31 fig. 1-2.

Rhynchonema deductum Kusta Spec. Alg. (1849) p. 443. Kieler El.

Rhynchonema deductum Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 443; Kickx Fl. crypt. II p. 106.

A.: Austruweel (Nob.). — Bt: env. de Bruxelles (Nob.), env. de Louvain (Paque), Vollezeele (V. W.). — Ht: Leuze (G. L.). — Ht: Olloy (M. et F.). — Fl. or.: Neder-Eenacme, Leupeghem (Nob.). — Fl. occ.: Nieuport (West.). —

- Lg.: env. de Spa (Nob.), Riz de Wapp (M. et C.). Lx.: Libin (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).
- 10 S. Hassallii (Jenner) Petit Spirog. env. Paris (1880) p. 12 pl. II fig. 6-8; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 107; De-Toni Syll. Alg. I p. 772. Rhynchonema Kuetz Spec. Alg. (1849) p. 443.

Zygnema — Jenner in Fl. of Tunbridge Wells (1845) p. 182.

- A.: Austruweel (Nob.). Fl. or.: Denderwindeke (V. W.). Bt: St-Gilles (Piré et Miller).
- 11 S. inflata (Vauch.) Rabenh. Handl. II 2 p. 120; De Wild. loc. cit. p. 105; De-Toni Syll. Alg. I p. 766.

Conjugata — Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 68 pl. V fig. 3.

- Bt: env. de Bruxelles C, entre Eppeghem et Elewyt (Sonnet). A.: Lierre, Austruweel (Nob.). Fl. or.: Denderwindeke (V. W.), Neder-Eenaeme, Eyne, Leupeghem (Nob.). Lg.: env. de Spa. Lg.: Stavelot (Nob.), Gives (M. et C.). Lx.: Opont (L. M.), Libramont, Presseux (L. D.), env. de Houffalize (J. M.). N.: Walzin (Él. M.). Ht: Beloeil (Nob.). Lb.: Molenbeersel (J. M.).
- 12 S. insignis (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 438; *De Wild.* loc. cit. p. 107; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 772.

Zygnema - Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 440.

- A.: Anderlecht (Nob.). Fl. or.: Denderwindeke (V. W.), Neder-Eenaeme, Welden (Nob.).
- var. Hantzschii Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 236;
 De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 773.

Fl. or.: Denderwindeke (V. W.).

- 13 S. irregularis Naeg. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 440; De Wild. loc. cit. p. 111; Kickx Fl. crypt. II p. 406; De-Toni Syll. Alg. I p. 754. Fl. occ.: Bruges (West.).
- 14 S. jugalis (Dillw.) Kuetz. Spec. Alg. (1809) p. 442; De Wild. loc. cit. p. 113; De-Toni Syll. Alg. I p. 751.

Conferva - Dillw. Brit. Conf. (1809) pl. V.

Spirogyra setiformis (Roth) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 442; De-Toni loc. cit. p. 752.

- Bt: Neeryssche (Paque), bois de la Cambre, Saint-Job, Jardin bot. de Bruxelles, Sept-Fontaines, Auderghem, Anderlecht (Nob.), Uccle (L. G.), Rouge-Cloître (A. D.). N.: I.effe (Él. M.). A.: Lierre (Nob.). Lg.: Charneux (Nob.). Fl. or.: Welden, Eenaeme (Nob.). Lx.: Paliseul (A. D.). Lb.: Genck (Troch), Molenbeersel, Kessenich, Kinroy (J. M.).
- 15 S. longata (Vauch.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 439; De Wild. loc. cit. p. 109; De-Toni Syll. Alg. I p. 743.

Conjugata — Vauch. Hist. des Conf. d'eau douce (1800) p. 71 pl. 6 fig. 1. Lg.: Spa (Nob.).

16 S. neglecta (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 441; De Wild. loc. cit. p. 111; De-Toni Syll. Alg. I p. 750.

Zygnema — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 142 pl. 23. fig. 1-2. Fl. or.: Meerbeke (V. W.).

- 17 S. nitida (Dillw.) Link Handb. III (1833) p. 262; Kickx Fl. crypt. II p. 406; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 112; De-Toni Syll. Alg. I p. 750. Conferva Dillw. Brit. Conf. (1803) pl. 4 C.
 - A.: entre Lierre et Emblehem (Nob.). Bt: env. de Bruxelles AC.; La Hulpe (Él. M.), Bergh (L. G.), Zoetwater (Paque). Fl. or.: Welden, Eyne (Nob.), Kraenepoel (L. G.). N.: Vierves (M. et F.). Lx.: Villance (A. D.). Lg.: Marchin (M. et C.). Lb.: Kessenich (J. M.).
- 18 S. orbicularis (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 442; *De Wild.* loc. cit. p. 113.

Zyguema - Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 138.

Spirogyra maxima Wittr.; De-Toni Syll. Alg. I. p. 756.

Fl. or. : Eyne, Bevere (Nob.).

19 S. orthospira Naeg. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 441; De Wild. loc. cit. p. 113.

Spirogyra majuscula *Kuetz*. Spec. (1849) p. 441; *Kickx* Fl. crypt. II p. 113; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 756.

- A: Gierle (Paque). Fl. or.: Gand (Kickx). Polders (Kickx).
- 20 S. pluvialis (*Hilse*) Petit Spirog. env. Paris (1880) p. 27 pl. 5 fig. 13; De Wild. loc. cit. p. 112.

Bt: Woluwe-St-Pierre (Nob.).

- 21 S. porticalis (Vauch.) Cooke Brit. Freshw. Alg. (1882) p. 89; De Wild. loc. cit. p. 109.
 - var. quinina Cooke Brit. Fresh. Alg. (1882) p. 89; De
 Wild. loc. cit. p. 110.

Spirogyra porticalis *Petit* Spirog. env. Paris p. 21 pl. 5 fig. 8-12; *Kichx* Fl. erypt. II p. 455.

- Bt: Forest (P. et M.), Anderlecht, Bergh, Tourneppe (Nob.), La Hulpe (Él. M.), Rouge-Cloître, Val-Duchesse (Nob.), Blanden, Héverlé (Paque), Vollezeele, (V. W.). Fl. or.: Melle (Scheidweiler), Denderwindeke (V. W.), Leupeghem, Neder-Eename (Nob.). A.: Schoorvoort (Paque), Austruweel (Nob.). Fl. occ.: env. de Bruges (West.). Lg.: env. de Spa (Nob.), mares de Java (M. et C.). Lx.: Villance (A. D.).
- var. rivularis (Hass.) Cooke Brit. Freshw. Alg. (1882) p. 90 pl. 35 fig. 3; De Wild. loc. cit.

Spirogyra rivularis Rabenh. Fl. eur. Alg. III (1868) p. 243; Kickx Fl. crypt. p. 405.

- Bi: Blanden, Héverlé (Paque). Fl. occ.: Menin (West.).
- 22 S. tenuissima (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 437; De Wild. loc. cit. p. 105; De-Toni Syll. Alg. I p. 765.

Zygnema — Hass. in Ann. nat. Hist. X (1842) p. 41.

- Bt: Beggynendyck (Sonnet). N.: Olloy (M. et F.). Lx.: Villance (A.D.). Ht: Bas-Silly (Goffart). Lg.: Marchin (M. et C.).
- var. Naegelii (Kuetz.) Petit Spirog. env. Paris (1880) p. 6;
 Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 766.

Spirogyra — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 437.

Fl. or. : Denderwindeke (V. W.).

23 S. varians (Huss.) Kuctz. Spec. Alg. (1849) p. 439; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 109; De-Toni Syll. Alg. I p. 746.

Zygnema -- Hass. Brit. Frehw. Alg. (1852) p. 145 fig. 1-9.

Rhynchonema Woodsii Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 444.

Rhynchonema abbreviatum Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 444; Kicke Fl. crypt. II p. 404.

Bt: Bergh (L. G.), La Hulpe (Él. M.), Woluwe-St-Pierre, Anderlecht (Nob.), Evere (Piré et Miller), Blanden, Héverlé, Wilsele (Paque). — A.: Schoorvoort, Broekzyde (Paque), entre Lierre et Emblehem (Nob.). — Ht: Leuze (G. L.), Camp de Oasteau, Beloeil (Nob.). — Fl. or.: Denderwindeke (V. W.), Welden (Nob.). — N.: Dourbes (M. et F.), Hastières (Él. M.). — Fl. occ.: env. de Brages (West.). — Lx.: Our (A. D.), Libramont, Presseux (L. D.), Villance, Libin (L. M.), env. de Houffalize (J. M.). — Lg.: env. de Spa, env. de Huy (Nob.).

24 S. ventricosa Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 440; De Wild. loc. cit. p. 110.

Spirogyra arcta var. nodosa (Kuetz.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. II (1868) p. 239; Kickw Fl. crypt. II p. 405; De-Toni Syll. Alg. I p. 745.

Bt: Laeken (P. et M.). — A.: Gierle (Paque). — Fl. occ.: env. de Bruges (West.).

25 S. Weberi Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 279 pl. XIX fig. 3; De Wild. loc. cit. p. 106; De-Toni Syll. Alg. I p. 768.
Ht: Beloeil (Nob.). — Bt: Genck (Nob.).

- 3 SIROGONIUM Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 278; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 114.
- 1 S. stieticum (Engl. Bot.) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 278; De Wild. loc. cit. fig. 49.

Spirogyra — Wille Bidr. t. Sydamerika Algfl. (1884) p. 34; De-Toni Syll. Alg. I p. 774.

Conferva - in Engl. Bot. (1812) pl. 2463 excl. fig. B.

Bt: Rouge-Cloître (A. D.). — A.: Lierre (Nob.). — Fl. or.: Eyne (Nob.).

FAM. MESOCARPACEAE.

4 MESOCARPUS Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 166; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 97.

Mougeotia sect. Mesocarpus (Hass.) Wittr.; De-Toni Syll. Alg. I p. 712.

1 M. nummuloides Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 109 pl. XLV fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 97.

Mougeotia — De-Toni Syll. Alg. I (1889) p. 713.

Bt: Woluwe-St-Pierre (Nob.).

2 M. parvulus (Hass.) De Bary Conjug. (1858) p. 80 pl. 11 fig. 15; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 98 fig. 42.

Mongeotia — Hass. Descr. of Freshw. Conf. (1843) p. 434; De-Toni Syll. Alg. I p. 714.

- Bt: Evere (Nob.). Lg.: Francorchamps, entre Marteau et La Reid (Nob.), Bas-Oha (M. et C.). Lx.: Seviscourt (L. D.), Libin, Opont, Villance (J. M.), Maissin (A. D.), Genck (Nob.). Ht: Beloeil (Nob.).
- var. angustus (Hass.) Cooke Brit. Freshw. Alg. (1852)
 p. 104 pl. 42 fig. 4.

Mesocarpus — Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 170 pl. 45 fig. 4.

Mougeotia parvula var. — Kirchn. Alg. Schlesien (1878) p. 128; De-Toni Syll. Alg. I p. 714.

- Bt: Etterbeek, Tervueren, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). Fl. or. : Leupeghem (Nob.).
- 3 M. pleurocarpus De Bary Conjug. (1858) p. 81 pl. III fig. 14; De Wild. loc. cit.: p. 98 fig. 44 et 45.

Mougeotia genuflexa Ag. Syst. (1824) p. 83; De-Toni Syll. Alg, I p. 716.

Bt: env. de Bruxelles C., Sichem (Nob.). — Fl. or.: Eyne (Nob.), Denderwindeke (V. W.). — Fl. occ.: env. de Bruges (West.). — A.: Austruweel (Nob.). — Ht: Leuze, Blicquy (G. L.). — Lg.: env. de Spa (Nob.), env. de Huy (M. et C.). — N.: Vierves, Olloy (M. et F.), Walzin, Leffe, env. de Dinant (Él. M.). — Lb.: — Lg.: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kessenich (J. M.). — Lx.: env. de Houffalize (J. M.).

4 M. scalaris Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 66 pl. XLII fig.; De Wild. loc. cit. p. 97.

Mougeotia - Hass. Observ. on Zygnem. (1842) p. 45.

Mesocarpus intricatus Hass. Brit. Frehw. Alg. (1852) p. 167 pl. 43 fig. 1. Mougeotia tenuis Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 434.

- Bl: Zoetwater, Eegenhoven (Paque). Lg.: Spa, Préfayhay, entre Marteau et La Reid (Nob.). Lx.: Seviscourt (L. D.), Villance (A. D.). Ht: env. de Mons (Michot).
 - 5 STAUROSPERMUM Kuetz. in Linnaea XVII (1843) p. 92;
 De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 100.

Mougeotia sect. Staurospermum Wittr.; De-Toni Syll. Alg. I p. 718.

1 S. capucinum (Bory) Kuetz. De Wild. loc. cit. p. 100.

Leda - Bory in Moug. et Nestler Exs. n. 793.

Mougeotia — Ag. Syst. Alg. (1824) p. 84; De-Toni Syll. Alg. I p. 721. Lb.: Libin (L. M.).

S. quadratum Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 436; De Wild. loc. cit.
 p. 100.

Mougeotia - Wittr.; De-Toni Syll. Alg. I p. 719.

- A.: Calmpthout (Nob.). Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). Lg.: entre Spa et Tiége (Wayai) (Nob.).
- 3 S. viride Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 278; De Wild, loc. cit. p. 100. Mougeotia Wittr.; De-Toni Syll. Alg. I p. 719.

A.: Wuestwezel, Calmpthout (Nob). — Lg.: Yernée (M. et C.), env. de Spa, Tihange (Nob.). — Ht: Belœil, camp de Casteau (Nob.). — Lx.: Seviscourt (L. D.), Maissin, Villance (A. D.). — Lb.: Kinroy (J. M.).

CHLOROPHYCEAE.

Volvocineae.

FAM. CHLAMYDOMONADACEAE.

1 CHLAMYDOMONAS Ehrenb. Inf. (1838) p. 64; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 67; De-Toni Syll. Alg. I p. 547.

 C. pulvisculus (Muell.) Ehrenb. Inf. (1833) p. 64 pl. III fig. X; De Wild. loc. cit. p. 68; De-Toni Syll. Alg. I p. 549.

Bt: Uccle, Bergh (L. G.), Schaerbeek, Woluwe-St-Lambert, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — Lx.: Villance (L. M.). -- Lg.: Route de la Gleize (Spa) (Nob.), Bois de Bailly (M. et C.).

2 HAEMATOCOCCUS Ag. Icon. Algar. (1828) pl. XXII; De Wild. Fl. Alg. Belg. pr. 67; De-Toni Syll. Alg. I p. 551.

H. lacustris (Girod) Rostaf. Sur l'Haematococcus (1875) p. 139;
 De Wild. loc. cit. p. 67; De-Toni Syll. Alg. I p. 552.

Volvox - Girod Rech. chim. et micr. sur les Conf. etc. (1802) p. 54.

Protococcus pluvialis Kuetz. Tab. Phyc. (1849) pl. I fig.1.

Chlamydococcus - Br. Verjung. (1851) p. 219.

Bt: Louvain, Wilsele (Paque).

FAM. VOLVOCACEAE.

- 1 GONIUM Mueller Vermium Hist. (1773) p. 60; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 66; De-Toni Syll. Alg. I p. 541.
- 1 G. pectorale Mueller loc. cit. (1773); De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Bt: St-Gilles (Miller), entre Eppeghem et Elewyt (Sonnet), Tervueren, Jardin bot. de Bruxelles, Sichem (Nob.) — Ht: entre Hussignies et Beloeil (Nob.). — Lb.: près de Maeseyck (J. M.).

- 3 PANDORINA Bory Encycl. Méthod.; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 65; De-Toni Syll. Alg. I p. 538.
- 1 P. morum (Muell.) Bory loc. cit.; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. I p. 539.

Botryocistis Volvox Kuetz. Tab. Phyc. I (1845) pl. 9 fig. 64.

A.: Calmpthout (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — Bt: La Hulpe, Peuthy (Él. M.), Sichem (Nob.). — Lg.: Ru de Polleur, Hoyoux (M. et C.). — Ht: env. de Mons (Michot), entre Hussignies et Beloeil (Nob.).

- 3 EUDORINA Ehrenb. in Monastber. Berl. Ak. (1831) p. 78; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 65; De-Toni Syll. Alg. I p. 537.
- 1 E. elegans Ehrenb. in Monatsb. Berl. Ak. (1831) p. 78; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. I p. 537.
 Bt: Evere (Nob.).
 - 4 VOLVOX Ehrenb. Iuf. (1830) p. 68; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 64; De-Toni Syll. Alg. I p. 535.
- V. globator Ehrenb. Inf. (1830) p. 68 pl. 4; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. I p. 536.
 - Bt: Louvain (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). Lg.: Ahin, Bas-Oha, Sollières, Vierset, Barse, Grand-Marchin, Vyle-Tharoul (M. et C.). Lb.: Kinroy (J. M.).
- 2 V. minor Stein Entwick. Infus. (1854) p. 47; De Wild. loc. cit. Bt: Louvain (Paque).

Protococcineae.

FAM. PROTOCOCCACEAE.

SUBFAM. COENOBIEAE.

TRIB. HYDRODICTYEAE.

- 1 HYDRODICTION Roth Tent. Fl. Germ. III (1880) p. 501; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 69; De-Toni Syll. Alg. I p. 561.
- 1 H. reticulatum (L.) Lagerh. Brid. till Sver. Algfl. (?) p. 71; Kicka Fl. crypt. II p. 69; De-Toni Syll. Alg. I p. 562.

Conferva — L. Sp. plant. (1753) p. 1635.

Hydrodictyon utriculatum Roth Tent. Fl. germ. III (1800) p. 531.

Bt: Louvain (Poskin). — Ht: Tournai (Dumortier). — Lg.: Hermalle-sous-Argenteau (Él. M.), Braives (M. et O.). — Fl. occ.: Menin (West.). — Fl. or.: Geudbrugge (Kickx), Bevere (Nob.).

SUBFAM. PEDIASTREAE.

- 2 SCENEDESMUS Meyen in Nov. Acta Ac. Leop. XIV 2 (1829) p. 774; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 69; De-Toni Syll. Alg. I p. 563.
- 1 S. hystrix Lagerh. in Ofvers. Kongl. Vet. Ak. Forhandl. (1882)

- p. 62 pl. II fig. 18; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 71; De-Toni Syll. Alg. p. 565.
- Lb .: Genck (Nob.). Lg .: Berinsenne (Nob.). Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).
- 2 S. obliquus (Turp.) Kuetz. in Linnaea (1833) p. 609; De Wild. loc. cit. p. 72; De-Toni Syll. Alg. I p. 566.
 - Bt: env. de Bruxelles C., env. de Louvain (Paque). Ht: env. de Tournai (Marissal). N.: env. de Dinant (Él. M.). Lg.: env. de Spa (Nob.). Lx.: Villance, Redu (L. M.). A: Campine C. Lb.: Campine C.
- 3 S. variabilis De Wild. in Notarisia (1893) p. 99; De Wild. loc. cit. p. 70.
 - var. ecornis Franzé in Termeszetrajzi Fuzetek Budapest
 (1892) p. 144; De Wild. loc. cit.
 - S. bijugatus (Turp.) Kuetz. in Linnaea (1833) p. 607; De-Toni Syll. Alg. I p. 563.
 - S. obtusus Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849) p. 91 pl. V, A fig. 1.
 - S. quadricauda B ecornis Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 190 pl. 31 fig. 12 h i.
 - Bt: env. de Bruxelles C.; env. de Louvain (Paque). Ht: env. de Tournai (Marissal) Beloeil (Nob.). Lx.: env. de St-Hubert (A. D.). Fl. or.: Denderwindeke (V. W.). N.: env. de Dinant (Él. M.). Lg.: env. de Spa (Nob.). Lb.: Genck (Nob.), env. de Maeseyck (J. M.).
 - var. cornutus Franzé in Termeszetrajzi Fuzetek Budapest (1892) pl. III fig. 7; De Wild. loc. cit. p. 71.
 - S. quadricauda Bréb. Alg. Falaise in Mém. Soc. Ac. Falaise (1835) p. 66; De-Toni loc. cit. p. 365.
 - S. var. setosus Kirchn. et horridus Kirchn. Alg. Schlesien. (1878) p. 98.
 - S. caudatus Corda Alman, de Carlsbad (1834).
 - S. abundans Kirchn. Alg. Schlesien (1878) p. 98.
 - S. dispar $Br\acute{e}b$. in Mém. Soc. Sc. de Cherbourg (1856) p. 159 pl. I fig. 32. Bt: env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Nob.). N.: Olloy, env. de Dinant (Él. M.). Lx.: Opont, Libin, Villance (A. D.). Ht: env. de Leuze (G. L.), env. de Mons (Nob.). Lb.: Campine Limbourgeoise C. Fl.or.: Tête-de-Flandre (Ensch).
 - 3 SORASTRUM Kuetz. Phyc. germ. (1895) p. 144; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 72; De-Toni Syll. Alg. I p. 568.
- 1 S. spinulosum Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849) p. 99 pl. V fig. D; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
 - Bt: St-Gilles (Miller). Lx.: Tihange (Nob.). FI or.: Kraenepoel (L. G.).
 - 4 COELASTRUM Naeg. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 195; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 73; De-Toni Syll. Alg. I. p. 570.
- 1 C. cubicum Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849) p. 97 pl. V. Bt: St-Gilles (Miller).

- 2 C. pulchrum Schmidle in Ber. naturf. Gesellsch. Freiburg i. Br. Bd VII p. 79; De Wild. Fl. Alg. Belg. Lb.; Genck (Nob.).
- 3 C. sphaericum Naeg. Einz. Alg. (1849) p. 98 pl. V fig. CI; De Wild. loc. cit. p. 73; De-Toni Syll. Alg. I p. 570.

Bt: St-Gilles (Miller), Boitsfort, Bergh, Jardin bot, de Bruxelles, Bois de la Cambre (Nob.), Zoetwater (Paque). — Lb.: Genck (Nob.). — Lx.: Tihange (Nob.).

- 5 PEDIASTRUM Meyen Beobacht. über Algenf. (1829) p. 772; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 73; De-Toni Syll. Alg. I p. 572.
- 1 P. angulosum (Ehrenb.) Menegh. Syn. in Linnaea (1840); De Wild. loc. cit. p. 76; De-Toni Syll. Alg. I p. 578.
 Micrasterias Ehrenb. Monatsber. Berl. Ak. 1833 p. 301.

Lb. : Genck (Nob.).

- 2 P. bidentulum Br. Alg. unicell. (1855) p. 91; De Wild. loc. cit. p. 77; De-Toni Syll. Alg. I p. 583.
 - var. ornatum Nordst. De Alg. et Characeis Sandv. (1878)
 p. 8 pl. I fig. 7; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 584.
 Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). Lg.: Ru de Polleur (Nob.).
- 3 P. Boryanum (Turp.) Menegh. in Linaaea (1840) p. 210; De Wild. loc. cit. p. 75; De-Toni Syll. Alg. I p. 576.

Hierella—Turp. in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVI(1828) p. 319 pl. XIII fig. 22.

Bt: St-Gilles (Miller), Louvain (Paque), Bois de la Cambre, Jardin bot. de Bruxelles, Anderlecht (Nob.). — A.: Tongerleo (L. G.). — Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — N.: Walzin, Leffe (Él. M.). — Lg.: Spa à Polleur, Berinsenne, Tihange (Nob.), Gives, Fumal (M. et C.). — Lx.: Villance (A. D.), Opont, Libin, Anloy (L. M.), Libramont, Presseux (L. D.). — Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel, près de Maeseyek, Kinroy (J. M.). — Ht: Belœil (Nob.).

var. granulatum (Kuetz.) Br. Alg. unicell. (1855) p. 90;
 De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. I p. 576.
 Pediastrum — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 192.

Bi: St-Gilles (Miller). — Lb.: Genck (J. M.).

4 P. Ehrenbergii (Corda) Br. Alg. unicell. (1855) p. 97 pl. 5 fig. 1-4; De Wild. loc. cit. p. 76, fig. 30.

Euastrum — *Oorda* Alman, de Carlsbad (1839) p. 138 pl. II fig. 8.

Pediastrum tetras Ralfs in Ann. and Mag. XIV (1845) p. 469 pl. XV fig. 4.

Bt: St-Gilles (Miller). — A.: Tongerloo (L.G.), Weelde, Raevels (Paque). — Fl. or.: Kraenepoel (L.G.). — Ht: Gaurain, Breuze, Mont-St Aubert (Marissal). — Lx.: Libin Redu (L.M.). — Lg: entre Malchamp et Nivezé (Sart) (Nob.), Gives (M. et C.). — Lb: Genck (Nob.), Kinroy, env. de Maeseyck, Kessenich, Molenbeersel (J.M.).

- 5 P. pertusum Kuetz. Phyc. germ. (1895) p. 143; De Wild. loc. cit. p. 76.
 Pediastrum duplex Meyen in Nova Acta (1829) p. 772 pl. 43 fig. 6-10,
 16-19; De-Toni Syll. Alg. I p. 578.
 - $\mathsf{Lx}.: \mathsf{Anloy} \ (\mathsf{L}.\ \mathsf{M}.). \ -- \ \mathsf{Lb}.: \ \mathsf{Genck} \ (\mathsf{Nob.}), \ \mathsf{env}. \ \mathsf{de} \ \mathsf{Maeseyck}, \ \mathsf{Kessenich}, \ \mathsf{Molenbeersel} \ (\mathsf{J}.\ \mathsf{M}.).$
- 6 P. simplex Meyen in Nova Acta XIV 2 (1828) p. 772 pl. 43 fig. 1-5; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 74 fig. 29; De-Toni Syll. Alg. I p. 574.

Bt: Bois de la Cambre (Nob.).

- 7 P. tricornutum Borge in Bihang till. k. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd 17 Afd. III (1892) p. 4 fig. 3. Lb.: Genck (J. M.).
- 8 P. vagum Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 143; De-Toni Syll. Alg. I p. 581.

Lb. .: Kinroy (J. M.).

SUBFAM. SCIADIEAE.

- 6 SCIADIUM A. Braun in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 490; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 77; De-Toni Syll. Alg. I p. 585.
- 1 S. arbusculum Br. Alg. unicell. (1855) p. 106 pl. 4; De Wild. loc. cit. p. 78 fig. 31; De-Toni loc. cit.
 - Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Anderlecht, Tervueren, Sichem (Nob.). Fl. or.: Denderwindeke (V. W.), Eyne, Leupeghem (Nob.). A.: Tongerloo (L. G.), Austruweel (Nob.).
 - 7 MISCHOCOCCUS Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849) p. 80; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 78; De-Toni Syll. Alg. I p. 586.
- 1 M. confervicola Naeg. loc. cit. (1849) p. 82 pl. II D; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 587.

Bt: Laeken (Nob.). - Fl. or.: Neder-Eenaeme, Leupeghem (Nob.).

Subfam. EREMOBIEAE.

TRIB. RAPHIDIEAE.

- 8 OPHIOCYTIUM Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849) p. 87; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 79; De-Toni Syll. Alg. I p. 590.
- 1 0. cochleare (*Eichw.*) Br. Alg. Unicell. (1855) p. 54; De Wild. loc. cit. p. 79; De-Toni loc. cit. p. 591.
 - Bt: Héverlé (Paque), Watermael (De Wèvre), Bergh (L. G.), Evere, Anderlecht, Tervueren, Woluwe-St-Lambert, Sichem (Nob.), Beggynendyck (Sonnet). A.: Nieuwmoer, Lierre (Nob.). Fl. or.: Eyne, Neder-Eenaeme (Nob.). Ht: entre Hussignies et Belœil (Nob.), Tourpes (Goffart). Lg.: Malchamp à Nivezé (Sart), entre Spa et Malchamp, ru de Polleur, Trou-Gonet (Spa), ru de

Chefna (La Reid), Wayai, Coquaifange, Francorchamps, Berinsenne, Ruy (Nob.), Braives (M. et C.). — Lx.: Presseux (L. D.). — Lb.: Genck (Nob.), Kessenich, Molenbeersel, Kiuroy (J. M.).

- 9 RAPHIDIUM *Kuetz*. Phyc. germ. (1845) p. 144; *De Wild*. Fl. Alg. Belg. p. 80; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 592.
- R. polymorphum Fres. in Abhandl, Senckenb. Naturf. Gesellsch. II (1856) p. 199 pl. VIII; De-Toni Syll. Alg. I p. 592.
 - var. aciculare (Br.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 45;
 De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 593.

Raphidium - Br. in Rabenh. Alg. n. 412.

Bt: env. de Bruxelles C. (Nob.), env. de Louvain (Paque), Beggynendyck (S.), Sichem (Nob.). — A.: Tongerloo (L. G.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — Lg.: env. de Spa et plateau des Hautes-Fanges C. (Nob.).

- var. falcatum (Corda) Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 45; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Raphidium — Cooke Brit, Freshw. Alg. (1886) p. 19 pl. 8 fig. 4. Micrasterias — Corda Alman, de Carlsbad (1835) p. 121 pl. JI fig. 29.

Bt: env. de Bruxelles C. (Nob.), env. de Louvain (Paque). — A.: Tongerloo (L. G.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy, env. de Maeseyck, Molenbeersel, (J. M.). — Lg.: env. de Spa et Plateau des Hautes-Fanges (Nob.). — Ht: Beloeil (Nob.). — Lx.: Qpont, Libin (L. M.), Villance, Our, Anloy, Maissin (A. D.).

- var. fusiforme (Oorda) Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 45; De-Toni loc. cit.

Ancistrodesmus — *Gorda* Alman. de Carlsbad (1838) p. 199 pl. II. Bt: env. de Louvain (Paque).

- 10 KIRCHNERIELLA Schmidle in Berl. d. naturf. Gesellsch. Freiburg in B. Bd VII p. 82; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 86.
- 1 K. lunata Schmidle loc. cit. pl. II fig. 1-2; De Wild. loc. cit.

Raphidium convolutum var. lunare Kirchn. Algenfl. v. Schlesien (1878) p. 114.

Selenastrum Bibraianum Reinsch.

- Lg.: Vallée de Tolifa (Winamplanche), Tihange (Nob.). Lb.: Genck (Nob.).
 - 11 TETRAEDRON Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 129; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 81; De-Toni Syll. Alg. I p. 597.
- 1 T. caudatum (Gorda) Hansg. in Hedwigia (1888) p. 131; De Wild. loc. cit. p. 81; De-Toni Syll. Alg. I p. 603.

Astericium — Corda Alman. de Carlsbad (1839).

Bi: Auderghem (Él. M.). — Lb.: Genck (Nob.).

2 T. enorme (Ralfs) Hansg. in Hedwigia (1888) p. 132; De Wild. loc. cit. p. 82; De-Toni Syll. Alg. I p. 608.

Polyedrium — De Bary Conjug. (1858) p. 71 pl. 6.

Staurastrum — Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 140.

Bt: Bois de Cambre, Laeken (Nob.), Peuthy (Él. M.). — Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — Lg.: Ru de Chefna (La Reid), Ru de Polleur (Nob.). — Lb.: Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

3 T. minimum (Br.) Hansg. in Hedwigia (1888) p. 131; De Wild. loc. cit. p. 81; De-Toni Syll. Alg. I p. 601.

Polyedrium - Br. Alg. Unicell. (1855) p. 94.

Bi: Auderghem (Él. M.), Bois de la Cambre (Nob.). — Lg.: Stavelot (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.).

4 T. regulare Knetz. Phyc. germ. (1845) p. 125; De Wild. loc. cit. p. 82; De-Toni Syll. Alg. I p. 604.

Polyedrium tetraedricum Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849) p. 84 pl. IV B f. 3. Lx.: Anloy (L. M.). — A.: Calmpthout (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.).

5 T. trigonum (Naeg.) Hansg. in Hedwigia (1888) p. 130; De Wild. loc. cit. p. 81; De-Toni Syll. Alg. I p. 598.

Polyedrium — Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849) p. 84 pl. 4 B fig. 1. Bt: Tervueren (Él. M.).

- 12 CERASTERIAS Reinsch Algentl. Frank. (1867) p. 68; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 82; De-Toni Syll. Alg. I p. 614.
- 1 C. raphidioides Reinsch Algenfl. Frank. (1867) p. 68; De-Toni loc. cit.
 - f. tetradens Reinsch loc. cit. (1867) pl. V fig. 1 c; De Wild. loc. cit. p. 82; De-Toni loc. cit. Lg.: Stavelot (Nob.).
 - 13 EREMOSPHAERA De Bary Conjug. (1858) p. 56; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 82; De-Toni Syll. Alg. I p. 616.
- 1 E. viridis De Bary loc. cit. (1858) pl. VIII fig. 26, 27; De Wild. loc. cit. p. 63; De-Toni loc. cit. Lg.: La Fange (Stoumont) (Nob.).

TRIB. CHARACIEAE.

14 CHARACIUM A. Br. in Kuetz. Spec. (1849) p. 208; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 83; De-Toni Syll. Alg. I p. 618.

C. ambiguum Herm. in Rabenh. Beitr. (1362) p. 26 pl. VII fig. 9
 a, b; De Wild. loc. cit. p. 83; De-Toni loc. cit. p. 623.

Characium tenue Herm. loc. cit. (1862) fig. 11.

Bt: Tervueren (Nob.). - Lb.: Genck (Nob.).

2 C. longipes Rabenh. Alg. Sachs. 171 et in Hedwigia (1854) pl. IX; De Wild. loc. cit. p. 83; De-Toni loc. cit. p. 624.
Lb.: Genck (Nob.).

- 3 C. ornithocephalum Br. Alg. unicell. (1855) p. 42 pl. III C; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 84 fig. 35; De-Toni loc. cit. p. 625.
 - Bt: Laeken (Nob.). A.: Calmphout (Nob.). Fl. or.: Kraenepoel (L. G.).
- 4 C. Sieboldi Br. in Kuetz Spec. Alg. (1849) p. 208; De Wild. loc. cit. p. 83; De-Toni loc. cit. p. 619.

Lb.: Genck (Nob.).

SUBFAM. TETRASPOREAE.

- 15 SCHIZOCHLAMYS Br. in Knetz. Spec. Alg. (1849) p. 891;
 De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 85; De-Toni Syll. Alg. I p. 643.
- 1 **S.** gelatinosa *Br.* in *Kuetz.* loc. cit. (1849); *De Wild.* loc. cit. p. 86 fig. 36.
 - Bt: Bergh (Nob.). Lg.: Spa (Wayai), Ru du fond de Polleur, entre Malchamp et Nivezé (Sart), Ru de Chefna (La Reid), Hockay (Nob.). Lb.: Genck (Nob.).
 - 16 TETRASPORA Link in Schrad. Journ. f. d. Bot. III (1839) p. 9; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 86; De-Toni Syll. Alg. I p. 646.
- T. bullosa (Roth) Ag. Spec. Alg. I (1821) p. 414; De-Toni Syll. Alg. I p. 648; De Wild. loc. cit. p. 86.

Ulva - Roth Cat. bot. III (1806) p. 320.

- Fl. or.: Meerbeke (V. W.), Neder-Eenaeme (Nob.). Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Neder-over-Heembeek (Nob.), Uccle (Piré et Miller). A.: Entre Lierre et Emblehem (Nob.). Lg.: Route de la Gleize (Spa), Arbespine, Spa, Coquaifange, Stavelot (Nob.). N.: Bouvignes et Dinant (Él. M.).
- var. cylindracea (Hilse) Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1863) p. 59; De Wild. loc. cit. p. 87; De-Toni loc. cit. p. 649.

T. cylindrica Hilse in Rabenh. Alg. n. 1171.

Bt: Evere, Laeken (Nob.).

2 T. gelatinosa (Vauch.) Desv. Flore de l'Anjou (1826) p. 18; De Wild. loc. cit. p. 87; De-Toni Syll. Alg. I p. 649.

Ulva - Vauch. Hist. Conf. d'eau-douce (1800) p. 244 pl. 7 fig. 2.

- Bi: Louvain (Paque). Bergh (L. G.), Etterbeek, Villers-la-Ville (Nob.). Fl. or.: Meerbeke (V. W.). Lg.: Spa, Polleur (Nob.).
- 3 T. lubrica (Roth) 4g. Spec. Alg. I (1848) p. 415; De Wild. loc. cit. p. 87; De-Ioni Syll. Alg. I p. 651.

Conferva — Roth Cat. bot. III (1806) p. 168.

- Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). Lg.: Cour. Francorchamps, Wayai, Ruy (Nob.). Lx.: Libramont (L. D.). Ht: Silly (Goffart).
- var. lacunosa Chauv. in Bréb. Alg. Falaise (1835) p. 11
 pl. I; De Wild. loc. cit. p. 88; De-Toni Syll. Alg. I p. 651.

Lx.: Villance (A. D.), Libramont, Presseux (L. D.), Transinne (L. M.).

- 17 STAUROGENIA *Kuctz*. Spec. Alg. (1849) p. 194; *De Wild*. Fl. Alg. Belg. p. 88; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 655.
- 1 S. rectangularis (Naeg.) Br. Alg. unicell. (1835) p. 70; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Chloropedium - Naeg. mss.

Bt: Auderghem (Él. M.). — Lg.: Vallée de Tolifa (Winamplanche) (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.), Kessenich (J. M.).

2 S. quadrata (Morren) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 194; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 656; Kickx Fl. Crypt. II p. 447. Crucigenia — Morren in Ann. Sc. nat. t. XX (1830) p. 404 pl. XV fig. 1-5.

Fi. or.: Destelbergen (Morren). - Bt: Bruxelles (Morren).

SUBFAM. DICTYOSPHAERIEAE.

- 18 DICTYOSPHAERIUM Naeg. Gatt. einz Alg. (1849) p. 73;
 De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 89; De-Toni Syll. Alg. I p. 659.
- 1 D. Ehrenbergianum Naeg. loc. cit. (1849) p. 73; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 660.
 - A.: Tongerloo (L. G.). -- Lb.: Genck (Nob.). -- Lg.: entre Spa et Polleur, Berinsenne (Nob.). -- Lx.: Villance (A. D.), Libin (L. M.).
- 2 D. reniforme Bulnh. in Hedwigia II (1863) p. 22 pl. II fig. 6; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 660.

 Bt: Peuthy (Él. M.).

SUBFAM. NEPHROCYTIEAE.

- 19 NEPHROCYTIUM Naeg. Gatt. einz Alg. (1849) p. 80; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 89; De-Toni Syll. Alg. I p. 662.
- 1 N. Agardhianum Naeg. Gatt. einz Alg. (1849) p. 80 pl. III C; De Wild. loc. cit. p. 90; De-Toni loc. cit. p. 663.
 Lg.: Tihange (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.). — Ht: Beloeil (Nob.).
- 2 N. Naegeli Grun. in Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 52; De Wild, loc, cit.; De-Toni loc, cit.
 - Bt: Peuthy (El. M.). Fl. or.: Kraenepoel (L. G.).
 - 20 OOCYSTIS Naeg. in Br. Alg. Unicell. (1855) p. 94; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 99; De-Toni Syll. Alg. I p. 663.
- O. solitaria Wittr. in Wittr. et Nordst. Alg. aquae dulc. exsicc.
 n. 244 fig. 1-5 et in Bot. Notis. (1879) p. 24; De Wild. loc. cit.;
 De-Toni loc. cit. p. 664.
 - Lg.: Tihange (Nob.). Lb.: Genck (Nob.).

SUBFAM. PALMELLEAE.

- 21 GLOEOCYSTIS *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 66; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 61; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 668.
- 1 G. rupestris (Lyngb.) Rabenh. Krypt. Fl. v. Sachsen (1863) p. 128; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

- 22 BOTRYOCOCUUS Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 892; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 91; De-Toni Syll. Alg. I p. 674.
- 1 B. Braunii Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 892; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Lx.: Libin (L. M.).

- 23 PALMELLA Lyngb. Hydroph. Danica (1819) p. 205; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 92; De-Toni Syll. Alg. I p. 677.
- 1 P. botryoides (Lyngb.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 214; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. p. 679.

Bt: Louvain (Paque), Schaerbeek, Tervueren (Nob.). — Lg.: Spa (Nob.).

- 24 PROTOCOCCUS Ag. Syst. Alg. (1863) p. 13; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 92; De-Toni Syll. Alg. I p. 699.
- 1 P. viridis Ag. Syst. Alg. (1863) p. 13; De-Toni loc. cit.; De Wild. loc. cit.
 - - 25 WESTELLA De Wild. in Bull. Herb. Boissier (1897) p. 532. Tetracoccus West in Journ. R. Microsc. Soc. London (1892); De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 85.
- 1 W. nimbata De Wild. in Bull. Herb. Boissier (1897) p. 532.

Tetracoccus De Wild. in Bull. Herb. Boissier t. II (1894) p. 388; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 85.

Pleurococcus — De Wild. in Bull. Herb. Boissier t. I (1893) p. 342.

Tetracoccus Wildemani Schmidle in Flora (1894)

Bi: Jardin bot. de Bruxelles (Serre à Victoria) (Nob.).

SUBFAM. PLEUROCOCCEAE

- 26 PLEUROCOCCUS Menegh. Monog. Nostoch. (1842) p. 40; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 93; De-Toni Syll. Alg. I p. 687.
- P. vulgaris Menegh. loc. cit. (1842) p. 38 pl. 5 fig. 1 inf.; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 688.

C. dans toutes nos provinces.

- 27 STICHOCOCCUS *Naeg.* einz. Alg. (1849) p. 76; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 93; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 686.
- 1 S. bacillaris Naeg. einz. Alg. (1849) pl. IV fig. 1-2; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit. p. 687.

Bt: env. de Bruxelles (Nob.).

2 S. flaccidus (Kuelz.) Gay Rech. sur le développ. etc. des Algues vertes (1891) p. 79; De Wild, loc. cit. p. 94 fig. 42.

Hormiscia — Lagerh. in Flora (1888); De-Toni Syll. Alg. I.p. 161.

Ulothrix - Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 349.

Bt, Fl. or., Lg., N. et Lx.: Assez commun. - Lb.: Kinroy (J. M.).

- 28 SCHIZOGONIUM Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 245; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 94.
- 1 S. crenulatum (Kuetz.) Gay Rech. sur le développ. etc. des Algues vertes (1891) p. 88; De Wild. loc. cit. p. 95.

Hormidium — Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 158; De-Toni Syll. Alg. I p. 158. Ulothrix — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 350.

FI. or.: Mooreghem (Nob.). - Bt: Louvain (Leburton). - Lb.: Beverloo (West.).

2 S. crispum (Lightf.) Gay Rech. sur le développ. etc. des Algues vertes (1891) p. 86; De Wild. loc. cit. p. 94.

Prasiola - Menegh. Cenni s. org. et fisiol. (1838) p. 38.

Ulva — Lightf. Flora Scotica II (1777) p. 972.

Ulothrix radicans Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 349.

Bt: env. de Bruxelles (Nob.), env. de Louvain (Paque). — A.: Austruweel (West. et Van Haes.), env. de Turnhout (Paque). — Fl. or.: Melle (Scheidweiler), Polders des Flandres (Kickx), env. d'Audenaerde (Nob.), Denderwindeke (V. W.). — Ht: env. de Leuze (Goffart). — Lg.: Spa (Nob.).

3 S. murale Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 246; Gay loc. cit. p. 87; De Wild. loc. cit. p. 95; fig. 43.

Ulothrix parietina Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 350.

Ulothrix crassiuscula Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 350.

Bt: C. env. de Bruxelles (Nob.), Louvain, Héverlé (Paque). — Fl. or.: Grammont (Kickx), env. de Gand (Demey), env. d'Audenaerde (Nob.), Denderwindeke, Meerbeke (V. W.). — Lg.: env. de Spa (Nob.). — Lb.: Tongres (Paque).

Confervineae.

FAM. ULVACEAE.

- 1 MONOSTROMA Thurst in Ann. Soc. Sc. Nat. de Cherbourg. II (1854) p. 19; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 31; De-Toni Syll. Alg. I p. 98.
- 1 M. latissimum (Kuetz.) Wittr. Monostr. (1872) p. 33 pl. I fig. 4; De

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 32; De-Toni Syll. Alg. I p. 98.

Ulva — Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 296 pl. 20 fig. 4; Kickw Fl. crypt. II p. 392.

Fl. occ.: dans un filet de pêcheur à Nieuport (Kickx),

M. latissimum var. palmatum Ag.; Kicka loc. cit.

FI. occ. : Ostende (West.).

2 M. fuscum (Post et Ruprecht) Wittr. Monostr. (1872) p. 53 pl. 4 fig. 13; De Wild. loc. cit. p. 31; De-Toni Syll. Alg. I p. 109.

Ulva — Post et Ruprecht Illustr. Alg. in Oceano pacifico coll. (1840) p. 21 pl. 37.

Ulva sordida Aresch. Phyc. Scand. (1850) p. 187 pl. 1 f. H.; Kickx Fl. erypt. II p. 393.

Polders, bords de l'Escant, entre la Tête-de-Flandre et le Doel, Havre de Philippine, chenal d'Axel (Kickx).

- 2 ULVA L. Gen. pl. (1737) p. 326; De-Toni Syll. Alg. I p. 110; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 32.
- U. lactuca L. Spec. pl. II (1763) p. 1163; De-Toni Syll. Alg. I p. 111; De Wild. loc. cit.; De Toni loc. cit. p. 111.
 Phycoseris Kickw Fl. crypt. II p. 394.

Fl. occ.: Jetées d'Ostende, Blankenberghe, Nieuport (Kickx).

f. lapathifolia (Aresch.) Hauck Meeres-Alg. (1885) p. 437;
 De Wild. loc. cit. p. 33; De-Toni loc. cit. p. 112.
 Phycoseris Linza Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 475; Kickw loc. cit.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx), Brackman de Philippine, Ostende (West.).

- 3 ENTEROMORPHA Link in Nees Hor. Phys. Berol. (1820) p. 5; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 33; De-Toni Syll. Alg. I p. 118.
- 1 E. clathrata (Roth) Ag. Till. Alg. Syst. VI (1882) p. 133; Kickx Fl. crypt. II p. 35; De Wild. loc. cit. p. 35; De-Toni Syll. Alg I. p. 133.

Conferva — Roth Cat. bot. III (1806) p. 175.

Fl. occ.: env. d'Ostende (West.).

- f. trichodes Kuetz.; Kickw loc. cit.; De Wild. loc. cit.
 Doel (Kickx).
- E. compressa (L.) Grev. Alg. Brit. (1830) p. 180; De Wild. loc. cit.
 p. 34; Kickv Fl. crypt. II p. 397; De-Toni Syll. Alg. I p. 126.
 Ulva L. Fl. Suec. (1745) n. 1155.

Fl. occ.: Heyst (Kickx). - A.: env. d'Anvers (West. et Van Haes.).

E. compressa f. nana J. G. Ag.; Kickw Fl. crypt. II p. 397; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 35.

Fl. occ.: Ostende (Kickx.).

- f. procerrima Kuetz.; Kickx loc. cit.; De Wild. loc. cit.
 Chenal d'Axel (Kickx).
- 3 E. intestinalis (L.) Link in Nees Hor. Phys. Berol. (1820) p. 5; De Wild. loc. cit. p. 33; Kickw Fl. crypt. II p. 36; De-Toni Syll. Alg. I p. 123.

Ulva — L. Fl. Suec. ed. 2 (1756) p. 432.

Flandres (Kickx). — Bt: Virginal (Nob.), Louvain (Poskin). — A.: Nylbeeke (Paque).

- f. crispa Kuetz.; Kickx loc. cit.; De Wild. loc. cit. Polders (Kickx).
- f. mesenteriformis Kuetz.; Kicka loc. cit.; De Wild. loc. cit. p. 34.
 - Fl. occ.: Ostende (West.), Assenede (Coem.). A.: Anvers (West.).
- f. gigantea Kuetz.; Kickw loc. cit.; De Wild. loc. cit. Fl. occ.: Nieuport (Kickx).
- 4 E. Linza (L.) J. Ag. Till. Algern. Syst. VI (1882) p. 134 pl. 4 fig. 110-112; De Wild. loc. cit. p. 34; De-Toni Syll. Alg. I p. 124. Ulva L. Sp. pl. (1763) p. 1633.

Phycoseris - Kickx Fl. crypt. II p. 394.

Fl. occ.: Ostende (Kickx).

5 E. percursa (Ag.) J. Ag. Alg. med. (1842) p. 15; Kickæ Fl. crypt. II p. 398; De Wild. loc. cit. p. 35; De-Toni Syll. Alg. I p. 129. Ulva — Ag. Spec. Alg. I (1821) p. 424.

Fl. occ.: Env. d'Ostende (Kickx).

6 E. ramulosa (Engl. Bot.) Hook. Brit. Fl. II (1833) p. 319; Kickw Fl. crypt. II p. 398; De Wild. loc. cit. p. 36; De-Toni Syll. Alg. I p. 134.

Ulva - Engl. Bot. (1810) t. 2137.

Fl. occ. : Ostende (West.).

FAM. ULOTRICHIACEAE.

- 1 HORMISCIA Fries Fl. Scanica (1835) p. 327; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 36; De Toni Syll. Alg. I p. 159.
- 1 H. zonata (Web. et Mohr) Aresch. in Acta Soc. Ups. (1866) p. 12 pl. II; De Wild. loc. cit. fig. 12; De-Toni loc. cit. p. 163.

Conferva — Web. et Mohr Naturhist. Reise d. e. Theil. d. Schwed. p. 97 (1804) pl. 4 fig. 7 a-b.

Bt: env. de Bruxelles AC. — N.: Belvaux, Han-sur-Lesse (L. G.), Olloy (Él. M.). — Lg.: Goffontaine (Nob.), Modave (Él. M.), Marchin (M. et C.). — Lx.: Opont, Villance, Libin (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).

- 2 CONFERVA L. Gen. (1737) p. 326; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 45; De-Toni Syll. Alg. I p. 215.
- 1 C. fontinalis Berk. Glean. of Brit. Alg. (1832) pl. XIV fig. 1; De Wild. loc. cit.

Microspora — De-Toni Syll. Alg. I (1889) p. 230. Bt: Woluwe-St-Pierre, Neder-over Heembeek (Nob.).

- 2 C. bombycina (Ag.) Lagerh. Zur Entwick, einiger Conf. in Ber. deutsch. Bot. Gessell. (1887) p. 412; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. I p. 216.
 - C. dans toutes nos provinces.
 - 3 MICROSPORA Thur. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 221; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 46; De-Toni Syll. Alg. I p. 225.
- 1 M. floccosa (Ag.) Thur. loc. cit. (1850) pl. XVII fig. 4-7; De Wild. loc. cit. p. 46.

Conferva — Ag. Syst. Alg. (1829) p. 89.

Fl. or.: Denderwindeke (V. W.), Bevere (Nob.). - Bt: Wilsele (Paque).

2 M. amoena (Kuetz.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 321; De Wild. loc. cit. p. 46; De-Toni Syll. Alg. I p. 227.

Conferva - Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 372.

Lg.: Spa (Wayai), Stavelot (Nob.). — Lb.: Presseux (L. D.).

- 4 UROSPORA Aresch. Observ. phyc. (1866) p. 15; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 46; De-Toni Syll. Alg. I p. 232.
- 1 U. penicilliformis (Roth) Aresch. loc. cit. (1866); De Wild. loc. cit. p. 47; De-Toni Syll. Alg. I p. 232.

Conferva - Roth Cat. bot. III (1806) p. 272.

Hormotrichum speciosum Crouan Alg. Mar. Finist. n. 349; Kickw Fl. crypt. II p. 410.

Fl. occ.: Ostende (West.).

FAM. CHAETOPHORACEAE.

- 1 HERPOSTEIRON Naeg. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 423; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 38; De-Toni Syll. Alg. I p. 180.
- 1 H. Braunii Naeg. Mss. ex. Huber in Ann. Sc. Nat. sér. 7 t. XVI (1893) p. 287; De Wild. loc. cit. p. 38.

Bt: Auderghem (Él. M.), Sichem (Nob.). — N.: entre Bouvignes et Dinant (Él. M.). — Fl. or.: Tête de Flandré (Ensch). — Lb.: Kinroy, Kessenich (J. M.).

- 2 CHAETOPHORA Schrank Bair, Fl. (1789); De Wild, Fl. Alg. Belg. p. 39; De-Toni Syll. Alg. I p. 182.
- 1 C. cornu-Damae (Roth) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 29; De Wild. loc. cit. p. 39; De-Toni Syll. Alg. I p. 186.

Rivularia - Roth Cat. bot. III (1806) p. 332.

C. endiviaefolia Ag. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 532; Kickv Fl. crypt. II p. 419.

Bt: Laeken, Linkebeek (Piré et Miller), Bergh. Tervueren, Evere, Rouge-Cloître, Woluwe-St-Lambert (Nob.). — A.: entre Lierre et Emblehem (Nob.). — Fl. or.: Denderwindeke (V. W.), env. de Gand, Melle (Kickx), Eyne (Nob.). — Fl. occ.: env. d'Ostende (Kickx). — Ht: Tournay (Marissal). — N.: Vierves (M. et F.). — Lg.: env. de Huy (M. et C.). — 1.b.: Kessenich (J. M.).

2 C. elegans (Roth) Ag. Syst. (1824) p. 27; De-Toni Syll. Alg. I p. 183; Kickx Fl. crypt. II p. 420; De Wild. loc. cit. p. 40.

Rivularia — Roth Cat. bot. III (1806) p. 337.

Lb.: Kinroy (J. M.). — Bt: Jette, Vilvorde (A. D.), Dilbeek (Piré et Miller), Ganshoren, Bergh, Woluwe-St-Lambert, Woluwe-St-Pierre, Woluwe-St-Étienne, Boitsfort, Evere, Tervueren, Laeken, Neder-over-Heembeek, Anderlecht (Nob.). — A.: entre Lierre et Emblehem, Austruweel (Nob.), entre Turnhout et Beersse (Paque). — Fl. or.: Melle (Kickx), Eyne (Nob.). — Lx.: Villance (A. D.), Opont, Transinne (L. M.), entre Waltzing et Eischer (Paque). — Lg.: Ru de Turon (La Reid), ru de Chefna (La Reid), Winandplanche, Berinsenne (Nob.).

- var. longipila (Kuetz.) Hansg. Prodr. (1886) p. 70; De Wild. loc. cit. p. 41; De-Toni loc. cit.

Chaetophora — Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 281; Kickx Fl. crypt. II p. 421.

Bi: Louvain (Paque). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

- 3 C. flagellifera Kuctz. Spec. Alg. (1849) p. 532; Kicka Fl. Crypt. II p. 420; De Wild. loc. cit. p. 41; De-Toni Syll. Alg. I p. 184. Fl. or.: Gand (Scheidweiler).
- 4 C. pisiformis (Roth) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 27; Kicke Fl. Crypt. II p. 420; De Wild. loc. cit. p. 40; De-Toni Syll. Alg. I p. 182. Rivularia Roth Cat. bot. III (1806) p. 338.

Bt: Bergh (Él. M.), Corbeek-Dyle, Zoetwater, Egenhoven (Paque), St-Gilles (Piré et Miller). — A.: env. de Turnhout (Paque). — Fl. occ.: env. de Bruges (West.). — Fl. occ.: env. de Alost (Paque), Melle, Meirelbeke (Kickx), Meerbeeke (V. W.), Heurne, Eyne (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.). — N.: env. de Namur (Bell.). — Lx.: Libin (L. M.). — Lg.: Ruisseau de Solières (M. et C.).

5 C. tuberculosa (Roth) Hook. in Ag. Syst. Alg. (1824) p. 27; De Wild. loc. cit. p. 41; De-Toni Syll. Alg. I p. 184.

Rivularia - Roth ex Engl. Bot. (1841 P) t. 2866.

Bt: Bergh (Nob.). — Fl. or.: Meerbeke (V. W.). — Lg.: Petit-Modave (M. et C.).

- 3 DRAPARNALDIA *Bory* in Ann. Mus. (1808) p. 399; *De Wild*. Fl. Alg. Belg. p. 42; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 189.
- D. glomerata (Vauch.) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 59; Kickx Fl. crypt. II p. 419; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 42, De-Toni Syll. Alg. I p. 192.

Batrachospermum — Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 118 pl. XII fig. 1.

- Bt: Forêt de Soignes, Bergh. (L. G.), Anderlecht, Woluwe-St-Lambert et St-Etienne (Nob.). Fl. occ.: env. de Bruges (West.). Fl. or.: Meerbeke (V. W.). N.: Hamerenne (L. G.). Lx.: Our, Villance (A. D.), Opont, Libin (L. M.), env. de Houffalize (J. M.). Lg.: Bas-Oha, Hermalle, Yernée, Jehay (M. et C.), env. de Spa, Tiége, Polleur, Charneux, Desniez, Winanplanche, Berinsenne (Nob.).
- var. acuta Ag. Syst. Alg. (1824) p. 59; De Wild. loc. cit. p. 43; De-Toni loc. cit.

D. acuta Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 356; Kicka Fl. Crypt. II p. 419.

Fl. or.: Melle (Planchon). - Lx.: entre Waltzing et le Grand-duché (Paque).

2 D. plumosa (Vauch.) Ag. Syst. Alg. (1824). p. 58; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 42; De-Toni Syll. Alg. I p. 190.

Batrachospermum — Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) pl. XI fig. 2,

- Bt.: Etterbeek (Piré et Miller), canal de Willebroeck et de Charleroi (A. D.), Woluwe-St-Lambert, Boitsfort (Nob.). Fl. or.: Eyne (Nob.). Lx.: Libramont (A. D.). Lb.: env. de Maeseyck (J. M.).
 - 6 STIGEOCLONIUM Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 233; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 43; De-Toni Syll. Alg. p. 195.
- S. longipilum Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 354; De Wild. loc. cit.
 p. 44; De-Toni Syll. Alg. I p. 198.

Bt: Wolawe-St-Étienne et St-Lambert (Nob.).

S. tenue (Ag.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 577;
 De Wild. loc. cit. p. 43; De Toni Syll. Alg. p. 197.
 Draparnaldia — Ag. Syst. (1824) p. 57.

Bt: Bergh (L. G.), Bois de la Cambre, Molenbeek-St-Jean, Woluwe-St-Pierre (Nob.). — Ht: Gaurin (Marissal). — Fl. or.: Meerbeke (V. W.), Neder-Benaeme, Edelaere (Nob.). — Lg.: Thiers de-Statte (M. et C.), Juslenville, entre Spa et Malchamp, Cour, Berinsenne (Nob.), Jehay, Picherotte (M. et C.). — Lb.: (Nob.) — Lx.: Libramont (L. D.), Villance, Paliseul (A. D.), Opont, Libin (L. M.).

var. lubricum (Dillw.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868)
 p. 377; De Wild. loc. cit. p. 44; De-Toni Syll. Alg. I p. 197.

Stigeoclonium - Kuetz.; Kicka Fl. crypt. II p. 44.

Conferva — Dillw. Brit. Conf. (1809) pl. 57.

Fl. or.: Ledeberg (Scheidweiler). — Bt: Schaerbeek, Molenbeek-St-Jean (Nob.).

- 5 CHAETONEMA Nowak. in Cohn Beitr. z. Biol. d. Pflanzen II (1876) p. 76; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 44; De-Toni Syll. Alg. I p. 208.
- 1 C. irregulare Nowak. in Cohn. Beitr. z. Biol. d. Pflanzen II (1876); De Wild. loc cit.; De-Toni Syll. Alg. I p. 208.
 - Bt : Auderghem (L. Errera).
 - 6 CHAETOSPHAERIDIUM Klebahn in Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. XXIV (1892) p. 276.
- 1 C. Pringsheimii Klebahn loc. cit. (1892).
 - f. confertum Klebahn in Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. XXV (1893) p. 307 pl. XIV 11.

Lb.: Kinroy, Molenbeersel, Genck (J. M.).

- 7 MICROTHAMNION Naeg. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 552; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 38; De-Toni Syll. Alg. I p. 257.
- 1 M. Kuetzingianum Naeg. in Kuetz. Spec. Alg. (1849). p. 352; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.
 - Bt: Neder-over-Heembeek, Woluwe St-Lambert, Jard. bot. de Bruxelles, Anderlecht, Haeren, Watermael, Sichem (Nob.), Bergh (L. G.). A.: Calmpthout (Nob.). Fl. or.: Denderwindeke (V. W.), Edelaere, Eenaeme (Nob.). Lg.: Malchamp à Nivezé (Sart), Spa, La Fange (Cour), Wayai, Berinsenne, Ruy (Nob.). Lb.: Molenbeersel, Genck (J. M.).

FAM. CHROOLEPIDACEAE.

- 1 TRENTEPOHLIA Mart. Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 351; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 47; De-Toni Syll. Alg. I p. 257.
- 1 T. aurea (L.) Mart. (1817) p. 351; De Wild. loc. cit. p. 47, fig. 15; De-Toni loc. cit. p. 236.

Chroolepus — Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 284; Kickv Fl. crypt. II p. 331. Byssus — L. Spec. plant. II (1763) p. 1683.

Bt: Kessel-Loo (Paque). — Fl. or.: Montagne de l'Enclus (Renaix) (Kickx). — N.: Montaigle (Él. M.), Papeterie, Live (Bell.), Anseremme, Falmignoul, Pont-à-Lesse (Troch), Marlagne (Paque). — Lg.: Huy, Modave (Nob.), Thiers de Statte (Antheit), Surroyseux, Modave, Les Avins, Tacqueval (M. et C.), Jardin bot. de Liége (Nob.), entre Poulseur et Esneux (Goffart).

2 T. odorata (Wigg.) Wittr. Points-forteckn. Skand. vaexter (1880) p. 16.

Lepra - Wigg. Prim. Fl. Holsatiae (1780) p. 96.

T. umbrina (Kuetz.) Born.; De Wild. loc. cit. p. 48.

Chroolepus — Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 283.

Chroolepus aurantiacum Kueta.; Kicke Fl. crypt. II p. 351.

C. dans toutes nos provinces.

FAM. CYLINDROCAPSACEAE.

- 1 CYLINDROCAPSA Reinsch Algenfl. mittl. Franken (1867) p. 66; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 30; De-Toni Syll. Alg. I p. 92.
- 1 C. involuta Reinsch Algenfl. mittl. Franken (1867) pl. 6 fig. 1; De Wild. loc. cit.; De-Toni loc. cit.

Bt: Bergh, Tervueren (Nob.). — Fl. or.: Leupeghem (Nob.).

2 C. nuda Reinsch Algenfl, mittl. Franken (1867) p. 67 pl. 6 fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 31; De-Toni loc. cit. p. 93. Bt: Bergh (Nob.).

FAM. OEDOGONIACEAE.

- 1 OEDOGONIUM Link in Nees Hor. Phys. Berol. (1820) p. 5; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 24; De-Toni Syll. Alg. I p. 31.
- 1 Oe. capillaceum Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 255; Kickv Fl. crypt. II p. 409; De Wild. loc. cit. p. 29; De-Toni loc. cit. p. 87. Bi: Héverlé (Paque). A.: Broekzyde, Oosthoven (Paque). Fl. or.: Gand
- (Scheidweiler).

 2 Oe. cardiacum (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 369; De Wild. loc. cit. p. 27; De-Toni Syll. Alg. I p. 70.

Vesiculifera — Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 203 pl. 51 fig. 4.

Oe. pulchellum Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 366.

Fl. or.: Denderwindeke (V. W.), St-Amand (Kichv), env. d'Alost (Paque).

3 Oe. ciliatum (Hass.) Pringsh. Beitr. z. Morph. d. Algen (1850) p. 70 pl. 5 fig. 8; De Wild. loc. cit. p. 27 fig. 10; De-Toni Syll. Alg. I p. 60.

Vesiculifera — Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 202 pl. 52 fig. 2. Bt: St-Gilles (Piré et Miller), Evere, Bergh (Nob.).

4 Oe. concatenatum (Hass.) Wittr. in Acta Soc. sc. Upsal (1874) p. 25; De Wild. loc. cit. p. 26 fig. 9.

Vesiculifera — Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 201.

Oe. apophysatum *Pringsh.* Beitr. z. Morph. d. Algen (1850) p. 71-pl. 5 fig. 9. Lb.: Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — Bi: Woluwe-St-Étienne (A. D.). — Fl. or.: Moerbeke (V. W.).

5 Oe. excisum Wittr. et Lund. ex Wittr. in Bot. Notiser (1872) p. 3; De Wild. loc. cit. p. 25; De-Toni Syll. Alg. I p. 45. Bi: Bergh (Nob.).

- 6 Oe. fonticolum Br. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 368; Kickx Fl. crypt. II p. 409; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 29; De-Toni Syll. Alg. I p. 80.
 - Bt: St-Gilles (Piré et Miller), Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). Fl. or.: Gand (Scheidweiler), Neder-Eenaeme (Nob.).
- 7 Oe. Itsigsohnii De Bary Ueb, Oed. und Bulb. (1864) p. 56; De Wild. loc. cit. p. 25 fig. 7; De-Toni Syll. A.g. I p. 44.
 Lb.; Genck (Nob.).
- 8 Oe. longatum Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 364; De Wild. loc. cit. p. 28; De-Toni Syll. Alg. I p. 77.
 Lb.: Genck (Nob.).
- 9 Oe. paludosum (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 369; De-Toni Syll. Alg. I p. 42.
 Vesiculifera Hass. Hist. of Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 199 pl. 52 fig. 3.
 Lb.: Kinroy (J. M.).
- 10 Oe. princeps (Hass.) Wittr. in Acta Soc. Sc. Upsal. (1874) p. 42;
 De Wild. loc. cit. p. 29 fig. 11; De-Toni Syll. Alg. I p. 81.
 Vesiculifera Hass. Obs. on Freshw. Conf. p. 388.
 Fi. or.: Leupeghem (Nob.).
- 11 Oe. Pringsheimianum Arch. in Quart. Journ. Micr. Sc. (1868) p. 195; De-Toni Syll. Alg. I p. 45.
 Lb.: Molenbeersel (J. M.).
- 12 Oe. Reinschii Roy ex Cooke Brit. Freshw. Alg. (1884) p. 160; De Wild. loc. cit. p. 30.
 Lb.: Genck (Nob.).
- 13 Oe. Rothii (*Le Clerc*) Pringsh. Beitr. z. Morph. d. Oed. (1850) p. 69 pl. 5 fig. 4; De Wild. loc. cit. p. 26; De-Toni Syll. Alg. I p. 47.

Prolifera - Le Clerc Sur le genre Prolifera (anno?) p. 476 pl. 23 fig. 8.

- Bt: St-Gilles (Piré et Miller), Kessel-Loo (Paque). A.: Schoorvoort (Paque). Fl. or.: env. d'Alost (Paque). Lb.: Genck (Nob.), St-Léonard (M. et C.). Lx.: Villance, Anloy (A. D.).
- 14 Oe. tumidulum Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 366; Kickv Fl. crypt. II p. 408; De Wild. loc. cit. p. 28; De-Toni Syll. Alg. I p. 73. Bt: Boitsfort (Piré et Miller). A.: Brockzyde (Paque). Fl. or.: St-Amand (Kickx).
- 15 Oe. undulatum (Bréb.) Br. in De Bary Ueber Oed. et Bulb. (1864) p. 94; De Wild. loc. cit. p. 26 fig. 8; De-Toni Syll. Alg. I p. 49. Conferva Bréb. mss.
 - **Lb.**: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). A.: Raevels, Weelde (Paque). Lg.: Gives (M. et C.).

- 16 Oe. vesicatum (Lyngb.) Wittr. in Acta Soc. Sc. Upsal. (1879) p. 39;
 Do Wild. Fl. Alg. Belg. p. 29; De-Toni Syll. Alg. I p. 79.
 Conferva Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 144 pl. 47 fig. D.1.
 Ht: env. de Tournai (Marissal).
 - 2 BULBOCHAETE Ag. Syn. (1817) p. XXIX; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 23; De-Toni Syll. Alg. I p. 16.
- 1 B. intermedia De Bary Ueber Oed. und Bulb. (1864) p. 72 pl. IV fig. 1-7; De Wild. loc. cit. p. 23; De-Toni Syll. Alg. I p. 17. Lb.: Genck (Nob.).
- 2 B. pygmaea (Pringsh.) Wittr. Disp. Ocd. Succ. in Ofv. Kgl. Vet. Ak. Handl. (1870) p. 141; De Wild. loc. cit. p. 24 fig. 6; De-Toni Syll. Alg. I p. 25.
 - A.: Calmpthout (Nob.). Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). Lx.: Anloy (L. M.).
- 3 B. rectangularis Wittr. Disp. Oed. Suec. (1870) p. 142; De Wild. loc. cit. p. 24; De-Toni Syll. Alg. I p. 29.
 Lg.: Spa (Marteau) (Nob.).
- 4 B. setigera (Roth) Ag. Syn. Alg. Scand. (1817) p. 717; Kickv Fl. crypt. II p. 416; De Wild. loc. cit. p. 23; De-Toni Syll. Alg. I p. 20.

Conferva - Roth Cat. bot. III (1806) p. 283.

Bt: Beggynendyck (Sonnet), Anderlecht (Nob.). — A.: Tongerloo (L. G.), entre Lierre et Emblehem, Calmpthout (Nob.), Beersse (Paque). — Lb.: Genck (Nob.). — Lg.: Ru de Creppe, entre Spa et Polleur, Spa et Malchamp, Spa (Wayai, Orléans), Ru de Chefna (La Reid), Berinsenne (Nob.), Vierset (M. et C.). — Lx.: Libin (L. M.), Anloy, Villance (A. D.), Transinne (L. M.).

FAM. COLEOCHAETACEAE.

- 1 COLEOCHAETE Bréb. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1844) p. 29; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 20; De-Toni Syll. Alg. 3 p. 7.
- 1 C. divergens Pringsh. in Jahrb. f. wiss. Bot. II (1859) pl. I fig. 1; De-Toni Syll. Alg. I p. 87.
 Lb.: Kinroy (J. M.).
- 2 C. irregularis Pringsh in Jahrb. f. wiss. Bot. II (1859) pl. 1 fig. 6, pl. VI fig. 3-9; De Wild. loc. cit. p. 21; De-Toni loc. cit. p. 9. Bt: Woluwe-St-Pierre, Tervueren (Nob.). Fl. or.: Denderwindeke (V. W.). —

Lb.: Genck (Nob.). — Lg.: Chateau de Tillesse (M. et C.).

3 C. orbicularis Pringsh. in Jahrb. f. wiss. Bot. II (1859) pl. I fig. 5, pl. III fig. 6-7, pl. VI fig. 1-2; De-Toni Syll. Alg. I p. 8; De Wild. loc. cit. p. 21.

A.: entre Lierre et Emblehem (Nob.).

- 4 C. scutata Bréb. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. II (1844) p. 29 pl. II fig. 3.4; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 21 fig. 5; De-Toni Syll. I p. 9.
 - Bt: Anderlecht, Evere, Neder-over-Heembeek, Jardin bot. de Bruxelles, Sichem (Nob.). A.: entre Lierre et Emblehem (Nob.), Tongerloo (L. G.). F1. or.: Denderwindeke (V. W.), Eyne (Nob.). Ht.: Maire (Marissal). Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.), étang Godin à Huy (M. et C.), Coquaifange (Nob.). Lx.: Libramont (L. D.), Anloy (L. M.).
- 5 C. soluta Pringsh. in Jahrb. f. wiss. Bot. II (1859) pl. I fig. 2-3, pl. IV fig. 1-2; De Wild. loc. cit. p. 22; De-Toni Syll. Alg. I p. 10; Bt: Neder-over-Heembeek, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). Lb.: Genck (Nob.). Lx.: Villance (L. M.).

FAM. CLADOPHORACEAE.

- 1 CHAETOMORPHA Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 203; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 49; De-Toni Syll. Alg. I p. 265,
- C. crassa (Ag.) Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 204; De-Toni loc. cit.
 p. 270; De Wild. loc. cit. p. 50; Kickw Fl. crypt. II p. 50.
 Conferva Ag. Syst. Alg. (1824) p. 99.
 Fl. or.: Brackman de Philippine (Kickx).
- 2 C. linum (Muell.) Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 204; De Wild. loc. cit. p. 49; Kickx loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. I p. 269. Conferva Muell. in Fl. Dan. (1778) pl. 771 fig. 2.
 Fl. occ.: Nieuport (Kickx).
 - 2 CLADOPHORA Kuetz, in Linnaea XVII (1843) p. 91; De-Wild, Fl. Alg. Belg. p. 50; De-Toni Syll, Alg. I p. 287.
- 1 C. albida (Huds.) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 267; Kicka Fl. crypt. II p. 413; De Wild. loc. cit. p. 54; De-Toni loc. cit. p. 325. Fl. occ.: Ostende (West.).
- 2 C. crispata (Roth) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 264; De-Toni loc. cit. p. 291; De Wild. loc. cit. p. 52; Kickw Fl. crypt. II p. 414. Conferva Roth Cat. bot. I (1797) p. 178.
 - Signalé dans les provinces de Liége, de Brabant, et dans la Flandre orientale.
 - var. brachyclados Kuetz. sec. De-Toni loc. cit. p. 293; De Wild. loc. cit.

Cladophora — Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 216; Kickw Fl. crypt. II p. 52. Fl. occ. : env. d'Ostende (Mac Leod). — Bt : Kessel-Loo (Paque).

var. longissima (Kuetz.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868)
 p. 337; De Wild. loc. cit. p. 52.

Cladophora — Kuetz.; Kickw Fl. crypt. II p. 514.

Fl. or. : Ledeberg (Kickx). - Bt : Berthem (Paque).

3 C. crystallina (Roth) Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 213; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 54; De-Toni Syll. Alg. I p. 318.

Conferva - Roth Cat. bot. I (1797) p. 196.

Cladophora sericea (Lyngb.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 401; Kickw Fl. crypt. II p. 413.

Fl. occ. : Côtes d'Ostende (Kickx).

4 C. fracta (Dillw.) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 263; De Wild. loc. cit. p. 51; Kickw Fl. crypt. II p. 51; De-Toni Syll. Alg. I p. 288.

Conferva - Dillw. Brit. Conf. (1809) pl. XIV.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

— var. gossypina (Draparn.) Rabenh. Fl. Eur. alg. III (1868) p. 335; De Wild. loc. cit. p. 51; De-Toni loc. cit. p. 289.

Cladophora — Kuetz. Tab. Phyc. (1852) IV pl. 51; Kickx Fl. crypt. II p. 415.

Conferva — Draparn.; cf. De-Toni loc. cit. Polders (Kickx).

— f. marina *Hauch* in *Rabenh*. Krypt. Fl. ed. 2 Bd 2 (1885) p. 461; *De Wild*. loc. cit. p. 51;

Cladophora patens Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 394; Kickx Fl. crypt. II p. 412.

Fl. occ. : Nieuport, env. d'Axel (Kickx).

5 C. glomerata (L.) Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 212; De Wild. loc. cit. p. 52 fig. 16; Kickx Fl. crypt. II p. 414; De-Toni Syll. Alg. I p. 295.

Conferva - L. Syst. Nat. II (1759) p. 721.

Llége et Brabant: C. — Ht: Blicquy (G. L.). — Fl. or.: Melle (Kickx). — Signalé dans la prov. de Namur par Bellynck.

6 C. laetevirens (Dillw.) Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 214; Kickx Fl. crypt. II p. 413; De Wild. loc. cit. p. 54; De-Toni Syll. Alg. I p. 327.

Conferva — Dillw. Brit. Conf. (1809) p. 48.

Fl. occ.: Ostende (Kickx).

7 C. lanosa (Roth) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 269; Kicke Fl. crypt. II p. 415; De-Toni Syll. Alg. I p. 336; De Wild. loc. cit. p. 55. Conferva — Roth Cat. bot. III (1806) p. 291 pl. 9.
Fl. occ.: Ostende (West.).

8 C. oligoclona Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 218; Kicka Fl. crypt. II p. 415; De-Toni Syll. Alg. I p. 291.

Fl. occ.: Ostende (Kickx). - Bt: Héverlé (Paque).

9 C. prolifera (Roth) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 207; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 53; De-Toni Syll. Alg. I p. 306.

Conferva - Roth Cat. bot. I (1797) pl. III fig. 2.

C. catenata Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 389; Kickw Fl. crypt. II p. 411. Fl. ccc.: Blankenberghe (Kickx).

10 C. rupestris (L.) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 270; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 54; De-Toni Syll. Alg. I p. 328.

Conferva - L. Syst. Nat. II (1759) p. 721.

Cladophora Lyngbyeana Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 208; Kickv Fl. crypt. II p. 721.

F1. occ.: Ostende, Nieuport (Kickx).

- 11 C. utriculosa Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 269; De Wild. loc. cit. p. 53; Kickx Fl. crypt. II p. 412; De-Toni Syll. Alg. I p. 312. Fl. occ.: Nieuport (Kickx).
- 12 C. vaga Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 401; Kickx Fl. crypt. II p. 414; De Wild. loc. cit. p. 55; De-Toni Syll. Alg. I p. 349. Fl. occ.: env. d'Ostende (West.).
 - 3 RHIZOCLONIUM Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 261; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 50; De-Toni Syll. Alg. I p. 278.
- 1 R. riparium (Roth) Harv. Phyc. Brit. (1850) pl. 238; De Wild. loc. cit.; De Toni Syll. Alg. I p. 278.

Rhizoclonium pannosum Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 262; Kickv. Fl. crypt. II p. 411.

Fl. occ.: Ostende (West.).

2 R. setaceum Kuetz. in Bot. Zeit. (anno?) p. 166; Kickx Fl. crypt. II p. 411: De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. I p. 286. Fl. occ.: Havre de Bouchaute (Scheidweiler).

Siphonineae.

FAM. BOTRYDIACEAE.

- 1 BOTRYDIUM Wallr. in Annal. Bot. (1815) p. 153; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 61; De-Toni Syll. Alg. I p. 528.
- B. granulatum (L.) Grev. Alg. Brit. pl. XIX (1830); De Wild. loc. cit. p. 61; De-Toni loc. cit. p. 529.

Ulva — L. Spec. pl. (1753) p. 1633.

Rhizococcum crepitans Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 1 t. XX (1833) p. 217 pl. VII; Kickw Fl. crypt. II p. 398.

Botrydium Wallrothii West. et Wall. in Herb. crypt. n. 781.

Bt: Vilvorde (Laurent), Neder-over-Heembeek, Limelette (Él. M.), Groenendael, Cortenberg (Nob.). — Ht.: env. de Mons (Herb. Brux.). — Lx.: La-

roche (Él. M.). — Fl. occ. :env. d'Ypres (West.). — Fl. or. : Gendbrugge, Jardin bot. de Gand (Kickx), Beverloo (West.). — Lg. : Hoyoux (M. et C.).

FAM. BRYOPSIDACEAE.

- 1 BRYOPSIS Lamour. in Journ. de Bot. (1809) p. 129; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 60; De-Toni Syll. Alg. I p. 427.
- 1 B. plumosa (*Huds.*) Ag. Spec. Alg. (1821) p. 448; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. I p. 431.
 - f. genuina Hauck in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd II (1885) p. 472; De Wild. loc. cit. p. 61; De-Toni loc. cit. Bryopsis plumosa Kickx Fl. crypt. II p. 402.

Fl. occ.: Canal de Bruges à Ostende (West.).

- f. adriatica Hauck in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd II (1885) p. 472; De Wild. loc. cit.

Bryopsis hypnoides Lamour. in Journ. de Bot. (1809) p. 135 pl. 1 fig. 2 a-b; Kickx loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. I p. 434.

FI. occ.: Ostende (Mac Leod et West.).

FAM. VAUCHERIACEAE.

- 2 VAUCHERIA DC. in Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 25; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 56; De-Toni Syll. Alg. I p. 393.
- 1 V. De Baryana Woronin in Bot. Zeit. (1880) p. 425; De Wild. loc. cit. p. 60; De-Toni Syll. Alg. I p. 402.
 Ht: Pipaix (G. L.), Leuze (Goffart). Fl. or.: Denderwindeke (V. W.).
- 2 V. Dillwynii (Web. et Mohr) Ag. Syst. (1824) p. 173; De Wild. loc. cit. p. 67; Kickæ Fl. crypt. II p. 57; De-Toni Syll. Alg. I p. 397. Bt: Héverlé, Wilsele (Paque). A.: Gierle (Paque). Fl. occ.: env. d'Ostende (West.).
- 3 V. geminata (Vauch.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 52; De Wild. loc. cit. p. 58; De-Toni Syll. Alg. I p. 399.

Ectosperma — Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 29 pl. II fig. 5. Vaucheria caespitosa Ag. Syst. Alg. (1824) p. 174; Kickw Fl. Crypt. II p. 400.

- Bi: Haeren (A. D.), Héverlé, Coorbeek-Dyle (Paque). Fl. or.: Tronchiennes (Kickx). Fl. occ.: Cherscamp (Kickx). Lg.: Waremme (Papy), bois Sandron (M. et C.).
- var. racemosa Walz; De Wild. loc. cit. p. 59.
- Bt: Woluwe St-Étienne (A. D.), Sichem (Nob.). N.: Hastières (Él. M.). Ht: Leuze (G. L.).
- 4 V. hamata Walz in Jahrb. f. wiss. Bot. V (1866) p. 148 pl. XII

- .fig. 12-16, pl. XIII fig. 17; De Wild. loc. cit. p. 59; Kicka Fl. crypt. II p. 401.
- Bt: Watermael (A. D.), Auderghem, Ganshoren (Nob.). Fl. or.: Denderwindeke (V. W.), Trouchiennes (Kickx), Neder-Eenaeme (Nob.). Ht: Chimay (M. et F.). Lg.: Yernée (M. et C.).
- 5 V. orníthocephala Ag. Spec. Alg. (1821) p. 467; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 56, fig. 17; De-Toni Syll. Alg. I p. 397.

Vaucheria sericea Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 78 pl. 21 B.

Bt: Peuthy, Auderghem (Él. M.).

6 V. sessilis (Vauch.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 63; De Wild. loc. cit. p. 57; Kickx Fl. crypt. II p. 399.

Ectosperma - Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 31 pl. II fig. 7.

- Bt: Neder-over-Heembeek, Jardin bot. de Bruxelles, Sichem (Nob.), Louvain (Paque), St-Gilles (Piré et Miller), Rouge-Cloître (A. D.). A.: env. de Turnhout (Paque). Fl. occ.: env. de Bruges (West.). Ht: Leuze, Pipaix (G. L.). Fl. or.: env. d'Alost (Paque), Denderwindeke (V. W.), Eyne, Welden (Nob.). Lx.: env. de Huy (M. et C.).
- 7 V. terrestris (Vauch.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 62; Kickæ Fl. crypt. II p. 400; De Wild. loc. cit. p. 59; De-Toni Syll. Alg. I p. 401.

Ectosperma — Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 27 pl. 2 fig. 3.

Bt: Wilsele, Wygmael (Paque), Uccle (L. G.), Schaerbeek, Woluwe-St-Pierre et St-Étienne, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — Fl. or.: Denderwindeke (V. W.), Eyne (Nob.). — Ht: Blicquy, Pipaix (G. L.), Leuze (Goffart). — N.: env. de Namur (Bell.). — Lg.: Bois de Bailly, Vierset (M. et C.), Spa (Nob.), Ombret, fond d'Oxhe (M. et C.). — Lx.: Villance (A. D.).

CHARAPHYCEAE.

FAM. CHARACEAE.

1 CHARA L. Gen. (1737) p. 326; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 10.

- C. aspera Willd. in Mag. d. naturf. Freunde III (1809) p. 298;
 Crépin Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 469; De Wild. loc. cit. p. 12.
 Bt: Bergh (Bamps).
- 2 C. Braunii Gmel. Fl. Bad. IV (1826) p. 646; Crépin Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 469; De Wild. loc. cit. p. 12.

Lb.; Entre Diepenbeek et Genck (Van den Born).

- 3 C. foetida Al. Br. Esquisse Monogr. (1834) p. 354; Crép. Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 460; De Wild. loc. cit. p. 10 fig. 1.
 - C. AC. dans les régions calcaire et jurassique, AR. ailleurs, non signalé dans la zône ardennaise.
 - var. contraria Coss. in Coss. et Germ. Fl. des env. de Paris (1861) p. 890; De Wild. loc. cit. p. 11.

Fl occ. : La Panne, Westende (Martinis).

4 C. fragilis Desv. in Lois. Not. (1810) p. 137; Crépin Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 469; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 11.

Fl. or.: env. de Berlaere (Crép.). — A.: env. de Westerloo (V. Haes.), Bois du Liereman, Kerkom, Eegenhoven, Holsbeck (Paque), env. d'Anvers (V. d. Broeck). — Lx.: env. de Rance, env. de Virton (Soc. bot.). — Bl: Ganshoren, Ixelles, Boitsfort, Auderghem (Piré et Miller), Wilsele, Parc, Corbeek-Dyle, Kessel-Loo, Haecht, Werchter, Pecrot (Baguet), Vieux-Genappe, Maransart, Sart-Dame-Avelines (Dand.), env. de Diest (Ghysbrechts). — Lb.: Diepenbeek (Van den Born), Godscheid, Stockroye, Lummen, Curange (Bamps), Bolderberg (Gérard), Maeseyck (Verheggen), Lannaye (Hardy), Lanaeken (Dumoulin), Tessenderloo (Ghysbrechts), Schuelen (Hecking).

- 5 C. hispida L. Fl. Suec. (1745) p. 428; Crépin Man. Fl. Belg. éd. 5. p. 469; De Wild. loc. cit. p. 10.
 - Bt: Bergh (Hecking), Peuthy, Kessel-Loo (Baguet), Wilsele (T. et W.). A.: R. Pold. RR. Camp. (V. d. Broeck). Fi. or.: Moerbeke, Melle (Crép.), Exaerde (Baguet). Lg.: Visé (Él. M.). Ht: Beloeil. Fl. occ.: marais du littoral AC.
 - 2 NITELLA Ag. Syst. Alg. (1824); De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 13.
- I. N. capitata (Nees) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 125; Crépin Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471; De Wild. loc. cit. p. 14.

Chara — Nees in Denkschrift. bayr. bot. Gesellsch. II (1818) p. 64 pl. 6.

- Bt: Anderlecht (V. d. Born.), Wilsele (Bamps), Kessel-Loo, Tremeloo (Baguet).—Lb.: Lummen (Baguet), Gelrode (Hecking), Maeseyck, Neer-Oeteren (Verbruggen), Curange (Bamps), Zonhoven (Geraets), Hasselt (Borgrave-Weyer) (Gérard), entre Diepenbeek et Genck (Gérard).—Ht: Camp de Casteau.—Fl. or.: env. de Gand, Exaerde (Crép.).—A.: Austruweel, Vaerendonck, Eynthout (V. Haes.), env. de Gheel et de Lichtaert (V. d. Broeck).
- 2 N. flexilis (L.) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 124; Crépin Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471; De Wild. loc. cit. p. 15 fig. 4.

Chara — L. p. p.

A.: Lierre (Piré et Miller), Westerloo (Van Haes.). — Bt: Laeken (Kickx, DK. et P.), Etterbeek (J. M.), Cortenberg (Hecking). — Lb.: Diepenbeek (V.d. Born), Hechtel (West.), Neer-Oeteren (Verheggen), Herck-St-Lambert, Hasselt, Curange (Bamps), Zeelhem (Ghysbrechts), Schuelen, Lummen (Hecking). — Fl. or.: Kraenepoel (V. d. Meersch).

3 N. gracilis (Smith) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 125; Crépin Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471; De Wild. loc. cit. p. 17.

Chara - Smith Engl, Bot. t. 2140.

Lg.: Lommel (West.), Diepenbeek, Godscheid (Bamps, Geraets), Genck (Bamps), Borgrave-Weyer (Hasselt) (Gérard). — Lx.: Ligny, Dohan (Del.), Recogne, env. de Rance (Soc. bot.).

- 4 N. mucronata A. Br. Schweiz. Char. (1847); Crépin Man. Fl. Belgique éd. 5 p. 471; De Wild. loc. cit. p. 16.
 - Fl. or. : Clappelstraet (Overmeire) (Crép.).
- 5 N. opaca Ag. Syst. Alg. (1824) p. 124; Crépin Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471; De Wild. loc. cit. p. 14.

A.: Tongerloo (Van Haes.), entre Turnhout et Beersse (Paque). — Bt: Beggynendyck (Th.), Perck (Laurent). — N.: Éprave (Crépin). — Lb.: entre Maeseyck et Neer-Oeteren, entre Kinroy et Neer-Oeteren (Verheggen).

6 N. syncarpa (Thuill.) Kuetz. Phyc. germ. (1845); De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 13 fig. 2.

Chara - Thuillier Flor. de Paris éd. II (1799) p. 473.

Bt: Woluwe-St-Pierre (J. M.), Peuthy (T. et W.).

7 N. tenuissima (Desv.) Coss. et Germ. Atl. de la Flore de Paris (1845) pl. XLI, F fig. 1-2; Crépin Mau. Fl. Belg. éd. 5 p. 471; De Wild. loc. cit. p. 17.

Chara — Desv. Journ. bot. II (1809) p. 313.

Ht: Virelles (Cogniaux). - Fl. or.: Moerbeke (Crépin).

8 N. translucens (Pers.) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 124; Crépin Man.
Fl. Belg. éd. 5 p. 471; De Wild. loc. cit. p. 16.

Chara - Pers. Syn. II (1807) p. 531.

A.: Tongerloo (Van Haes.), Gheel, env. de Lichtaert (V. d. Broeck).—
Bl: Wespelaer, Wygmael, Campenhout, Tremeloo (Baguet).—Lb.: Diepenbeek,
Beverloo (V. d. Born), Pietersheim (Dumoulin), Kinroy (Verheggen), Genck
(Hecking, Bamps), Curange, Stockroye (Geraets, Bamps), Tessenderloo
(Ghysbrechts).—Fl. or.: Kraenepoel (V. d. Meersch).

- 3 TOLYPELLA v. Leonhardi in Lotos (1863) p. 72 et in Böhm. Char. (1863); De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 17.
- 1 T. glomerata (Desv.) v. Leonhardi in Lotos (1863) p. 129; De Wild. loc. cit. p. 18.

Chara — Desv. in Lois. Not. (1810) p. 135.

Nitella — Br. Char. v. Afrika (1868) p. 822; Crépin Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471.

Lb.: Peer (West.). - Fl. or.: Saint-Laurent, Gand (Crép.).

2 T. intricata (Trent.) v. Leonhardi in Lotos (1863) p. 32; De Wild. loc. cit. p. 18.

Chara — Trent. ap. Roth Cat. bot. I (1797) p. 125.

Nitella — Ag. Syst. Alg. (1824) p. 125; Crépin Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471.

Bt: Holsbeek (Hecking). - Lb.: St-Trond (V. d. Born).

- 4 TOLYPELLOPSIS Migula in Rabenh. Kryptog. Fl. ed. 2 Bd V (1890) p. 253.
- 1 T. stelligera (Bauer) Migula loc. cit. (1890) p. 255.

Chara — Bauer in herb. ap. Moessler Handb. ed. 3 v. III (1834) p. 1665; Crépin Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 469; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 9.

Fl. occ.: Entre la Panne et Nieuport (Crép.). — Fl. or.: Destelbergen (Crép.). — Lb.: Entre Hasselt et Curange (Gérard).

PHAEOPHYCEAE.

FAM. ECTOCARPACEAE.

1 PILAYELLA Bory in Dict. class. IV (1825) p. 393; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 387; De-Toni Syll. Alg. III p. 530.

1 P. littoralis (L.) Kjellmann Handb. I (?) p. 84.

— var. firma (Ag.) Kjellmann Handb. I p. 84; De Wild. loc. cit. De-Toni loc. cit. p. 533.

Ectocarpus firmus Ag. Sp. Alg. I (1821) p. 23; Kickx Fl. crypt. II p. 333. Fl. occ.: Ostende (Mac Leod).

2 ECTOCARPUS Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 130; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 385; De-Toni Syll. Alg. III p. 537.

1 E. fasciculatus (Griff.) Harv. Man. Brit. Alg. (1841) p. 40; Kickx Fl. crypt. II p. 387; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 389; De-Toni Syll. Alg. III p. 553.

Fi. occ. : Ostende (Mac Leod).

2 E. fenestratus Berk.; Kicka Fl. crypt. II p. 382; De Wild. loc. cit. p. 387.

FI. occ.: Ostende (West.).

3 E. granulosus (Engl. Bot.) Ag. Spec. Alg. (1821) p. 45; Kickw Fl. Crypt. II p. 386; De Wild. loc. cit. p. 386; De-Toni Syll. Alg. II p. 554.

Conferva — Engl. Bot. (1811) pl. 2351.

Fl. occ. : Ostende (Mac Leod et West.).

4 E. siliculosus (Dillw.) Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 131; Kickx Fl. crypt. II p. 332; De Wild. loc. cit. p. 386; De-Toni Syll. Alg. III p. 549.

Conferva - Dillw. Brit. Conf. Suppl. (1809) p. 69 pl. E.

Fl. occ.: Ostende, Nieuport (West.).

5 E. tomentosus (Huds.) Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 132 pl. 44 A; De Wild. loc. cit. p. 386; Kickx Fl. crypt. II p. 382; De-Toni Syll. Alg. III p. 556.

Conferva — Huds. Fl. Angl. (1732) p. 594.

Fl. occ.: Ostende (West.).

6 E. velutinus Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 458; De Wild. loc. cit. p. 386. Streblonema — Thur. in Le Jol. Alg. mar. Cherbourg (1863) n. 238; De-Toni Syll. Alg. III p. 578.

Elachista — Aresch. in J. Ag. Sp. Alg. I (1821) p. 10; Kickv Fl. crypt. II p. 338.

Fl. occ. : Sur Himanthalia lorea (Kickx).

FAM. SPHACELARIACEAE.

TRIB. SPHACELARIEAE.

- 1 SPHACELARIA Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1879) p. 103; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 388; De-Toni Syll. Alg. III p. 499.
- 1 S. cirrosa (Roth) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 164; Kicke Fl. crypt. II p. 334; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 388; De-Toni Syll. Alg. III p. 503. Fl. occ.: Sur les Algues de nos côtes (Kicke).
 - var. nana Griff.; Kicky loc. cit.; De Wild. loc. cit. Fl. occ.: Ostende (West.).
- 2 S. radicans (Dillw.) Ag. Syst. (1824) p. 165; Kickæ Fl. crypt. II p. 334; De Wild. loc. cit. p. 388; De-Toni Syll. Alg. III p. 501. Fl. occ.: Ostende (Kickæ).
 - 2 STYPOCAULON Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 293; De-Toni Syll. Alg. III p. 516.
- S. scoparium (L.) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 293 pl. 18 fig. II.
 Conferva L. Syst. Nat. II (1759) p. 720.

Sphacelaria Ulex Bonn. sec. Kuetz.; Kickw Fl. crypt. II p. 334; De Wild. loc. cit. p. 389.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

- 3 CLADOSTEPHUS Ag. Syn. Alg. (1817) p. XXV; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 389; De-Toni Syll. Alg. III p. 512.
- 1 C. spongiosus (Lightf.) Ag. Spec. II (1828) p. 12; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. III p. 512.

Conferva - Lightf. Fl. Scotica (1777) p. 983.

Dasytrichia - Lamour.; Kicka Fl. crypt. II p. 335.

Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (Kickx).

2 C. verticillatus (Lightf.) Ag. Syn. (1817) Introd. p. XXV; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. III p. 513.

Dasytrichia - Lamour.; Kicka Fl. crypt. II p. 335.

Conferva - Lightf. Fl. Scotica (1777) p. 984.

Fl. occ.: Ostende, Nieuport (Kickx).

TRIB. ELACHISTEAE.

- 1 ELACHISTA Duby Mém. Ceram. I (1832) p. 19; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 390; De-Toni Syll. Alg. III p. 439.
- 1 E. flaccida (Dillw.) Aresch. in Linnaea XVII (1843) p. 262 fig. 7;

Kicka Fl. crypt. II p. 330; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 390; De-Toni Syll. Alg. III p. 441.

Conferva - Dillw. Brit. Conf. (1809) p. 53 pl. C.

Fl. occ. : Sur des Fucus (Kickx).

E. fucicola (Velley) Aresch. in Linnaea XVI (1842) p. 235 pl. 8 fig.
 6-7; De Wild. loc. cit. p. 390; De-Toni loc. cit. p. 442.

Conferva - Velley Mar. Pl. n. 4.

Elachista ferruginea Rabenh.; Kickx Fl. crypt. II p. 331.

Fl. occ. : Sur Fucus (Kickx).

3 E. scutulata (Sm.) Duby Bot. Gall. II (1829) p. 972; De Wild. loc. cit. p. 390; Kicker Fl. crypt. II p. 330; De-Toni loc. cit. p. 440. Conferva — Sm. Engl. Bot. (1811) pl. 2311.

Fl. occ. : Sur Himanthalia lorea (Kickx).

TRIB. ENCOELIEAE.

- 1 PHYLLITIS Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 342 pl. 24 III; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 396; De-Toni Syll. Alg. III p. 487.
- 1 P. fascia (Muell.) Kuetz. loc. cit. (1843); De-Toni loc. cit.; De Wild. loc. cit.

Fucus — Muell. Fl. Dan. V (1778) pl. 768.

Laminaria — J. Ag. Sp. Alg. I (1821) p. 122; Kickv Fl. crypt. II p. 343. Fl. occ.: Chenal de Nieuport (Kickx).

- 2 SCYTOSIPHON Ag. Disp. Alg. Suec. (1811) p. 24; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 395; De-Toni Syll. Alg. III p. 485.
- S. filum J. G. Ag. Spec. Alg. I (1821) p. 14; Kickx Fl. crypt. II p. 340; De Wild. loc. cit. p. 395.

Chorda — Lamour. Essai (1813) p. 26; De Toni Syll. loc. cit. p. 318. Fl. occ.: Nieuport, Ostende, Blankenberghe (Kickx).

2 S. lomentarius (*Lyngb.*) J. Ag. Spec. Alg. I (1821) p. 120; De Wild. loc. cit. p. 395; De-Toni loc. cit. p. 485.

Chorda - Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 74 pl. 18.

Fl. occ.: Entre Nieuport et La Panne (Kickx), Ostende (Mac-Leod).

- 3 PUNCTARIA Grev. Alg. Brit. (1830) p. XLII; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 392; De-Toni Syll. Alg. III p. 473.
- 1'P. plantaginea (Roth) Grev. Alg. Brit. (1830) p. 53 pl. IX; Kickx

Fl. crypt. II p. 337; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 394; De-Toni Syll. Alg. III p. 475.

Ulva - Roth Cat. bot. II (1707) p. 243.

Fl. occ. : Furnes (West.).

- 4 ASPEROCOCCUS Lamour. Essai (1813) p. 61; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 394; De-Toni Syll. Alg. III p. 492.
- 1 A. compressus Griff. in Hook. Brit. Fl. II (1833) p. 278; De Wild. loc. cit.; Kickx Fl. crypt. II p. 338; De Toni loc. cit. p. 494. En pleine mer, Ostende (Lanszweert).
- 2 A. Laminariae Ag. Spec. Alg. I (1821) p. 79; De Wild. loc. cit. p. 395; Kickv loc. cit.

Lithosiphon — Harv. Phyc. Brit (1849) pl. 295.

Fl. occ.: Ostende (West.).

TRIB. DESMARESTIEAE.

- 1 DESMARESTIA Lamour. Essai (1813) p. 23; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 392; De-Toni Syll. Alg. III p. 455.
- D. aculeata (L.) Lamour. Essai (1813) p. 23; De-Toni loc. cit. p. 458; Kickx Fl. crypt. II p. 345; De Wild. loc. cit. p. 393.
 Fucus -- L. Sp. plant. II (1763) p. 1632.

Fl. occ.: Ostende, Nieuport (Kickx).

FAM. LAMINARIACEAE.

- 1 ALARIA Grev. Alg. Brit. (1830) p. 25; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 399; De-Toni Syll. Alg. III p. 325.
- 1 A. esculenta (Lyngb.) Grev. loc. cit. (1830) pl. IV; Kickv Fl. crypt. II p. 344; De Wild. loc. cit. p. 399; De-Toni loc. cit. p. 326. En pleine mer à Ostende (Lanszweert).
 - 2 LAMINARIA Lamour. in Ann. Mus. XX (1813) p. 41; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 396; De-Toni Syll. Alg. III p. 336.
- L. digitata (L.) Lamour. Essai (1813) p. 22; De Wild. loc. cit.
 p. 396 fig. 103; Kickx Fl. crypt. II p. 341; De-Toni loc. cit. p. 342.
 Fucus L. Mant. (1767) p. 134 p. p.
 Fl. occ.: Rejeté sur tout le littoral.
 - var. stenoloba Kickv Fl. crypt. II (1867) p. 341; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Ostende (Kickx).

2 L. saccharina (L.) Lamour. Essai (1813) p. 22; De-Toni Syll. Alg. III p. 346; Kicker Fl. crypt. II p. 361; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 397.

Fucus — L. Sp. plant. II (1763) p. 1630.

Fl. occ.: Communément rejeté sur la plage.

var. bullata Lyngb.; Kickx Fl. crypt. II p. 342; De Wild. loc. cit. p. 398.

Fl. occ.: Blankenberghe (Kickx).

- var. cornea Kickw Fl. crypt. II (1867) p. 342; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Ostende (Kickx).

- var. latifolia Hook.; Kicka Fl. crypt. II p. 342; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: entre Nieuport et La Panne (Kickx).

var. Phyllitis (Stackh.) Hauck in Rabenh. Krypt. Fl. éd. 2,
 II (1885) p. 398.

Fucus — Stackh. Ner. Brit. (1801) p. 33 pl. 9.

Laminaria — Lamour.; Kicke Fl. crypt. II p. 342.

Fl. occ.: Blankenberghe (Kickx).

- 3 SACCORHIZA De la Pyl. Fl. Terre-Neuve (1824) p. 23; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 398; De-Toni Syll. Alg. III p. 322.
- 1 S. bulbosa (Huds.) De la Pyl. loc. cit. (1824); De Wild. loc. cit. p. 399; De-Toni loc. cit. p. 423.

Haligenia — Decaisne Ess. sur une class. des Algues etc. (1842) p. 345 Kickv Fl. crypt. II p. 343.

Fucus — Huds. Fl. angl. (1762) p. 579.

En pleine mer devant Ostende (Lanszweert).

FAM. FUCACEAE.

- . 1 ASCOPHYLLUM Stackh. Tent. mar. crypt. (1809) p. 54; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 376; De-Toni Syll. Alg. III p. 209.
- 1 A. nodosum (L.) Le Jolis Liste Alg. Cherbourg (1863) p. 96; De Wild. loc. cit. p. 376 fig. 100; De-Toni Syll. Alg. I p. 210.

Ozothalia vulgaris Decaisne et Thuret in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1844); Kickw Fl. crypt. II p. 360.

Fl. occ. : Commun sur la plage.

- var. scorpioides (Hornem.) Reinke Algenfl. (1889) p. 33;

Kickx Fl. crypt. II p. 360; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 377; De-Toni Syll. Alg. I p. 211.

Fucus - in Fl. Dan. (1878) pl. 1479.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

- A. nodosum var. furcatum Aresch.; Kickx loc. cit.; De Wild. loc. cit. En pleine mer (Kickx).
 - 2 HIMANTHALIA Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 36; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 375; De-Ioni Syll. Alg. III p. 217.
- 1 H. lorea (L.) Lyngb. loc. cit. (1819) p. 36 pl. 8; Kichx Fl. crypt. II p. 359; De Wild. loc. cit. p. 375 fig. 99; De-Toui loc. cit. Facus L. Syst. Nat. II (1759) p. 716.

Fl. occ.: Communément rejeté sur la plage.

- 3 FUCUS L. Gen. plant. (1737) p. 326; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 377; De-Toni Syll. Alg. III p. 194.
- 1 F. ceranoides L. Spec. plant. II (1763) p. 1626; De Wild. loc. cit. p. 380; Kicke Fl. crypt. II p. 358; De-Toni Syll. Alg. III p. 204. Fl. occ.: Ostende, La Panne (Kicke).
 - var. latifrons Kickx loc. cit.; De Wild. loc. cit. Fl. occ.: Shorres du Swin, Philippine, Doel (Kickx).
 - var. vesiculosus Ag.; Kickx loc. cit.; De Wild. loc. cit. Fl. occ.: Shorres du Swin, Philippine, Doel (Kickx).
- 2 F. platycarpus Thuret in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVI (1861) p. 9;
 De Wild. loc. cit. p. 378 fig. 101.
 Fl. occ.: Ostende (Errera, Nob.).
- 3 F. serratus L. Spec. plant. II (1763) p. 1626; De Wild. loc. cit. p. 379 fig. 102; Kickæ Fl. crypt. II p. 346; De-Toni Syll. Alg. III p. 208.

Fl. occ. : Commun sur tout le littoral.

- 4 F. vesiculosus L. Spec. plant. II (1763) p. 1636; Kicke Fl. crypt. II p. 347; De Wild. loc. cit. p. 377; De-Toni Syll. Alg. II p. 206. Fl. occ.: Très commun et très variable; rejeté sur tout le littoral.
 - 4 FUCODIUM J. Ag. Spec. Alg. I (1848) p. 200; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 381.
- 1 F. canaliculatum Ag. Spec. Alg. I (1848) p. 204; De Wild. loc. cit. Pelvetia Dec. et Thur. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IV (1845); Kicker Fl. crypt. II p. 358; De-Toni Syll. Alg. III p. 214.

Fucus — L. Syst. Nat. II (1759) p. 716.

Fl. occ. : Ça et là sur la plage, Chenal de Nieuport (Kickx).

2 F. tuberculatum Ag. Spec. Alg. I p. 204. (1848) p. 204; Kickx Fl. crypt. II p. 358; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 381.

Bifurcaria — Stackh. Ner. brit. (1801) p. 63 pl. 9.

F1. occ.: Ostende (Kickx).

- 5 HALIDRYS Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 37; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 380; De-Zoni Syll. Alg. IV p. 150.
- 1 H. siliquosa (L.) Lyngb. loc. cit. (1819) p. 37 pl. 8; Kickx Fl. crypt. II p. 360; De Wild. loc. cit. p. 380; De-Ioni loc. cit. p. 151. Fucus L. Spec. plant. II (1763) p. 1829.

Fl. occ. : Sur tout le littoral.

— — vaa. minor Grev.; Kickæ Fl. crypt. II p. 360; De Wild. loc. cit. p. 381.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

- var. denudata Lyngb.; Kickx Fl. crypt. II p. 360; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: La Panne (Van de Vyvere).

- 6 SARGASSUM Ag. Spec. Alg. I (1821) p. 1; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 383; De-Toni Syll. Alg. Belg. II p. 6.
- 1 S. bacciferum (Turn.) Ag. loc. cit. (1821) p. 6; De-Toni loc. cit. p. 82; Kichx Fl. crypt. II p. 362; De Wild. loc. cit. p. 383.
 Fucus Turn. Hist. Fuc. (1802) p. 55 pl. 47.

Fl. occ.: Ostende (Kickx).

- 7 CYSTOSEIRA Ag. Spec. Alg. I (1821) p. 50; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 382; De-Toni Syll. Alg. III p. 159.
- 1 C. barbata (Good. et Woodw.) Ag. Spec. Alg. I (1821) p. 57; Kickw Fl. crypt. II p. 362; De-Toni loc. cit. p. 169.

Fucus - Good. et Woodw. in Linn. Trans. III (1795) p. 128.

Fl. occ.: Entre Nieuport et La Panne (Kickx).

- var. concatenata Kuetz.; Kickx Fl. crypt. II p. 362. Fl. occ.: Ostende (Lanszweert).
- 2 C. fibrosa (Huds.) Ag. Spec. I (1821) p. 65; De-Toni loc. cit. p. 173; Kickx Fl. crypt. II p. 361; De Wild. loc. cit.

Fucus — Huds. Fl. Angl. (1762) p. 575.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

FAM. ARTHROCLADIACEAE.

- 1 ARTHROCLADIA Duby Bot. Gall. II (1830) p. 971; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 393.
- 1 A. villosa (Huds.) Duby loc. cit. (1830) p. 971; De Wild. loc. cit.;

De-Toni Syll. Alg. IV p. 403.

Conferva - Huds. Fl. Angl. ed. II (1778) p. 603.

A. septentrionalis Kuctz. Phyc. germ. (1845) p. 275; Kickx Fl. crypt. II p. 345.

Fl. occ. : Nieuport (West.).

FAM. CHORDARIACEAE.

- 1 CASTAGNEA Derb. et Sol. Mém. phys. Alg. (1856) p. 567; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 391; De-Toni Syll. Alg. III p. 406.
- 1 C. Griffithsiana (Grev.) J. Ag. Till Alg. Syst. IV (1880) p. 38; De Wild. loc. cit. p. 391; De-Toni Syll. Alg. III p. 406.

Mesogloia — Grev. in Hook. Brit. Fl. II (1834) p. 387; Kicka Fl. crypt. II p. 337.

Fl. occ.: Ostende (Kickx).

- 2 MESOGLOIA Ag. Syn. Alg. Scand. (1817) p. XXVII; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 391; De-Toni Syll. Alg. III p. 424.
- 1 M. vermicularis Ag. Syn. Alg. Scand. (1817) p. 126; De Wild. loc. cit.; Kickx Fl. crypt. II p. 337.

Mesogloia vermiculata Le Jolis in Mém. Soc. de Cherb. (1856) p. 87. Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

FAM. SPOROCHNACEAE.

- 1 SPOROCHNUS Ag. Spec. Alg. I (1817) p. 147; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 394; De-Toni Syll. Alg. III p. 379.
- 1 S. pedonculatus (Huds.) Ag. loc. cit. p. 149; De Wild. loc. cit.; Kickx Fl. crypt. II p. 345.

Fucus - Stackh. Ner. brit. (1801) pl. 16.

Fl. occ.: Ostende (West.).

DICTYOTEAE.

FAM. DICTYOTACEAE.

- 1 TAONIA Ag. Spec. Alg. I (1848) p. 101; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 384; De-Toni Syll. Alg. III p. 240.
- 1 T. atomaria (Good. et Woodw.) Ag. loc. cit. (1848); De-Toni loc. cit.

p. 241; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 385; Kickv Fl. crypt. II p. 339. Ulva — Good. et Woodw. in Linn. Trans. III (1795) p. 53.

Fl. occ. : Rejeté sur la plage à Furnes (West.).

- 2 PADINA Adans. Fam. II (1763) p. 13; De-Toni Syll. Alg. III p. 242; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 385.
- 1 P. pavonia (L.) Lamour. in Bory Dict. class. d'Hist. nat. XII (1827) p. 589; De Wild. loc. cit.; Kickx Fl. crypt. II p. 339; De-Toni loc. cit. p. 243.

Fl. occ.: Ostende, Nieuport (Kickx).

- 3 DICTYOTA Lamour. in Desv. Journ. de Bot. II (1809); De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 383; De-Toni Syll. Alg. III p. 260.
- 1 D. dichotoma (Huds.) Lamour. loc. cit. (1809) p. 42; Kickx Fl. crypt. II p. 439; De Wild. loc. cit. p. 384; De-Toni Syll. Alg. III p. 261.

Ulva - Huds. Fl. Angl. (1732) p. 476,

Fl. occ. : Entre Nieuport et Furnes (Kickx).

- var. acuta Chauv.; Kickx Fl. crypt. II. p. 338; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Plus commun que le type (West.).

2 D. fasciola (Roth) Lamour. loc. cit. (1809) p. 41; Kickx. Fl. crypt. II p. 338; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. III p. 277.

Fucus — Roth Cat. Bot. I (1797) p. 146 pl. 7 fig. 1.

Fl. occ.: Entre Nieuport et La Panne (Kickx).

RHODOPHYCEAE.

BANGIEAE.

FAM. BANGIACEAE.

- 1 BANGIA Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1879) p. 82 pl. 24, 25;
 De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 409.
- 1 B. atropurpurea (Dillw.) Ag. Syst. (1824) p. 76; Kicke Fl. crypt. II p. 417; De Wild. loc. cit.

Conferva - Dillw. Brit. Conf. (1809) pl. 103.

Bt.: Woluwe-St-Lambert (Nob.). — Fl. occ.: Havre de Philippine (Kickx). — Noble de la Molignée (Sonnet). — Lg.: Ahin, Regissa, Barse, Royseux, Modave (M. et C.), Nessonvaux (Lejeune).

- 2 PORPHYRA Ag. Spec. Alg. I 2 (1822) p. 404; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 409.
- 1 P. laciniata (Lightf.) Ag.; Kicka Fl. crypt. II p. 391; De Wild, loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (Kickx), Ostende (West.).

FLORIDEAE.

FAM. LEMANEACEAE.

- 1 LEMANEA Bory in Ann. Mus. XII (1808) p. 181; De Wild.
 Fl. Alg. Belg. p. 402; De-Toni Syll. Alg. IV p. 36.
- 1 L. catenata Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 528; De Wild. loc. cit.
 p. 503; De-Toni Syll. Alg. IV p. 39.
 N.: Lustin (Bell.).
- 2 L. fluviatilis (L.) Ag. in Act. Holm. (1814) pl. 2 fig. 2; De Wild. loc. cit. p. 402; De-Toni Syll. Alg. IV p. 41.

Conferva - L. Syst. Nat. (1759) p. 720.

- N.: Belvaux (L. G.). Lg.: Ahin (Cluysenaar), Theux (Él. M.), Spa (Nob.).
- 3 L. fucina Bory in Ann. Mus. Paris (1802) pl. 21 fig. 3; De Wild. loc. cit. p. 403; De-Toni Syll. Alg. IV p. 43.

Sacheria — Sirodot in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVI (1872) p. 74 pl. 3 fig. 20, pl. 8 fig. 23.

Fl. or.: Etichove (Kickx).

4 L. torulosa (Roth) Ag. in Act. Holm. (1814) pl. 2 fig. 1; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. IV p. 39.

Conferva - Roth Cat. bot. I (1797) p. 202.

N.: Olloy, Dourbes (M. et F.). — Lg.: Banneux (Él. M.).

FAM. BATRACHOSPERMACEAE.

- 2 THOREA Bory in Ann. Mus. XII (1808) p. 126; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 403; De-Toni Syll. Alg. III p. 587.
- 1 T. ramosissima Bory loc. cit. (1808); De Wild. loc. cit. fig. 104; De-Toni Syll. Alg. III p. 588.

Lg.: près de Liége (Lejeune).

- 3 BATRACHOSPERMUM Roth Tent. fl. germ. III (1808) p. 480; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 404; De-Toni Syll. Alg. IV p. 49.
- 1 B. Boryanum Sirodot Les Batrachospermes (1884) p. 246 pl. 29 fig. 1-3; De Wild. loc. cit. p. 406; De-Toni Syll. Alg. IV p. 56. Lx.: Libramont (L. D.).

- 2 B. corbula Sirodot Les Batrachospermes (1884) p. 226 pl. 5 fig. 1-3; De Wild, Fl. Alg. Belg. p. 406; De-Toni Syll. Alg. IV p. 55. Bt.: Villers-la-Ville, Schaerbeek (Nob.).
- 3 B. Dillenii (Bory) Sirodot Les Batrachospermes (1884) p. 254 pl. XX fig. 1-4, pl. XXI fig. 1-14, pl. XXII fig. 4; De Wild. loc. cit. p. 407; De-Toni Syll. Alg. IV p. 57.
 - Ht: Fontaine du Saulchoir (Marissal), env. de Mons (Tosquinet). N.: env. de Louette-St-Pierre (Gravet).
- 4 B. moniliforme (Roth) Sirodot Les Batrachospermes (1884) pl. 1 fig. 1, pl. 2 fig. 1-5 pl. 3; De Wild. loc. cit. p. 405 fig. 105; De-Toni Syll. Alg. IV p. 50.

B. moniliforme et var. Kickx. Fl. crypt. II p. 335.

- Bt: Auderghem (A. D.). Fi. or.: env. de Grammont (Kickx), env. de Gand, Ledeberg, Wetteren (Scheidweiler). Ht: Chimai (M. et F.). Lg.: Nessonvaux (Lejeune), Ahin, Marchin (M. et C.). N.: env. de Louette-St-Pierre (Gravet).
- var. scopula Sirodot Les Batrachospermes (1884) p. 213
 pl. IX fig. 1; De Wild. loc. cit. p. 406.

Lx.: Villance (A. D.). - Lb.: Spa (Wayai, Meyerbeer) (Nob.).

- 4 B. vagum (Ag.) Sirodot Les Batrachospermes (1884) p. 259 pl. 34, 35 et 36 fig. 1-4; pl. 37 fig.; De Wild. loc. cit. p. 407; De-Toni Syll. Alg. IV p. 58.
 - A.: Calmpthout (Nob.). Lg.: entre Malchamp et Nivezé (Sart), Hockay (Nob.), Barse (M. et C.). Lb.: Kinroy (J. M.).
 - 4 OHANTRANSIA DC. Fl. fr. II (1805) p. 49; De Wild. Fl. Alg. Belg. 408; De-Toni Syll. Alg. IV p. 67.
- 1 C. chalybea (Lyngb.) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 229; De Wild. loc. cit. p. 408 fig. 106.

Bt: Crainhem (Nob.).

2 C. Hermanni (Roth) Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 230; De Wild. loc. cit. p. 408.

N.: env. de Namur (Bell.).

FAM. WRANGELIACEAE.

- 1 SPERMOTHAMNION Aresch. ex Fries Summa Veg. Scand. I (1846) p. 127; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 410.
- 1 S. Turneri (Mert.) Aresch. Phyc. Scand. (1846) p. 113 t. 5 C.
 - f. variabilis Ag. Hauck Meeres Alg. (1885) p. 44; De Wild. loc. cit.

Callithamnion variabile Ag. Spec. Alg. II (1828) p. 163; Kicke Fl. crypt. II.p. 374.

Fl. occ.: assez commun, sur nos côtes (Kickx).

FAM. CERAMIACEAE.

- 1 RHODOCHORTON Naeg. sec. Hauck Meeres Alg. p. 67; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 411.
- 1 R. Rothii (Engl. Bot.) Naeq. Ceram. p. 355; De Wild. loc. cit, Conferva — Engl. Bot. (1807) tab. 1702. Callithamnion — Kickx Fl. crypt. II p. 347.

En pleine mer à Ostende (Kickx).

- 2 ANTITHAMNION Naeg. Alg. Syst. (1847) cf. Flora (1848) II p. 620; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 411.
- 1 A. plumula (Ell.) Thurst in Le Jolis Alg. mar. de Cherbourg (1863) p. 112; De Wild, loc. cit.

Conferva — Ell. in Phil. Trans. t. 57 (?) p. 426 pl. 18.

Callithamnion - J. G. Ag. Spec. Alg. II (1828) p. 159; Kickx Fl. crypt. II p. 374.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

- 3 CALLITHAMNION Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 123; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 412.
- 1 C. byssoideum Arn. sec. Harv. in Hook. Brit. Fl. II (1833) p. 342; De Wild. loc. cit. p. 413; Kickx Fl. crypt. II p. 376. Fl. occ. : Nieuport (Kickx).
- 2 C. granulatum (Ducl.) Ag. Spec. Alg. II (1828) p. 177; De Wild. loc. cit. p. 414.

Ceramium — Ducl. Ess. sur l'Hist. nat. env. Montpellier (1805) p. 72. Callithamnion spongiosum Harv. Phyc. Brit. (1859) pl. 125; Kickx Fl. crypt. II p. 376.

Fl. occ.: Ostende (West.).

- 3 C. polyspermum Ag. Spec. Alg. II (1828) p. 169; De Wild. loc. cit. p. 412; Kicke Fl. crypt. II p. 375. Fl. occ.: Ostende (West.).
- 4 C. tetragonum (Dillw.) Ag. Spec. Alg. II (1828) p. 176; De Wild. loc. cit. p. 413; Kickx Fl. crypt. II p. 376. Conferva - Wither. Syst. arrang. Brit. pl. (1796) p. 405.

Fl. occ.: Ostende (West.).

5 C. tetricum (Dillw.) Aq. Spec. Alg. II (1828) p. 179; De Wild. loc. cit. p. 412; Kicka Fl. crypt. II p. 375.

Conferva — Dillw. Brit. Conf. (1809) pl. 81.

Fl. occ.: Ostende (Kickx).

- 4 GRIFFITHSIA Ag. Syn. Alg. (1817) p. XXVIII; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 414.
- 1 G. corallina Ag. Ord. II (1863) p. 79; Kickx Fl. crypt. II p. 377; De Wild. loc. cit. p. 414.
 Fl. occ.: Nieuport (West.).
- ² 2 G. setacea (Ellis.) Ag. Syn. (1817) p. XXVIII; Kickv Fl. crypt. II p. 377; De Wild. loc. cit. p. 414.

Conferva - Ell. Phil. Trans. t. 57 pl. 16 fig. e.

Fl. occ.: Entre Ostende et Nieuport (West.), Ostende (Demey et Lanszweert).

- 5 PTILOTA Ag. Syn. Alg. (1817) p. XIX, 39; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 415.
- 1 P. elegans Bonnem. in Ann. Mus. t. XVI (1828) p. 22; De Wild. loc. cit. p. 415; Kickw Fl. crypt. II p. 383.
 Fl. occ.: Nieuport (Kickx).
- 2 P. plumosa (L.) Ag. Spec. Alg. I (1821) p. 385; Kicka Fl. crypt. II p. 383; De Wild. loc. cit. p. 415.
 Fucus L. Mant. (1767) p. 134.

FI. occ.: Heyst (West.).

- 6 CERAMIUM Ag. Syn. Alg. (1817) p. XXVI; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 415.
- C. Deslongchampii Chauv. in Chauv. et Roberge Alg. Norm. (1826)
 p. 83; Kickx Fl. crypt. II p. 378; De Wild. loc. cit. p. 416.
 Fl. occ.: Nieuport (Kickx).
- 2 C. diaphanum (Lightf.) Roth Tent. Fl. Germ. (1788) p. 525; Kickw Fl. erypt. II p. 371; De Wild. loc. cit. p. 416. Conferva — Lightf. Flora Scot. (1777) p. 996.
 Fl. occ.: Nieuport, Blankenberghe (Kickx).
- 3 C. flabelligerum Ag.; Kicka Fl. crypt. II p. 373; De Wild. loc. cit. p. 417.

FI. occ. : Ostende (West.), Blankenberghe (Kickx).

4 C. rubrum (Huds.) Ag. Syn. (1817) p. 60; Kickv Fl. crypt. II p. 371; De Wild. loc. cit. p. 416.

Conferva - Huds. Fl. Angl. (1742) p. 600.

Fl. occ.: Commun sur nos côtes (Kickx).

— — var. diaphanum Desm.; Kicka Fl. crypt. II p. 372; De Wild. loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

FAM. CRYPTONEMIACEAE.

- 1 FASTIGARIA Stackh. in Mém. Soc. Moscou II (1809) p. 59; De Wild. Fl. Alg. Belg. Belg. p. 418.
- 1 F. furcellata (L.) Stackh. Tent. mar. crypt. (1807) p. 91; De Wild. loc. cit.

Fucus — L. Spec. pl. (1763) p. 1631.

Furcellaria fastigiata Lamour.; Kicke Fl. crypt. II p. 363.

Fl. occ.: Assez commun entre Ostende et Nieuport (Kickx).

- 2 DUMONTIA Lamour. in Ann. Mus. XX (1813) p. 133; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 418.
- D. filiformis (Fl. Dan.) Grev. Alg. Brit. (1830) p. 165 pl. 17; Kickx
 Fl. crypt. II p. 367; De Wild. loc. cit. p. 419.

Conferva — Fl. Dan. (1778?) pl. 1480 fig. 2.

Fl. occ.: Nieuport, La Panne (Kickx).

FAM. GIGARTINACEAE.

- 1 CHONDRUS Stackh. ex Lamour. in Ann. Mus. XX (1813) p. 126; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 429; De-Ioni Syll. Alg. IV p. 179.
- C. erispus (L.) Lyngb. sec. Kuetz. Spec. Alg. p. 735; Kickx Fl. crypt.
 II p. 364; De-Toni Syll. Alg. III. p. 180; De Wild. loc. cit. p. 420.
 Fucus L. Mant. (1767) p. 134.

Fl. occ.: AC. sur nos côtes (Kickx).

— var. aequalis Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 16; Kickx Fl. crypt. II p. 364; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Ostende (Donkelaer).

var. incurvatus Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p.16; Kickx
 Fl. crypt. II p. 364; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (Kickx.)

- var. lacerans Turn.; Kicker Fl. crypt. II p. 364; De Wild. loc. cit.

Fl. occ. : Nieaport (Kickx).

- var. planus Turn.; Kickv Fl. crypt. II p. 364; De Wild. loc. cit.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

- 2 GIGARTINA Stackh. in Mém. Soc. Moscou II (1809) p. 55; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 420; De Toni Syll. Alg. IV p. 196.
- 1 G. mamillosa (Good. et Woodw.) Ag. Alg. Med. (1842) p. 104; De

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 421; De-Toni Syll. Alg. IV p. 218.

Fucus - Good, et Woodw. in Linn. Trans. III (1795) p. 174.

Mastocarpus — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 733; Kickw Fl. crypt. II p. 385. Fl. occ.: Ostende (Lanszweert), Blankenberghe (Kickx).

- 3 GYMNOGONGRUS Martius Fl. Brasil. (1825) p. 27; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 421; De-Toni Syl. Alg. IV p. 240.
- 1 G. norwegicus (Gunn.) Ag. Spec. gen. et ord. Alg. II pars 1 (1851) p. 320; Kickx Fl. crypt. II p. 365; De Wild. loc. cit. p. 422; De-Toni Syll. Alg. IV p. 246.

Fucus - Gunn. Fl. Norv: (1866) pl. 3 fig. 4.

FI; occ.: Ostende (Kickx).

2 G. plicatus (Turn.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 789; Kickv Fl. crypt. II p. 366; De Wild. loc. cit. p. 421.

Fucus — Turn. Fl. Angl. (1732) p. 589 pl. 180.

Fl. occ. : Nieuport, Ostende. Blankenberghe (Kickx).

- 4 PHYLLOPHORA Grev. Alg. brit. (1830) p. 135; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 422; De-Toni Syll. Alg. IV p. 230.
- 1 P. Brodiaei (Turn.) Ag. Alg. Med. (1842) p. 93; Kichx Fl. crypt. II p. 385; De Wild. loc. cit. p. 422; De-Toni Syll. Alg. IV p. 231. Fucus Turn. Hist. Fuc. II (1809) p. 1 pl. 72, Fl. occ.: Ostende (Kickx).
 - var. concatenata Rabenh.; Kickv Fl. crypt. II p. 387; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Ostende (Kickx).

2 P. rubens (Good. et Woodw.) Grev. Alg. Brit. (1830) p. 13 pl. 15; Kickx Fl. crypt. II p. 386; De Wild. loc. eit. p. 423; De-Toni Syll. Alg. IV p. 233.

Fucus — Good. et Woodw. in Linn. Trans. III (1795) p. 165.

Fl. occ.: Ostende (West. et Lanszweert).

- 5 CYSTOCLONIUM Kuetz. in Linnaea XVII (1843) p. 102; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 423; De-Toni Syll. Alg. IV p. 313.
- 1 C. purpurascens (Huds.) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 404 pl. 58; Kickw Fl. crypt. II p. 366; De Wild. loc. cit.; De-Toni Syll. Alg. IV p. 314.

Fucus — Huds. Fl. Angl. (1732) p. 589.

Fl. occ.: Ostende (West.), Nieuport, La Panne (Kickx).

FAM. RHODYMENIACEAE.

1 CHYLOCLADIA Grev. in Hook. Brit. Fl. (1853) p. 297; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 424.

 C. articulata (Huds.) Grev. in Hook. Brit. Fl. II (1853) p. 298; De Wild. loc. cit. p. 424.

Ulva - Huds. Fl. Angl. (1732) p. 569.

Lomentaria — Lyngb.; Kickx Fl. crypt. II p. 368.

Fl. occ.: La Panne, Nieuport, Ostende (Kickx).

C. clavellosa (Turn.) Grev. sec. J. Ag. Spec. Alg. II (1863) p. 366.
 De Wild, loc. cit. p. 424.

Fucus — Turn. in Linn. Trans. VI (1802) p. 133 pl. 9.

Chondrothamnion — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 856; Kicks Fl. crypt. II p. 383.

Fl. occ.: Ostende (Lanszweert).

- 2 RHODYMENIA Mont. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XII (1839) p. 44; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 424.
- R. ciliata Grev. Alg. Brit. (1830) p. 90; De Wild. loc. cit. p. 425;
 Kickx Fl. crypt. II p. 388.
 Fl. occ.: Nieuport (Kickx).
- 2 R. palmata (L.) Grev. Alg. Brit. (1830) p. 93; Kickv Fl. crypt. II p. 388; De Wild. loc. cit. p. 425.

Fucus — L. Spec. plant. II (1763) p. 1630.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

— var. sarniensis Grev.; Kicke Fl. crypt. II p. 388 De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Entre Nieuport et La Panne (Kickx.).

3 R. palmetta (Esper) Grev. Alg. Brit. (1830) p. 88 pl. XII; Kickx Fl. crypt. II p. 389; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 425.

Fucus - Esper Icon. Fuc. (1797) pl. 40.

Sur différents points du littoral (Kickx).

- var. Ellisiae Lenorm.; Kickx Fl. crypt. II p. 389; De Wild. loc. cit. p. 426.

Fl. occ.: Ostende (Kickx).

- 3 PLOCAMIUM Lamour. in Ann. Mus. XX (1813) p. 137;

 De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 426.
- 1 P. coccineum (Huds.) Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 39 pl. 9; Kickx Fl. crypt. II p. 390; De Wild. loc. cit. p. 426.

Fucus — Huds. Fl. Angl. (1732) p. 586.

Fl. occ.: CC. sur nos côtes.

- P. coccineum var. subtilis Lyngb.; Kicka Fl. crypt. II p. 390; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 426.
 - Fl. occ.: Nieuport (Kickx).
 - 4 HYDROLAPATHA Stackh. in Mém. Soc. Moscou II (1809) p. 54; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 427.
- 1 H. sanguinea (L.) Stackh. in Mém. Soc. Moscou II (1809) p. 54; De Wild. loc. cit.

Fucus - Mont. (1767) ubi.

Delesseria — Lamour. Ess. sur les genres de la fam. des Thalassiophytes (1813) p. 7 pl. 2; Kickx Fl. crypt. II p. 387.

Fl. occ.: Entre Nieuport et la Panne (Kickx).

FAM. DELESSERIACEAE.

- 1 NITOPHYLLUM Grev. Alg. Syn. (1830) p. XLVII; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 427.
- N. Gmelini Grev. Alg. brit. (1830). p. 82; Kickx Fl. crypt. II p. 390;
 De Wild. loc. cit. p. 428;

Fl. occ.: Entre Nieuport et Oostduinkerke (Kickx).

- 2 DELESSERIA Lamour. in Ann. Mus. XX (1813) p. 122; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 428.
- D. alata (Huds.) Lamour, in Ann. Mus. XX (1813) p. 36; Kickx
 Fl. crypt. II p. 38; De Wild. loc. cit. p. 428.
 Fucus Huds. Fl. Angl. (1732) p. 578.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

2 D. sinuosa (Good. et Woodw.) Lamour. in Ann. Mus. XX (1813) p. 124; Kickw Fl. crypt. II p. 387; De Wild. loc. cit. p. 429. Fucus — Good. et Woodw. in Linn. Trans. III (1795) p. 111.

Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (Kickx).

FAM. SPHAEROCOCCACEAE.

- 3 GRACILARIA *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 121; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 430.
- 1 G. confervoides (L.) Grev. Alg. Brit. (1830) p. 123; Kicka Fl. crypt. II p. 385; De Wild. loc. cit.

Fucus - L. Spec. plant. II (1763) p. 2629.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

FAM. SOLIERIACEAE.

1 CATENELLA Grev. Alg. Brit. (1830) p. 166; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 430; De-Ioni Syll. Alg; IV p. 317.

C. Opuntia (Good. et Woodw.) Grev. Alg. Brit. (1830) p. 166 pl. 17;
 Kickv Fl. crypt. II p. 367; De Wild. loc. cit. p. 341; De-Toni Syli. Alg. Alg. IV p. 318.

Fucus - Good. et Woodw. in Linn. Trans. III (1795) p. 219.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

FAM. SPONGIOCARPACEAE.

1 POLYIDES Ag. Spec. Alg. I, 2 (1822) p. 390; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 431.

1 P. rotundus (Gmel.) Grev. Alg. Brit. (1830) p. 70 pl. 2; De Wild. loc. cit.; Kickx Fl. crypt. II p. 363.

Fucus - Gmel. Hist. Fuc. (1768) p. 110 pl. 6 fig. 6 fig. 3.

Fl. occ. : Nieuport, Blankenberghe (Kickx).

FAM. LOMENTARIACEAE.

- 1 LOMENTARIA Lyngb. Hydrophyt. Dan. (1819) p. 101; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 432.
- 1 L. kaliformis (Good. et Woodw.) Gaill. Essai Thalass. (1820); Kickx Fl. crypt. II p. 369; De Wild. loc. cit. p. 433.

Fucus - Good. et Woodw. in Linn. Trans. III (1795) p. 206 pl. 18.

Fl. occ.; Nieuport (West.).

2 L. reflexa Chauv. in Chauv. et Roberge Alg. Norm. (1826) n. 143; Kickx Fl. crypt. II p. 368.

Fl. occ.: La Panne (Kickx).

FAM. RHODOMELEACEAE.

- 1 LAURENCIA Lamour. in Ann. Mus. XX (1813) p. 130; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 433.
- 1 L. pinnatifida (Gmel.) Lamour. in Ann. Mus. XX (1813) p. 42; Kickx Fl. crypt. II p. 384; De Wild. loc. cit.

Fucus - Gmel. Syst. Nat. II (1768) p. 1385.

Fl. occ. : Blankenberghe (Kickx).

- var. Osmunda Turn.; Kickx loc. cit.; De Wild. loc. cit. p. 434.
 Fl. occ.: Nieuport (Kickx).
 - 2 POLYSIPHONIA Grev. Fl. Edinens. (1824) p. 308; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 434.
- 1 P. atro-rubescens (Dillw.) Grev. Fl. Edinens. (1824) p. 308; De

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 434.

Conferva - Dillw. Brit. Conf. (1809) pl. 70.

. Polysiphonia Agardhianum Grev.; Kicka Fl. crypt. II p. 381.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

2 P. fastigiata (Roth) Grev. Fl. Edinens. (1824) p. 308; De Wild. loc. cit. p. 435; Kickx Fl. crypt. II p. 381.

Ceramium - Roth Tent. Fl. Germ. III (1793)'p. 463.

Fl. occ.: Sur Ozothallia (Kickx).

3 P. fibrata Harv. Man. Brit. Alg. (1841) p. 93; Kicke Fl. crypt. II p. 579; De Wild. loc. cit. p. 435.

Fl. occ.: Ostende (West.), Blankenberghe (Kickx).

4 P. insidiosa Crouan Alg. mar. Finist. (1852) n. 293 et Florule du Finistère (1867) p. 156; Kickx Fl. crypt. II p. 378; De Wild. loc. cit. p. 435.

P. havanensis var. — J. Ag. Spec. gen. et ord. II pars 3 (1863) p. 960. Fl. occ.: Ostende (Kickx).

5 P. nigrescens (Dillw.) Grev. ex Kuetz. Phyc. gener. (1843) pl. 50 fig. IV; Kickx Fl. crypt. II p. 380; De Wild. loc. cit. p. 436.

Conferva - Dillw. Brit. Conf. (1809) n. 155.

Polysiphonia dichocephala Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 812; Kickv Fl. crypt. II p. 381; De Wild. loc. cit. p. 434.

P. violascens Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 815; Kickx loc. cit. p. 382; De Wild. loc. cit. p. 437.

Fl. occ.: Sur tout le littoral, chenal de Nieuport (Kickx).

6 P. pulvinata Kuetz. Tab. Phyc. XIII (1863) pl. 36; Kicka Fl. crypt. II p. 377; De Wild. loc. cit. p. 436.

Fl. occ.: Canal de Bruges à Ostende (West.).

7 P. rigidula Crouan Alg. Finist. (1852) n. 313; Kickæ Fl. crypt. II p. 380; De Wild. loc. cit. p. 436.

P. thuyoides Harv. in Mackay Fl. hib. (1836).

Fl. occ.: Ostende (West.).

- 8 P. stricta Grev.; Harv. Man. p. 94; De Wild. loc. cit. p. 436.
 P. urceolata var. comosa Ag. Spec. gen. et ord. Alg. II pars 3 (1863) p. 97.
 P. urceolata Grev. Fl. Edinens. (1824) p. 309; Kickw Fl. crypt. II p. 378.
 Fl. occ.: Nieuport (Kickx).
 - var. patens Hook.; Kicka Fl. crypt. II p. 378; De Wild. loc. cit. p. 437.

Fl. occ.: Nieuport, Ostende (Kickx).

9 P. subulata Crouan Alg. Finist. (1852) n. 298; Kicke Fl. crypt. II p. 380; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 437.

P. violacea var. robusta Ag. Gen. spec. et ord. Alg. II pars 3 (1863) p. 988. Fl. occ.: Sur d'autres Algues (Kickx).

10 P. violacea (Roth) Grev.; Harv. Man. p. 92; Kickx Fl. crypt. II p. 379; De Wild. loc. cit. p. 437.

Ceramium - Roth Cat. bot. (1797) p. 150.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

— var. fibrillosa Aresch.; Kickw. Fl. crypt. II p. 379; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: La Panne (Kickx).

- 3 BOSTRYCHIA Mont. Hist. Cub. Pl. cell. (1842) p. 39;
 De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 438.
- 1 B. scorpioides Mont. loc. cit. (1842); Kickv. Fl. crypt. II p. 382; De Wild. loc. cit.

Fl. occ.: Nieuport (West.).

- 4 VIDALIA Lamour. in Dict. class. V (1826?) p. 387; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 438.
- 1 V. volubilis (L.) Ag. Spec. Alg. II (1828) p. 1121; De Wild. loc. cit.

Fucus - L. Syst. Nat. ed. X (1759) p. 1344.

Fl. occ.: Ostende (West.).

- 5 DASYA Ag. Spec. Alg. II 1 (1828) p. 116; De Wild. Fl. Alg. Belg. 439.
- 1 D. coccinea (*Huds.*) Ag. Spec. Alg. II (1828) p. 119; De Wild. loc. cit.

Conferva — Huds. Fl. Angl. (1732) p. 603.

Trichothamnion — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 800, Kickw Fl. crypt. II p. 382.

Fl. occ. : Nienport, Ostende (West.).

FAM. CORALLINACEAE.

- 1 MELOBESIA Lamour. Polyp. flex. (1816) p. 315; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 440.
- 1 M. membranacea Lamour. Polyp. flex. (1816) p. 315; De Wild. loc. cit.; Kicka. Fl. crypt. II p. 364.

Corallina — Esper Zooph. pl. 12 fig. 1-4.

Fl. occ. : Ostende (West.).

- 2 CORALLINA Lamour. Polyp. flex. (1816) p. 275; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 440.
- C. officinalis L. Fl. Suec. (1745)? n. 2234; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 440; Kickx Fl. crypt. II p. 369.

Fl. occ.: C. sur nos côtes (Kickx).

var. procumbens Ell.; Kicka Fl. crypt. II p. 369; De Wild. loc. cit. p. 441.

Fl. occ.: Rare sur nos côtes (Kickx).

- 2 C. rubens L. Syst. Nat. ed. 12, I (1785) p. 1304; De Wild. loc. cit. p. 441.
 - Jania Lamour. Polyp. flex. (1816) p 272; Kickx Fl. crypt. II p. 370. Fl. occ.: Entre Heyst et Knocke (Kickx).
 - var. corniculata (L.) Hanck Meeres Alg. (1885) p. 279;
 De Wild, loc. cit.

Jania — Lamour. Polyp. flex. (1816) p. 274; Kickw Fl. crypt. II p. 370. Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

4 C. virgata Zanard. Sagg. class. Ficee (1843) p. 42; De Wild. loc. cit. p. 442.

Corallina granifera Aresch. in J. Ag. Spec. Alg. II (1863) p. 569; Kicker Fl. crypt. II p. 370.

F1. occ. : Ostende (Kickx).

GENUS DUBIUM.

- 1 GONIOTRICHUM Kuetz. in Linnaea XVII (1843) p. 89; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 468.
- 1 G. ceramicola Kuetz. Tab. phyc. III (1851) p. 7; Kicka Fl. crypt. II p. 416; De Wild. loc. cit.

FI. occ.: Ostende (West.).

MYCETES.

PHYCOMYCETES.

Oomycetineae.

FAM. PERONOSPORACEAE.

1 CYSTOPUS Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 371;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 233.

1 C. candidus (Pers.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 371; Sacc. Syll. Fung. VII p. 234; Kicker Fl. crypt. II p. 71; Lamb. Fl. myc. II p. 103; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Uredo — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 223.

Caeoma — Nees Syst. d. Pilze (1816) p. 6.

Uredo cubica Martius Prodr. Fl. Mosq. (1812) p. 228.

Uredo cruciferarum DC. Fl. fr. II (1805) p. 596.

Fl. occ.: dunes (Kickx), Ostende (Magnus), C. (Él. M.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael, Uccle (Bm. et R.), Louvain, Wilsele, Blanden (Paque), C. en Brabant (Él. M., P. Nypels). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), C. (Él. M., P. Nypels). — A.: Turnhout (Paque). — Lg.: env. de Visé et de Liége (Nypels). — Lx.: Commun (Él. M.).

2 C. Lepigoni De Bary in Rabenh. Fungi Eur. n. 483 et in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 132; Kickx Fl. crypt. II p. 72; Sacc. Syll. Fung. VII p. 236); Lamb. Fl. myc. II p. 104.

Fl. occ. : Ostende, Nieuport (Kickx).

3 C. Portulacae (DC.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 371; Sacc. Syll. Fung. VII p. 235; Kickx Fl. crypt. II p. 71; Lamb. Fl. myc. II p. 102; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Uredo — DO. Fl. fr. II (1805) ?

Bt: Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — A.: Turnhout, Moll (Paque). — Lx.: Arlon (Paque). — Lg.: Liége (Gravis).

4 C. spinulosus De Bary in Rabenh. Fungi Eur. n. 479 et in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 133; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.

Brux. p. 244; Lamb. Fl. myc. II p. 104; Sacc. Syll. Fung. VII p. 235. Bt: Watermael (Bm. et R.).

5 C. Tragopogonis (Pers.) Schroet. in Cohn Krypt. Fl. v. Schles. III, 1 (1889) p. 234; Sacc. Syll. Fung. VII p. 234.

Uredo Tragopogi Pers. Syn. Fung. (1801) p. 223.

Cystopus cubicus De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 132; Kickv Fl. crypt. II p. 71; Lamb. Fl. myc. II p. 102; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Uredo — Strauss in Ann. Wetter. Gesell. f. Naturk. II (1810) p. 86 t. 2. f. 3. Uredo — var. Pyrethri Bell. in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 73.

Fl. or.: Denderleeuw, Gand (Staes). — A.: Lierre, Weelde-Merxplas, Moll (Staes). — Bt: Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Jardin bot. de Bruxelles, Boitsfort (Él. M.). — Lg.: Liége (Gravis), Goé (Él. M.). — N.: Namur (Bell.), Humerenne (P. Nypels), Gembloux (Él. M.). — Lx.: Ebly (Él. M.).

- 2 PHYTOPHTHORA De Bary in Journ. Agric. Soc. ser. 2 t. XII (1876) p. 1; Sacc. Syll. Fung. VII p. 237.
- 1 P. infestans (Mont.) De Bary in Journ. Agric. Soc. ser. 2 t. XII (1876) p. 1; Sacc. Syll. Fung. VII p. 237; Lamb. Fl. myc. II p. 100. Peronospora De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 104 t. 20; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Peronospora devastatrix Casp. Monatsb. Berl. Ak. (1855); Kickx Fl. crypt. II p. 292.

Botrytis Solani Hart. Malad. pommes de terre, Amsterdam (1846).

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Louvain, Tervueren (Paque), Gentinnes (de Limm.). — A.: Turnhout (Paque). — Lg.: env. de Liége (Nypels). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 3 PLASMOPARA Schroet. in Cohn Krypt. Fl. v. Schles. Bd III, 1 (1889) p. 236; Sacc. Syll. Fung. VII p. 239.
- 1 P. densa (Rabenh.) Schroet. in Cohn Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 239; Sacc. Syll. Fung. VII p. 243; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Peronospora — Rabenh. Herb. myc. I n. 1572.

Bt: Vilvorde, La Hulpe, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

2 P. nivea (Unger) Schroet. in Cohn. Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 237; Sacc. Syll. Fung. VII p. 240.

Botrytis — Unger Exanth. d. Pflanzen (1833) p. 172 t. II f. 14.

Peronospora Umbelliferarum Casp. in Monatsb. Berl. Ak. (1855); Kickx Fl. crypt. II p. 292.

Peronospora - var. Berkeleyi Ces. (Ubi?).

Botrytis macrospora Unger Exanth. d. Pflanzen (1833).

Ht: Familleureux (Aub.). — Bt: Ottignies (Él. M.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Blankenberghe (West.).

3 P. pusilla (De Bary) Schroet. in Cohn. Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 237; Sacc. Syll. Fung. VII p. 241; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 222.

Peronospora — De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 106. Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 P. pygmaea (Ung.) Schroet. in Cohn. Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 239; Sacc. Syll. Fung. VII p. 240.

Peronospora — Ung. in Bot. Zeit. (1847) t. VI fig. 8; Kickx Fl. crypt. II p. 292; Lamb. Fl. myc. II p. 96; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 222.

Bi: Groenendael (Bm. et R.). — Lx.: Ebly (Él. M.). — Fl. or.: env. de Termonde (West.).

5 P. viticola (Berk. et Curt.) Berl. et De-Toni in Sacc. Syll. Fung. VII (1888) p. 239.

Botrytis - Berk. et Curt. ex Casp. in Monatsb. Berl. Ak. (1855).

Peronospora — De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 125;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. de Brux. p. 224.

Ht: Hornu (Ém. M.). — A.: Esschen (Staes). — Bt: Watermael (Bm. et R.), Grez-Doiceau (P. Nypels), Vilvorde, Perck, Gouy-lez-Piéton (Laurent), St Josse-ten-Noode (Él. M.). — Lg.: Huy (Cluysenaer), Stavelot (Nypels). — Fl. or.: Gand, Gendbrugge, Stablo (Staes).

- 4 BREMIA Regel in Bot. Zeit. (1843) p. 665; Sacc. Syll. Fung. VII p. 243.
- 1 B. Lactucae Regel in Bot. Zeit. (1843) p. 665; Sacc. Syll. Fung. VII p. 244.

Peronospora nivea Ung. p. p. in Bot. Zeit. (1847) p. 313; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Bruxelles p. 222; Lamb. Fl. myc. II p. 99.

Peronospora gangliformis Tul. Comptes rendus XXXVIII (1854); Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 22; Lamb. Fl. myc. II p. 92.

Peronospora stellata Delacre ex Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 65; Kickx Fl. crypt. II p. 291.

Bt: Groenendael, Watermael (Bm. et R.), env. de Bruxelles C. (Él. M.). — N.: Institut agricole de Gembloux (Él. M.), Rienne, Louette St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: env. de Gand (*Kichx*), env. de Termonde (West.). — Lx.: Laroche Ebly (Él. M.). — Lg.: Spa (Él. M.).

- 5 PERONOSPORA Corda Icon. Fung. I (1837) p. 20; Sacc. Syll. Fung. VII p. 244.
- 1 P. Alsinearum Casp. in Berl. Ak. d. Wissensch. (1855); Kickz Fl. crypt. II p. 291; Sacc. Syll. Fung. VII p. 246; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223; Lamb. Fl. myc. II p. 94.

Fl. occ.: Coxyde (Bm. et R.). — Fl. or.: env. de Termonde (Weşt.), env. de Gand (Kickx). — Bt: Watermael (Bm. et R.), Uccle (P. Nypels). — Lx.: Hatrival (Él. M.).

- 2 P. alta Fuck. Fung. Rhen. 39 et Symb. myc. (1869) p. 71; Sacc. Syll. Fung. VII p. 262; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223. Bt: env. de Bruxelles A O. (Bm. et R.). Ht: Ath (Él. M.). N.: Yvoir C. (Él. M.). Fl. or.: Ste-Anne (P. Nypels).
- 3 P. arborescens (Berk.) De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 119; Sacc. Syll. Fung. VII p. 251; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223; Lamb. Fl. myc. II p. 98.

 Botrytis Berk. Journ. Hort. Soc. Lond. I (1846) p. 31 t. 4 f. 24.

Ht: Deux-Acren (P. Nypels). - Bt: Linkebeek, Watermael (Bm. et R.). - Lx.: L'église (Él. M.).

4 P. arenariae (Berk.) Tul. Comptes Rend. Ac. Sc. XXXVIII (1854); Sacc. Syll. Fung. VII p. 347; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223; Lamb. Fl. myc. II p. 95. Botrytis — Berk. Journ. Hort. Soc. Lond. I (1846) p. 31 t. 4.

Lb.: Beverloo (West.). - Bt: Uccle (Bm. et R.).

- 5 P. calotheca De Bary in Rabenh. Herb. myc. ed. 2, 673; Sacc. Syll. Fung. VII p. 245; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223. Bt: Mont-St-Guibert, Woluwe (Bm. et R.). Lx.: Env. d'Arlon (Nypels), Poix (Bm. et R.).
- 6 P. candida Fuck. Fung. Rhen. 38; Sacc. Syll. Fung. VII p. 258; Lamb. Fl. myc, II p. 98; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223.

Bt: Boitsfort, Watermael, Groenendael (Bm. et R.).

7 P. conglomeratus Fuck. Fung. Rhen. n. 25 et Symb. myc. (1869) p. 68; Sacc. Syll. Fung. VII p. 252; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223.

Bt: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

- 8 P. Corydalis De Bary in Hedw. (1864) p. 134; Sacc. Syll. Fung.
 VII p. 250.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- P. crispula Fuckl. Fungi Rhen. 22 et Symb. myc. (1869) p. 67;
 Sacc. Syll. Fung. VIII p. 250.
 Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.).
- 10 P. Dianthi De Bary in Hedw. (1864) p. 136; Sacc. Syll. Fung. VII p. 247.
 Lx.: Ebly (Él. M.).
- 11 P. Dipsaci De Bary in Hedw. (1864) p. 137; Sacc. Syll. Fung. VII p. 259.

N.: Montaigle (Bm. et R.).

12 P. effusa (Grev.) Rabenh. Herb. myc. (1880); Kickx Fl. crypt. II p. 290; Sacc. Syll. Fung. VII p. 256; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223; Lamb. Fl. myc. II p. 94.

Botrytis — Grev. Fl. Edin. (1824) p. 468.

- Bt: Watermael (Bm. et R.), env. de Bruxelles C. (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Villers-la-Ville (Paque). N.: Willerzie (Aub.). Lx.: env. de Neufchateau C. (Él. M.), Ebly (Él. M.).
- 13 P. Ficariae Iul. Compt. rend. (26 Janv. 1854); Sacc. Syll. Fung. VII p. 251; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 222.
 - Bt: Bois de la Cambre (P. Nypels), Hoeylaert, Watermael (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). Lx.: Ebly (Él. M.). Lg.: env. de Huy (Mansion).
- 14 P. grisea (Ung.) De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 119 t. 13 f. 12; Sacc. Syll. Fung. VII p. 255; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223; Lamb. Fl. myc. II p. 97.

 Rt: Greenendeel (Bm. et B.) Elewyt. Schaerbeek (Él. M.) Ix: Poix

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Elewyt, Schaerbeek (El. M.). — Lx.: Poix (El. M.).

- 15 P. leptosperma De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 121; Sacc. Syll. Fung. VII p. 254.
 Lx.: Champlon (Laroche) (Él. M.), Auby (Bm. et R.). Lg.: Poulseur (Bm. et R.).
- 16 P. Myositidis De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 112; Sacc. Syll. Fung. VII p. 245; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Bt: Hoeylaert (Bm. et R.). — Lx.: Poix (Bm. et R.).

17 P. parasitica (Pers.) De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 110; Kickx Fl. crypt. II p. 291; Sacc. Syll. Fung. VII p. 249; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223; Lamb. Fl. myc. II p. 95.

Botrytis — Pers. Obs. I (1796) p. 96 t. 5 f. 6. Botrytis — var. Brassicae Desm. (Ubi?).

- Bt: Villers, Watermael (Bm. et R.), Waterloo, Uccle, Jardin bot. de Bruxelles (P. Nypels), Wilsele (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). N.: env. de Namur (Bell.), Gembloux (Ém. M.). Lg.: env. de Visé et de Liége, Francorchamps (P. Nypels). Fl. occ.: Courtrai (West.). Lx.: Laroche, Ebly (Él. M.).
- 18 P. pulveracea Fuck. Symb. myc. (1869) p. 67; Sacc. Syll. Fung. VII p. 261.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 19 P. Potentillae De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 124;
 Sacc. Syll. Fung. VIII p. 253; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.
 Brux. p. 223.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). - Lx.: Ebly (Él. M.).

20 P. Radii De Bary in Hedw. (1864) p. 138; Sacc. Syll. Fung., VII p. 254; Lamb. Fl. myc. II p. 92.

Peronospora violagea Lév.; Kicka Fl. crypt. II p. 290.

- Fl. or.: env. d'Audenarde (West.). Bt: Groenendael (Bm. et R.). Lx.: Herbeumont (Bm. et R.).
- 21 P. Rumicis Corda Icon. I (1837) p. 20 t. 5 f. 273; Sacc. Syll. Fung. VII p. 262.
 N.: Willerzie (Aub.).
- 22 P. Schachtii Fuck. Symb. myc. (1869) p. 71; Sacc. Syll. Fung. VII p. 262.
 Lg.: Hesbaye (Ém. M.). Ht: Fleurus (Ém. M.).
- 23 P. Schleideni Unger in Bot. Zeit. (1847) p. 315; De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) pl. XIII fig. 1-3; Lamb. Fl. myc. II p. 98.
 Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Evere (Él. M.).
- 24 P. Scleranthi Rabenh. in Klotzsch Herb. myc. n. 1471; Sacc. Syll. Fung. VII p. 263.
 Lx.: Auby (Bm. et R.).
- 25 P. sordida Berk. in Ann. Mag. nat. Hist. ser. 3 t. VIII (1861) p. 449; Sacc. Syll. Fung. VII p. 263; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 224; Lamb. Fl. myc. II p. 98.
 Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 26 P. Trifoliorum De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 117; Sacc. Syll. Fung. VII p. 252; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223; Lamb. Fl. myc. II p. 97.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Ixelles, Watermael, Uccle (P. Nypels). — N.: Malonne (P. Nypels), env. de Gembloux (Ém. M.), Lonzée (Él. M.). — Lx.: Ebly, Laroche (Él. M.).

- 27 P. Urticae (Lib.) De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 116; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223; Sacc. Syll. Fung. VII p. 257; Lamb. Fl. myc. II p. 97. Botrytis Lib. apud Berk. Journ. Hort. Soc. Lond. I (1846) p. 31.
 - Bi: Boitsfort (Bm. et R.), Malaise (Él. M.). N.: Arbre (Él. M.).
- 28 P. Viciae (Berk.) De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 112; Sacc. Syll. Fung. VII p. 245; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 223; Lamb. Fl. myc. II p. 96.

Botrytis - Berk. in Journ. Hort. Soc. Lond. I (1846) p. 31.

Bt: Watermael, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Malaïse, Uccle (Él. M.). — Lx.: Ebly (Él. M.).

29 P. violacea Berk. Outl. of Brit. Fungol. (1860) p. 349; Sacc. Syll. Fung. p. 349.

Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.). — N.: Marche-les-Dames (Bm. et R.). — Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.).

30 P. Violae De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 125; Sacc. Syll. Fung. VII p. 252. Lx.: Ebly (Él. M.).

FAM. SAPROLEGNIACEAE.

- 1 LEPTOMITUS Ag. Syst. Alg. (1824) p. 48; Sacc. Syll. Fung. VII p. 265.
- I. L. brachynema Hildebr. in Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd V (1867) p. 261 t. XVI fig. 12-23; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 228; Sacc. Syll. Fung. VII p. 265.
 Bt: Bruxelles (Bm. et R.).
 - 2 SAPROLEGNIA Necs in Nov. Act. Leop. XI, 2 (1823) p. 513; Sacc. Syll. Fung. VII p. 268.
- S. ferax (Gruith.) Thur. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 230; Sacc. Syll. Fung. VII p. 269; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 227.

Conferva - Gruith. in Nova Acta (1821).

Saprolegnia Thureti De Bary in Abhandl. Senck. naturf. Gesell. XII (1881) p. 102.

Bt: Jardin botanique de Bruxelles (L. Errera), Boitsfort (Él. M.), Bruxelles (Bm. et R.). — A.: Turnhout (Él. M.).

- 3 PYTHIUM Pringsh. in Monatsber. Berl. Ak. (1857) p. 318; Sacc. Syll. Fung. VII p. 270.
- Fung. VII p. 271; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 226. Bt: Bruxelles (Bm. et R.).
- 2 P. gracile Schenk in Verhandl. der phys. med. Ges. Wurzburg IX (1859) p. 1 t. I fig. 1-26; Sacc. Syll. Fung. VII p. 272. Nematosporangium Schroet. in. Engl. et Prantl. Naturl. Pflanzenfam. I, 1 (1893) p. 104.
 Bt: Sichem (Nob.).

- 4 DICTYUCHUS Leitg. in Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd VII (1870) p. 357; Sacc. Syll. Fung. VII p. 273.
- 1 D. Magnusii Lindstedt Syn. Saprol. (1872) p. 7 t. I fig. 1-8, t. II fig. 1-8; Sacc. Syll. Fung. VII p. 273.
 Bt: Molenbeek (Bm. et R.).
 - 5 ACHLYA Nees in Nova Acta Ac. Leop. t. XI, 2 (1823) p. 514;
 Sacc. Syll. Fung. VII p. 274.
- 1 A. prolifera Nees; De Bary in Bot. Zeit. (1852) t. VII fig. 1-28. Bt: St-Job (Él. M.).
- 2 A. racemosa Hildebr. in Pringsh. Jahrb. Bd IX (1873) p. 205; Sacc. Syll. Fung. VII p. 275; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 227.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.), St-Job, Neder-over-Heembeek (Él. M.).

- 6 APHANOMYCES De Bary in Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd II (1860) p. 170; Sacc. Syll. Fung. VII p. 276.
- 1 A. phycophilus De Bary in Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd II (1860) p. 79; Sacc. Syll. Fung. VII p. 276; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 228.

Bt: Boitsfort (L. Errera).

FAM. ENTOMOPHTHORACEAE.

- 1 EMPUSA Cohn in Hedw. (1855) p. 57; Sacc. Syll. Fung. VII p. 281.
- 1 E. Culicis (Braun) Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. Bd. I (1884) p. 77; Sacc. Syll. Fung. VII p. 281. Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 2 E. Muscae (Fres.) Cohn in Nov. Acta Ac. Leop. t. XXV, I (1850?) p. 317; Kickx Fl. crypt. II p. 315; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 229; Sacc. Syll. Fung. VII p. 281.
 - Bt: Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). Fl. occ.: Courtrai (West.). Fl. or.: Termonde (West.).
 - 2 COMPLETORIA Lohde in Tageblatt Naturf. Breslau (1878); Sacc. Syll. Fung. VII p. 286.
- 1 C. complens Lohde loc. cit. (1878); Sacc. Syll. Fung. VII p. 286. Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Errera).

Zygomycetineae.

FAM. MUCORACEAE.

SUBFAM. PILOBOLEAE.

- 1 PILOBOLUS Tode Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 41; Sacc. Syll. Fung. VII p. 184.
- 1 P. crystallinus (Wigg.) Tode Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 41; Kickx Fl. crypt. II p. 313; Sacc. Syll. Fung. VII p. 185; Romm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 215; Lamb. Fl. myc. II p. 135.

 Hydrogera Wigg. Prim. Fl. Holsat. (1780) p. 110.

Fl. occ.: dunes des env. Nieuport (Piré), Ostende (Él. M.). — Bt: Malaise, Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Boitsfort (Bm. et R.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Ht: Ath, Stambruges, Belœil (Él. M.). — N.: La Plante (Él. M.). — Lx.: Ebly (Él. M.).

- 2 P. Oedipus Mont. in Mém. Soc. Linn. de Lyon (1826) p. 1-7 f. a-1; Kickx Fl. crypt. II p. 313; Sacc. Syll. Fung. VII p. 186; Bomm. Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 215; Lamb. Fl. myc. II p. 135. P. — var. intermedia Goem.
 - Bt: Boitsfort, Etterbeek, Aerschot (Él. M.). Fl. or.: env. de Gand. (Coem.).
 - 2 PILAIRA Van Tiegh. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 51; Sacc. Syll. Fung. VII p. 188.
- 1 P. anomala (Ces.) Schroet. in Kryptfl. v. Schles. III, 1 (1889) p. 211; Sacc. Syll. Fung. VII p. 186.

Pilaira Cesatii Van Tieghem in Ann. Sc. Nat. sér. 6 t. I (1875) p. 52 pl. I fig. 14-24; Bonm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 215.

Bt : Bruxelles (L. Errera).

SUBFAM. MUCOREAE.

- 3 MUCOR Micheli Nov. Plant. Gen. (1729) p. 215; Sacc. Syll. Fung. VII p. 190.
- 1 M. acicularis Wallr. Fl. crypt. II (1833) p. 349; Sacc. Syll. Fung. VII p. 195.

Fl. or. : Jardin zool. de Gand (Él. M.).

2 M. caninus Pers. Obs. myc. I (1796) p. 96 pl. 6 fig. 3-4; Kickx Fl. crypt. II p. 310; Sacc. Syll. Fung. VII p. 191; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 216; Lamb. Fl. myc. II p. 139.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.), St-Josse-ten-Noode (Él. M.).

- 3 M. clavatus Link in Willd. Sp. plant. I (1824) p. 92; Sacc. Syll. Fung. VII p. 193

 Bt: Louvain (Paque).
 - var. globifer (Link) Sacc. Syll. Fung. VII (1888) p. 193.
 Mucor globifer Link in Willd. Sp. plant. I (1824) p. 92.
 Bt: Louvain (Paque).
- 4 M. delicatulus Berk. Engl. Fl. V (1826) p. 332; Sacc. Syll. Fung. VII p. 199; Lamb. Fl. myc. II p. 140; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 216.
 Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 5 M. fimetarius Link Obs. I (1809) p. 20; Sacc. Syll. Fung. VII p. 199. Hydrophora — Fries Syst. myc. (1829) p. 313; Kickx Fl. crypt. II p. 312; Lamb. Fl. myc. II p. 142.
- 6 M. Juglandis Link Obs. I (1809) p. 18; Kickx Fl. crypt. II p. 311; Sacc. Syll. Fung. VII p. 199; Lamb. Fl. myc. II p. 141. Bt: Louvain (Paque).
- 7 M. Mucedo L. Spec. Plant. II (1762) 1655; Kickw Fl. crypt. II p. 310; Sacc. Syll. Fung. VII p. 191; Bomm. et Rouss. Fl. myc. Brux. p. 216; Lamb. Fl. myc. II p. 139.
 - A.: Turnhout (Paque). Lx.: C. (Él. M.). Bi: Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (Él. M.).
- 8 M. pygmaeus Link in Willd. Spec. I (1824) p. 83; Sacc. Syll Fung. VII p. 200; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 216. Bt: Bruxelles (Bm. et R.).
- 9 M. racemosus Fres. Beitr. Myk. (1850) p. 12 t. I fig. 24-31; Kickw Fl. crypt. II p. 311; Sacc. Syll. Fung. VII p. 193; Lamb. Fl. myc. II p. 140.
 Lg.: Liége (Nypels). Bt: C. (Él. M.). Lx.: C. (Él. M.).
- 10 M. stercoreus (Tode) Link in Willd. Spec. I (1824) p. 90; Sacc. Syll. Fung. VII p. 191; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 216.
 - Hydrophora Tode Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 6; Kicke Fl. crypt. II p. 312; Lamb. Fl. myc. II p. 143.
- 11 M. tenuis Link Spec. plant. I (1824) p. 86; Sacc. Syll. Fung. VII p. 197.

Mucor Mucedo var. tenuis Fries Syst. Myc. III (1829) p. 320; Kicke Fl. erypt. II p. 310.

Belgique (Coem.). - Lx.: Poix (Él. M.).

- 4 PHYCOMYCES Kunze in Kunze et Schmidt Myk, Hefte II (1823) p. 113; Sacc. Syll. Fung. VII p. 204.
- 1 P. nitens (Ag.) Kunze in Kunze et Schmidt Myk. Hefte II (1823) p. 113; Kickv Fl. crypt. II p. 309; Sacc. Syll. Fung. VII p. 205; Lamb. Fl. myc. II p. 138.

Ulva - Ag. Syn. Alg. Scand. (1817) p. 46.

Bt: env. de Bruxelles (Errera, De Wèvre). — Fl. or.: Gand (Van Bambeke). — Lx.: Laroche (Él. M.). — A.: Anvers (West.).

- 5 SPINELLUS Van Tiegh. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 66; Sacc. Syll. Fung. VII p. 205.
- 1 S. fusiger (Link) Van Tiegh. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 66 t. I fig. 29-37; Sacc. Syll. Fung. VII p. 206; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 216.

Mucor — Link Spec. Plant. I (1824) p. 93; Lamb. Fl. myc. II p. 140. Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 6 SPORODINIA Link Spec. Plant. I (1824) p. 94; Sacc. Syll. Fung VII p. 206.
- 1 S. Aspergillus (Scop.) Schroet. in Cohn Krypt. Fl. v. Schles. III, 1 (1889) p. 209; Sacc. Syll. Fung. VII p. 207.

Mucor — Scop. Fl. Carn. ed. II (1772) p. 494.

Sporodiuia grandis Link Spec. plant. I (1824) p. 94; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 217.

Mucor ramosus Bull. Herb. Fr. (1789) t. 480; Kickx Fl. crypt. II p. 141. Sporodinia dichotoma Corda Icon. I (1837) f. 184.

Hydrophora tenella *Tode* Fungi Meckl. sel. II (1791) p. 6; *Kickv* Fl. crypt. II p. 312; *Lamb*. Fl. myc. II p. 142.

Mucor - Schum. Saell. II (1803) 237.

Bt.: Bois de la Cambre, Boitsfort (Bm. et R.). — Lx.: Laroche (Él. M.). — Fl. or.: St-Amand (Kickx).

- 7 CHAETOSTYLUM Van Tiegh. et Le Monnier in Ann. Sc. nat. sér. 5. t. XVII (1873) p. 328; Sacc. Syll. Fung. 208.
- C. Freseni Van Tiegh. et Le Monnier in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 338 t. 23 f. 61-62; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 219; Sacc. Syll. Fung. VII p. 208.
 St. Evere (Él. M.). Lx.: Poix (Él. M.).
 - 8 THAMNIDIUM Link Obs. Plant. I (1809) p. 31; Sacc. Syll. Fung. VII, p. 211.
- 1 T. elegans Link Obs. Plant. I (1809) p. 45 t, II f. 45; Sacc. Syll.

Fung. VII p. 211; Bomm et Rouss. env. Brux. p. 218; Lamb. Fl. myc. II p. 146.

Ascophora — Corda Icon. III (1839) fig. 43; Kickx. Fl. crypt. II p. 308. Bt: Bruxelles, Malaise (Él. M.). — Lx.: Ebly (Él. M.). — A.: Turnhout (P. Nypels).

- 9 RH1ZOPUS Ehrenb. in Nova Acta Ac. Leop. X (1821) p. 198; Sacc. Syll. Fung. VII p. 212.
- R. microsporus Van Tiegh. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. 1 (1875) p. 83
 t. 2 fig. 46-48.

N.: Waulsort (Él. M.).

2 R. nigricans Ehrenb. in Nova Acta Ac. nat. Cur. X (1821) p. 198 t. II; Kickx Fl. crypt. II q. 310; Sacc. Syll. Fung. VII p. 212; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 217; Lamb. Fl. myc. II p. 137.

Mucor stolonifer Ehr. Sylvae Mycol. Berol. (1818) p. 25.

Ascophora Mucedo Tode Fungi Meckl. sel. II (1791); Kichv. Fl. crypt. II p. 308.

Sporotrichum fenestrale Link; Kickx Fl. crypt. II p. 285; Lamb. Fl. myc. III p. 238; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Bruxelles. p. 274.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Paque.), Gentinnes (de Limm.). — N.: Namur (Bell.). — A.: Mall, Turnhout (Paque). — Ht: Belœil (Él. M.). — Lx.: Ebly (Él. M.).

SUBFAM. CHAETOCLADIAEAE.

- 10 CHAETOCLADIUM Fres. Beitr. z. Myk. III (1863); Sacc. Syll. Fung. VII p. 220.
- C. Brefeldii Van Tiegh. et Le Monnier in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 342 t. 342 t. 23 fig. 71-79.
 N.: Gembloux (Ém. M.).
- 2 C. Jonesii (Berk. et Br.) Fres. Beitr. z. Mykol. III (1863) p. 97; Sacc. Syll. Fung. VII p. 220; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 229.

Botrytis — Berk. et Broom. in Ann. and Magaz. of Nat. Hist. 760 t. 15 f. 12. Bt: Bruxelles (L. Errera, Él. M.), Evere (Él. M.).

SUBFAM. MORTIERELLAEAE.

- 11 MORTIERELLA Coem. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XV (1863) p. 536; Sacc. Syll. Fung. VII p. 220.
- 1 M. apiculata El. March. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 135.

Lx: : env. de Neufchateau (Él. M.).

2 M. Bainieri Constantin in Bull. Soc. myc. franc. t. IV (1888) p. 151 pl. XXII fig. 7-10.

Lx.: Libramont (Él. M.).

- 3 M. capitata Él. March. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 134.

 Lb.: Bockryk (Él. M.).
- 4 M. polycephala Coem. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XV part. 1 (1863) p. 536; Kickæ Fl. crypt. II p. 312; Sacc. Syll. Fung. VII p. 222; Lamb. Fl. myc. II p. 147.
 - Bt: Evere, Boitsfort (Él. M.). Lx.: Ebly (Él. M.). Fl. or.: Melle, Meirelbeke (Coemans).
- M. strangulata Van Tiegh. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. 1 (1875) p. 102
 t. 2 fig. 70-76; Sacc. Syll. Fung VII p. 221.
 - minima Él. Marchal var. nov.

Sporangium minutum, obovoideum, 30-85 μ diam. Sporis irregularibus 4-6 μ diam.

Hab. - In fimo avis. - Lx.: Libramont (Serpont) (Él. M.).

SUBFAM. SYNCEPHALIDEAE.

- 12 PIPTOCEPHALIS De Bary et Woron. in Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges. V, 7 (1866); Sacc. Syll. Fung. VII p. 225.
- 1 P. Fresiana De Bary et Woron. loc. cit. (1866); Sacc. Syll. Fung. VII p. 226; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 220. Lx.: Poix (Él. M.).
- 2 P. fusispora Van Tiegh. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. 1 (1875) p. 146 t. 4 fig. 137-145.
 - var. lepidula Él. March. in Bull. Soc. roy. de bot. do Belg.
 t. XXX portr. II (1892) p. 135.
 Fl. or.: Jardin zool. de Gand (Él. M.).
 - 13 SYNCEPHALIS Van Tiegh. et Le Monnier in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 372; Sacc. Syll. Fung. VII p. 227;
- 1 S. asymmetrica Van Tiegh. et Le Monnier in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 375 t. 15 fig. 120-121; Sacc. Syll. Fung. VII p. 230.
 - Syncephalis var. miner *Schroet*. in Krypt. Flora v. Schles. III, 1 (1889) p. 216; *El. March*. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 138.
 - Fl. or.: Jardin zool. de Gand (Él. M.).

- 2 S. cordata Van Tiegh. et Le Monnier in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 374 t. 25 fig. 112-119; Sacc. Syll. Fung. VII p. 230. Fl. or.: Jardin zoolog. de Gand (Él. M.).
- 3 S. minima Van Tiegh. et Le Monnier in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 376 t. 25 fig. 126-128; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 221; Sacc. Syll. Fung. VII p. 230.

 Bt: Bruxelles (L. Errera).
- 4 S. nodosa Van Tiegh. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 131 t. III fig. 123-131; Sacc. Syll. Fung. VII p. 231; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 221.

Bt: Bruxelles (L. Errera).

- 14 SYNCEPHALASTRUM Schroet. in Cohn Krypt. Fl. v. Schles. III, 1 (1889) p. 217; Sacc. Syll. Fung. VII p. 232.
- 1 S. elegans *Em. March.* in Bull. Soc. belge de microsc. t. XVIII (1892) p. 132.

Bt: Institut botanique de Bruxelles (J. Massart).

Chytridineae.

MYXOCHYTRIDINEAE.

FAM. OLPIDIACEAE.

- 1 LATROSTIUM Zopf in Beitr. z. Phys. und Morph. nied. Organis. Heft IV (1894) p. 43-68.
- 1 L. comprimens Zopf loc. cit. pl. III fig. 15-19.

 Bt: env. de Bruxelles (L. Errera). Ht: Leuze (Goffart).
 - o or didition at the first at t
 - 2 OLPIDIUM Fischer in Rabenh. Krypt. Fl. Bd I Abth. IV (1892) p. 22; Sacc. Syll. Fung VII p. 310.
- 1 0. entophytum Br. in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 589; Sacc. Syll. Fung. VII p. 310; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXXV part. I (1896) p. 13.
 - O. Algarum Sorok. in Archiv. bot. du Nord de la France t. II (1889) p. 28 fig. 32 et 32bis.

Lb.: Genck (Nob.).

2 0. Brassicae (Woron.) Dang. in Ann. Sc. nat. sér. 7 t. IV (1886) p. 327; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 12.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

- 3 0. immersum Sorok. in Archiv. bot. du Nord de la France t. II (1889) p. 29 f. 34; Sacc. Syll. Fung. IX p. 361; De Wild. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 14. Lg.: Huy (Nob.).
- 4 0. Mesocarpi De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 25 pl. I fig. 13-16.

 Ht: Belœil (Nob.).
- 5 0. radicicolum De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 25 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 16.
 - O. Borzii De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 19 pl. III fig. 7-18.
 - Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).
- 6 O. Sorokinei De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 16.
 - Olpidiopsis De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t. XIV (1890) p. 22 c. fig.
 - Bt: Laeken (Nob.).
- 7 0. saccatum Sorok. in Archiv. bot. du Nord de la France t. II (1889) p. 28 fig. 33; Sacc. Syll. Fung. IX p. 361; De Wild. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 16.
 Lb.: Genck (Nob.).
 - 3 ASTEROCYSTIS De Wild. in Mém. Soc. belge de microsc. t. XVII (1893) p. 21.
- 1 A. radicis De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 21, pl. III fig. 1-6, 19 et in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXXV (1896) p. 17.
 - Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).
 - 4 OLPIDIOPSIS Cornu in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XV (1872) p. 114; Sacc. Syll. Fung. VII p. 229.
- 1 0. appendiculata De Wild. in Notarisia (1895) p. 34 et in Mém. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 29 pl. I fig. 4; 8-12. Ht: Belwil (Nob.).
- 2 0. fibrillosa De Wild. in Notarisia (1895) p. 34 et in Mém. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 27 pl. II fig. 13-14, 18-19.
 Lx.: Houffalize (J. Massart).
- 3 0. Schenkiana Zopf in Nova Acta Ac. Leop. XLVII (1889) p. 168, pl. XV fig. 1-32; Sacc. Syll. Fung. XI p. 247; De Wild. in Bull.

Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 20.

Lg.: Arbespine (Spa), Desniez (Nob.). — Bt: Lacken (Nob.), La Hulpe (Él. M.), Anderghem (Ém. M.). — Ht: Camp de Casteau, Belœil (Nob.). — Lx.: Houffalize (Massart).

4 0. Zopfii De Wild. in Notarisia (1895) p. 34 et in Mém. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 25 pl. 1 fig. 1-3, 5-7.

Lx.: Houffalize (J. Massart).

- 5 PLASMOPHAGUS De Wild, in Mém. Soc. belge de microsc. t. XIX (1895) p. 223.
- 1 P. Oedogoniorum De Wild. loc. cit. (1895) p. 224 pl. VIII et IX. N.: Moniat (Chalon).
 - 6 PLEOTRACHELUS Zopf in Nova Acta Leop. t. XLVII (1884) p. 173; Sacc. Syll. Fung. VII p. 315
- 1 P. radicis De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 23 pl. III fig. 20-25 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 21.
 Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).
 - 7 ECTROGELLA Zopf in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 175; Sacc. Syll. Fung VII p. 315.
- 1 E. Bacillariacearum Zopf loc. cit. (1884) p. 175 pl. XVI fig. 1-24; De Wild. in Bull. Soc. roy. Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 21.
 - Bt: Peuthy (Él. M.), Woluwe-St-Étienne, Jardin hot. de Bruxelles (Nob.). Lg.: Winamplanche (Nob.).

FAM. SYNCHYTRIACEAE.

- 1 SYNCHYTRIUM De Bary et Woron. in Ber. d. naturf. Gesellsch. Freiburg III (1862); Sacc. Syll. Fung. VII p. 289.
- 1 S. Anemones (DC.) Woron. in Bot. Zeit. (1868) p. 100 pl. III fig. 31-36; Sacc. Syll. Fung. VII p. 288; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 233.

Dothidea - DC. Fl. fr. VI (1815) p. 143.

- Bt: Groenendael (Bm. et R.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Lg.: env. de Spa (Nypels), Huy (Mansion). Lx.: Ebly (Él. M.).
- 2 S. anomalum Schroeter in Cohn Beitr. I (1870) p. 15 pl. 1 fig. 5-7; Sacc. Syll. Fung. VII p. 289; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 233.
 - Bt: Hoeylaert (Bm. et R.). Lg.: Huy (Mansion).

- 3 S. aureum Schroeter in Cohn Beitr. z. Biol. d. Pflanzen I (1870) p. 36 pl. III fig. 8-12; Sacc. Syll. Fung. VII p. 290; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 234.
 - Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).
- 4 S. Mercuriales (Lib.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 74; Sacc. Syll. Fung. VII p. 288.

Sphaeronema - Lib. Exsice n. 264.

Lx.: Poix, Hastière (Bm. et R.). - Lg.: Huy (Mansion).

- 5 S. Succisae De Bary et Woron. in Ber. d. Naturf. Gesellsch. Freiburg (1863) p. 25; Sacc. Syll. Fung. VII p. 291; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 28.
 Lx.: Arlon (Bm. et R.).
- 6 S. Taraxaci De Bary et Woron, in Ber. d. Naturf. Gesellsch. Freiburg III (1862) pl. I fig. 1-58, pl. II fig. 1-7; Sacc. Syll. Fung. VII p. 291; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 233; Lamb. Fl. myc. III p. 51: De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 29.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.), Tilff, Esneux (Nypels). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 2 RHIZOMYXA Borzi Rhizomyxa nuovo Ficomicete Messina (1884); Sacc. Syll. Fung. VII p. 278.
- 1 R. hypogaea Borzi Rhizomyxa nuovo Ficomicete Messina (1884) pl. I et II p. p.; De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 25 pl. II fig. 9-16; Sacc. Syll. Fung. VII p. 278; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 31.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

- 3 MICROMYCES Dang. in Le Botaniste I (1889) p. 55; Sacc. Syll. Fung. IX p. 363.
- 1 M. Zygogonii Dang. in Le Botaniste I (1889) p. 52 pl. II; Sacc. Syll. Fung. IX p. 363 et Syll. Fung. XI p. 247; De Wild. in Bull. Soc. royale de Bot. de Belg. t. XXXV partie 1 (1896) p. 32.

A.: Campine Anversoise (Nob.). — Lb.: Campine Limbourgeoise (L. Errera et Nob.).

MYCOCHYTRIDINEAE.

FAM. ANCYLISTACEAE.

- 1 MYZOCYTIUM Schenk in Verhandl. med. phys. Ges. Wurzburg VIII (1858); Sacc. Syll. Fung. VII p. 279.
- 1 M. megastomum De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t, XVII Mém. (1893) p. 56 pl. VI fig. 6-10, pl. VII fig. 19-20 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 32.
 Lg.: Ruy, Ru de Chefna, Préfayhay (Nob.).
- 2 M. proliferum Schenk; Fischer in Rabenh. Krypt. Flora ed. II Bd I Abtheil IV p. 72; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 32.

Bt: Anderghem (Ém. M.). - A.: env. de Turnhout (Él. M.).

- 2 LAGENIDIUM Schenk in Verhandl. phys. med. Ges. in Wurzburg. t. IX (1859) p. 27; Sacc. Syll. Fung. VII p. 279.
- 1 L. Closterii De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 42 pl. VI fig. 1-5 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 34. Lg.: Stoumont (Nob.).
- 2 L. ellipticum De Wild. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXI part. 2 (1892) p. 180 et in Mém. Soc. belge de microsc. t. XVII (1893) p. 8 pl. I; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 34.
 Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Nob.).
- 3 L. Rabenhorstii Zopf in Bot. Ver. Brandenburg (1878) p. 77 et in Nova Acta Ac. Leop. (1884) p. 145 t. I et II; Sacc. Syll. Fung. VII p. 279. Bt: Rouge-Cloître (Él. M.).
- 4 L. Zopfii De Wild. in Bull. Soc. belge de microsc. t. XVI (1890) p. 139 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 36.

Bt: Laeken (Nob.).

- 3 ANCYLISTES *Pfitzer* in Monatsb. d. Berl. Ak. d. Wiss. (1872) p. 379; Sacc. Syll. Fung. VII p. 280.
- 1 A. Closterii Pfitzer loc. cit. (1872) p. 379 pl. XIV fig. 1-10; Sacc. loc. cit.; De Wild. in Bull. Soc. roy de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 36.

Lb.: Genck (Nob.). - Lg: Ruy, Desniez (Nob.). - N.: Gembloux (É. Laurent)

FAM. SPOROCHYTRIACEAE.

- 1 RHIZOPHIDIUM Schenk Ueber d. vorkommen contractiler Zellen (1858).
- 1 R. acuforme (Zopf) Fischer. in Rabenh. Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 93; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 37.

Rhizidium — Zopf in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 209 pl. XXI fig. 33-44; Sacc. Syll. Fung. VII p. 298.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

2 R. fusus (Zopf) Fischer in Rabenh. Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 99; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 41.

Rhizidium — Zopf in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 199 pl. XVIII fig. 9-12; Sacc. Syll. Fung. VII p. 297.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Woluwe-St-Étienne (Nob.).

3 R. decipiens (Br.) Fischer in Rabenh. Krypt, Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 100; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 40.

Chytridium — Br. in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 383; Sacc. Syll. Fung. VII p. 307.

Lb.: Genck (Nob.).

4 R. globosum (Br.) Rabenh. Fi. Eur. Alg. III (1868) p. 280; Succ. Syll. Fung. VII p. 298.

Chytridium - Br. in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 381.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — Lg.: Nivezé (Spa) (Nob.).

5 R. irregulare (De Wild.) Fischer in Rabenh. Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) De Wild. Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 42.

Phlyctidium — De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t. XIV Mém. (1890) p. 21: Sacc. Syll. Fung. IX p. 360.

Bt: Jardin botanique, Laeken (Nob.).

6 R. Lagenula (Br.) Fischer in Rabenh. Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1894) De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 42.

Chytridium — Br. in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 391; Sacc. Syll. Fung. VII p. 365.

Bt: La Hulpe (Él. M.), Watermael (De Wèvre).

7 R. mamillatum (Br.) Fischer in Rabenh. Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1894) p. 93; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 42.

Chytridium — Br. in Monatsb. Berl. Ak. (1859) p. 381.

Phlyctidium — Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 280; Sacc. Syll. Fung. VII p. 308.

Lg.: Arbespine (Spa) (Nob.). — Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.), La Hulpe (Él. M.). — Fl. or.: Eyne (Nob.):

8 R. marinum De Wild, in Bull. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 11 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896).

Bt: Institut bot. de Bruxelles (Nob.).

9 R. rostellatum (De Wild.) Fischer in Rabenh. Krypt. Fl. ed. II Bd 1 Abth. IV (1892) p. 105; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 43.

Chytridium — De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t. XIV Mém. (1890) p. 49 c. fig.; Sacc. Syll. Fung. IX p. 259.

Bi: Jardin botanique de Bruxelles (Nob.).

10 R. sphaerocarpum (Zopf) Fischer in Rabenh. Krypt. Fl. ed. II Bd. I Abth. IV (1892) p. 95; De Wild. in Mém. Soc. belge de microsc. t. XVII (1893) p. 61 pl. VI fig. 13 pl. VII fig. 18.

Rhizidium — Zopf in Nova Acta Ac. Leop. XLVII (1884) p. 202 pl. XIX fig. 16-27; Sacc. Syll. Fung. VII p. 297.

Bt: Penthy (Él. M.). — Lg.: env. de Spa (Nob.).

11 R. subangulosum (Br.) Rabenh. Flor. Eur. Alg. III (1868) p. 201; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1896) p. 45.

Chytridium — Br. in Abhandl. Berl. Ak. (1855) p. 44 pl. III fig. 27-31.

Bt: Laeken (Nob.).

12 R. transversum (Br.) Rabenh. Flor. Eur. Alg. III (1868) p. 281;

De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I. (1896) p. 45.

Chytridium — Br. in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 382; Sacc. Syll. Fung. VII p. 305.

Bt.: Jardin Bot. de Bruxelles (Nob.).

- 2 PHLYCTOCHYTRIUM Schroeter in Engl. et Prantl Pflanzenfam. I, 1 (1893) p. 78.
- P. Chaetophorae De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 46.

Rhizidium — De Wild. in Notarisia (1895) et in Ann. Soc. belge de microsc. t. XIX Mém. (1895) p. 217 pl. VII fig. 15-21.

Ht: Tourpes (Goffart).

2 P. Euglenae (Dang.) Schroeter in Engler et Prantl Pflanzenfam. I, 1 (1893) p. 79; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 46.

Rhizidium — Dang. in Ann. Sc. nat. série 7 t. IV (1866) p. 301 pl. XVII fig. 11-19; Sacc. Syll. Fung. IX p. 248.

Bt: Peuthy (Él. M.).

3 P. Hydrodictyi (Br.) Schroeter in Engl. et Prantl Pflanzenfam. I, 1 (1893) p. 78 fig. 59 A, B; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 47.

Chytridium - Br. in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 383.

Phlyctidium — Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 279; Sacc. Syll. Fung. VII p. 309.

Bi: Louvain (Nob.).

4 R. Schenkii (Dang.) De Wild. in Mém. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 50 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1886) p. 47.

Rhizidium — Dang. in Ann. Sc. nat. série 7 t. IV (1886) p. 297 pl. XIII fig. 24-30; Sacc. Syll. Fung. VII p. 298.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

- 3 ENTOPHLYCTIS Fischer in Rabenh. Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 114.
- 1 E. apiculata (Br.) Fischer loc. cit. (1892) p. 117; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. p. 50.

Chytridium - Br. in Abhandl. Berl. Ak. (1855) p. 57.

Rhizidium — Zopf in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1889) p. 207 pl. XXI fig. 11-31; Sacc. Syll. Fung. VII p. 298.

Bi : Laeken (Nob.).

- 2 E. bulligera (Zopf) Fischer in Rabenh. Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 116 fig. 20b; Sacc. Syll. Fung. XI p. 249; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 50. Rhizidium Zopf in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 195 pl. XVIII fig. 5-8; Sacc. Syll. Fung. VII p. 297.
 - Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Nob.). Ht: Thuin (Nob.).
- 3 E. Cienkowskiana (Zopf) Fischer loc. cit. (1892) p. 118 fig. 20 α, c; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1896) p. 50.

Rhizidium — Zopf in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 196 pl-XVII fig. 14-24; Sacc. Syll. Fung. VII p. 297.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

- 4 CHYTRIDIUM Braun in Monatsb. Berl. Ak. (1856) p. 591; Sacc. Syll. Fung. VII p. 305.
- 1 C. Lagenaria Schenk in Verhandl. med. phys. Ges. Wurzburg VIII (1858) p. 241; Sacc. Syll. Fung. XI p. 250; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1896) p. 54. Rhizidium Dang. in Le Botaniste I (1889) p. 64 pl. III fig. 23. Bt: Louvain, Woluwe St-Étienne (Nob.).
 - 5 POLYPHAGUS Nowak. in Cohn Beitr. zur Biol. d. Pflanzen t. II (1876) p. 203; Sacc. Syll. Fung. VII p. 302.
- 1 P. Euglenae Nowak. loc. cit. (1876) p. 203 pl. VIII et IX; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 55. Bt: Schaerbeek (Nob.).
 - 6 SEPTOCARPUS Zopf in Nova Acta Ac. Leop. t. LII (1888) p. 348; Sacc. Syll. Fung. XI p. 249.
- 1 S. corynephorus Zopf loc. cit. (1888) p. 348 pl. XX fig. 21-28; Sacc. loc. cit.; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXXV part. 1 p. 49.

Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Nob.), Peuthy (Él. M.). — Lg.: Préfayhay (Nob.).

FAM. HYPHOCHYTRIACEAE.

- 1 CLADOCHYTRIUM Nowak. in Cohn Beitr. zur Biol. d. Pflanzen t. II (1876) p. 92; Sacc. Syll. Fung. VII p. 295.
- 1 C. Butomi (Schroeter) Busgen in Cohn Beitr. zur Biol. d. Pfanzen t.

IV (1887) p. 269 pl. XV fig. 1-20; Sacc. Syll. Syll. Fung. XI p. 250; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 56.

Physoderma — Schroeter in Ber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur (1882) p. 198; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 235.

Bt: Trois-fontaines (Bm. et R.).

2 PHYSODERMA Wallr. Comp. Fl. Germ. t. IV (1833) p. 192.

P. maculare Wallr. Comp. Fl. Crypt. Germ. t. IV (1833) p. 192; Sacc. Syll. Fung. VII p. 317; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 235.

Physoderma Alismatis De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 58.

Cladochytrium — Büsgen in Cohn Beitr. zur Biol. d. Pflanzen. (1867).

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

2 P. Hippuridis Rostr. in Till. Groenl. Swaenp. (1888) p. 631; Sacc. Syll. Fung. XI p. 250; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXXV part. 1 (1896) p. 59.

Cladochytrium — De Wild. in Mém. Soc. belge de Microsc. t. XVII (1893) p. 46 pl. VII fig. 1-3.

Bt: St-Job (L. Errera).

3 P. Menyanthis De Bary in Bot. Zeit. (1874) p. 106; Sacc. Syll. Fung. VII p. 318; De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 60.

Bt: Ottignies (Bm. et R.).

ASCOMYCETES.

Exoascineae.

FAM. EXOASCACEAE.

SUBFAM. EXOASCEAE.

- 1 TAPHRINA Fries Obs. myc. I (1815) p. 217; Sacc. Syll. Fung. VII p. 812.
- T. aurea (Pers.) Fries Obs. I (1815) p. 217; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 812.

Erineum — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 700.

Exoascus - Sadebeck.

Taphrina populina Fries; Kickw Fl. crypt. II p. 474.

Exoascus Populi *Thuem.* in Hedw. (1874) p. 98; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 145.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N.: Champion (Bell.), Auseremme (Él. M.). — Lx.: Ebly, Poix (Él. M.).

2 T. caerulescens (Desm. et Mont.) Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. V (1866) p. 127.

Ascomyces — Desm. et Mont. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. IV (1840) p. 345; Kicke Fl. crypt. II p. 315; Lamb. Fl. myc. II p. 597.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). - N. : Namur (Bell.).

3 T. Sadebeckii Johans. Taphr. (?) p. 38; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 816.

Ascomyces Tosquinetii West. in Herb. crypt. n. 1293 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 655; Kicker Fl. crypt. II p. 315; Lamb. Fl. myc. II p. 597.

Exoascus Alni De Bary in Fuck. Symb. myc. (1869-1870) p. 252 p.p.; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Bt.: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Malaise, Dilbeek (El. M.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: assez répandu (Él. M.). — Fl. or.: env. d'Audenarde (West.).

SPEC. DUB.

Ascomyces Fagi Lamb. in Rev. myc. (1885) p. 71. Sine loco (Lamb.).

- 2 EXOASCUS Fuck. Enum. Fung. Nass. (1860) p. 29; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 816.
- 1 E. alnitorquus (*Iul.*) Sadeb. Unters. ueber Exoascus (1884) p. 115 fig. 6; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 817; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 144.

Taphrina — Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. V (1886) p. 130.

Bt: Groenendael, Dilbeek, Woluwe-St-Pierre (Bm. et R.). - Lx.: Ebly (Él. M.).

- 2 E. Betulae Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 49; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 818; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 145. Bt; Dilbeek, La Hulpe (Bm. et R.). Lx.: St-Hubert (Él. M.).
- 3 E. bullatus (Berk. et Br.) Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 49; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 817; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 144.

Oidium - Berk. et Br. in Journ. Hortic. Lond. (1864) p. 48.

Ascomyces — Berk. Introd. crypt. Bot. (1857) p. 284; Lamb. Fl. myc. II p. 597.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Louvain (Paque). — A.: Moll, Bouchaute (Staes). — N.: Gembloux (Em. M.).

4 E. deformans (Berk.) Fuck. Symb. myc. (1869-1870) p. 252; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 817; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 144.

Ascomyces — Berk. Introd. crypt. Bot. (1857) p. 284; Lamb. Fl. myc. II p. 596.

Ascosporium — Berk. Outl. Brit. Fung. (1860) p. 449.

Taphrina — Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. V (1866) p. 128.

 ${\tt Bt:}$ Watermael (Bm. et R.), Louvain (Paque), Neder-over-Hembeek, Weerde, (Él. M.). — N.: Gembloux (Ém. M.).

5 E. Pruni Fuck. Enum. Fungi Nass. (1860) p. 29 c. ic.; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 817.

N.: Merlemont, Matagne, env. de Rochefort (Ém. M.).

6 E. Ulmi Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 149; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 819; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 145. Bt: Auderghem, Rouge-Cloître (Bm. et R.).

SUBFAM. GYMNOASCEAE.

- 3 ENDOMYCES Rees Bot. Unters. ueber Alkoholgahr. (1870) p. 77; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 821.
- 1 E. decipiens (Tul.) Rees loc. cit. (1870) p. 77; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 820; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 145. Hypomyces Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 61. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 E. parasiticus Fayod in Ann. Sc. nat. sér. 7 t. II (1885) p. 28 t. II fig. 1-12.

A.: Hérenthals (Bm. et R.).

- 4 GYMNOASCUS Buran. in Bot. Zeit. (1872) p. 158; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 823.
- G. Reesii Baran, in Bot. Zeit. (1872) p. 158; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 823.

Bt: Boitsfort (Él. M.). — Ht: Ath (Él. M.).

- 2 G. ruber Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. de France (1877) p. 159; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 823. Bt: Bruxelles (Él. M.).
- 3 G. uncinatus Eidam in Cohn Beitr. z. Biol. d. Pflanzen Bd III (1833) p. 293; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 824; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 145.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.). - Fl. occ.: Ostende (Él. M.).

Erysiphaeineae.

FAM. ERYSIPHACEAE.

- 1 PODOSPHAERA Kunze in Kunze et Schmidt Myk. Hefte II (1823) p. 111; Sacc. Syll. Fung. I p. 2.
- 1 P. myrtillina Kunze in Kunze et Schmidt Myk. Hefte II (1823) p. 111; Sacc. Syll. Fung. I p. 2; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 146.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

2 P. Oxyacanthae (DC.) De Bary in Hedwigia (1871) p. 68; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 146; Sacc. Syll. Fung. I p. 2. Erysiphe — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 106.

Podosphaera clandestina Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 135 t. 6 f. 5; Lamb. Fl. myc. II p. 177; Kicka Fl. crypt. I p. 376.

- N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Uccle (Él. M.). Lx.: Jusseret, Poix (Él. M.).
- 3 P. tridactyla (Wallr.) De Bary in Hedwigia (1871) p. 68; Sacc. Syll. Fung. I p. 2.

Alphitomorpha - Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 733.

Podosphaera Kunzei *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 156 t. 6 p. p.; *Kickv.* Fl. crypt. I p. 376; *Lamb.* Fl. myc. II p. 176.

Bt: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). - Fl. occ.: Dunes (Kickx).

- 2 SPHAEROTHECA Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 138; Sacc. Syll Fung. I p. 3.
- S. Castagnei Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) t. 6 fig. 9-10;
 Kickx Fl. crypt. I p. 375; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.
 p. 146; Lamb. Fl. myc. II p. 173; Sacc. Syll. Fung. I p. 4.
 - S. Castagnei var. fuliginea Fries; Kickx Fl. crypt. I p. 375.
 - S. Castagnei var. Humuli Lév.; Kickx Fl. crypt. I p. 375.
 - S. Castagnei var. ferruginea Fries; Kickx Fl. crypt. I p. 375.

Erysibe Potentillae Lib.

Erysibe macularis Fries Summ. veg. scand. II (1849) p. 406.

E. - var. Urticae Fries.

E. Cichoracearum DO. Fl. fr. II (1805) p. 274.

E. Humuli DO. Fl. fr. VI (1815) p. 106.

Erysiphe fuliginea var. Veronicarum Fries.

Lb.: Molingen (Nypels). — Lg.: Queue de bois, Jupille, env. de Visé (Nypels), Liége (Van der Ryst). — Fl. occ.: Courtrai (West.). — N.: Jambe (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Gembloux (Él. M.). — Fl. or.: Gand, Ruisselede (Staes). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Watermael (Bm. et R.),

Louvain (Renson), Berthem, Tervueren, Villers-la-ville, Corbeek-Loo, Corbeek-Dyle (Paque), Bruxelles, Peuthy (Él. M.). — Lx.: Ebly, Laroche (Él. M.).

2 S. detonsa (Fries) Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 375; Lamb. Fl. myc. II p. 175; Sacc. Syll. Fung. I p. 4.

Erysiphe — Fries Syst. myc. (1829) p. 247.

N.: env. de Namur (Bell.). — Fl. occ.: env. de Furnes (Wall.).

3 S. Mors-uvae (Schwein.) Berk. et Curt. in Grev. IV (1876) p. 158; Sacc. Syll. Fung. I p. 5.

Erysibe - Schwein.

Sine loco (Ém. M.).

4 S. pannosa (Wallr.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 138, t. 6 fig. 8; Kickx Fl. crypt. I p. 374; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 146; Lamb. Fl. myc. II p. 173; Sacc. Syll. Fung. I p. 3.

Alphitomorpha pannosa Wallr. in Verhandl. d. Naturf. Fr. Berlin (1819) p. 43.

Erysibe - Link in Willd. Sp. plant. VI (1824) p. 104.

Fl. or.: Gand (Staes). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lb.: Molingen (Nypels). — Lg.: Liége (Van der Ryst). — Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Bruxelles (Bm. et R.).

- 3 PHYLLACTINIA Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 144; Sacc. Syll. Fung. I p. 5.
- 1 P. suffulta (Rebent.) Sacc. in Michelia II (1880) p. 50; Sacc. Syll. t. II p. 5.

Sclerotium - Rebent. Flor. Neom. (1804) p. 360.

Phyllactinia guttata Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 144 t. 7 fig. 11; Kickw Fl. crypt. I p. 383; Lamb. Fl. myc. II p. 177.

Ph. - var. Coryli Link; Kicka Fl. crypt. I p. 384.

Erysiphe Fraxini DO. Fl. fr. II (1805) p. 273.

Erysiphe guttata Link in Willd. Sp. plant. VI (1824) p. 116.

E. - var. Marissalii Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 384.

Erysiphe Marissalii West. in Bull. Ac. belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 403 pl. fig. 4.

Erysiphe Coryli Hedw. Fung. med. t. 1; DC. Fl. fr. II (1805) p. 273.

Bi: Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.). — N.: Grands-malades, Dave (Bell.). Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg.: Dolembreux (Mout.). — Fl. occ.: Courtrai (West.). — Lx.: Ebly, Libramont (Él. M.).

- 4 UNCINULA Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 151; Sacc. Syll. Fung. I p. 6.
- 1 U. aceris (DC.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 8; Bomm. et Rouss.

Fl. myc. env. Brux. p. 147.

Erysiphe Aceris DO. Syn. n. 733 et Fl. fr. VI (1815) p. 104.

U. bicornis (Wallr.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 153, t. 7 fig. 17; Kickw Fl. crypt. I p. 378; Lamb. Fl. myc. II p. 181.

Erysibe - Link in Willd. Sp. plant. (1824) p. 112.

Bt: Bois de la Cambre, Uccle (Bm. et R.), Bergh, Woluwe-St-Étienne (Él. M.). — Lg.: Liége (Van der Ryst). — N.: Mazy (Ém. M.), Grands-malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Flandres (Kickx). — Lx.: Ebly (Él. M.). — Lb.: Genck (Él. M.).

2 U. adunca (Wallr.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 151 t. 7 fig. 15; Kickw Fl. crypt. 377; Lamb. Fl. myc. II p. 179; Sacc. Syll. I p. 7.

Alphitomorpha - Wallr. Verh. Naturf. Freunde I (1819) p. 37 p. p.

Bi: Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — Lb.: Molingen (Nypels). — Flandres (Kickx).

3 U. Bivonae Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) pl. t. 7 fig. 14; Kickx Fl. crypt. I p. 377; Sacc. Syll. Fung. I p. 6; Lamb. Fl. myc. II p. 179.

Flandres (Kickx).

4 U. Prunastri (DO.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 7.

Erysiphe — DC. Fl. fr. VI (1815).

U. Wallrothii Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 153 pl. 7 fig. 16; Kickw Fl. crypt. I p. 377; Lamb. Fl. myc. II p. 180.
Flandres (Kickw.).

- 5 MICROSPHAERA Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 381; Sacc. Syll. Fung. I p. 10.
- 1 M. Astragali (DO.) Trev. ex Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 12.

Erysiphe — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 105.

M. holosericea (Wallr.) Kickv Fl. crypt. I (1867) p. 379; Lamb. Fl. myc. II p. 185.

Calocladia — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 159 t. 9 fig. 27.

Bt: Route de Stalle (West. et Van Haes.), Louvain (Ém. M.). — Lx.: Orval (West.), env. d'Arlon (Paque), entre Bomal et Barvaux (Él. M.). — Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx). — Lg.: Liége (Van der Ryst).

2 M. Friesii (Lév.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 13.

Calocladia — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 156 t. 8 f. 20.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

3 M. Berberidis (DC.) Kicker Fl. crypt. I (1867) p. 379; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 147; Lamb. Fl. myc. II p. 186; Sacc. Syll. Fung. I p. 13.

Erysiphe - DO. Fl. fr. II (1805) p. 275.

Calocladia — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 159 t. 10 fig. 28. Bt: Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Flandres (Kickx).

4 M. divaricata (Wallr.) Kickv Fl. crypt, I (1867) p. 378; Lamb. Fl. myc. II p. 182; Sacc. Syll. Fung. I p. 11.

Alphitomorpha — Wallr. in Verhandl. Gesell. Naturf. Freunde I (1819) p. 39. Calocladia — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 155 pl. 8 fig. 18. Erysiphe — var. Frangulae Link Spec. plant. I (1824) p. 112.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Bt: Héverlé (Maertens). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

5 M. Dubyi (Lév.) Kicka Fl. crypt. I (1867) p. 379; Sacc. Syll. Fung. I p. 10.

Calocladia — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 158. Erysiphe abnormis Duby Bot. Gall. II (1830) p. 871.

Flandres (Kickx). - Bt: Gentinnes (de Limm.). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

6 M. Ehrenbergii (Lév.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 14; Lamb. Fl. myc. II p. 183.

Calocladia — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 155 t. 8 fig. 22. N.: Bonninne (Barbier).

7 M. Evonymi (DC.) Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 379; Lamb. Fl. myc. II p. 184; Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 11.

Erysiphe Evonymi DO. Fl. fr. VI (1815).p. 105.

Calocladia comata (Wallr.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 157 t. 9 fig. 23.

- Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx). Bt: Villers la-Ville (Bm. et R.), Louvain (Ém. M.).
- 8 M. Grossulariae (Lév.) Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 380; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 147; Lamb. Fl. myc. II p. 184.

 Calocladia Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 160 t. 9 fig. 25.

 Erysiphe penicillata var. Grossulariae Link Sp. plant. VI (1824) p. 114.

 Bt: Watermael (Bm. et R.). Lg.: Liége (Van der Ryst). Lb.: Molingen (Nypels). N.: Gembloux (Ém. M.).
- 9 M. Hedwigii (Lév.) Lamb. Fl. myc. II p. 182; Sacc. Syll. Fung. Ip. 11. Calocladia Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 155 t. 8 fig. 19. Sine loco (Lamb.).
- 10 M. Lycii (Lasch) Sacc. et Roum. in Mich. II (1880) p. 310; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 147; Sacc. Syll. Fung. I p. 10. Erysiphe Lasch in Klotzsch et Rabenh. Herb. myc. ed. I n. 950. Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 11 M. penicillata (Wallr.) Kickv Fl. crypt. I (1867) p. 378; Lamb. myc. II p. 183; Sacc. Syli. Fung. I p. 14.

Calocladia — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 155 t. 8 fig. 21. Alphitomorpha — Wallr. in Verhandl. Naturf. Freunde I (1819) p. 40.

Bt: Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Wilsele (Paque); Gentinnes (de Limm.). — Flandres (Kickx).

- 6 ERYSIPHE Hedw. ex DC. Fl. fr. II (1805) p. 272; Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 161; Sacc. Syll. Fung. I p. 15.
- 1 E. communis (Wallr.) Fries Summ. Veg. Scand. II (1849) p. 406 pr. p.; Kickx Fl. crypt. I p. 380; Sacc. Syll. Fung. I p. 18; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 147; Lamb. Fl. myc. II p. 191.

Alphitomorpha - Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 758.

Erysiphe alphitomorpha var. -- plur. auct.

Erysiphe Aquilegiae DO. Fl. fr. VI (1915) p. 105.

- A.: Schoorvoort (env. de Turnhout) (Paque). Bt: Bruxelles (Él. M.), Gentinnes, Villers (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Héverlé, Wilsele (Paque), Louvain (Leburton), Tervueren, Weert-St-Georges (Paque). Fl. occ.: dunes (West.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Barbier), Champion (Bell.), Gembloux (Él. M.). Ht: Beloeil (Él. M.). Lx.: Laroche (Él. M.).
- 2 E. Euphorbiae *Peck* 26 Rep. of the st. bot. of New-York (1875); Sacc. Syll. Fung. I p. 18.

Lx.: Poix (Bm. et R.). - N.: Yvoir (Bm. et R.).

3 E. Galeopsidis DÛ. Fl. fr. VI (1815) p. 108; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 147; Sacc. Syll. Fung. I p. 16.

Erysiphe Labiatarum Chev. Fl. Paris III (1826) p. 380.

Erysiphe nervisequia West. in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 235; Lamb. Fl. myc. II p. 187.

- Bi: La Hulpe (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). N.: Wépion, Dave, Salzine (Bell.). Lg.: Comblain-au-pont (Él. M.). Lx.: Laroche (Él. M.).
- 4 E. graminis DC. Fl. fr. VI (1815) p. 106; Kickx Fl. crypt. I p. 383; Sacc. Syll. Fung. I p. 19; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 148; Lamb. Fl. myc. II p. 188.
 - Bt: Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.), Boitsfort (Él. M.). Fl. occ.: env. de Bruges, de Courtrai (West.), Blankenberghe (Kickx). Lx.: Laroche (Él. M.). Ht: La Louvière (Ém. M.).
- 5 E. horridula (Wallr.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851)
 p. 170 t. 11 fig. 37; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 147;
 Lamb. Fl. myc. II p. 198; Sacc. Syll. Fung. I p. 27.
 Alphitomorpha Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 755.
 - Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Boitsfort (Bm. et R.), Héverlé, Pellenberg (Paque). N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Dinant, Olloy, Spontin (Él. M.), Gembloux (Ém. M.). Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). Lx.: Sesselich, Waltzing (Paque).
- 6 E. lamprocarpa (Wallr.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 163 t. 10 fig. 31; Kickx Fl. crypt. I p. 382; Bomm. et Rouss.

- Fl. myc. env. Brux. p. 147; Sacc. Syll. Fung. I p. 16.
 - Alphitomorpha Wallr. Comp. Fl. Germ. II (1833) p. 757.
 - Erysiphe var. Cichoracearum Link, var. Galeopsidis Link et var. plantaginis Link.
 - Erysiphe compositarum Duby Bot. Gall. II (1830) p. 870.
 - E. var. Lappae Duby loc. cit. (1830).
- Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Héverlé, Winxele (Paque), Limelette (Él. M.). N.: Louette-St-Pierre, Willerzies (Aub.), Wépion, St-Servais (Bell.), Mazy (Él. M.). Ht: Blicquy (Él. M.).
- 7 E. Linkii Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 161 t. 10 fig. 29; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. 147; Lamb. Fl. myc. II p. 187; Sacc. Syll. Fung. I p. 16.
 - E. compositarum var. Artemisiae Duby Bot. Gall. II (1830) p. 870.
 - E. Artemisiae Link.
 - Bt: Limelette (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.), Louvain (Leburt.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Citadelle de Namur (Bell.). Ht: Baudour (Él. M. et Laurent). Lx.: Ebly (Él. M.).
- 8 E. Martii Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 166 t. X fig. 34; Kickw Fl. crypt. I p. 382; Sacc. Syll. Fung. I p. 19; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 148; Lamb. Fl. myc. II p. 189. Erysiphe Pisi DO. Fl. fr. VI (1815) p. 274.
 - N.: Champion, Namur (Bell.), Waulsort (Él. M.). Bi: env. dc Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Uccle, Watermael (Bm. et R.), Villers-la-Ville (Paque), Terbank (Leburt.).
- 9 E. Montagnei Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 169 t. 41 fig. 36; Kickx Fl. crypt. I p. 381; Sacc. Syll. Fung. I p. 16; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 147; Lamb. Fl. myc. II p. 191.
 - Bt: env. de Bruxelles AC, (Bm. et R.), Vilvorde (Él. M.). Lg.: Spa (Él. M.). Lx.: Neufchateau (Él. M.).
- 10 E. tortilis (Wallr.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 170 fig. 35; Kickæ Fl. crypt. I p. 380; Sacc. Syll. Fung. I p. 17; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 147; Lamb. Fl. myc. II p. 190.
 Alphitomorpha Wallr. Comp. Fl. Germ. t. IV (1833) p. 756.
 Erysiphe Corni DO.; Duby Bot. Gall. II (1830) p. 870.
 - Bt: Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Aerschot (Él. M.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.), citadelle de Namur (Bell.). Lx.: Poix (Él. M.). Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).
- 11 E. Tuckeri Berk. in Moniteur belge IX (1850) p. 2383; Kickx Fl. . crypt. I p. 382; Sacc. Syll. Fung. I p. 20; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 148; Lamb. Fl. myc. II p. 194.
 - Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). Flandres (Kickx).

- 12 E. Ulmariae Pers. in Herb. Desm. (1846); Kickw Fl. crypt. I p. 381; Sacc. Syll. Fung. I p. 19; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 148; Lamb. Fl. myc. II p. 192.
 - N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Bt: Watermael (Bm. et R.). Fl. or.: env. de Gand (Kickx).
- 13 E. umbelliferarum De Bary in Hedwigia (1871) p. 69; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 147; Sacc. Syll. Fung. I p. 17. Oidium De Bary stat. conid.
 - . Bt : Ucclé (Bm. et R.). Lh. : St-Trond (Ém. M.). Lx. : Vaux-le-Chêne (Él. M.). A. : Anvers (Ém. M.).

FAM. PERISPORIACEAE.

SUBFAM. PERISPOREAE.

- 1 EUROTIUM Link Spec. plant. I (1824) p. 79; Sacc. Syll. Fung. I p. 25.
- 1 E. herbariorum (Wigg.) Link Spec. plant. I (1824) p. 79; Kickx Fl. crypt. I p. 371; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 150; Lamb. Fl. myc. II p. 170; Sacc. Syll. Fung. I p. 26. Mucor Wigg. Prim. Fl. Holsat. (1780) p. 111.
 - A.: Turnhout (Paque). Bt: Louvain (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). N.: Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). Flandres (Kickx).
 - epixylon Schm. et Kunze; Kickx Fl. crypt. I p. 371. Flandres (Kickx).
- 2 E. lateritium Mont. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 54; Kickv Fl. crypt. I p. 370; Sacc. Syll. Fung. I p. 26; Lamb. Fl. myc. II p. 170.
 - Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.). Flandres (Kickx).
- 3 E. pulcherrimum Wint. in Hans. Fungi fim. Dan. (1876) p. 104; Sacc. Syll. I p. 27. Bt: Bruxelles (Él. M.).
- 4 E. repens De Bary Beitr. z. Morph. und Physiol. d. Pilze in Hedw. (1871) p. 52; Sacc. Syll. Fung. I p. 26.
 Bt: Evere (Él. M.).
- 5 E. semiimmersum Él. March. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. I (1896) p. 128.
 Bt: Evere (Él. M.).

- 2 KICKXELLA Coem. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. I (1862) p. 155; Sacc. Syll. Fung. II p. 815.
- I K. alabastrina Coem. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. I (1862) p. 155 pl. fig. 1-8; Kickx Fl. crypt. I p. 372; Lumb. Fl. myc. II p. 160; Sacc. Syll. Fung. II Add. p. 815.
 Fl. or.: Gand (Coem.).
 - 3 LASIOBOTRYS Kunze in Kunze et Schmidt Myk, Hefte II (1823) p. 88; Sacc. Syll, Fung. I p. 29.
- L. Lonicerae Kunze loc. cit. (1823) p. 88; Lamb. Fl. myc. II
 p. 162; Sacc. Syll. Fung. I p. 30.
 Dothidea Fries Syst. myc. II (1823) p. 557.

Bt: Louvain (Paque). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 4 APIOSPORIUM Kunze in Kunze et Schmidt Myk. Hefte I (1817) p. 8; Sacc. Syll. Fung. I p. 30.
- A. Brassicae (Lib.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 86; Sacc. Syll.
 Fung. I p. 33; Lamb. Fl. myc. II p. 164.
 Perisporium Lib. Crypt. ard. n. 280.
 - Bt : St-Gilles (West. et Van Haes.).
- 2 A. pinophilum Fuck. Symb. myc. (1869) p. 87; Sacc. Syll. Fung. I p. 30; Lamb. Fl. myc. II p. 163.
 Flandres sec. Lamb.
- 3 A. Plantaginis Fuck. Symb. myc. (1869) p. 87; Sacc. Syll. Fung. I p. 34; Lamb. Fl. myc. II p. 164.
 Sine loco (de Limm.).
- 4 A. Rhododendri Fuck. Symb. myc. (1869) p. 87; Sacc. Syll. Fung. I p. 32; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 149. Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 5 A. Salicis Kunze et Schmidt Myk. Hefte I (1817) p. 8; Sacc. Syll. Fung. I p. 33; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 70. Zone ardenn. (Lamb.).
- 6 A. stygium Wallr. Deutsch. crypt. Fl. II (1833) p. 362; Sacc. Syll. Fung. I p. 31; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 90. Zone ardenn. (Lamb.).
 - 5 ANIXIA *Fries* Nov. Fl. Suec. ed. I (1814) p. 80; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 34.
- 1 A. perichaenoides (Cooke) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 35; Lamb.

Fl. myc. Supplém. I p. 91. Orbicula — *Cooke* in Grevillea VIII (1879) p. 10. Zone ardenn. (Lamb.).

2 A. spadicea Fuck. Symb. myc. (1869) p. 91; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 149; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 91; Sacc. Syll. Fung. I p. 35.

Bt: Evere, Beggynendyck, Bruxelles (Él. M.). - N.: Yvoir (Él. M.).

- 6 ASTERINA Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1845) p. 59; Sacc. Syll. Fung. I p. 39.
- 1 A. Himantia (Pers.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) 46; Lamb. Fl. myc. supplem. I p. 92.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 89.

Lg.: Dolembreux, Gomzé (Mout.).

- 7 DIMEROSPORIUM Fuck. Symb. myc. (1869) p. 89; Sacc. Syll. Fung. I p. 51.
- 1 D. abjectum (Wallr.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 89; Lamb. Fl. myc. II p. 166; Sacc. Syll. Fung. I p. 51.

Sphaeria - Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1823) p. 810.

Capnodium sphaericum Cooke Handb. II (1871) 934; Lamb. Fl. myc. II p. 286.

Asteroma Veronicae Desm. in Act. Lille (1836).

Bt: Env. de Louvain (Leburt.), Gentinnes (de Limm.).

- 8 MARCHALIELLA Wint. ex Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 243.
- 1 M. Zopfielloides Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1891) p. 243; Él. March. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIX part. 1 (1896) p. 128 fig. 1. Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).
 - 4 PERISPORIUM Fries Syst. myc. III (1829) p. 248; Sacc. Syll. Fung. I p. 55.
- 1 P. disseminatum Fries Syst. myc. III (1829) 250; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 92; Sacc. Syll. Fung. I p. 58.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 P. Betulinum (Alb. et Schwein.) Fries Syst. myc. III (1829) 249;
 Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 149; Lamb. Fl. myc.

- Supplém. I p. 92; Sacc. Syll. Fung. I p. 59. Peziza — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 339 pl. 12 fig. 5 n. bona. Bt: Limelette (Bm. et R.),
- 3 P. poliotum Fries Syst. myc. II (1823) 512; Kicke Fl. crypt. I p. 368; Sacc. Syll. Fung. I p. 59; Lamb. Fl. myc. II p. 165. Bt: Eegenhoven (Paque).
- 4 P. Arundinis Desm. Crypt. exs. 329; Kickx Fl. crypt. I p. 369; Sacc. Syll. Fung. I p. 59; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 149; Lamb. Fl. myc. II p. 165.
 - N.: Salzinnes (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). Bt: Bergh (Del.), Gentinnes (de Limm.), Rouge-Cloître (Bm. et R.). Fl. occ.; Zillebeke (West.). Lx.: Samrée (Él. M.).
- 5 P. vulgare Corda Icon. II (1838) fig. 97; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 149; Sacc. Syll. Fung. I p. 55; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 92.
 - Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Limelette, Etterbeek (Él. M.). Lx.: Laroche (Él. M.). Ht: Ath (Él. M.).
 - f. lignicolum Lamb. loc. cit. (1887).
 Zone ardennaise (Lamb.).
 - var. fimicolum El. March. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIII (1884) p. 89.
 - Bt: Hoeylaert, Bruxelles, St-Josse-ten-Noode (Él. M.). Lx.: Ebly (Él. M.).
 - var. substipitum El. Marchal var. nov.
 Forma ascis brevissime stipitatis Hab.: In fimo ovino.
 Lx.: Grupont (Él. M.). N.: Olloy (El. M.).
 - 10 MELIOLA Fries Elench. II (1828) p. 109; Sacc. Syll. Fung. I p. 60.
- M. Penzigi Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 70.
 Capnodium citri Penz. Agr. Ms.
 Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

SUBFAM. CAPNODEAE.

- 11 CAPNODIUM *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1848) p. 233; *Sacc.* I p. 73.
- 1 C. Nerii Rabenh. Fung. Eur. n. 662 et in Hedwigia (1864) p. 73; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 150; Sacc. Syll. Fung. I p. 77; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 164. Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

2 C. salicinum (Alb. et Schwein.) Mont. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 234; Kickx Fl. crypt. I p. 373; Sacc. Syll. Fung. I p. 73; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 150.

Dematium - Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 368.

Fumago — Tul.; Lamb. Fl. myc. II p. 285.

Capnodium sphaeroideum De Lacr. in Rabenh. Fungi Eur. n. 352; Kickx Fl. crypt. I p. 373.

FI. or.: Termonde env. de Gand (West.), Stablo (Staes). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

3 C. Tiliae (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 74.

Fumago - Fuck. Symb. myc. (1869) p. 142; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 288.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

Tuberineae.

FAM. ONYGENACEAE.

- 1 ONYGENA Pers. Syn. Fung. (1801) p. 203; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 861.
- O. equina Pers. Obs. myc. II (1799) p. 71 t. 6 f. 3; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 861; Lamb. Fl. myc. II p. 590. Sine loco (Lamb.).
- 2 O. corvina Alb. et Schwein.; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 861.
 - var. alliacea Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg, t. XXVI part. 1 (1887) p. 193.
 Bt: Hoeylaert (Bm. et R.).
- 3 0. piligena Fries Syst. myc. III (1829) p. 208; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 862; Lamb. Fl. myc. II p. 590.
 Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

FAM. ELAPHOMYCETACEAE.

- I ELAPHOMYCES Nees Syn. Pl. myc. (1820) p. LXVIII; Sacc. Syll. Fung. XIII p. 863.
- 1 E. granulatus Fries Syst. myc. III (1829) p. 58; Sacc. Syll. VIII p. 868; Kicka Fl. crypt. II p. 9; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 455; Lamb. Fl. myc. II p. 591.
 - Fi. or.: Aaltre, Nevele (Kickx). Fi. occ.: Thourout (Kickx). Bi: La Hulpe, Groenendael (Bm. et R), Héverlé (Paque), Rixensart (Él. M.). Lx.: Poix (Él. M.). Hi: Stambruges (Él. M.).

2 E. variegatus Vittad. Monog. Tub. (1831) p. 68 t. IV fig. 4; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 867; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 155.

E. muricatus Fries Syst. myc. III (1829) p. 59.

Bt: C. env. de Bruxelles (Bm. et R.). - Fl. occ : Gheluvelt (Wall.).

FAM. CENOCOCCACEAE.

- 1 CENOCOCCUM Fries Syst. Veg. (1825) p. 364; Sacc. VIII p. 871.
- I C. geophilum Fries Scler. Suec. exsicc. dec. 37; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 871; Kickx Fl. crypt. II p. 9; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 156; Lamb. Fl. myc. I p. 502.

Fl. occ.: env. de Bruges (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Héverlé (Coem.), Groenendael, Rixensart (Él. M.). — Ht: Belœil, Masnuy (Él. M.).

FAM. TUBERACEAE.

- 1 GENEA Vittad. Monog. Tub. (1831) p. 27; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 873.
- 1 G. hispidula Berk. in Tul. Fungi Hypog. (1851) p. 121; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 875; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 152. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
 - 2 HYDNOBOLITES Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 278; Sacc. Syll. Fung VIII p. 879.
- 1 H. cerebriformis Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 278; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 879; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 153.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 3 HYDNOTRYA Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. XVIII (1846) p. 28; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 879.
- 1 H. Tulasnei Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. XVIII (1846) p. 78; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 879; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 153.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lg.: Forêt (Mout.).

- 4 TUBER Mich. Nov. Pl. Gen. (1729) p. 221 t. CII; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 882.
- 1 T. Borchii Vittad. Monog. Tub. (1831); Sacc. Syll. Fung. VIII

- p. 889; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 154. Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 2 T. dryophilum Iul. in Giorn. Bot. Ital. II p. I (1847) p. 62; Sacc. Syll. Fung. VII p. 889; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 154. Bt: Groenendael, Auderghem (Bm. et R.).
 - 5 AMYLOCARPUS Curr. in Proc. Roy. Soc. (1857) p. 119; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 905.
- 1 A. encephaloides Curr. in Proc. Roy. Soc. (1857) p. 119 c. ic.; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 905.
 Fl. occ.: Nieuport (Bm. et R.).

FAM. ENDOGONACEAE.

- 1 ENDOGONE Link Obs. Pl. Nat. III (1809) p. 33; Sacc. Syll. Fung VIII p. 905.
- 1 E. macrocarpa Tul. Hypog. (1851) p. 182 t. XX fig, 1; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 906; Bomm. et Rouss. Fl myc. env. Brux. p. 155. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 E. microcarpa *Tul.* Hypog. (1851) p. 182 t. XX fig. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 906; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 155. Bt: Rixensart, Limelette (Él. M.).
- 3 E. pisiformis Link Obs. Pl. nat. III (1809) p. 33 t. II f. 3; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 906.

 Bt: Ixelles (Bm. et R.).

Pyrenomycetineae.

FAM. SPHAERIACEAE.

SECT. ALLANTOSPORAE.

- 1 ENCHNOA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 410; Sacc. Syll. Fung. I p. 89.
- 1 E. infernalis (Kunze et Fries) Fuck. Symb. myc. (1869-1870); Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 169; Sacc. Syll. Fung. I p. 89. Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 871. Lg.: Gomzé, Tilff (Mout.).
 - 2 COELOSPHAERIA Sacc. Myc. venet. (1873) p. 115 et Syll. Fung. I p. 91.
- 1 C. cupularis (Pers.) Karst. Symb. ad Myc. Fenn. (1879); Bomm. et

- Rouss, Fl. myc. env. de Brux. p. 161; Sacc. Syll. Fung. I p. 91. Sphaeria Pers. Obs. myc. I (1796) p. 64; Kickx Fl. crypt. I p. 334. Nitschkia Fuckelii Nitschke in Fuck. Symb. myc. (1869) p. 165; Lamb. Fl. myc. II p. 311.
- N.: Louetto-St-Pierre (Aub.). Bt: Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). Fl. or.: env. de Gand (Kickx).
- 2 C. tristis (Pers.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 92; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 187.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. I (1801) p. 87. Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 FRACCHIAEA Sacc. Myc. Ven. (1873) p. 115 et Syll. Fung. I p. 93.
- F. heterogenea Sacc. Myc. Ven. (1873) p. 115 t. XII fig. 3-7 et Syll. Fung. I p. 93.
 - Bt: Groenendael (Bm. et R.).
 - 4 CALOSPHAERIA Tul. Sel. Fung. carp. II (1863) p. 108; Sacc. Syll. Fung. I p. 95.
- 1 C. affinis Nitschke Pyr. germ. (1867) p. 98; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 188; Sacc. Syll. Fung. I p. 100. Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 C. ciliatula (Fries) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 156; Sacc. Syll. Fung. I p. 96.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 406.

- N.: Hastière, Yvoir (Bm. et R.).
- 3 C. corylina Nitschke Pyr. Germ. (1867); Sacc. Syll. Fung. I p. 97; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 188.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 4 C. Crataegi Mout. in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. II (1897) p. 10.

 Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 5 C. dryina (Curr.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 94; Sacc. Syll. Fung. I p. 97; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 189.

Sphaeria — Curr. in Trans. Linn. Soc. Lond. XXII p. III (1865) p. 278 t. XLVIII fig. 135b.

Lg.: Tilff (Mout.):

6 C. microtheca (Cooke et Ell.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 97. Sphaeria — Cooke et Ell. in Greyillea V (1876) p. 51 t. 80 fig. 14. Lg.: Beaufays (Mout.).

7 C. minima Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 112; Sacc. Syll. Fung. I p. 101.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

8 C. princeps Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 109 t. XIII fig. 17-22; Lamb. Fl. myc. II p. 410; Sacc. Syll. Fung. I p. 95. Sphaeria pulchella Pers. Syn. Fung. (1801) p. 43. Valsa — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 414; Kickw Fl. crypt. I p. 321.

Bt: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- C. pusilla (Wahlenb.) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 157; Lamb.
 Fl. myc. supplem. I p. 188; Sacc. Syll. Fung. I p. 96.
 Sphaeria Wahlenb. Fl. Lappon. (1812) p. 520.
 Zone calc. (Lamb.).
- 10 C. vasculosa Sacc. Mich. II (1880) p. 52 et Syll. Fung. I p. 101. Sine loco (Lamb.).
 - 5 CORONOPHORA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 229; Sacc. Syll. Fung. I p. 103.
- C. angustata Fuck. Symb. myc. (1869-1870) p. 229; Sacc. Syll. Fung. I p. 103; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 189.
 Lg: Beaufays (Mout.).
- 2 C. annexa (Nitschke) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 229; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 169; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 189; Sacc. Syll. Fung. I p. 104.

Calosphaeria - Nitschke Pyrenom. (1867) p. 102.

Coronophora biformis Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 11 p. p.; Lamb. Fl. myc. II p. 411.

Bt.: Groenendael (Bm. et R.). - Lg.: Liège (Lamb.).

3 C. fallax Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 254.

A.: Westmalle (Bm. et R.). - Bt: Tervueren (Bm. et R.).

4 C. gregaria (Lib.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 229; Lamb. Fl. myc. II p. 411; Sacc. Syll. Fung. I p. 103. Sphaeria — Lib. Pl. crypt. Ard. n. 145.

Lg.: Beaufays (Mout.). - Bt: Tervueren (Bm. et R.).

5 C. macrosperma Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 324; Sacc. Syll. Fung. I p. 104; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 190. Zone ardenn. (Lamb.).

- 6 QUATERNARIA Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 104; Sacc. Syll. Fung. I p. 106.
- 1 Q. dissepta (Fries) Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 107; Lamb. Fl. myc. II p. 413; Sacc. Syll. Fung. I p. 107. Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 392.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.). — Bt: Tervueren (Bm. et R.).

2 Q. Persoonii Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 105 t. XII fig. 16-25; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 163; Lamb. Fl. myc. II p. 412; Sacc. Syll. Fung. I p. 106.

Valsa quaternata Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 423; Kickx Fl. crypt. I p. 322.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 45.

N.: Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Vlierbeek (Leburt.), Groenendael (Bm. et R.). - Fl. or .: entre Wetteren et Alost (Kickx). - Fl. occ.: Courtrai (West.).

- 7 VALSA Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 410; Sacc. Syll. Fung. I p. 108.
- 1 V. Abietis Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; Lamb. Fl. myc. snpplem. I p. 197; Sacc. Syll. Fung. I.p. 111. Sphaeria Pinastri Grev. Scott. crypt. Flora (1823) t. 63. Bt: ? Louvain, Héverlé (Paque).
- 2 V. ambiens (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; Kicka Fl. crypt. I p. 324; Sacc. Syll. Fung. I p. 131; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 162.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 44; Lamb. Fl. myc. II p. 368. Hypoxylon :- West, et Van Haes, Cat. crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 5 n. 50.

Bt: bois de la Cambre (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Dilbeek, Peuthy (Él. M.). — Fl. occ.: Nieuport (Kickx). — Fl. or.: Baarle (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Ste-Croix (Bell.).

- 3 V. Auerswaldii Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 225; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 400; Sacc. Syll. Fung. I p. 138.
 - Lg.: Beaufays (Mout.). A.: Calmpthout (Bm. et R.). Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 4 V. cenisia De Not. Sfer. ital. (1863) p. 39 t. XLIV; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 197; Sacc. Syll. Fung. I p. 110.

Lg: Tilff (Mout.). - N.: Mariembourg (Montagne-au-buis) (Bm. et R.). -Lx.: Prieuré de Conques (Bm. et R.).

5 V. ceratophora Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 191 t. XXII fig. 1-11; Sacc. Syll. Fung. I p. 108; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 162; Lamb. Fl. myc. II p. 373.

Sphaeria ceratosperma Tode Meckl. sel. II (1791) p. 53.

Diatrype - Tode?

Sphaeria enteroleuca Fries?

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Limelette (Él. M.). — N.: Louette St-Pierre (Aub.).

6 V. cincta Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 200; Sacc. Syll. Fung. I p. 412. Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 542.

Lg. : Dolembreux (Mout.).

7 V. cornicola Cooke in Grevillea VII (1879) p. 83; Sacc. Syll. Fung. I p. 122.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

8 V. coronata (Hoffm.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; Sacc. Syll. Fung. I p. 110.

Sphaeria — Hoffm. Veg. Crypt. I (1787) p. 26 t. 5 fig. 2.

Bi: Gentinnes (de Limm.), Tervueren (Bm. et R.). - N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 9 V. Curreyi Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 202; Lamb. Fl. myc. Supplém. I 199; Sacc. Syll. Fung. I p. 132.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- .10 V. decorticans Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412 p. p.; Sacc. Syll. Fung. I p. 123; Lamb. Fl. myc. II p. 372. Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 396 pr. p.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

11 V. fallax (Nitschke) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 200; Sacc. Syll. Fung. I p. 113; Lamb. Fl. myc. II p. 372.

Valsa — Nitschke ex Fuck. loc. cit. (1869).

Lg.: Forêt (Mout.). -- Fl. occ.: Courtrai (West.).

- 12 V. Friesii (Duby) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 198; Lamb. Fl. myc. II p. 371; Sacc. Syll. Fung. I p. 118. Sphaeria Duby Bot. Gall. II (1830) p. 690.
 ? (Lamb.).
- 13 V. Fuckelii Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 192; Lamb. Fl. myc. supplem. I p. 197; Sacc. Syll. Fung. I p. 112.
 Lg.: Forêt (Mout.). Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 14 V. germanica Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 215; Lamb. Fl. myc. supplem. I p. 199; Sacc Syll. Fung. I p. 133.
 Lg.: Liége (Mout.). Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 15 V. intermedia Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 199; Sacc. Syll. Fung. I p. 119.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

16 V. leucostoma (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411;

Kickz Fl. crypt. I p. 326; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 162; Sacc. Syll. Fung. I p. 139.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 39 p. p.

Valsa Persoonii Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 222; Lamb. Fl. myc. II p. 374.

- Bt: Watermael, Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). Fl. or.; Gand (Coemans). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 17 V. massariana De Not. Sfer. ital. cent. I (1863) p. 33 t. 39; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 201; Sacc. Syll. Fung. I p. 138. Zone ardenn. (Lamb.).
- 18 V. microspora (*Crouan*) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 128; *Lamb*. Fl. myc. Supplém. I p. 201.
 Diatrype *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 33.

Bi: Groenendael (Bm. et R.).

- 19 V. nivea (Hoffm.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411; Kickw Fl. crypt. I p. 326; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 162; Sacc. Syll. Fung. I p. 137; Lamb. Fl. myc. II p. 373. Sphaeria — Hoffm. p. p.
 - Hypoxylon West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 49.
 - Bt: Ganshoren (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque), parc de Bruxelles (West. et Van Haes.), Berthem (Leburt.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). Fl. or.: env. de Gand (Kickx). Fl. occ.: env. de Nieuport (Kickx). Lg.: Forêt (Mout.).
- .20 V. Pini (Alb. et Schwein.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 412; Sacc. Syll. Fung. I p. 113; Lamb. Fl. myc. II p. 375. Sphaeria — Alb. et Schwein. Consp. (1805) p. 20.
 - Bi: Héverlé, Eegenhoven (Paque). Lx.: Vaux-le-Chêne (Él. M.).
- 21 V. Populina Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 314; Sacc. Syll. Fung. I p. 131.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 22 V. pustulata Auersw. in Fuck. Fung. Rhen. n. 612; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 162; Lamb. Fl. myc. Supplém. I.p. 199; Sacc. Syll. Fung. I p. 135.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 23 V. rhodophila Berk. et Br. in Ann. and Mag. of nat. Hist. ser. III (1859) p. 367; Sacc. Syll. Fung. I p. 136.
 N.: Hastière (Bm. et R.).
- 24 V. Rubi Fuck. Symb. myc. (1869) p. 200; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 198; Sacc. Syll. Fung. I p. 109. Rel. Westendorpianae.

25 V. Salicina (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; Kichx Fl. crypt. I p. 324; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 162; Sacc. Syll. Fung. I p. 131; Lamb. Fl. myc. II p. 369. Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801). p. 47.

Hypoxylon — West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 5 n. 52.

- Bi: Groenendael, Limelette (Bm. et R.), Bruxelles (Él. M.), Louvain, Héverlé, Zoetwater (Paque), Gentinnes (de Limm.), Elewyt (Él. M.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Bell.). Lx.: Laroche (Él. M.).
- 26 V. sepincola Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 35; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 200; Sacc. Syll. Fung. I p. 134.
 N.: Han-sur-Lesse (Bm. et R.).
- 27 V. sordida Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 203; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 162; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 198; Sacc. Syll. Fung. I p. 120.

Lg.: Dolembreux (Mout.). — Bt: Watermael (Bm. et R.).

28 V. Syringae Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 189; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 162: Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 198; Sacc. Syll. Fung. I p. 115.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 29 V. tessela Fries Summa Veg. Scand. II (1849) 411; Kicka Fl. crypt. I p. 327; Sacc. Syll. Fung. I p. 145.
 Fl. occ.: env. d'Ypres (West.).
- 30 V. translucens De Not. Schem. Sfer. (1863) p. 208; Sacc. Syll. Fung. I p. 142.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

31 V. Vitis (Schwein.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 199; Sacc. Syll. Fung. I p. 115.

Sphaeria — Schwein. Syn. Fung. Carol. (1822) n. 117: Fries Syst. Myc. II p. 481.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 8 EUTYPELLA Nitschke Pyr. Germ. (1867); Sacc. Syll. Fung. I p. 145.
- E. alnifraga (Wahlenb.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 150.
 Sphaeria Wahlenb. Fl. suec. (1824-1826) n. 2183.
 Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).
- 2 E. cerviculata (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 146; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 202.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1822) p. 383.

Lg.: Dolembreux, Forêt (Mout.).

3 E. extensa (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 153; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 201.

Sphaeria — Fries Obs. myc. I (1815) p. 175 pl. 3 fig. 2.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 E. grandis (Nits.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 152.
Valsa — Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 164.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

5 E. Padi (Karst.) Sacc. Syll. Fung, I (1882) p. 147.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).
E. pentagona (Pers.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 148.
Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 42.

Lx.: Laroche (Él. M.).

F. prunastri (Pers.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 147; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 163.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 37.

Hypoxylon — West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 43.

Valsa — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411; Lamb. Fl. myc. II p. 371.

Bt: Watermael, Boitsfort (Bm. et R.), entre Tervueren et Auderghem, Tervueren (Él. M.). — Lg.: Dolembreux (Mout.).

8 E. Sorbi (Schmidt) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 148.

Sphaeria — Schmidt in Kunze et Schmidt Myk. Hefte I (1817) p. 59; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 260.

Valsa — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411.

Sphaeria prunastri var. — Alb. et Schwein. Consp. (1805).

Sphaeria coronata Wahlenb. Fl. Lapp. (1812) p. 520.

Bt: Auderghem (Bm. et R.).

9 E. stellulata (Fries) Sacc. Syll. Fung. I p. 149.

Sphaeria — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 380.

Lg.: Beaufays (Mout.). — Bt; env. de Bruxelles (Bm. et R.).

10 E. Tosquinetii (West.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 156.

Sphaeria — West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 82 pl. fig. 2. Valsa — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 375.

Lx.: Mirwart (Tosquinet).

9 VALSELLA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 203; Sacc. Syll. Fung. I p. 158.

 V. adhaerens Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 36; Sacc. Syll. Fung. I p. 159.

Lx.: Ebly (Él. M.).

V. amphoraria (Nitschke) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 158.
Valsa — Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 236.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 V. furva Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 158.

Valsa translucens var. — Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 149.

A.: Westmalle (Bm. et R.).

4 V. Salicis Fuck, f. Populi Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. II (1890) p. 73.

Lg.: Beaufays (Mout.).

- 10 EUTYPA *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 52; Sacc. Syll. Fung. I p. 162.
- I E. Acharii Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 53 t. VII fig. 8-20; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 165; Lamb. Fl. myc. II. p. 386; Sacc. Syll. Fung. I p. 162.

Sphaeria eutypa Fries Syst. myc. II (1823) p. 478; Kicke Fl. crypt. I p. 341.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Tervueren, Limelette (Él. M.). — Fl. occ.: Menin (West.). — Fl. or.: Gand (Kickx).

2 E. aspera (Nitschke) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 214.

Valsa — Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 132. Bt; Tervueren (Bm. et R.).

3 E. flavovirescens (Hoffm.) Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 57. t. VII fig. 1-7; Bomm. et Rouss. Fl. mye. env. Brux. p. 165; Lamb. Fl. myc. II p. 385; Sacc. Syll. Funh. I p. 172.

Sphaeria — Hoffm. Veget. crypt. I (1787) p. 10. Bt: Watermael (Bm. et R.). — N: Louette-St-Pierre (Aub.).

4 E. heteracantha Sacc. Mich. I (1878) p. 504; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 165; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 192.

Valsa — Sacc. Myc. Ven. spec. (1873) p. 129 t. XIV fig. 35-42.

Bt; env. de Bruxelles (Bm. et R.).

5 E. lata (Pers.) Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 56; Sacc. Syll. Fung. I p. 170; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. 165; Lamb. Fl. myc. II p. 385.

Sphaeria — Pers. Obs. myc. I (1796) p. 66.

Hypoxylon — West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 48. Bt: Groenendael (Bm. et R.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Rixensart (Él. M.).

6 E. lejoplaca (Fries) Cooke Handb. II (1871) p. 800; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 165, Lamb. Fl. myc. II p. 387; Sacc. Syll. Fung. I p. 170.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 370.

Bt: Uccle, Groenendael (Bm. et R.).

7 E. ludibunda Sacc. Mich. I. (1878) p. 15 et 501; Sacc. Syll. Fung. I p. 167; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 193.
Zone ardenn. (Lamb.).

- 8 E. maura (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 166.
 Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 370.
 N.: Hastière (Bm. et R.).
- 9 E. prorumpens (Wallr.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 172.
 Sphaeria Wallr. Fl. crypt. II (1833) p. 780.
 N.: Mariembourg (Montagne-au-buis) (Bm. et R.).
- 10 E. Rhodi (Nitschke) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 213; Sacc. Syll. Fung. 1 p. 176.
 Valsa Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 148.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 11 E. scabrosa (Bull.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 215; Lamb. Fl. myc. II p. 386; Sacc. Syll. Fung. I p. 171.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 12 E. subtecta (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 214; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 165; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 193; Sacc. Syll. Fung. I p. 164.

 Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 376.

 Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- E. tetragona (Duby) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 166.
 Sphaeria Duby Bot. Gall. II (1830) p. 703.
 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 14 E. Ulicis (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 180; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 166; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 193. Sphaeria Fries in Linnaea (1830) p. 544; Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 382. Bt: Groenendael (Él. M.), Marbais (de Limm.), Groenendael (Él. M.). Lx.: Ebly (Él. M.).
- 15 E. velutina (Wallr.) Sacc. Fung. Ven. ser. IV (1873-82) p. 16. Sphaeria Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. (1833) p. 844. Hypoxylon West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 387. Fl. or.: Dans une cave humide (West.).
 - 11 CRYPTOSPHAERIA Grev. Sc. crypt. Fl. III (1822) t. 13; Sacc. Syll. Fung. I p. 182.
- C. ligniota (Fries) Auersw. in Rabenh. Fung. Eur. n. 1269.
 Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 376.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 C. millepunctata Grev. Scott. Crypt. Fl. IV (1823-29) p. t. 201; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 166; Lamb. Fl. myc. II

p. 389 et Supplém. I p. 194; Sacc. Syll. Fung. I p. 182. Sphaeria — Spreng. ex Kicka Fl. crypt. I p 342.

Bt: env. de Bruxelles CC. (Bm. et R.). — Fl. occ.: Courtrai (West.). — Lx.: Poix (Él. M.).

3 C. ocellata (Fries) Ces. et De Not. Schem. Sfer. it. (1861) p. 57; Sacc. Syll. Fung. I p. 189.

Sphaeria - Fries in Kunze Myk. Hefte II (1823) p. 53.

Cryptospora - Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 365.

Bt: Vlierbeek (Leburt.), Watermael (Bm. et R.). — N.: citadelle de Namur (Bell.). — Fl. occ.: Courtrai (Wallays).

4 C. Populina (Pers.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 183; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 166; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 194.

Sphaeria — Pers. Ic. Fung. (1798-1809) p. 52 t. 21 fig. 5.

Sphaeria corticis Fries Syst. myc. II (1823) p. 481.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Louvain, Kessel·Loo, Eegenhoven (Paque). — Fl. occ.: Courtrai (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 12 CRYPTOVALSA Ces. et De Not. Schem. Sfer. it. (1861) p. 29; Sacc. Syll. Fung. I p. 189.
- C. Nitschkei Fuch. Symb. myc. (1869) p. 212; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 194; Sacc. Syll. Fung. I p. 188.
 N.: Yvoir (Bm. et R.). Lg.: Beaufays (Mout.).
- 2 C. protracta (Pers.) De Not. Schem. Sfer. it. (1861) p. 29 p. p.; Sacc. Syll. Fung. I p. 187.

N.: Hastière (Bm. et R.).

3 C. Rabenhorstii (Nitschke) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 190.

Valsa - Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 158.

Sphaeria spiculosa var. Robiniae *Rabenh*. in *Klotzsch* Herb. myc. ed. I n. 1843.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

- 13 DIATRYPE Fries Pl. homon. (1825) p. 106; Sacc. Syll. Fung. I p. 191.
- 1 D. bullata (Hoffin.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 385; Kickw Fl. crypt. I p. 302; Sacc. Syll. Fung. I p. 192; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 169; Lamb. Fl. myc. II p. 416.

Sphaeria — Hoffm. Veg. Crypt. I (1787) p. 5; Pers. Syn. Fung. p. 27.

Hypoxylon — West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. Anv. (1838) p. 5 n. 53.

FI. or.: env. de Gand (Kickx). — FI. occ.: env. d'Ypres et de Courtrai (West.). — Lx.: Beaufays (Mout.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Forêt de Soignies (West. et Van Haes.). — N.: Louette St-Pierre (Aub.).

- 2 D. disciformis (Hoffin.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 385; Kicka Fl. crypt. I p. 303; Sacc. Syll. Fung. I p. 191; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 169; Lamb. Fl. myc. II p. 415. Sphaeria — Hoffin. Veg. Crypt. I (1787) p. 15.
 - Lg.: Liége (Mout.), Goé (Él. M.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). Lx.: Ebly (Él. M.).
 - var. grisea Fries; Kickw Fl. crypt. I p. 303.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Fl. or.: Melden (Kickx).
- 3 D. stigma (Hoffm.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 386; Kickx Fl. crypt. I p. 301; Sacc. Syll. Fung. I p. 193; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 169; Lamb. Fl. myc. II p. 414. Sphaeria Hoffm. Veg. Crypt. I (1787) p. 7 t. II fig. 2. Nemaspora microspora Desm. in Ann. Sc. nat. (1830) t. VI fig. 1.
 - Bt.: Laeken (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
 - var. rugosa Kicka Fl. crypt. I (1867) p. 301. Fl. occ.: Env. de Courtrai (West.).
 - var. exserta Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 301.
 Flandres (Kickx).
 - var. undulata Fuck. Symb. myc. (1869) p. 23.
 Sphaeria Pers. in Moug. et Nestler Exsicc. n. 371.
 - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
 - 14 DIATRYPELLA Ces. et De Not. Schem. Sfer. it. (1861) p. 28; Sacc. Syll. Fung. I p. 200.
- 1 D. aspera (Fries) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 74; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 169; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 196; Sacc. Syll. Fung. I p. 204. Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 354.
 - Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 2 D. decorata Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 79; Sacc. Syll. Fung. I p. 203; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 195. Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 D. favacea (Fries) Ces. et De Not. Schem. sfer. (1861) p. 28; Sacc. Syll. Fung. I p. 201; Lamb. Fl. myc. II p. 418. Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 354.
 - Lg.: Angleur (Mout.). Bt: Watermael (Bm. et R.).

4 D. melasperma (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 208.

Sphaeria — Fries Syst, myc. II (1823) p. 389,

Melanconis - Tul.; Lamb. Fl. myc. II p. 357.

- N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Ht: env. de Mons (Dumont).
- 5 D. nigro-annulata (Grev.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 81; Sacc. Syll. Fung. I p. 202; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 195. Sphaeria.— Grev. ex Sacc. loc. cit.
 Lg.: Forêt, Tilff (Mout.).
- 6 D. quercina (Pers.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 71; Sacc. Syll. Fung. I p. 206; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 169; Lamb. Fl. myc. II p. 416.

Sphaeria — Pers. Tent. Disp. Meth. Fung. (1797) p. 2.

Diatrype — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 385; Kickw Fl. crypt. I p. 303.

- Bt: Groenendael, bois de la Cambre (Bm. et R.). FI. or.: Destelbergen (Kickx).
- 7 D. Tocciaeana De Not. Sfer. it. (1863) p. 30 t. XXXI; Sacc. Syll. Fung. I p. 202.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

8 D. verrueiformis (Ehrenb.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 76;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 169; Lamb. Fl. myc. II p. 417.
Diatrype — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 385; Kicke Fl. crypt. I p. 304.

Sphaeria - Ehrenb. Fl. Crypt. exs. n. 385.

Bt: bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx). — N.: env. de Namur (Bell.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

SECT. PHAEOSPOREAE.

- 15 CERATOSTOMA Fries Syst. Veg. Scand. II (1849) p. 392; Sacc. Syll. Fung. I p. 215.
- C. caulincolum Fuck. Symb. myc. (1869) p. 130; Sacc. Syll. Fung. I p. 217; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 163.
 Lg.: Beaufays, Dolembreux (Mout.).
- 2 C. piliferum (Fries) Fuck. Symb. myc. (1889) p. 128; Sacc. Syll. Fung. I p. 219; Lamb. Fl. myc. II p. 260. Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) 472; Kitha Fl. crypt. I p. 339.

Bi: Groenendael (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). — Lx.: Ebly (Él. M.).

3 C. robustum Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 10.

Lg.: env. de Liége (Mout.).

- 4 C. vitis Fuck. Symb. myc. (1869) p. 129; Sacc. Syll. Fung. I p. 218; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 162.
 tg.: Beaufays (Mout.).
 - 16 CHAETOMIUM Kunze in Kunze et Schmidt Myk. Hefte I (1817) p. 15; Sacc. Syll. Fung. I p. 220.
- C. bostrychodes Zopf in Nova Acta Bd 42 (1881) p. 81 t. 7 fig. 14-28; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 196; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 145; Sacc. Syll. Fung. I p. 224.
 Lg.: Liége (Mout.). Bt: Evere, Limelette, Malaise (Él. M.). Fl. occ.: Ostende (Él. M.). Lb.: Eelen (Él. M.).
- 2 C. chartarum Ehrenb. Sylv. myc. Berol. (1818) 15 et 27; Kickx Fl. crypt. I p. 368; Sacc. Syll. Fung. I p. 223; Lamb. Fl. myc. II p. 167.
 - Fl. or.: Gand (Demey). N.: Gembloux (Él. M.).
- 3 C. comatum (Tode) Fries Syst. myc. III (1829) p. 203; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 195; Sacc. Syll. Fung. I p. 221. Sphaeria Tode Fung. Meckl. II (1791) p. 15.
 - C. elatum Kunze et Schmidt Myk. Hefte I (1817) p. 19 t. I fig. 3; Kickw Fl. crypt. I p. 368; Lamb. Fl. myc. II p. 167.
 - Bt: Watermael, Uccle (Bm. et R.), Bergh (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo (Leburt.), Eegenhoven, Wilsele (Paque). Fl. occ.: env. de Courtrai (Wallays). N: Louette-St-Pierre (Aub.). Ht: Beloeil (Él. M.).
- 4 C. crispatum Fuck. Symb. myc. (1869) p. 90; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 196; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 146; Sacc. Syll. Fung. I p. 224.
 - Bt: St-Josse-ten-Noode (Él. M.). Lx.: Assez abondant (Él. M.).
 - 5 C. cuniculorum Fuck. Symb. myc. (1869) p. 89; Lamb. Fl. myc. supplem. I p. 146; Sacc. Syll. Fung. I p. 224. Ht: Masnuy-St-Pierre (Él. M.).
- 6 C. Fibieri Corda Icon. Fung. I (1837) p. 24 fig. 293; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 195; Sacc. Syll. Fung. I p. 223. Bt: Bruxelles (Bm. et R.).
 - var. Saccardianum Bomm. et Rouss.; Lamb. Fl. myc. supplém. I (1887) p. 145.
 Zone arg.-sablon. sec. Lamb.
 - 7 C. Kunzeanum Zopf in Nova Acta Bd 42 (1881) p. 244.
 - var. fimicolum El. March. in Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 195.
 - ·Bi: Jardin botanique de Bruxelles, Elewyt (Él. M.).

- 8 C. pannosum Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 267; Sacc. Syll. Fung. I p. 221.
 - Bt: Jardin de l'observatoire à Bruxelles (Bm. et R.).
- 9 C. spirale Zopf in Nova Acta Bd 42 (1881) p. 79 t. 6, fig. 21-26; Lamb. Fl. myc. Suppl. I p. 146; Sacc. Syll. Fung. I p. 224.

 Bt: Aerschot (Él. M.). — Lb.: Genck (Bm. et R.).
 - 17 BOMMERELLA El. March. in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. t. XXIV (1895) p. 165; Sacc. Syll. Fung. Suppl. I-IV p. 38.
- 1 B. trigonospora £l. March. Bull. Soc. bot. Belg. t. XXIV (1895) p.165 et t. XXVIII pl. X; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 147; Sacc. Syll. Fung. Suppl. 1-4 p. 38.
 - 18 HELMINTHOSPHAERIA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 166; Sacc. Syll. Fung. I p. 230.
- 1 H. Clavariarum (Desm.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 166; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 160; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 185; Sacc. Syll. Fung. I p. 230.

Peziza - Desm. in Ann. Sc. nat. (1837) t. 2 fig. 1.

- Bt: Groenendael (Bm. et R.).
 - 19 SORDARIA Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) 51; Sacc. Syll. Fung. I p.
- 1 S. anserina (Rabenh.) Wint. Deutsch. Sord. (1873) p. 35; Lamb. Fl. myc. suppl. I p. 171; Sacc. Syll. Fung. I p. 238.
 Malinvernia Rabenh. in Herb. myc. n. 526.
 - A.: Jardin zoologique d'Anvers (Mout.). N.: Mariembourg (Él. M.).
- 2 S. appendiculata (Auersw.) Niessl Beitr. z. Kenntn. d. Pilze (1876) p. 38 t. V; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 186; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 171; Sacc. Syll. Fung. I p. 234.

Ht: Masnuy-St-Pierre (Él. M.). — Lb.: Genck (Bm. et R.). — Bt: Limelette (Él. M.). — Lg.: Gomzé (Mout.). — Fl. occ.: Ostende (Él. M.).

3 S. carbonaria (*Plowr.*) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 233: Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 185; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 169.

Sphaeria — Plowr. in Grevillea II (1874) 188 t. 25 fig. 3.

- Bi: Groenendael (Bm. et R.). Lg.: env. de Liége AC. (Mout.).
- 4 S. coprophila (Fries) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 52 t. XX; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 185; Sacc. Syll.

Fung. I p. 230.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 342.

Hypoxylon coprophilum Fries Summ. Veg. Scand. II (1849) Kickv Fl. crypt. I p. 305.

Cercophora mirabilis Fuck. Symb. myc. (1869) p. 245.

Bt: Env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Malaise, env. d'Aerschot (Él. M.). — Ht: Belœil (Él. M.). — Lx.: Awennes, Chiny, entre Poix et Mirwart (Él. M.). — Fl. occ.: Nieuport (West.). — Lb.: Genck (Él. M.). — N.: Olloy (Él. M.).

- 5 S. curvula De Bary Morph. und Phys. d. Pilze I (1864) p. 209; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 185; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 170; Sacc. Syll. Fung. I p. 233.
 - Ht: Ath, Belwil, Basècle (Él. M.). Bt: Etterbeek (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). Lb.: Eelen (Él. M.). Lx.: Sud de la province C. (Él. M.).
 - var. tetraspora Él. March. in Bull. soc. roy. Bot. Belg. t.
 XXIII part. 2 (1884) p. 12.
 Bt: Etterbeek (Él. M.).
 - var. aloides (Fuck.) Wint. Deutsch. Sord. (1873) p. 38; Sacc. loc. cit. p. 234.

Sordaria - Fuck. Syn. Nachtr. II (1873) p. 43.

N.: Marche-les-Dames (Paque).

- 6 S. decipiens Wint. Deutsch. Sord. (1873) p. 28 pl. IX; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 171; Sacc. Syll. Fung. I p. 235.
 - Lg.: env. de Liége (Mont.). A.: Aerschot, entre Boisschot et Beggynendyk (Él. M.). Ht: Blaton (Él. M.). Lb.: Eelen (El. M.).
- 7 S. fimiseda Ces. et De Not. Schem. class. (1861) p. 52; Wint. Sord. p. 25 t. IX fig. 13; Sacc. Syll. Fung. I p. 232.

Podospora fimicola *Oes.* in *Rabenh.* Herb. myc. n. 259 et in Hedw. I (1861) n. 15; *Kiekx* Fl. crypt. I p. 362; *Lamb.* Fl. myc. II p. 436.

Ht: Stambruges (Él. M.). — Lx.: Auby (Bm. et R.). — Bt: entre Beggynendyck et Aerschot (Él. M.). — FI. or.: Gand (Coem.). — FI. occ.: dunes (Piré). — Lx.: Barvaux (Él. M.).

- 8 S. hirta Hans. Champ. sterc. du Dan. (1876) p. 22; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 185; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 171; Sacc. Syll. Fung. I p. 232.
 - Lb.: Genck (Bm. et R.). Lx.: Ebly, Awennes (Él. M.). Lg.: Goé (Él. M.). Ht: Baudour, Beloeil (Él. M.). Bt: Tervueren (Él. M.).
- 9 S. lanuginosa (Preuss) Sacc. Fung. ven. sér. VI (1873-82) p. 26; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 172; Sacc. Syll. Fung. I p. 237. Sphaeria — Preuss in Linnaea XXVI (1853) p. 114.

Lg.: Beaufays, Liége (Mout.).

- 10 S. lignicola Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 38; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 170; Sacc. Syll. Fung. I p. 236.
 Lg.: Forêt (Mout.). Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 11 S. minuta Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 44; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 185; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 170; Sacc. Syll. Fung. I p. 231.

Ht: Stambruges, Baudour, Camp de Casteau (Él. M.). — N.: Yvoir (Él. M.). — Bt: Boitsfort (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — Lx.: Laroche et env. C., Grupont (Él. M.). — Ht: Masnuy (Él. M.), Montbliart (Hardy). — Lg.: env. de Spa, Baraque-Michel, Francorchamps C. (Él. M.).

— var. tetraspora (Wint.).

Sordaria - Wint. in Hedwigia (1871) p. 161.

Bt: Tervueren, Limelette, Aerschot (Él. M.). — Ht: Masnuy St Pierre (Él. M.). — N.: Marche-les-Dames (Él. M.). — Lx.: Poix (St-Hubert) (Él. M.). — Fl. occ.: Ostende (Él. M.).

— var. leptospora £l. March. in Bull. Soc. roy. bot. Belg.
 t. XXIII 1884 p. 90.

Bi : Hoeylaert (Él. M.).

- 12 S. neglecta *Hans*. Champ. sterc. du Dan. (1876) p. 22 t. IX fig. 12-18; *Sacc*. Syll. Fung. I p. 232; *Lamb*. Fl. myc. Supplém. I p. 174. Lx.: Ebly (Él. M.).
- 13 S. pilosa Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. I (1886) p. 144, pl. IV fig. 1-3; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 170. Lg.: Gomzé, Forêt (Mout.).
- 14 S. ustorum Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 11.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 15 S. Winteri Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 251 in obs.; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 171; Sacc. Syll. Fung. I p. 234.
 Lb.: Bockryck (Él. M.).
 - 20 HYPOCOPRA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 240; Succ. Syll. Fung. I p. 240.
- 1 H. discopora (Auersw.) Fuck. Symb. App. II (1873) p. 241; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. 186; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 174; Sacc. Syll. Fung. I p. 241.

Sordaria — Auersw. in Wint. Deutsch. Sord. (1873) 19 et tab. VIII fig. 8. Ht: Sirault, Camp. de Casteau, Bandour, Masnuy (Él. M.). — Fl. occ.: Ostende (Él. M.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.), Boitsfort, Rixensart, Limelette, entre Aerschot et Rillaer (Él. M.). — Lx: Poix (Él. M.).

2 H. dunarum Mont. in Bull. Soc roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 145 pl. IV fig. 4-5; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 176. Fl. occ.: Blankenberghe (Mont.).

3 H. fimicola (Rob.) Sacc. Syll, Fung. I (1882) p. 240; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 186; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 175.

Sphaeria — Rob. ex Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 339.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — Lx.: Grupont, Smuid, Ebly (Él. M.). — Lb.: Genck, Maeseyck (Él. M.). — Hf: Stambruges (Él. M.).

4 H. humana Fuck. Symb. myc. (1869) p. 241; Sacc. Syll. Fung. I p. 240.

Bt: Bruxelles (Él. M.).

5 H. macrospora (Auersw.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 241; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 186.

Sordaria - Auersw. in Rabenh. Fungi Eur. n. 954.

Sphaeria stercoris DC. Fl. fr. II (1805) p. 294; Kickx Fl. crypt. I p. 332. Hypocopra — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 241.

Ht: Stambruges, Masnuy-St-Pierre (Él. M.), Sirault (Él. M.). — Bt: Elewyt: Aerschot, Boitsfort, Tervueren, Limelette, Malaise (Él. M.), Héverlé (Paque). — Lb.: Genek (Bm. et R.). — Fl. occ.: Nieuport (West.).

6 H. maxima (Niessl) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 245; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 175.

Sordaria — Niessl in Rabenh. Fungi Eur. 1340.

Lg.: Louvegnez (Mout.). — Ht.: Camp de Casteau, Stambruges (Él. M.). — Fl. occ.: Nieuport (Bm. et R.).

7 H. microspora (Plowr.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 141; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 174.

Sordaria - Plowr. in Grevillea VI (1877) p. 28 t. 94, fig. 3.

Fl. occ.: Ostende (Mout.). - Bt.: Aerschot (Él. M.).

8 H. minima (Sacc. et Speg.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 244; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 174.

Sordaria - Sacc. et Speg. in Michelia I (1878) 373.

Ht: Camp de Casteau (Él. M.). — Lb.: Genck (Bm. et R.). — Lx.: Ebly (Él. M.). — N.: Anseremme (Él. M.).

9 H. platyspora (Plowr.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 241; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 186; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 175.

Sordaria - Plowr. in Grevillea VI (1877) p. 28 t. 94 fig. 2.

tg.: Louvegnez, Dolembreux (Mout.), Spa, Baraque-Michel (El. M.). — Bt: Limelette, Boitsfort (Él. M.). — N.: bois de Marlagne (Él. M.). — Lb.: Lanaeken (Bm. et R.).

10 H. Rabenhorstii (Niessl) Sacc. Syll. Fung. (1882) p. 245 Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 174.

Sordaria - Niessl in Rabenh. Fung. Eur. 1528.

Fl. occ. : Blankenberghe (Mout.).

- 11 H. Saccardoi Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV (1885) part. 1 p. 59 pl. fig. 7-9; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 175. Lx.: Neufchateau (Él. M.).
 - 21 COPROLEPA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 240; Sacc. Syll. Fung. I p. 248.
- 1 C. equorum Fuck. Symb. myc. (1869) p. 240; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 176; Sacc. Syll. Fung. I p. 249.
 Lg.: Forêt, Boncelles (Mout.).
- C. fimeti (Pers.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 248.
 Sphaeria Pers. Syn. Fung. (1801) p. 64.
 Hypocopra Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 397; Kickx Fl. crypt. I p. 362; Lamb. Fl. myc. II p. 434.
 - Fl. occ.: dunes (Kickx), Hoogenblikker (Piré), Ostende (Él. M.). Bt: Aerschot, Limelette (Él. M.). Lb.: env. de Genck (Él. M.).
- 3 °C. Kickxii Él. March. in Bull. Soc. roy. de Belgique t. XXV part. 1 (1886) p. 48; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 176. Bt: Beggynendyck (Él. M.).
- 4 C. merdaria (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 240; Lamb. Fl. myc. II p. 433; Sacc. Syll. Fung. I p. 248.

Sphaeria — Fries Elench. Fung. II (1828) p. 100.

Hypocopra — Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 362.

Ht: Stambruges (Él. M.). — Bt: Aerschot, Limelette (Él. M.). — Fl. occ.: Nieuport (West.). — N.: Namèche (Él. M.). — Lb.: Beverloo (Bm. et R.). — Lx.: St-Hubert (Él. M.).

- 22 PHILOCOPRA Speg. in Fungi Arg. Pug. I (1880); Sacc. Syll. Fung. I p. 249.
- P. curvicolla (Wint.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 250; Bomm. et Rouss, Fl. myc. env. Brux. p. 186; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 178.

Sordaria - Wint. Deutsch. Sord. (1873) p. 34 t. 10 fig. 19.

- Ht: Masnuy-St-Pierre (Él. M.). Lg.: Beaufays, Forêt, Angleur (Mout.). Bt: Ottignies (Bm. et R.), Aerschot, Tervueren (Él. M.).
- var. penicillato-setosa Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 145.
 Lg.: Forêt, Gomzé, Tilff (Mout.).
- P. dubia (Hans.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 251; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 187; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 173. Sordaria Hans. Champ. sterc. du Dan. (1876) p. 23 t. VIII fig. 48.
 Bt!: Tervueren (Él. M.).

3 P. Hansenii Oud. in Hedwigia (1882) p. 160; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 172.

Ht: Stambruges (Él. M.). — Lg.: Tilff (Paque), Angleur, Gomzé (Mout.). — Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.). — Lx.: Libramont (Él. M.).

4 P. plejospora (Wint.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 249; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 186; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 173.

Sordaria - Wint. in Hedwigia (1871) p. 161.

Lg.: Beaufays (Mout.). — Lb.: Eelen, Genck (Él. M.). — Fl. occ.: Ostende (Él. M.). — Ht: Happart (Él. M.). — N.: Namèche (El. M.). Mariembourg (Determe). — Lg.: Baraque-Michel (Él. M.). — Bt: Boitsfort, Bergh, Malaise, Rhode-St-Genèse, Rixensart, Aerschot, La Hulpe, Elewyt (Él. M.).

macrospora El. March, in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.
 t. XXXII (1884) p. 90.

Fl. occ.: Ostende (Él. M.). - N.: Olloy (Aigret).

- 5 P. pusilla Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 146; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 172. Lg.: Angleur (Mout.).
- 6 P. setosa (Wint.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 249; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 186; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 173.

Sordaria - Wint. Deutsch. Sord. (1873) p. 33 t. 10 fig. 18.

Lg.: Angleur, Beaufays (Mout.), Aywaille (Él. M.). — Bt: Hoeylaert, Boitsfort, Malaise, Tervueren (Él. M.). — Ht: Baudour (Él. M.). — Lb.: Bockryck (Él. M.).

var. longicolla Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIII (1884) p. 91.

Bt: Boitsfort (Él. M.).

7 P. similis (Hans.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 251. Sordaria — Hans. Champ. sterc. du Dan. (1867) p. 23 t. VIII fig. 1.3. Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

23 ROSELLINIA De Not. in Giorn. Bot. it. II (1847) p. 334; Sacc. Syll. Fung. I p. 252.

- 1 R. abietiena Fuck. Symb. myc. (1869) p. 150; Sacc. Syll. Fung. I p. 271; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 144.

 Lx.: Poix (Bm. et R.). Lg.: env. de Verviers (Lamb.).
- 2 R. aquila (Fries) De Not. Sfer. ital. (1863) p. 21 t. 18; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 195; Lamb. Fl. myc. II p. 292; Sacc. Syll. Fung. I p. 252.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 442; Kickw Fl. crypt. I p. 329 et 356.

Sphaerella aquila *Fries*; *Lamb*. Fl. myc. II p. 219. Sphaeria byssiseda *Tode* Fung. Meckl. (1790) 2 p. 16 fig. 69.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Louvain (Paque). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 3 R. belgica Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 171.

 Lg.: Tilff (Mout.).
- 4 R. calospora Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. II (1847) p. 12 pl. A fig. 4.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 5 R. cellarum Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 294; Sacc. Syll. Fung. I p. 260.

Lg.: Verviers (Lamb.).

- 6 R. conglobata (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 274. Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 414. Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- R. Desmazierii (Berk. et Br.) Sacc. Fung. ital. (1878) t. 393.
 Sphaeria Berk. et Br. Brit. Fung. (anno?).
 Bt: Boitsfort (Bm. et R.).
- 8 R. gomzeensis Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 12.

 Lg.: Gomzé (Mout.).
- 9 R. ligniaria (Grev.) Nitschke ex Fuck. Symb. myc. (1869) p. 150; Sacc. Syll. Fung. I p. 269; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 195; Lamb. Fl. myc. II p. 295. Sphaeria — Grev. Scot. crypt. Fl. I (1823) p. 82. Lg.: (Lamb.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 10 R. mammaeformis (Pers.) Ces. et De Not. in Comm. Soc. critt. ital. I (1861) p. 227; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux., p. 195; Lamb. Fl. myc. II p. 293; Sacc. Syll. Fung. I p. 258. Sphaeria Pers. Syn. Fung. I (1801) p. 64.
 - Bt: Gentinnes (de Limm.), Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.), Watermael (Bm. et R.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 11 R. Morthierii Fuck Symb. myc. (1369) p. 148; Sacc. Syll. Fung. I p. 254.

Bt: Abbaye-de-Villers (Bm. et R.).

- 12 R. pallida Mout. in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 171.
 Lg.: Tilff (Mout.).
- 13 R. pulveracea (Ehrhart) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 149; Sacc. Syll. Fung. I p. 264; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 195;

Lamb. Fl. myc. II p. 293.

Sphaeria — Ehrhart ex Pers. Syn. Fung. (1801) p. 83; Kickx Fl. crypt. I p. 332.

Bi: env. de Bruxelles (Bm. et R.). - Fi. or.: Gand (Kickx).

- 14 R. rimincola Rehm Ascom. (1881) n. 89; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 144; Sacc. Syll. Fung. I p. 266. Lx.: Ebly (Él. M.).
- 15 R. Rosarum Niessl Beitr. z. Kenntn. Pilze (1872) 32 t. XV fig. 35;
 Sacc. Syll. Fung. I p. 266.
 Bt: Abbaye-de-Villers (Bm. et R.).
- 16 R. Schumacheri (Hans.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 276; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 195; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 144.

Sphaerella — Hans. Champ. sterc. Dan. (1867) p. 16, t. VI fig. 24-27.

Lx.: Poix (Él. M.). — Fl. or.: Gand (Él. M.). — Bl: Malaise, Auderghem, Evere, Bruxelles (Él. M.).

17 R. Sordaria (Fries) Rehm Ascom. (1881) p. 192; Sacc. Syll. Fung. I p. 270.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 458.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

18 R. Syringae (Kickx) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 275.
Sphaeria — Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 337.
Cucurbitula — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 323.
Fl. or.: Termonde (West.).

19 R. Thelena (Fries) Rabenh. Fung. Eur. éd. II 747; Sacc. Syll. Fung. I p. 253; Lamb. Fl. myc. II p. 293.

Sphaeria — Fries in Kunze Myk. Hefte II (1791) p. 36; Kickw Fl. crypt. I p. 329.

Lg.: Tilff (Mout.).

20 R. velutina Fuck. Symb. myc. (1869) p. 149; Lamb. Fl. myc. Suppl. I p. 144.

Lg.: Beaufays, Tilff, Gomzé (Mout.). — N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 24 BOMBARDIA Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 389; Sacc. Syll. Fung. I p. 277.
- B. fasciculata Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 389; Sacc. Syll. Fung. I p. 277; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 203; Lamb. Fl. myc. II p. 310.

Sphaeria Bombarda Batsch Elench. Cont. I (1876) p. 271 fig. 181.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Notre-Dame de bonne-odeur (Él. M.). — N.: Olloy (Él. M.). — Lx.: Libramont (Él. M.).

- 25 ANTHOSTOMELLA Sacc. Consp. Gen. Pyrenom. (1875) p. 8 et Syll. Fung I p. 278.
- A. clypeata (De Not.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 283.
 Sordaria De Not. Sfer. ital. (1863) p. 24 t. XXII.
 Lg.: Chaudfontaine (Mont.).
- 2 A. Genistae (Crouan) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 290; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 134.

Sphaeria - Crouan Fl. Finist. (1867) p. 25.

Lx.: Corbion (Bm. et R.), Laroche (Él. M.).

3 A. limitata Sacc. Fungi. Ven. Ser. IV (1873-82) p. 1; et Syll. Fung. I p. 284.

N.: Yvoir, Hastière (Bm. et R.).

4 A. lugubris (Rob.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 278; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 134.

Sphaeria — Rob. ex Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 172; Lamb. Fl. myc. II p. 221.

FI. occ. : Nieuport, Blankenberghe (West.), Ostende (Bm. et R.).

5 A. phaeosticta (Berk.) Sacc. Mich. I (1878) p. 374; Sacc. Syll. Fung. I p. 279.

Sphaeria - Berk. Crypt. Antarct. p. 59 t. 68 fig. IV.

Bi: Groenendael (Bm. et R.).

6 A. tersa Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 73.

Lg. : env. de Liége (Mout.).

7 A. Tomicum (Lév.) Sacc. Fungi Ven. Ser. IV (1873-85) p. 1; Sacc. Syll. Fung. I p. 282.

Sphaeria — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 144; Kickx Fl. crypt. I p. 346; Lamb. Fl. myc. II p. 241.

Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

- 26 ANTHOSTOMA Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 110; Sacc. Syll. Fung. I p. 293.
- 1 A. alpigenum (Fuck.) Sacc. Fung. Ven. Ser. IV (1873-82) p. 18; Sacc. Syll. Fung. I p. 301; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 226. Amphisphaeria — Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 304. Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 A. decipiens (DC.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 111; Sacc. Syll. Fung. I p. 302; Lamb. Fl. myc. II p. 388. Sphaeria DO. Fl. fr. II (1805) p. 285.

· N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

3 A. dryophilum (Curr.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 308; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 227.

Diatrype — *Ourr.* in *Linn.* Trans. t. XXII (1858) p. 279 fig. 75. Lg.: Tilff, Forêt (Mout.).

4 A. endoxyloides Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 146 pl. IV fig. 8-9; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 225.

Lg.: Beaufays (Mout.).

5 A. gastrinum (Fries) Sacc. Myc. Ven. (1873) p. 143 t. XIV fig. 52-57 et Syll. Fung. I p. 303.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 379.

Melogramma — Tul. Sel. Fung. Carp. (1863) p. 89; Kickv Fl. crypt. I p. 305.

Fuckelia — Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 36; Lamb. Fl. myc. II p. 408.

Hypoxylon — West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 387.

FI. occ.: env. de Courtrai (West.).

6 A. melanotes (Berk. et Br.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 326; Sacc. Syll. I p. 294; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 225.

Sphaeria — Berk. et Br. in Ann. and Mag. of nat. Hist. ser. 2 t. IX (1852) p. 322.

Lg.: env. de Liége (Mout.). — N.: Hastière (Bm. et R.).

- 7 A. ostropoides Rehm Ascom. n. 520; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 227; Sacc. Syll. Fung. I p. 304. Zone ardenn. (Lamb.).
- 8 A. turgida (Pers.) Nitschke Pyr. Germ. (1885) p. 111; Sacc. Syll. Fung. I p. 303; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 165; Lamb. Fl. myc. II p. 388.

Sphaeria - Pers. Obs. myc. I (1796) 17.

Valsa — Fries Syst. myc. II (1823) 400; Kicke Fl. crypt. I p. 325.

Hypoxylon - West. in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 112.

Hypoxylon fagineum West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. Anv. (1938) p. 4 n. 51.

Sphaeria — Pers. Syn. (1801) p. 44.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.), Bruxelles (Parc), (West. et Van Haes.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Flandres (Kickx).

9 A. Xylostei (Pers.) Sacc. Fung. ital. (1878) t. 162; Sacc. Syll. Fung. I p. 300.

Sphaeria — Pers. Tent. disp. method. Fung. (1797) p. 4; Kickv Fl. crypt. I p. 341. Didymosphaeria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 141; Lamb. Fl. myc. II p. 282.

Lg.: Dolembreux (Mout.). — N.: Han-sur-Lesse (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Louvain (Leburt.). — Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).

- 27 XYLARIA Hill. Hist. Plant. (1773) p. 62; Sacc. Syll. Fung. I p.
- X. arbuscula Sacc. Myc. Ven. n. 1192 et in Mich. I (1878) p. 249 et Syll. Fung. I p. 337; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 227.
 Rel. Westendorpianae.
- 2 X. carpophila (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 382; Kickx Fl. crypt. I p. 311; Sacc. Syll. Fung. I p. 336; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 173; Lamb. Fl. myc. II p. 430. Sphaeria — Pers. Obs. myc. I (1796) p. 19.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Vlierbeek (Leburt.), Jette (Bm. et R.). — N.: Namur (Bell.).

3 X. corniformis Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 381; Sacc. Syll. Fung. I p. 327.

Sphaeria - Fries Elench. Fung. II (1828) p. 59.

Lx.: Laroche (Él. M.): — Bt: Tervueren (Bm. et R.), Laeken (Él. M.).

4 X. coronata West. in Bull. Soc. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 242 pl. fig. 1; Kickv Fl. crypt. I p. 311; Sacc. Syll. Fung. I p. 314; Lamb. Fl. myc. II p. 430.

Fl. occ.: Courtrai (West.).

5. X. filiformis (Alb. et Schwein.) Fries Summa Veg. Scand II (1849) p. 382; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 173; Lamb. Fl. myc. II p. 431.

Sphaeria — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 2.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

6 X. hippotrichoides (Sow.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 344.

Sphaeria — Sow. in Smith et Sow. Engl. Fung. (1794) t. 200.

Rhizomorpha — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 237; *Lamb.* Fl. myc. II p. 427.

Rhizomorpha setiformis Roth Cat. bot. I (1797) p. 235.

Crypthothamnium usneaforme Wallr.; Kickx Fl. crypt. I p. 312.

C. - var. setiforme Kickx loc. cit. (1867) p. 312.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain, Héverlé (Paque). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

7 X. Hypoxylon (L.) Grev. Fl. Edin. (1824) p. 355; Kickæ Fl. crypt. I p. 310; Kickæ Fl. de Louvain p. 118; Bomm. et Ronss. Fl. myc. env. Brux. p. 172; Lamb. Fl. myc. II p. 429; Sacc. Syll. Fung. I p. 333.

Clavaria - L. Fl. Suec. ed. II (1755) p. 457.

Sphaeria cornuta Hoffm. Veget. Crypt. I (1787) p. 11.

Bi: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Zoetwater, Louvain (Paque). — N.: env. de Namur (Bell.). — Lg.: Tilff (Él. M.). — Lx.: env. de Neufchâteau (Él. M.).

- cupressiformis Woodw.; Kicka Fl. crypt. I p. 311.

X. cupressiforme Kickx Fl. de Louvain (1835) p. 117.

Bt: Corbeek-Dyle, Zoetwater, Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.). — Flandres (Kickx). — N.: Citadelle de Namur, Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

8 X. pedonculata (Dicks.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 382; Sacc. Syll. Fung. I p. 332.

Sphaeria — Dicks. Crypt. Brit. IV (1785-1801) p. 27 t. XII fig. 8.

Bt: Aerschot (Él. M.).

9 X. polymorpha (Pers.) Grev. Flor. Edin. (1824) p. 35; Kickæ Fl. crypt. I p. 309; Sacc. Syll. Fung. I p. 309; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 172; Lamb. Flor. myc. II p. 428. Sphaeria — Pers. Comm. Eungi Clavar. (1797) p. 149.

Ht: Sud de la province C. (Él. M.). — A.: Anvers (West. et Van Haes.). — N.: Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Boitsfort, Parc de Bruxelles (Bm. et R.). — Lg.: Tilff (Mout.), Ardennes Liégeoises C. (Él. M.). — Flandres (Kickx). — Lx.: Laroche et env. C. (Él. M.).

- spatulata Fers. Syn. Fung. (1801) p. 8; Kickw loc. cit. p. 310.
 Flandres (Kickx).
- 10 X. Tulasnei Nitschke Pyr. germ. (1867) p. 8; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 172; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 228; Sacc. Syll. Fung. I p. 334.

N.: La Plante, Mariembourg (Él. M.). — Lb.: Bockryck (Él. M.). — Ht: Baudour, Stambrages (Él. M.). — Bt: Boitsfort, Limelette, Aerschot, Rixensart (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: Gomzé, Boncelles (Mout.). — Lx.: Haré, St-Hubert (Él. M.).

11 H. udum (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 384; Sacc. Syll. Fung. I p. 386.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 33.

Bt: Tervueren (Él. M.).

- 28 PORONIA Willd. Flor. Berol. Prodr. (1787) p. 400; Sacc. Syll. Fung. I p. 348.
- P. punctata (L.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 382; Kickx Fl. crypt. I p. 309; Kickx Fl. de Louvain p. 116; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 173; Sacc. Syll. Fung. I p. 348; Lamb. Fl. myc. II p. 432.

Peziza — L. Fl. Suec. II (1755) p. 458.

Fl. occ.: env. de La Panne (Kickx, Piré), Blankenberghe (Bm. et R.). — Bt: Forest (Kickx).

- 29 USTULINA Iul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 23; Sacc. Syll. Fung. I p.
- U. vulgaris *Tul*. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 23 t. III fig. 1-6;
 Bomm. et *Rouss*. Fl. myc. env. Brux. p. 172; *Lamb*. Fl. myc. II
 p. 425; *Sacc*. Syll. Fung. I p. 351.

Hypoxylon ustulatum Bull. Champ. de Fr. I (1791) p. 176 t. 487 fig. 1; Kickx Fl. crypt. I p. 306.

Bt: Boitsfort, Watermael (Bm. et R.), Tervueren, Limelette (Él. M.). — Fl. or.: Audenarde (Scheidweiler), env. de Gand (Kickx). — N.: Dinant (Él. M.). — Lx.: Ebly (Él. M.).

- 30 HYPOXYLON *Bull.* Champ. de Fr. I (1791) p. 168; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 352.
- 1 H. argillaceum (Pers.) Berk. Outl. (1860) p. 380; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 171; Lamb. Fl. myc. II p. 423; Sacc. Syll. Fung. I p. 354.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 10.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre (Bm. et R.), Tervueren, La Hulpe (Él. M.). — Ht: Baudour (Él. M.). — Lx.: Ebly (Él. M.).

2 H. coccineum Bull. Champ. de Fr. (1791) p. 174 t. 345 fig. 2; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 171; Lamb. Fl. myc. II p. 419; Sacc. Syll. Fung. I p. 353.

Sphaeria fragiformis Pers. Syn. Fung. (1801) p. 9.

Hypoxylon - Kickx Fl. de Louvain (1855) p. 116; Kickx Fl. crypt. I p. 307.

- N.: env. de Namur (Bell.). Bt: bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.), Louvain (Leburt.), Boitsfort (Kickx), Gentinnes (de Limm.). Fl. or.: env. de Gand (Kickx). Campine (Van Haes.).
- 3 H. cohaerens (Pers.) West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 5 n. 54; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 171; Lamb. Fl. myc. II p. 422.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 11.

- Bt: Rouge-Cloître (West. et Van Haes.), Gentinnes (de Limm.), Tervueren (Él. M.).
- 4 H. crustaceum (Sow.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 49; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 171; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 228; Sacc. Syll. Fung. I p. 381.

Sphaeria — Sow. in Engl. Fungi (1797) t. 372 fig. 41.

Bi : N.-D. de bonne-Odeur (Él. M.).

5 H. fuscum (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849 p. 384; Kickx Fl. crypt. I p. 307; Sacc. Syll. Fung. I p. 361; Bomm. et Rouss.

Fl. myc. env. Brux. p. 171; Lamb. Fl. myc. II p. 420.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 12.

H. fuscum var. confluens Wild.

Bt: Forest, Laeken (Bm. et R.), Tervueren, Notre-Dame de bonne-Odeur, Malaise (Él. M.), Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — Lx.: l'oix, Laroche (Él. M.). — Fl. occ.: Courtrai env. d'Ypres (West.). — N.: Louette St-Pierre (Aub.).

- 6 H. leucostigma (Lév.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 367.
 Sphaeria Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IX (1848) p. 142.
 N.: Louette St-Pierre (Aub.).
- 7 H. multiforme Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 384 Kickx Fl. crypt. I p. 308; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 171; Lamb. Fl. myc. II p. 422; Sacc. Syll. Fung. I p. 363.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) 334.

Hypoxylon granulosum Bull. Champ. de Fr. (1791) t. 487 fig. 2.

Lg.: Dolembreux, Forêt (Mout.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or.: Beveren, Gand (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht: Cyply (Michot). — A.: env. d'Anvers (West. et Van Haes.).

8 H. rubiginosum (Pers.) Fries Summa Veg. Scand II (1849) p. 384; Kickv, Fl. crypt. I p. 306; Sacc. Syll. Fung. I p. 376; Lamb. Fl. myc. II p. 421.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 11.

Fl. or.: Gand (West., Coem.).

- 9 H. semi-immersum Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 50; Sacc. Syll. Fung. I p. 387.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 10 H. serpens (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. II p. 284 (1849); Kickx Louvain p. 115; Kickx Fl. crypt. I p. 306; Sacc. Syll. Fung. I p. 378; Lamb. Fl. myc. II p. 423. Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 20.

Lx.: Marche (Bm. et R.). - Bt: Berchem (Kickx). - Flandres (Kickx).

11 H. Udum (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 384; Bomm. et Rouss, Fl. myc. env. Brux. p. 171; Lamb. Fl. myc. II p. 423. Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 33. Sphaeria — Tode Meckl. Sel. I (1790) p. 19; Kicke. Fl. crypt. I p. 332.

Lg.: Beaufays (Mout.). — Bt: Gentinnes (de Limm.).

- 31 DALDINIA De Not. et Ces. Schem. Sfer. it. (1861) p. 198;
 Sacc. Syll. Fung. I p. 393.
- D. concentrica (Bolt.) Ces. et De Not. Schem. Sfer. it. (1861) p. 198; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 172; Sacc. Syll. Fung. I p. 393.

17

Sphaeria — Bolt. Fung. Halif. (1788-91) pl. 180.

Hypoxylon — Grev. Scot. Flor. VI (1829) pl. 324; Lamb. Fl. myc. II p. 424. Bt: Groenendael (Gravis). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 32 NUMMULARIA Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 42; Sacc. Syll. Fung. I p. 395.
- N. Bulliardi Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 43 t. V fig. 11;
 Kickv Fl. crypt. I p. 308; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.
 p. 172; Lamb. Fl. myc. II p. 426; Sacc. Syll. Fung. I p. 396.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or.: Ursele, Destelbergen (Kickx). — Lx.: Libramont (Él. M.).

SECT. HYALOSPOREAE.

- 33 CERATOSTOMELLA Sacc. in Mich. I (1878) p. 370 et Syll. Fung. I p. 408.
- 1 C. ampullacea (Oooke) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 409; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 162.

Sphaeria — Cooke Handbuch II (1871) p. 876.

Lg.: Tilff (Mout.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

C. barbirostris (Duf.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 410.
 Sphaeria — Duf. in Turp. Icon. (1841) fig. 1.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 3 C. capilliformis Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 257.
- Bt: Groenendael (Bm. et R.).
 4 C. cirrhosa (Pers.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 408; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 189.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 59.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 5 C. excelsior Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 12.
 - Lg. : Beaufays (Mout.).
- 6 C. hydrophila *Mout*. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887)

Lg.: Beaufays, Tilff (Mout.).

7 C. rostrata (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 408.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 473.

Ceratostoma — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 127; Lamb. Fl. myc. II p. 260. Sine loco (Lamb.).

8 C. stricta (Pers.) Sacc. in Mich. II (1880) 53; Sacc. Syll. Fung. I

p. 410; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 162.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 59.

Lg.: Beaufays (Mout.).

- 9 C. vestita Sacc. in Mich. I (1878) p. 370; Sacc. Syll. Fung. I p. 409; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 161.
 - Lg.: Louvegnez (Mout.). Bt: Boitsfort (Bm. et R.).
 - 34 GNOMONIELLA Sacc. in Mich. II (1880) p. 312 et Syll. Fung. I p. 413.
- 1 G. amoena (Nees) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 414. Sphaeria Nees in Act. Ac. Nat. Cur. t. IX t. 6 fig. 24. Bt: Hoeylaert (Bm. et R.).
- 2 G. Angelicae (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 417; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 190.

Sphaeria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 113; Lamb. Fl. myc. II p. 242. Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

3 G. circinata (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 416; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p.-190; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 115.

Sphaeria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 111.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

4 G. Coryli (Batsch) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 419.

Sphaeria — Batsch El. Fung. Cont. II (1789) fig. 231; Kickx Fl. crypt. I p. 352.

Gnomonia — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 120; Lamb. Fl. myc. II p. 251.

Bt: Gentinnes (de Limm.). - Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

5 G. devexa (Desm.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 417.

Sphaeria — Desm. Crypt. de Fr. ed. II n. 367; Kickx Fl. crypt. I p. 350. Plagiostoma — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 119; Lamb. Fl. myc. II p. 249.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or.: env. de Termonde (West.).

6 G. emarginata (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 414; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 190; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 114.

Gnomonia - Fuck. Symb. myc. (1869) p. 122.

Bt: Limelette (Bm. et R.).

7 G. fimbriata (Pers.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 419; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 190.

Sphaeria — Pers. Obs. myc. I (1796) p. 70; Kicka Fl. crypt. I p. 352.

Gnomonia - Fuck. Symb. myc. (1869) p. 120.

Dothidea — Kickx Fl. Louv. (1835) p. 112.

Bt: Bois de la Cambre, Limelette (Él. M.). — Lg.: Spa (Él. M.), Beaufays,

Dolembreux (Mout.). — N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St Pierre (Aub.), Onoz (Él. M.). — Lx.: Laroche, Melreux, Ebly (Él. M.).

8 G. lugubris (Karst.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 415; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 114.

Gnomonia - Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 121.

Bt: Ottignies (Bm. et R.).

9 G. melanostyla (DC.) Sacc. Syll. Fung. I p. 419; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 114.

Sphaeria — DO. Fl. fr. VI (1815) p. 129.

Lg.: Beaufays (Mout.). - N.: Yvoir (Bm. et R.).

10 G. tubaeformis (Iode) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 413; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Bruk. p. 190.

Sphaeria — Tode Meckl. Sel. II (1791) p. 51 fig. 128.

Gnomonia — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 120; Lamb. Fl. myc. p. 251).

Bt: Gentinnes (de Limm.).

11 G. vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 416. Gnomonia — Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 57. Lg.: Env. de Liége (Mout.).

35 CARLIA *Rabenh*. Herb. myc. ed. nov. Cent. VI n. 567 (1857), cf. Flora (1857) p. 382.

LAESTADIA Auersw. in Hedw. (1869) p. 177; Sacc. Syll. Fung. I p. 420.

C. Alnea (Fries) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
 Laestadia — Auersw. in Hedw. (1869) p. 177; Sacc. Syll. Fung. I p. 420.
 Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) 520; Lamb. Fl. myc. II p. 235.
 Lg.: Env. de Liége (Mout.).

2 C. Buxi (Fuck.) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — Sacc. Syll. Fung. II Add. (1883) XXXI; Bomm. et Rouss.
Fl. myc. env. Brux. p. 212; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 99.

Sphaerella — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 100.

Sphaerella — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t.XIX(1852); Lamb. Fl. myc. II p. 216. Sphaeria — Desm.; Kickx Fl. crypt. I p. 346.

Bt: Mousty (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.), Louvain (Paque). — N.: env. de Namur (Bell.).

3 C. buxifolia (Cooke) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846. Laestadia — Sacc. Syll. Fung. II Add. (1883) XXXI. Sphaerella — Cooke in Journ. of. Bot. (1883) p. 69.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

4 C. caricicola (Fuck.) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846. Laestadia — Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 430.

Sphaerella — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 101.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

5 C. Carpinea (Fries) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — Sacc. Fung. it. (1879) t. 543; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 212; Sacc. Syll. Fung. I p. 426.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 523; Kicka Fl. crypt. I p. 358.

Sphaerella - Auersw. in Rabenh. Myc. V-VI p. 2 pl. 2 fig. 16.

Ascospora — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 425; Lamb. Fl. myc. II p. 201.

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Louvain, Kessel-Loo, Eegenhoven, Héverlé, Vosselaer (Paque). — N.: Gedinne, Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

6 C. Cookeana (Auersw.) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 849. Laestadia — Sacc. Fungi Ven. Ser. V (1873-82) p. 175; Sacc. Syll. Fung. I p. 421; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 98. Sphaerella — Auersw. in Rabenh. Myc. Eur. V-VI (anno?) p. 2 fig. 6.

Lg.: env. de Liége (Mout.).

7 C. cucurbitacearum (Schw.) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846. Laestadia — Sacc. Syll. Fung. II Add. I (1883) XXXIII; Lamb. Fl. myc. I p. 98.

Sphaeria — Schw. in Fries Syst. myc. II (1823) p. 502; Kickw Fl. crypt. I p. 345; Lamb. Fl. myc. II p. 244.

Flandres (Kickx).

8 C. Epilobii (Fuck.) O. Kuntze Rev. gen. pl. 11 (1891) p. 846.

Laestadia - Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 249.

Sphaerella - Fuck. Symb. myc. (1869) p. 103.

Venturia maculaeformis (Desm.) Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. Ed. 2 Bd. I, 2 (1887) p. 435.

Lg.: Beaufays (Mout.).

C. microspora (Auersw.) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
 Laestadia — Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 424; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 99.

Sphaerella — Auersw. in Rabenh. Myc. Eur. V-VI (anno?) p. 16 fig. 76. Zone ardenn. (Lamb.).

- 10 C. Niesslii (Kunze) O. Kunize Rev. gen. pl. II (1891) p. 846. Laestadia — Kunze Fangi Sel. exsic. n. 241 et in Hedwigia (1881) p. 51; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 98; Sacc. Syll. Fung. I p. 421. Zone ardenn. (Lamb.).
- 11 C. Pinastri (DC.) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
 Laestadia Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 426; Bonm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 212; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 98.
 Sphaeria DC. Fl. fr. VI (1815) p. 133.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

12 C. perpusilla (*Desm.*) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846. Laestadia — *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 423; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.

env. Brux. p. 212.

Sphaeria — Desm. in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 80; Kickx Fl. crypt. I p. 355.

Sphaerella — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 217.

Bt: cnv. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Zoetwater, Vaelbeek (Paque). — N.: env. de Rochefort (Orépin), Louette-St-Pierre (Aub.).

13 C. punctoidea (Cooke) O. Kuntze Rev. Gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — Auersw. in Hedw. (1869) p. 178; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 212; Sacc. Syll. Fung. I p. 420.

Sphaerella — Cooke in Journ. of Bot. (1866) p. ? fig. 9; Lamb. Fl. myc. II p. 217.

Bt: Uccle (Bm. et R.).

14 C. Rhododendri (De Not.) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846. Laestadia — Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 428. Sphaerella — De Not. Sfer. ital. (1863) p. 86.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

15 C. systema-solare (Fuck.) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
Laestadia — Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 423; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 212; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 98.
Sphaeria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 111 t. III fig. 27.
Bt: Uccle (Bm. et R.).

16 C. Violae (Lib.) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
 Laestadia — Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 431.
 Ascospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 205.
 Conosporium — Lib. Exs.; Kickx Fl. crypt. I p. 367.

Fl. occ.: Courtrai (West.).

36 PHOMATOSPORA Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 432.

1 P. arenaria Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 276; Sacc. Syll. Fung. XI p. 291.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

- 2 P. Berkeleyi Sacc. Fung. Ven. Ser. II (1873-82) p. 306 et Syll. Fung. I p. 432; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 97.
 Lg.: Beaufays (Mout.). Lx.: Poix, Dohan (Bm. et R.).
- 3 P. therophila (Desm.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 433. Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 310. Lx.: Samré (Bm. et R.).

- 37 PHYSALOSPORA Niessl in Verhandl. naturf. Ver. Brunn XIV (1876); Sacc. Syll. Fung. I p. 433.
- 1 P. alpina Speg. in Roum. in Rev. myc. II (1880) p. 32.
 - f. Crepiniana Sacc. et March. in Rev. myc. (anno?).
 Lx.: Samrée (Crépin).
- 2 P. Callunae (De Not.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 447; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 138.
 Sphaerella De Not. Sfer. it. (1863) p. 88 t. 100.

N. : Roly (Bm. et R.).

- 3 P. fusispora Sacc. et Roum. in Rev. Myc. (1883) p. 233 t. 39 f. 2; Sacc. Syll. Fung. IX p. 595. Lg.: Beaufays (Mout.).
- 4 P. gregaria Sacc. Fung. ital. (1878) t. 432; Sacc. Syll. Fung. I p. 435; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 139.
 Zone calc. (Lamb.).
 - var. foliorum Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 435.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
 Bt: Bousval, Tervueren (Bm. et R.).
- 5 P. Idaei (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 445; Lamb. Fl. myc. Supplém. I.p. 138.
 Sphaeria Fuck. Symb. myc. (1869) p. 114.
 Zone calc. (Lamb.).
- 6 P. minutula Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 369; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 138; Sacc. Syll. Fung. I p. 437.

 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 7 P. Polypodii (Rabenh.) Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVII part. 1 (1890) p. 75.
 Lx.: Grupont (Él. M.).
 - 38 DITOPELLA De Not. Sfer. it. (1863) p. 48; Sacc. Syll. Fung. I p. 450.
- 1 D. fusispora De Not. Sfer. it. (1863) t. 48; Sacc. Syll. Fung. I p. 450.
 - Sphaeria ditopa Fries Syst. myc. II (1823) p. 481 p. p.; Kickæ Fl. crypt. I p. 342.
 - Bt: Kessel-Loo (Leburt.). N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). Fl. occ.: Blankenberghe (West.). A.: Westmalle (Bm. et R.).
- 2 D. Vizeana Sacc. et Speg. in Mich. II (1880) p. 248; Sacc. Syll. Fung. I p. 450.
 - N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 39 TRIOHOSPHAERIA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 144; Sacc. Syll. Fung. I p. 452.
- 1 T. Elisae-Mariae Sacc. et Pat. in Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 196; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 143.

 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 T. erythrella (Wallr.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 105; Lamb. Fl. myc. II p. 289; Sacc. Syll. Fung. I p. 453.

 Sphaeria Wallr. Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 794.

 Sine loco (Lamb.).
- 3 T. exosporioides Fuck. Symb. myc. (1869) p. 145; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 143; Sacc. Syll. Fung. I p. 453.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 4 T. pilosa (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 145; Sacc. Syll. Fung. I p. 452; Lamb. Fl. myc. II p. 289. Sphaeria Pers. Syn. Fung. (1801) p. 73; Kickx Fl. crypt. I p. 331.
 Fl. or.: Bottelaere (Kickx). Lo.: Dolembreux (Mout.). Bt: Groenendael
 - Fl. or.: Bottelaere (Kickx). Lg.: Dolembreux (Mout.). Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 5 T. punctillum Rehm et Britz. in 24 Ber. d. naturhist. Ver. Augsb- (1877) p. 82; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 196; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 143; Sacc. Syll. Fung. I p. 452. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- T. superficialis (Curr.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 452.
 Sphaeria Curr. in Trans. Linn. Soc. t. XXII (1859) p. 317 t. 57, fig. 25.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
 - 40 TRICHOSPHAERELLA Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 261. Sacc. Syll. Fung. IX p. 604.
- T. decipiens Sacc. Bomm. et Rouss, loc. cit.; Sacc. loc. cit. Lx.: Poix (Bm. et R.).
 - 41 BOTRYOSPHAERIA Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 37; Sacc. Syll. Fung. I p. 456.
- 1 B. advena Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 212; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux., p. 170; Lamb. Fl. myc. supplém. I p. 191; Sacc. Syll. Fung. I p. 458.
 Lg. Tilff (Mout.). Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 2 B. Berengeriana De Not. Sfer. ital. (1863) p. 82 fig. 90; Sacc. Syll. Fung. I p. 457; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 191. Zone ardenn. (Lamb.).

3 B. Dothidea (Moug.) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 212; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 171; Sacc. Syll. Fung. I p. 460.

Sphaeria - Moug. in Fries Syst. myc. II (1823) p. 423.

Sphaeria - var. Rosae Wallr. Fl. crypt. Germ. (1833) p. 817.

Dothidea Rosae Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 386; Kickw. Fl. crypt. I p. 299; Lamb. Fl. myc. II p. 402.

Bt: Boendael, Tervueren (Bm. et R.). — Fl. occ.: Zillebeke, env. de Courtrai et d'Ypres (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 42 SPHAERODERMA Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 23 Sacc. Syll. Fung. I p. 459.
- 1 S. Nectrioides Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV (1885) part. 1 p. 57; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 243. Lb.: Bockryk (Él. M.). — Fl. or.: Jardin Zool. de Gand (Él. M.).
 - 43 CRYPTOSPORELLA Sacc. in Mich. I (1878) p. 30 et Syll. Fung. I p. 466.
- C. Aesculi (Fuck.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 30; Sacc. Syll. Fung. I p. 468.

Cryptospora — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 193.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

2 C. aurea (Fuck.) Sace. in Mich. I (1878) p. 30; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 203.

Valsa — Fuck. Enum. Fung. Nass. (1851) p. 53 fig. 20.

Lg.: Forêt (Mout.). - N.: Yvoir (Bm. et R.). - Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 C. hypodermia (Fries) Sacc. in Mich. I (1878) 30 et 369.

Valsa — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 163.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 407.

Cryptospora -- Fuck. Symb. myc. (1869) p. 192; Lamb. Fl. myc. II p. 366. Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 C. Limminghii (West.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 466.

Sphaeria — West, in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 82 pl. fig. 3. Valsa — Kickv Fl. crypt. I (1867) p. 323; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 163.

Cryptospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 365.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). - Fl. occ.: Courtrai (West.).

5 C. Populina (Fuck.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 509 et Syll. Fung. I p. 467.

Cryptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 193; *Lamb.* Fl. myc. II p. 467. **Lg.**: (Lamb.).

6 C. veneta Sacc. in Mich. I (1878) p. 31 et 100; Sacc. Syll. Fung. I p. 468; Lamb, Fl. myc. Supplém. I p. 203.
Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. HYALODIDYMEAE.

- 44 SPHAERELLA Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 62; Sacc. Syll. Fung. I p. 476.
- S. acerina (Wallr.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 536; Lamb. Fl. myc. II p. 215.

Sphaeria — Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 770.

Reliquiae Westendorpianae.

- 2 S. Alni (Fuck.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 245; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 104; Sacc. Syll. Fung. I p. 496. Stigmatea Fuck. Symb. myc. (1869) p. 97. Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 S. assimilata Kunze Fung. Sel. exs. n. 246; Sacc. Syll. Fung. I p. 486; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 100. Zone ardenn. (Lamb.).
- 4 S. Asteroma (*Fries*) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 181; Sacc. Syll. Fung. I p. 523.

Dothidea - Fries Syst. myc. II (1823) p. 560.

Lg.: Forêt (Mout.). — Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.).

5 S. Atomus (Desm.) Cooke in Grevillea III (1874) p. 169; Sacc. Syll. Fung. I p. 536; Lamb. Fl. myc. II p. 214.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) p. 143; Kicka Fl. crypt. I p. 359.

Bt: Héverlé (Paque). - N.: env. de Namur (Bell.). - C. Sine loco (West.).

6 S. Aucupariae (Lasch) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 537; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 106.

Sphaeria — Lasch ex Plowr. Sphaer. Brit. III n. 65 sec. Sacc.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

7 S. Berberidis Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 3 fig. 41; Sacc. Syll. Fung. I p. 496.

Reliquiae Westendorpianae.

8 S. Brassicola (Duby) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 64; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210; Lamb. Fl. myc. II p. 224.

Sphaeria — Duby Bot. Gall. II (1830) p. 712.

Dothidea Brassicae f. Cochleariae West. in Bull. Soc. bot. Belg. t. VI (1866) p. 40.

Stigmatea - Berk.; Kickx Fl. crypt. I p. 365.

Fl. or. : Termonde (West.), env. de Gand (Kickx). — Bi : Boitsfort, Watermael (Bm. et R.).

9 S. brunneola (Fries) Cooke Handb. II (1871) p. 932.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 526; Kicke Fl. crypt. I p. 359. Ascospora — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 425; Lamb. Fl. myc. II p. 200.

Bt: bois de Meerdael (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Rienne (Kickx). — A.: Papenbrugge (Paque).

10 S. circumvaga (Desm.) Succ. in Mich. II (1880) p. 56 et Syll. Fung. I p. 514.

- var. Hyperici (Desm.).

Dothidea circumvaga — var. Hyperici Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 175.

Bt: Wilsele, Kessel-Loo (Paque).

11 S. Clymenia Sacc. Myc. Ven. 908 et in Mich. I (1378) p. 35; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 103; Sacc. Syll. Fung. I p. 492.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

12 S. conglomerata (Wallr.) Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 5 fig. 88; Sacc. Syll. Fung. I p. 496; Lamb. Fl. myc. II p. 228.

Sphaeria — Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 814; Kickw Fl. crypt. I p. 356.

Bt: Louvain (Leburt.). — Fi. or.: Gand (Kickx). — Fl. occ.: Courtrai (West.). — N.: Namur (Bell.).

13 S. corylaria (Wallr.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 99; Sacc. Syll. Fung. I p. 534; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 108. Sphaeria — Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 770. Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.).

14 S. Crataegi Fuck. Symb. myc. (1869) p. 105; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210; Lamb. Fl. myc. II p. 226; Sacc. Syll. Fung. I p. 483.

Lg.: Gomzé (Mout.). -- Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

15 S. cruciferarum (Fries) Sacc. in Mich. II (1880) p. 315; Kickv Fl. crypt. I p. 351; Lamb. Fl. myc. II p. 239.
Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 525.
Flandres (Kickx).

16 S. Duchartrei (Crié) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 495.
Depazea — Crié Rech. sur Depazées (1878) p. 41 t. VI fig. 6.
Bt: Tervueren, Villers-la-Ville (Bm. et R.).

17 S. Epilobii (Crié) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 503; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. 210; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 105. Depazea — Crié Rech. sur Depazées (1878) p. 40 t. VI fig. 1. Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

18 S. Equiseti Fuck. Symb. myc. (1869) p. 102 t. IV fig. 40; Sacc. Syll. Fung. I p. 534.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

19 S. Eryngii (Fries) Cooke Handb. II (1871) p. 917; Lamb. Fl. myc. II p. 230; Sacc. Syll. Fung. I p. 511.

Sphaeria — Fries in Duby Bot. Gall. II (1830) p. 710; Kicka Fl. crypt. I p. 358.

Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.), dunes (West.).

20 S. Evonymi (Kunze) Auersw. Myc. Eur. p. 10 fig. 40; Sacc. Syll. Fung. I p. 495; Lamb. Fl. myc. II p. 225. Sphaeria — Kunze in Fries Syst. myc. II (1823) p. 439 p. p. N.: St-Servais (Bell.).

21 S. Fagi Auersw. in Myc. Eur. Pyr. p. 6 t. II fig. 19-20; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 100; Sacc. Syll. Fung. I p. 483.
Zone ardenn. (Lamb.).

22 S. ferruginea Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 20; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 108.
Zone ardenn. (Lamb.).

23 S. Fragariae (*Tul.*) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 505; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210.

Sphaeria — *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. V (1856) p. 112 pl. V; *Lamb.* Fl. myc. II p. 233.

Stigmatea — Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 288 p. p.; Kickx Fl. crypt. I p. 363.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

24 S. Fraxini Niessl in Linhart Fungi Hung. n. 162; Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. Ed. II Bd I p. 385.
Lg.: Forêt, Gomzé (Mout.).

25 S. hedericola (Desm.) Cooke in Grevillea III (1874?) p. 96; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210; Sacc. Syll. Fung. I p. 481. Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1950) p. 115; Kickx Fl. crypt. I p. 359.

Ascospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 204.

 $\mathbf{B}\mathbf{t}: \mathtt{env.}$ de Bruxelles (Bm. et R.).

26 S. Hyperici Aversw. Myc. Eur. p. 14 t. 5 fig. 60; Sacc. Syll. Fung. I p. 519; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 102. Lg.: Gomzé (Mout.). — Lx.: St-Mard (West.).

27 S. Isariphora (Desm.) De Not. Schem. Sfer. (1863) p. 63: Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210; Lamb. Fl. myc. II p. 218; Sacc. Syll. Fung. I p. 510.

- Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat sér. 2 t. XIX (1843) p. 358; Kickw Fl. crypt. I p. 354.
- Bt: Watermael (Bm. et R.), Bleyenberg (Leburt.), Ergenhoven, Héverlé (Paque). N.: Namur (Bell.), Gedinne (Aub.). Fl. occ.: Mt de Fraisés près Ypres (West.).
- 28 S. latebrosa Cooke Handb. II (1871) p. 915; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 108; Sacc. Syll. Fung. I p. 482.
 Lg.: Forêt (Mont).
- 29 S. Leguminis-cytisi (Desm.) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 237; Sacc. Syll. Fung. I p. 499.
 Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 358.

Bt: Louvain (Leburt.), Eegenhoven (Paque). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: env. d'Ypres et de Bruges (West.).

Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: env. d'Ypres et de Bruges (West.).

30 S. Ligea Sacc. Fung. Ven. Ser. II (1873-82) p. 300; Bomm. et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210; Lamb. Fl. myc. Supplém. I

Bt: Env. de Bruxelles (Bm. et R.).

p. 106; Sacc. Syll. Fung. I p. 483.

- 31 S. Ligustri (Desm.) Cooke Handb. II (1871) p. 917 Lamb. Fl. myc. II p. 215; Sacc. Syll. Fung. I p. 480.
 - Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 360; Kickx. Fl. crypt. I p. 353.

Fl. occ.: Env. de Courtrai (West.).

- 32 S. lineolata (Desm.) De Not. Schem. Sfer. (1863) p. 63; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210; Sacc. Syll. Fung. I p. 531. Sphaeria Rob. et Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 351. Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 33 S. Liriodendri Cooke in Journ. of Bot. t. XXI (1883) p. 108; Sacc. Syll. Fung II Add. XXXVIII.

 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 34 S. Luzulae Cooke in Grevillea VI (1897?) p. 31; Sacc. Syll. Fung. I p. 529.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

- 35 S. lycopodina Karst. Fung. Fenn. exs. (1866) n. 596 et Myc. Fenn. II (1873) p. 184; Sacc. Syll. Fung. I p. 533; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 107.
- 36 S. maculans Sacc. et Roum. Rel. myc. Lib. sér. II t. XX fig. 10; Sacc. Syll. Fung. I p. 505; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 106. Rel. Westendorpianae.
- 37 S. macularis (Fries) Auersw. in Rabenh. Myc. Eur. Pyr. (anno?)
 p. 9 fig. 28; Sacc. Syll. Fung. I p. 488;
 Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 502.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

38 S. maculiformis (Pers.) Auersw. in Rabenh. Myc. Eur. Pyr. p. 5 fig. 1 et 109; Sacc. Syll. Fung. I p. 477; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 209; Lamb. Fl. myc. II p. 228.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 90; Kickx Fl. crypt. I p. 356.

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). - N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- var. immatura Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 356. Sphaeria macularis Kickx Rech. cent. III (1846) p. 19. Flandres (Kickx).
- 39 S. Mariae Sacc. et Bomm. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXV part. 1 (1886) p. 173; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 104. N.: Hastières (Bm. et R.).
- 40 S. microspila (Berk. et Br.) Cooke Handb. II (1871) p. 919; Lamb.
 Fl. myc. II p. 223; Sacc. Syll. Fung. I p. 501.
 Sphaeria Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. t. 17 fig. 36.
 Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). Lg.: env. de Verviers (Lamb.).
- 41 S. minor Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 171; Sacc. Syll. Fung. I p. 519.

N.: Hastière (Bm. et R.).

42 S. nebulosa (*Pers.*) Sacc. in Mich. II (1880) p. 56 et Syll. Fung. I p. 515.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 31.

Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

- 43 S. oblivia Cooke Handb. II (1871) p. 913; Sacc. Syll. Fung. Ip. 477. Septoria Castanaecola Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 26.

 Lg.: Beaufays (Mout.). Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Héverlé (Paque).
- 44 S. pardalota Cooke et E. in Grevillea VI (1877) p. 16 t. 96 fig. 23;
 Sacc. Syll. Fung. I p. 483; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 101.
 A.: Westmalle (Bm. et R.).
- 45 S. Patouillardi Sacc. in Add. Syll. (1886) p. 407 et Syll. IX p. 635.

 N.: Yvoir, Hastière (Bm. et R).
- 46 S. perforans (Desm.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 538.
 Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 23.
 Fl. occ.: Dunes (West.).
- 47 S. Petasitidis (Rabenh.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 99.

 Sphaeria Rabenh. ap. Klotsch Herb. myc. Ed. nov. Cent. VIII n. 733;

 Lamb. Fl. myc. II p. 214.

 Sphaeria punctiformis var. Kickw Fl. crypt. I (1867) p. 358.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

48 S. petiolicola (Desm.) Auersw. Syn. Pyr. Eur. p. 8 t. 3 fig. 38;

Sacc. Syll. Fung. I p. 490.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 354.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

49 S. polygonorum (Crié) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 512; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 105.

Depazea - Orié Rech. sur Depazées (1878) p. 41 t. 8 fig. 4.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 50 S. Polypodii (Rabenh.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 102; Sacc.
 Syll. Fung. I p. 539.
 Lx.: Grupont (Bm. et R.).
- 51 S. Populi Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 11 fig. 93; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 108; Sacc. Syll. Fung. I p. 488.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 52 S. praecox Pass. in Erb. critt. ital. n. 987; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 102; Sacc. Syll. Fung. I p. 515.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 53 S. pseudo-maculaeformis (Desm.) Auersw. Myc. Eur. p. 12 f. 51; Sacc. Syll. Fung. I p. 507.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1846) p. 83; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 101.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 54 S. Pteridis (Desm.) De Not. Sfer. it. (1863) p. 87 t. XCIX; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210; Sacc. Syll. Fung. I p. 531. Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 359. Bt: Groenendael (Bm. et R.). N.: env. de Namur (Bell.).
- 55 S. punctiformis (Pers.) Rabenh. Herb. myc. II n. 264; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 209; Lamb. Fl. myc. II p. 216; Sacc. Syll. Fung. I p. 476.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 90; Kickw. Fl. crypt. I p. 357. Spharia artocreas Rabenh. in Klotsch Herb. myc. Ed. 2 p. 360.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Aisnes-lez-Bomal (El. M.). — Lg.: Hertogenwald (Él. M.).

56 S. Pyri Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 11 fig. 34; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 107; Sacc. Syll. Fung. I p. 482.
Lg.: Beaufays (Mout.). — Bt: Watermael (Bm. et R.).

57 S. Rathayi Nypels mss.

Sphaerella sp. Rathay Klosterneuburger Jahresbericht (1893) p. 49. Bt: Schaerbeek (Nypels).

58 S. recutita (Fries) Cooke Handb. II (1871) p. 921; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210; Lamb. Fl. myc. II p. 230; Sacc. Syll. Fung. I p. 527.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 524.

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Ht: Ath (Él. M.).

- 59 S. Ribis Fuck. Symb. myc. (1869) p. 108; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210; Sacc. Syll. Fung. I p. 486.
 Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 60 S. Rhododendri Cooke in Journ. of bot. (1883) p. 108; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 182; Sacc. Syll. Fung. II Add. XXXVIII Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 61 S. Rumicis (Desm.) Cooke Handb. II (1871) p. 920; Lamb. Fl. myc. II p. 223; Sacc. Syll. Fung. I p. 512.
 Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 3 br.

Venturia — Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. ed. II Bd. I, 2 (1887) p. 435. N.: Env. de Namur (Bell.). — Lg.: Beaufays, Liége (Mout.).

- 62 S. sagedioides Wint. in Kunze Fung. Sel. exsicc. Cent. IV n. 323-324; Sacc. Syll. Fung. I p. 517.
 Lg.: Gomzé (Mout.). N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 63 S. salicicola (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 106; Lamb. Fl. myc. II p. 227; Sacc. Syll. Fung. I p. 487. Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) 530 p. p. Sine loco (Lamb.).
- 64 S. Schoenoprasi Auersw. Myc. Eur. Syn. Pyr. p. 19 t. 5 fig. 70; Sacc. Syll. Fung. I p. 522; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210; Lamb. Fl. myc. env. Brux. p. 107. Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 65 S. Scirpi-lacustris Auersw. Myc. Eur. Syn. Pyr. p. 18 fig. 73; Sacc. Syll. Fung. I p. 529.
- Lx.: env. d'Herbeumont (Bm. et R.). 66 S. sentina (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 482. Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 520.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque).

67 S. septorioides (Desm.) Niessl in Kunze Fung. Sel. p. 144 n. 242; Sacc. Syll. Fung. I p. 482; Lamb. Fl. myc. II p. 220.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 81; Kickw Fl. crypt. I p. 353.

- Bt: Eegenhoven, Winxele (Paque). N.: env. de Namur (Bell.). Flandres (West., Kickx).
- 68 S. simulans Cooke in Journ. of Bot. (1868) p. 246 t. 50 fig. 2; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 104; Sacc. Syll. Fung. I p. 478. Zone arg.-sablon. (Lamb.).

- 69 S. sparsa (Wallr.) Auersw. p. p. Myc. Eur. Pyr. p. 4 fig. 7; Sacc. Syll. Fung. I p. 485; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 100. Sphaeria Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 772. Zone ardenn. (Lamb.).
- 70 S. Tassiana De Not. Sfer. it. (1863) p. 87 t. XCVIII; Sacc. Syll. Fung. I p. 530; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 106.

 Lg.: env. de Liége (Mout.). Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.). -- Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 71 S. Tussilaginis Rehm Ascom. n. 100; Lamb. Ft. myc. Supplém. I I p. 102; Sacc. Syll. Fung. I p. 508. Zone ardenn. (Lamb.).
- 72 S. Typhae (Lasch) Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 18. fig. 110; Sacc. Syll. Fung. I p. 531; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 103. Sphaeria Lasch in Relh. Myc. I p. 660.
 Lx.: Dohan (Bm. et B.).
- 73 S. umbelliferarum Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 16 fig. 63; Sacc. Syll. Fung. p. 518; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 105. Zone ardenn. (Lamb.).
- 74 S. Vaccinii Cooke in Journ. of. Bot. (1866) p. 249 t. 50 fig. 11; Sacc. Syll. Fung. I p. 494; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 103. Lg.: Forêt (Mout.).
- 75 S. Vincetoxici Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 516; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 104.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
 - 46 STIGMATEA Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; Sacc. Syll. Fung. I p. 541.
- S. Andromedae Rehm Ascom. n. 542; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 109; Sacc. Syll. Fung. I p. 542.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- S. conferta Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; Sacc. Syll. Fung. I p. 544; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 109. Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 435.
 Lb.: Genck (Bm. et R.). Lx.: Samrée (Él. M.).
- 3 S. Geranii Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 241; Sacc. Syll. Fung. I p. 541; Kickv. Fl. crypt. I p. 364; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 209; Lamb. Fl. myc. II p. 206. Dothidea Fries Syst. myc. II (1823) p. 558.
 - N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Bt: Gentinnes (de Limm.). Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).
- 4 S. maculaeformis Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421;

Lamb. Fl. myc. II p. 207; Sacc. Syll. Fung. I p. 542.
Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. p.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

- 5 S. Ostruthii (Fries) Oudem. in Arch. Néerl. t. XI (1876) p. 52; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 209; Sacc. Syll. Fung. I p. 545. Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 526; Kickw Fl. crypt. I p. 357. Ascospora Fries; Lamb. Fl. myc. II p. 203.
 - Bi: Watermael (Bm. et R.), Notre-Dame de Bonne-Odeur (Él. M.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Fl. occ.: Menin, Blankenberghe (West.).
- 6 S. Polygonorum (Fries) Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; Kickx Fl. crypt. I p. 365; Sacc. Syll. Fung. I p. 544; Lamb. Fl. myc. II p. 207.

Fl. occ. : Nieuport (West.).

7 S. Ranunculi Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 209; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 109; Sacc. Syll. Fung. I p. 542.

Sphaerella - Karst. Fungi Spetsb. (1872) n. 58.

Bi: Jette (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

8 S. Robertiani Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; Kickw Fl. crypt. I p. 364; Sacc. Syll. Fung. I p. 541; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 209; Lamb. Fl. myc. II p. 206.

Dothidea - Fries Syst. myc. II (1823) p. 564.

Sphaeria — Wallr. Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 771.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Fl. or. : Pays de Waas (Kickx). — N.: citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 47 DIDYMELLA Sacc. in Mich. I (1878) p. 377 et Syll. Fung. I p. 545.
- 1 D. Barbieri (West.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 547.

Sphaeria — West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 85 pl. fig. 11. Trematosphaeria — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 308.

N.: Yvoir (Bm. et R.). - Lx.: Ebly (Él. M.). - Lb.: Beverloo (West.).

2 D. Bryoniae (Fuck.) Rehm Ascom. III n. 99; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 135; Sacc. Syll. Fung. I p. 557.

Sphaeria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 112.

Sphaerella — Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 15 fig. 56.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

3 D. Corni (Sow.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 547; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 136.

Sphaeria — Sow. in Smith et Sow. Engl. bot. Fung. (1797) t. 370 fig. 5; Lamb. Fl. myc. II p. 243.

. N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 4 D. effusa (Niessl) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 552.
 Didymosphaeria Niessl in Oesterr. bot. Zeitschr. (1875) p. 130.
 Bt: Abbaye de Villers (Bm. et R.).
- 5 D. eriostoma Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 172, pl. I fig. 17.
 Lg.: Gomzé, Tilff (Mout.).
- 6 D. Genistae (Fuck.) Rehm Ascom. III n. 97; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 208; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 136. Sphaeria Fuck. Symb. myc. (1869) p. 114.
 Lg.: Gomzé, Beaufays (Mout.). Bt: Ottignies (Bm. et R.).
- D. glomerulata (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 546.
 Sphaeria Fuck. Symb. myc. (1869) p. 113.
 N.: Env. de Mariembourg (Bm. et R.).
- D. Hellebori (Chaill.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 553.
 Sphaeria Chaill. in Fries Syst. myc. II (1883) p. 512; Lamb. Fl. myc. II p. 237.
 Dothidea Prostii Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 175. —
 N.: Yvoir (Bm. et R.), Hamerenne (Crépin). Bt: Louvain (Paque).
- D. media Sacc. in Mich. II (1880) p. 57 et Syll. Fung. I p. 553.
 N.: Hastière (Bm. et R.).
- D. Meisneriana (Rehm et Thuem.) Sacc. Syll. Fung. I 1882) p. 546.
 Didymosphaeria Rehm et Thuem. Contr. Myc. Lusit. (1878-1881) 303.
 Lg.: Beaufays (Mont.).
- 11 D. nigricans Karst. in Hedwigia (1884) p. 3; Sacc. Syll. Fung. IX p. 668.
 Lg.: Gomzé (Mout.).
- 12 D. Oleandri (Dur. et Mont.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 551. Sphaeria Dur. et Mont. in Dur. Fl. Alg. I (1847) p. 528. Bt: Louvain (Paque).
- 13 D. pachyspora Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 272.
 Lg.: Comblain-au-Pont (Bm. et R.).
- 14 D. proximella (Karst.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 558; Lamb.
 Fl. myc. Supplém. I p. 136.
 Sphaerella Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 177.
 Lg.: Angleur, Liége (Mout.).
- 15 D. salicis Grove ex Sacc. Syll. Fung. IX (1891) p. 667. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 16 D. superflua (Auersw.) Sacc. in Mich. II (1880) 316 et Syll. Fung.

I p. 555; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 135. Sphaeria — Auersw. ex Fuck. Symb. myc. (1869) p. 102. Sphaerella — Fuck. loc. cit. (1869).

Lg.: Beaufays, Liége (Mout.). — N.: Hastière (Bm. et R.).

17 D. tosta (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 556; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 136.

Sphaeria — Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. (anno?) n. 648 pl. 11 fig. 34. Lg.: Dôlembreux (Mout.).

18 D. vexata Sacc. in Mich. II (1880) p. 58 et Syll. Fung. I p. 547; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 136.

Lg.: Forêt (Mout.). - Bi: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 48 GNOMONIA Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 57; Svec. Syll. Fung. I p. 561.
- G. amoena (Nees) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 414; Lamb. Fl. myc. II p. 255.

Sphaeria — Nees in Acta Ac. nat. Cur. IX (1818) t. 6 fig. 24. Lg.: Forêt (Mout.).

- 2 G. earpophila Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 258. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 3 G. Cerastis (Riess) Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 27 fig. 144; Sacc. Syll. Fung. I p. 569; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 116. Sphaeria Riess in Hedwigia I (1878) t. III fig. 2 m-o. Lg.: Dolembreux (Mout.).
- 4 G. Epilobii (Fuck.) Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 26 t. 10 fig. 14; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 189; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 116; Sacc. Syll. Fung. I p. 561. Bt: Boitsfort (Bm. et R.).
- 5 G. errabunda (Rob. et Desm.) Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 25 fig. 120; Sacc. Syll. Fuug. I p. 568; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 115. Sphaeria Rob. et Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1849) p. 355.
 Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 6 G. erythrostoma (Pers.) Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 26 fig. 127; Sacc. Syll. Fung. I p. 566; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 116. Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 81. Zone ardenn. (Lamb.).
- 7 G. fenestrans (Duby) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 562.
 Sphaeria Duby ap. Klotsch. et Rabenh. Herb. myc. Cent. XX n. 33;
 Kickx Fl. crypt. I p. 348; Lamb. Fl. myc. II p. 240.

Fl. or.: env. d'Audenarde (West.). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 8 G. inclinata (Desm.) Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 27, fig. 143; Sacc. Syll. Fung. I p. 564.
 - Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 315. N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 9 G. ischnostyla (Desm.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 121; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 115; Sacc. Syll. Fung. I p. 564. Sphaeria Desm. in Klotsch Herb. myc. 1834. Zone ardenn. (Lamb.).
- 10 G. leptostyla (Fries) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 232; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 189; Lamb. Fl. myc. II p. 454; Sacc. Syll. Fung. 1 p. 568.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 517; Kickx Fl. crypt. I p. 352.

- Lg.: Beaufays (Mout.). Bt: Linkebeek, Groenendael (Bm. et R.). Fl. or. ∵ Gremberghe près Termonde (West.).
- 11 G. setacea (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 121; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 189: Lamb. Fl. myc. 11 p. 352; Sacc. Syll. Fung. I p. 563.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 62; Kicka Fl. crypt. I p. 353.

- $Bt: Uccle \ (Bm.\ et\ R.).$ N.: Louette-St-Pierre (Aub.). FI. or.: env. de Gand (Kickx).
- 12 G. suspecta (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 566; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 116.
 Plagiostoma Fuck. Symb. myc. (1869) p. 119 t. VI fig. 32.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 13 G. tetraspora Wint. in Hedwigia (1872) XI p. 148; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 115; Sacc. Syll. Fung. I p. 562.
 - N.: Fond d'Auffe (Bm. et R.). Lx.: env. d'Herbeumont (Bm. et R.).
 - var. Rubi Rehm Ascom. n. 596; Sacc. loc. cit.
 Gnomonia Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. Ed. II Bd I, 2 (1887) p. 586.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
 - 49 EPICYMATIA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 118; Sacc. Syll. Fung. I p. 570.
- E. vulgaris Fuck. Symb. myc. (1869) p. 118; Sacc. Syll. Fung. I p. 571; Lamb. Fl. myc. II p. 548.
 N.: Namur (Bell.).
 - 50 LIZONIA De Not. Sfer. it. (1863) p. 72; Sacc. Syll. Fung. I p. 574.
- 1 L. halophila Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.

. t. XXIX part. 1 (1891) p. 244. Fl. occ.: Nieuport (Bm. et R.).

- 51 MELANOPSAMMA Niessl Not. ueber Pyr. (1876); Sacc. Syll. Fung. I p. 575.
- 1 M. improvisa (Karst.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 579; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 160.

Sphaeria — Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 93.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 M. pomiformis (Pers.) Sacc. in Mich. II (1880) p. 58; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 160; Sacc. Syll. Fung. I p. 575.
Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 65.

Lg.: Forst, Tilff (Mout.).

3 M. Ruborum (Lib.) Sacc. in Mich. II (1880) p. 58; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 204; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 160; Sacc. Syll. Fung. I p. 576.

Sphaeria - Lib. Crypt. Arduen. n. 340.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

- 4 M. Saccardiana Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. de Brux. (1885) p. 203; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 159. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
 - 52 BERTIA De Not. in Giorn. bot. it. I (1863) p. 335; Sacc. Syll. Fung. I p. 582.
- B. macrospora Sacc. Mich. I (1878) p. 452; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 161; Sacc. Syll. Fung. I p. 584.
 Lx.: Poix (Bm. et R.), Ebly (Él. M.).
- 2 B. moriformis (Tode) De Not. in Giorn. bot. it. I (1863) p. 335; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 204; Lamb. Fl. myc. II p. 309; Sacc. Syll. Fung. I p. 582.

Sphaeria — Tode Meckl. Sel. II (1791) p. 22; Kickw Fl. crypt. I p. 331.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ.: Zillebeke (Wall.). — Lx.: Ebly, Libramont (Él. M.).

3 B. quercicola Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 13.

Lg.: env. de Liége (Mout.).

- 53 LENTOMITA Niessl Not. Pyr. (1876) p. 44; Sacc. Syll. Fung. I p. 584.
- 1 L. acuum Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 p. 173.

Lg. : Tilff (Mout.).

- 54 VENTURIA Ces. et De Not. in Comm. Soc. critt. it. I (1861) p. 1 p. 225; Sacc. Syll. Fung. I p. 586.
- 1 V. Alchemillae (Grev.) Berk. et Br. in Grevillea IV (1875) p. 68; Sacc. Syll. Fung. I p. 592.

Asteroma — Grev. Fl. Edin. (1824) p. 369.

Lg.: Tilff, Gomzé (Mout.).

2 V. Chaetomium (Corda) Ces. et De Not. Schema (1861) p. 225; Sacc. Syll. Fung. I p. 591.

Sphaeria — Corda Ic. Fung. I (1837) t. 2 p. 29 f. 152.

Niesslia exilis (Alb. et Schwein.) Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. Ed. II Bd I (1887) p. 196.

Lg.: Beaufays (Mout.).

3 V. chlorospora (Ces.) Karst. myc. Fenn. II (1873) p. 189; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 113; Sacc. Syll. Fung. I p. 586.

Sphaeria — Ces. Erb. critt. ital. n. 296.

Lg.: env. de Liége (Mout.).

4 V. circinans (Fries) Sacc. in Mich. I (1878) p. 499; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 198; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 111; Sacc. Syll. Fung. I p. 592.

Perisporium — Fries Syst. myc. III (1823) p. 252.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

5 V. ditricha (Fries) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 188; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 198.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 515.

Sphaerella — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 100; Lamb. Fl. myc. II p. 218.

Lg.: Forêt, Gomzé (Mout.).

6 V. exosporioides (Desm.) Sacc. in Rev. myc. (1881) p. 47 et Syll. Fung. I p. 595; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 111.

Sphaeria - Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 323.

Niesslia - Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. Ed. II Bd I, 2 (1887) p. 197.

Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.), Chaudfontaine, Dolembreux (Mout.).

- 7 V. fimiseda Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Relg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 173 pl. I fig. 14.
 Lg.: Forêt (Mout.).
- 8 V. glomerata Cooke in Grevillea III (1874) p. 69; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 198; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 111; Sacc. Syll. Fung. I p. 594.
 Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 9 V. ilicifolia Cooke Handb. II (1871) p. 924; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 118; Sacc. Syll. Fung. I p. 588.

Lg.: Forêt (Mout).

- 10 V. inaequalis (Cooke) Wint. in Thuem. Mycoth. univ. n. 1544; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 112; Sacc. Syll. Fung. I p. 587. Sphaerella — Cooke in Journ. of Bot. (1866) t. 50 fig. 26. Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 11 V. Johnstonii (Berk. et Br.) Sacc. in Mich. II (1880) p. 35 et Syll. Fung. I p. 592.

Dothidea — Berk. et Br. Not. of Brit. Fung. n. 663.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

12 V. Kunzei Sacc. Fungi Ven. Ser. V (1873-80) p. 174; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 198; Sacc. Syll. Fung. I p. 588.

Stigmatea Chaetomium (Kunze) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 422; Lamb. Fl. myc. II p. 210.

Dothidea - Fries Syst. myc. II (1823) p. 563.

Exosporium Rubi Nees in Nov. Act. Ac. Leop. IX (1818) p. 236 pl. V fig. 6; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 210.

Bt: Limelette (Él. M.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven, (Paque). — Lg.: Forêt (Mout.), Stoumont (Bm. et R.).

- 13 V. Lonicerae (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 589.
 Sphaeria Fuck. Symb. myc. (1869) p. 116; Lamb. Fl. myc. II p. 236.
 Sine loco (Lamb.).
- 14 V. Myrtilli Cooke in Journ. of Bot. (1866) p. 245 t. 2 fig. 4; Sacc. Syll. Fung. I p. 590; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 112. Lg.: Forêt (Mout.). Lb.: Genck (Bm. et R.).
- 15 V. Niesslii Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 594; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 113.

V. alpina Niessl in Hedwigia (1881) p. 55.

Zone ardenn. (Lamb.).

16 V. palustris Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 172; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 112.

Bt: Ottignies (Bm. et R.).

17 V. Potentillae (Fries) Cooke in Grevillea VI (1877) p. 76, t. 97 fig. 16; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 198; Sacc. Syll. Fung. I p. 594.

Dothidea — Fries Syst. myc. II (1823) p. 563.

Stigmatea — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 422; Lamb. Fl. myc. II p. 209.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

18 V. turfosum Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 149; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 112. Lg.: Tilff (Mout.).

19 V. vermiculariaeformis (Fuck.) Succ. Syll. Fung. I (1882) p. 589; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 111.

Sphaeria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 110.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 55 ERIOSPHAERIA Sacc. Consp. gen. Pyr. it. (1875) p. 10 et Syll. Fung. I p. 597.
- E. analoga Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 262.
 Et: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 E. Andromedae (Rehm) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 598; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 148.

Trichosphaeria — Rehm Ascom. n. 491.

Ubr: Genck (Bm. et R.).

- 3 E. corylina Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 174 pl. 1 fig. 10.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 4 E. horridula (Wallr.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 599; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 148. Sphaeria — Wallr. Comp. Fl. germ. IV (1833) p. 796. Zone calc. (Lamb.).
- 5 E. Vermicularia (Nees) Sacc. Consp. gen. Pyr. it (1875) p. 2; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 147.

Sphaeria - Nees Syst. d. Pilze (1816) p. 311 fig. 347.

Lx.: Bouillon (Bm. et R.). — Lg.: Gomzé (Mout.).

- 56 GIBBERA Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 402; Sacc. Syll. Fung. I p. 599.
- 1 G.Vaccinii (Sow.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; Lamb. Fl. myc. II p. 312.

Sphaeria — Sow. in Smith et Sow. Engl. Bot. Fung. (1795) t. 273 fig. 1. Lx.: Baraque de Fraiture (Crépin).

- 57 MELANCONIS Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 115; Sacc. Syll. Fung. I p. 602.
- 1 M. Alni Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. 5 (1865) p. 109; Sacc. Syll. Fung. I p. 604; Lamb. Fl. myc. II p. 354.

Lg.: Beaufays (Mout.). — Lx.: Poix (Bm. et R.). — Bt: Forêt de Soignes (Bm. et R.).

2 M. Carthusiana Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 129; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 167; Lamb. Fl. myc. II p. 353, Sacc. Syll. Fung. I p. 603. Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 3 M. dolosa (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 604. Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 405. Bt: Tervueren (Bm. et R.). Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).
- 4 M. modonia Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 141; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 204; Sacc. Syll. Fung. I p. 603.

 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 5 M. stilbostoma (Fries) Tul. Sel. Fung. Carp. II (I863) p. 119; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. 167; Lamb. Fl. myc. II p. 356; Sacc. Syll. Fung. I p. 602.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 403 p. p.

Valsa — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; Kickv. Fl. crypt. I p. 323.

Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Courtrai (West.). — Fl. or.: env. d'Audenarde, env. de Gand (Kickx).

6 M. thelobola (Fries) Sacc. in Rev. myc. (1881) p. 45; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 205.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 408.

tg.: env. de Liége (Mout.). — A.: Merxem (Bm. et R.). — Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 58 HERCOSPORA Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 154; Sacc. Syll. Fung. I p. 605.
- 1 H. Tiliae (Pers.) Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 154 t. XVIII et XIX fig. 1-14; Kickx Fl. crypt. I p. 328; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 166; Sacc. Syll. Fung. I p. 605; Lamb. Fl. myc. II p. 347.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 84.

- N.: env. de Namur (Bell.). Bt: Groenendael (Bm. et R.), Louvain (Paque).
 - 59 DIAPORTHE Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 240; Sacc. Syll. Fung. I p. 606.
- 1 D. Aceris Nitschke in Fuck. Symb. myc. (1869) p. 204; Sacc. Syll. Fung. I p. 610.

Lg.: Dolembreux (Mout.).

2 D. aesculicola (Gooke) Berl. et Vogl. Add. Syll. I-IV (1886) p. 105; Sacc. Syll. IX p. 709.

Valsa - Cooke in Grevillea XIV (1885) p. 47.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

3 D. affinis Sacc. in Mich. I (1878) p. 28 et Syll. Fung. I p. 625; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 214.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

4 D. Arctii (Lasch) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 268; Sacc. Syll. Fung. I p. 653.

Sphaeria — Lasch in Kl. Herb. myc. n. 1046.

Bt: Bousval, Limal (Bm. et R.).

- D. Aubertii (West.) Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 383.
 Sphaeria West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 84 pl. fig. 10.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Lb.: Beverloo (Tosquinet).
- 6 D. Beckhausii Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 295; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 215; Sacc. Syll. Fung. I p. 678.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

7 D. Berkeleyi (Desm.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 273; Sacc. Syll. Fung. I p. 647.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VIII (1837) p. 358; Kickx. Fl. crypt. I p. 340; Lamb. Fl. myc. II p. 243.

Lx.: Poix (Bm. et R.). — Bi: Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

- 8 D. Berlesiana Sacc. et Roum. in Rev. myc. (1883) p. 234 t. 39 f. 4; Sacc. Syll. Fung. IX p. 708.
 tx.: Ebly (Él. M.).
- 9 **D.** bitorulosa (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 608; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 163; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 212.

Valsa — Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. n. 861 t. 10 fig. 15.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 D. Bloxami (Cooke) Berl. et Vogl. Add. Syll. I-IV (1886) p. 108; ... Sacc. Syll. IX p. 702.

Valsa - Cooke in Grevillea XIV (1885) p. 47.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

11 D. Carpini (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 205; Lamb. Fl. myc. II p. 378; Sacc. Syll. Fung. I p. 608.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 39.

Valsa - Fries Summa Veg. Scand. p. 441; Kickv Fl. crypt. I p. 327.

Hypoxylon — West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 44. Lg.: Forêt, Angleur (Mout.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.).

- 11 D. castaneti Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 320; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 219; Sacc. Syll. Fung. I p. 689.
 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 13 D. Cerasi Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 319; Sacc. Syll. Fung. I p. 671.

Lg.: Forêt (Mout.). - Bt: Groenendael (Bm. et R.).

14 D. ceuthosporoides (Berk.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 646; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 223.

Sphaeria — Berk. Brit. Fung. in Engl. Fl. V (1836-43) p. 258; Kickx Fl. crypt. I p. 345.

Pleospora - Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 275.

Sphaeria -- var. Ilicis West. ex Aub. in Bull. Soc. roy. Bot. de Belg. t. IV (1865) p. 325.

FI. occ.: env. d'Ypres (Wall.). — Bt: Louvain, Eegenhoven (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

15 D. Chailletii Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 276; Sacc. Syll. Fung. I p. 658.

Bi: Tervueren (Bm. et R.).

16 D. ciliaris (Curr.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) 676; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164.

Sphaeria — *Curr.* in Micr. Journ. VII (1857) p. 232 t. II fig. 15; *Lamb.* Fl. myc. II p. 245.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 17 D. eircumscripta Otth. ex Fuck. Symb. myc. (1869) p. 207; Sacc. Syll. Fung. I p. 679; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 216. Zones arg.-sabl. et ardenn. (Lamb.).
- 18 D. coneglanensis Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 29; Sacc. Syll. Fung. I p. 688.

 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 19 D. conjuncta (Nees) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 206; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 163; Lamb. Fl. II p. 379; Sacc. Syll. Fung. I p. 607.

Sphaeria - Nees Syst. d. Pilze (1816) p. 305. fig. 337.

Bt: Tervueren, Watermael (Bm. et R.). — Ht: Mons (R. P. Dumont). — Lg.: Beaufays (Mout.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

20 D. conorum (Desm.) Niessl in Hedwigia (1876) p. 2; Lamb. Fl. myc. II p. 384; Sacc. Syll. Fnng, I p. 647.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1846) p. 76; Kickw Fl. crypt. I p. 340.

Lg.: Beaufays (Mout.). — Fl. occ.: Courtrai (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

21 D. controversa (Desm.) Fuck. Symb. myc. App. I (1871); Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164; Lamb. Fl. myc. II p. 381; Sacc. Syll. Fung. I p. 676.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1841) p. 12.

Valsa — Berk. Outl. Brit. Fung. (1860); Kicker Fl. crypt. I p. 325.

Bt: Groenendael, Watermael (Bm. et R.). - Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

22 D. Corni Fuck. Symb. myc. (1869) p. 207 pl. VI fig. 39; Lamb. Fl.

- myc. Supplém. I p. 217; Sacc. Syll. Fung. I p. 681. Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 23 D. crassicollis Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 259; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 222; Sacc. Syll. Fung. I p. 641.
 Bi: Watermael (Bm. et R.).
- 24 D. Crataegi (Curr.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 204; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 212.

Valsa — *Ourr.* in Trans. Linn. Soc. XXII (1858) p. 278 t. 48 fig. 1450. Lg.: Gomzé (Mout.). — N.: Mariembourg (Bm. et R.).

- 25 D. crustosa Sacc. et Roum. in Rev. myc. (1882) t. XIX fig. 3;
 Sacc. Syll. Fung. I p. 682; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 219.
 N.: Dáve (Bm. et R.). Lg.: Stoumont (Bm. et R.).
- 26 D. cryptica Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 265; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 222; Sacc. Syll. Fung. I p. 641.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 27 D. decedens (Fries) Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 318; Sacc. Syll. Fung. I p. 625; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 211. Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 481. Zone ardenn. (Lamb.).
- 28 D. decipiens Sacc. Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 6; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 214; Sacc. Syll. Fung. I p. 608.
 Lg.: env. de Liége (Mout.). Bt: Tervueren, Groenendael (Bm. et R.).
- 29 D. delitescens Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 250.

 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 30 D. detrusa (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 205; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164; Lamb. Fl. myc. II p. 377; Sacc. Syll. Fung. I p. 619.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 382.

Valsa - Fries Summa Veg. Scand. II (1849); Kickv Fl. crypt. I p. 328.

- N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Bt: Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). Fl. or.: Termonde (West.).
- 31 D. difficilior Kunze Fungi Sel. exs. n. 352; Sacc. Syll. Fung. I p. 620.

Bt: Abbaye de Villers (Bm. et R.).

32 D. digitifera Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 75.

Lg.: env. de Liége (Mout.). — Lx.: Poix (Bm. et R.).

33 D. disputata Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 251.

Lx.: env. d'Herbeumont (Prieuré de Conques) (Bm. et R.).

- 34 D. dubia Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 316; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 217; Sacc. Syll. Fung. I p. 678.
 Bt: Parc de Tervueren (Bm. et R.).
- 35 D. Dulcamarae Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 250; Sacc. Syll. Fung. I p. 658.

 Bt: Haeren (Bm. et R.).
- S6 D. enteroleuca (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 612; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 211.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 381 p. p. Valsa — Curr. in Trans. Linn. Soc. XXII (1858) p. t. 47, fig. 113. Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 37 D. eres Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 245; Lamb. Fl. myc.
 Supplém. I p. 223; Sacc. Syll. Fung. I p. 631.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 38 D. Euphorbiae Cooke in Grevillea III (1874) p. 67; Sacc. Syll. Fung. I p. 655.

Lg.: Forêt, Gomzé (Mout.). — N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 39 D. exasperans Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 289; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 219; Sacc. Syll. Fung. I p. 686.
 Lg.: Angleur (Mout.).
- 40 D. fallaciosa Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 254; Sacc. Syll. Fung. I p. 637.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

41 D. fasciculata Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 247; Sacc. Syll. Fung. I p. 639.

? Sphaeria spiculosaPers. Syn. Fung. (1801); Kichx Fl. crypt. I p. 340.

Bt: Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ. : env. d'Ypres et de Courtrai (West.).

42 D. fibrosa (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 204.
Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 40.
N.: Walzin, Hastière (Bm. et R.).

43 D. forabilis Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 259; Sacc. Syll. Fung. I p. 640.

Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.).

44 **D.** galericulata (*Tul.*) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 629. Valsa — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 203.

Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.).

45 D. grammodes (De Not.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 650; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 221.

Sphaeria — De Not. Micr. ital. Dec. II (1839) p. 74 fig. IV.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

46 D. Hippocastani (Cooke) Berl. et Vogl. Add. Syll. I-IV (1886)p. 185; Sacc. Syll. Fung. IX p. 709.

Valsa - Cooke in Grevillea XIII (1885) p. 98.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

47 D. Hippophaes Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 247.

Fl. occ.: Knocke (Bm. et R.).

48 D. Hystricula Sace. et Speg. in Mich. I (1878) p. 392; Sace. Syll. Fung. I p. 623.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

49 D. hystrix (*Tode*) Sacc. Fungi Ven. Ser. IV (1873-80) p. et Syll. Fung. I p. 623; *Lamb*. Fl. myc. Supplém. I p. 210. Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 53 fig. 127.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

D. immersa (Fuck.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 270; Sacc. Syll.
 Fung. I p. 653.

Sphaeria — Fuck. Fungi Rhen. n. 1795.

Bt: Rouge-cloître (Bm. et R.).

51 D. inaequalis (Ourr.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 285; Lamb.
Fl. myc. Supplém. I p. 219; Sacc. Syll. Fung. I p. 663.
Sphaeria — Ourr. in Trans. Linn. Soc. XXII (1858) p. 270 fig. 79.
Lg.: Gomzé (Paque). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

52 D. incarcerata (Berk. et Br.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 297; Sacc. Syll. Fung. I p. 669.

Diatrype - Berk. et Br. Ann. nat. Hist. (anno?) n. 842.

Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.).

53 D. incrustans Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 267; Sacc. Syll. Fung. I p. 655; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 221.
Lg.: Beaufays (Mout.).

54 D. inquilina (Wallr.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 272; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 221.

Sphaeria - Wallr. Comp. Fl. Crypt. Germ. IV (1833) p. 779.

Lg.: Beaufays (Mout.).

55 D. intermedia Sacc. Fungi Ven. Ser. IV (1873-80) p. 9 et Syll. Fung. I p. 660.

N.: Hastière (Bm. et R.).

56 D. juglandina (Fuck.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 281; Sacc. Syll. Fung. I p. 674.

Aglaospora - Fuck. Fungi Rhen. n. 2156.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

57 D. Kunzeana Sacc. Fung. Ven. Ser. V (1873-80) p. 181; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 212; Sacc. Syll. Fung. I p. 607. Lg.: env. de Liége (Mout.). — Bt: Watermael (Bm. et R.).

58 D. Landeghemiae (West.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 318; Sacc. Syll. Fung. I p. 683.

Sphaeria — West in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 83 pl. fig. 5;
 Kickw Fl. Crypt. I p. 343; Lamb. Fl. myc. II p. 245.

Bt: Tervueren (Bm. et R.), Louvain (Paque). - Fl. or.: Termonde (West.).

59 D. Laschii Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 292; Lamb. Fl. myc. II p. 380; Sacc. Syll. Fung. I p. 684.

Lg.: Forêt (Mout.): — Bt: Tervueren (Bm. et R.).

60 D. leiphaema (Fries) Sacc. Myc. Ven. (1873) p. 135 t. XIII fig. 26-28; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 399.

Valsa — Kickx Recherches Fl. crypt. Flandres (1846) p. 15; Kickx Fl. crypt. I p. 325.

Cryptospora — Fuck, Symb. myc. (1869) p. 194; Lamb. Fl. myc. II p. 363.

N.: citadelle de Namur (Bell.). — Bt: Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

61 D. leiphaemoides (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 624.
Cryptospora — Fuck. Fung. Rhen. Ed. I n. 2453 et Symb. myc. App. II (1873) p. 34.

Bt: Tervueren (Bm. et .R.).

62 D. ligulata Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 291; Sacc. Syll. Fung. I p. 662.

Bt: Auderghem (Bm. et R.).

63 D. linearis (Nees) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 277; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 222.

Sphaeria — Nees in Fries Syst. myc. II (1823) p. 529.

Lg. : Tilff (Mout.).

64 D. Lirella (Moug. et Nestl.) Nitschke in Fuck. Symb. myc. (1869) p. 206; Sacc. Syll. Fung. I p. 668; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164; Lamb. Fl. myc. II p. 379.

Sphaeria — Moug. et Nestl. in Fries Elench. II (1828) p. 105; Kickx Fl. crypt. I p. 347.

Fl. occ.: Termonde (West.). — Poldres (Kickx). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.).

65 D. maculosa Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 383; Lamb. Fl.

- myc. Supplém. I p. 215; Sacc. Syll. Fung. I p. 690. Lg.: Beaufays (Mout.).
- 66 D. medusaea Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 251; Sacc. Syll. Fung. I p. 639.

 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 67 D. minuscula Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 387; Sacc. Syll. Fung. I p. 655. Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 223. Zone ardenn. (Lamb.).
- 68 D. mucosa Wint. ex Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 609.
 N.: Dave, Han-sur-Lesse (Bm. et R.). Bt: Boitsfort (Bm. et R.).
- 69 D. nidulans Niessl Not. Pyr. (1876) p. 49; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 210; Sacc. Syll. Fung. I p. 637.
 Lg.: Forêt, Beaufays (Mout.). Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 70 D. Niesslii Sacc. in Mich. I (1878) p. 391; Sacc. Syll. Fung. I p. 610; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 211.
 Zones ardenn. et calc. (Lamb.).
- 71 D. oblita Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 386; Sacc. Syll.
 Fung. I p. 691.
 A.: Santvliet (Bm. et R.).
- 72 D. obscurans Sacc. Fung. Ven. Ser. IV (1873-80) p. 7 et Syll. Fung. I p. 675; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 216. Zone ardenn. (Lamb.).
- 73 D. occulta (Fuck.) Nitschke Pyr. Germ. (1887) p. 266; Sacc. Syll. Fung. I p. 647.
 Valsa Fuck. Fung. Rhen. n. 622.
 - Bt: Groenendael (Bm. et R.). N.: Han-sur-Lesse (Bm. et R.).
- 74 D. oncostoma (Duby) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 205; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 213; Sacc. Syll. Fung. I p. 612.
 Valsa Duby in Kl. Herb. myc. II 253.
 Lg.: Beaufays (Mout.). Bt: Tervueren, Groenendael (Bm. et R.).
- 75 D. orthoceras (Fries) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 270; Lamb.
 Fl. myc. Supplém. I p. 220; Sacc. Syll. Fung. I p. 651.
 Sphaeria Fries Elench. Fung. II (1828) p. 97.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 76 D. Oudemansii Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 611. Bt: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).
- 77 D. parabolica Fuck. Symb. myc. (1869) p. 211; Sacc. Syll. Fung. I p. 644.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 78 D. pardalota (Mont.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 206; Lamb. Fl.

myc. Supplém. I p. 116; Sacc. Syll. Fung. I p. 693. Sphaeria — Mont. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. I (1824) p. 304.

Lg.: Angleur, Forêt (Mout.). - Lx.: Poix (Bm. et R.).

- 79 D. perjuncta Niessl in Hedwigia (1878) p. 44; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 211; Sacc. Syll. Fung. I p. 628.
 Lg.: Dolembreux (Mout.).
- 80 **D. petiolorum** Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 388; Sacc. Syll. Fung. I p. 638.

Bt: Laeken (Bm. et R.).

81 **D. pithya** Sacc. Fungi Ven. Ser. IV (1873-80) p. 7 et Syll. Fung. I p. 689.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 82 **D. populea** Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p.:274.

 Lg.: Angleur, Beaufays (Mout.).
- 83 D. priva Sacc. et Roum. in Rev. myc. (1884); Sacc. Syll. Fung. IX
 p. 718.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 84 D. prominula Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 197.
 A.: Westmalle (Bm. et R.).
- 85 D. protracta Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 255; Lamb. Fl. myc.
 Supplém. I. p. 221; Sacc. Syll. Fung. I p. 637.
 Lg.: Chaudfontaine (Mout.).
- 86 D. pulchella Sacc. et Br.; Sacc. Syll. Fung. IX p. 704.
 N.: Yvoir (Bm. et R.). Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 87 D. pulla Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 246; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164; Sacc. Syll. Fung. I p. 636.

 Bt: Mousty, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).
- 88 D. punctata (*Cooke*) Berl. et Vogl. Add. Syll. (1886) p. 108; Sacc. Syll. IX p. 702.

Valsa — Cooke in Grevillea XIV (1885) p. 47.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 89 D. punctulata Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. Bot. Belg.
 t. XXVI part. 1 (1887) p. 197.
 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 90 D. pustulata (Desm.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 610.

 Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846).

 Aglaospora Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 163; Lamb. Fl. myc. II p. 351.

 Lg.: Chaudfontaine (Mout.). Bt: Groenendael (Bm. et R.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 91 D. Putator Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 306; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 165; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 217; Sacc. Syll. Fung. I p. 685. Bt: Jette (Bm. et R.).
- 92 D. pyrrhocystis (Berk. et Br.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 204;

 Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 214.

 Diatrype Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. (anno?) 841 t. 9 fig. 10

 Lg.: Gomzé (Mout.).
- 93 D. Quercina Fuck. Symb. myc. (1869) p. 204; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 218; Sacc. Syll. Fung. I p. 670. Zone ardenn. (Lamb.).
- 94 **D. radula** Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 313; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 218; Sacc. Syll. Fung. I p. 670. Zone ardenn. (Lamb.).
- D. resecans Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 314; Bomm. et Rouss.
 Fl. myc. env. Brux. p. 164; Sacc. Syll. Fung. I p. 674; Lamb.
 Fl. myc. Supplém. I p. 217.
 N.: Ardennes (Aub.). Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- D. retecta Fuck. et Nitschke in Fungi Rhen. n. 1992; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 165; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 218; Sacc. Syll. Fung. I p. 680.
 Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- D. Rhois Nitschke Pyr. Germ. (2867) p. 315; Sacc. Syll. Fung. I p. 680.
 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- D. Robergeana (Desm.) Niessl in Rabenh. Fung. Eur. n. 2222;
 Saec. Syll. Fung. I p. 616.
 Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 306.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- D. rostellata (Fries) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 198; Lamb. Fl. myc. II p. 380; Sacc. Syll. Fung. I p. 667.
 Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 476; Kickv Fl. crypt. I p. 348.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.). Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.).
- D. Ryckholtii (West.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 319; Lamb.
 Fl. myc. II p. 382; Sacc. Syll. Fung. I p. 679.
 Sphaeria West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 82 pl. fig. 4.
 Valsa Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 323.
 Fl. or.: Termonde (West.). Bi: Tervueren (Bm. et R.).

101 D. salicella (Fries) Sacc. Myc. Ven. Spec. (1873) p. 135 t. XIII fig. 22-25 et Syll. Fung. I p. 622.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 377.

Cryptospora — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 193; Lamb. Fl. myc. II p. 362.

Lg.: Comblain-au-Pont (Bm. et R.). — Bt: Louvain, Eegenhoven (Paque). — A.: Turnhout (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

102 D. Sarothamni (Auersw.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 303;
Sacc. Syll. Fung. I p. 663; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 218.
Valsa — Auersw. mss.

Lg.: Dolembreux (Mout.). - 8t: Villers-la-Ville (Bm. et R.).

- 103 D. sautonensis Sacc. Fungi Gall. Ser. V n. 216 in Mich. (1882) et Syll. Fung. IX p. 717.

 Bt: Boitsfort (Bm. et R.).
- 104 D. scobina Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 293; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 215; Sacc. Syll. Fung. I p. 676.
 Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 105 D. seposita Sacc. Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 7 et Syll.
 Fung. I p. 664.
 Bt: Hoeylaert (Bm. et R.).
- 106 D. simulans Sacc. Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 11 et Syll. Fung. I p. 664; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 223.
 Lg.: Dolembreux (Mout.).
- 107 D. Sorbariae Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 261; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 223; Sacc. Syll. Fung. I p. 664.
 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 108 D. spiculosa (Alb. et Schwein.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 256; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164; Sacc. Syll. Fung. I p. 633; Lamb. Fl. myc. II p. 383.

Sphaeria — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 16.

Hypoxylon — West. in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 242.

Valsa circonscripta Mont. Syll. Crypt. (1856) n. 764.

- Bt: Boitsfort (Bm. et R.), entre Tervueren et Auderghem (Él. M.). Fl. occ.: env. d'Ypres (West.).
- D. Spina Fuck. Symb. myc. (1869) p. 210 t. IV fig. 44; Lamb.
 Fl. myc. Supplém. I p. 220; Sacc. Syll. Fung. I p. 685.
 N.: Yvoir (Bm. et R.). Lg.: Jupille (Mout.). Fl. occ.: Courtrai (West.).
- 110 D. spissa Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 385; Sacc. Syll. Fung. I p. 681.

Bt: Limelette, Ternath (Bm. et R.).

111 D. striaeformis (Fries) Nitschke in Fuck. Symb. myc. (1869) p. 206;

Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 216; Sacc. Syll. Fung. I p. 690. Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1873) p. 428. Zone ardenn. (Lamb.).

112 D. strumella (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 205; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164; Lamb. Fl. myc. II p. 378; Sacc. Syll, Fung. I p. 613.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 365.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). - Bt: Boendael (Bm. et R.).

113 D. sulphurea Fuck. Symb. myc. (1869) p. 205; Sacc. Syll. Fung. I p. 625.

Lg.: Beaufays (Mout.).

114 D. syngenesia (Fries) Nitschke in Fuck, Symb. myc. (1869) p. 204;
Lamb. Fl. myc. II p. 376; Sacc. Syll. Fung. I p. 626.
Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 282 p. p.
Lg.: env. de Liége (Mout.). — Bt.: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

115 D. Taleola (Fries) Sacc. Fung. Ven. Ser. (1873-82) p. 12 et Syll. Fung. I p. 626; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164. Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 301.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

116 D. Tessella (Pers.) Rehm Ascom. n. 176; Sacc. Syll. Fung. I p. 628.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 48.

Cryptospora — Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 79: Lamb. Fl. myc. II p. 364

8t: Louvain (Leburt.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: St-Jean (Ypres) (West.).

D. Tessera (Fries) Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 318; Sacc.
 Syll. Fung. I p. 626; Lamb. Fl. myc. II p. 381.
 Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 405.
 Lg.: Gomzé (Mout.), Comblain-au-Pont (Bm. et R.).

118 D. Therryana Sacc. et Penz. in Mich. II (1880) p. 593; Sacc. Syll. Fung. II Add. p. L.
N.: Yvoir (Bm. et R.).

119 D. tortuosa (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 630; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 212. Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 395. Zone calc. (Lamb.).

120 D. Tulasnei Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 274; Sacc. Syll. Fung. I p. 657.

Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — N.: Yvoir (Bm. et R.).

121 D. velata (Pers.) Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 287; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 215.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 32.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

122 D. vepris (De Lacr.) Fuck. Fung. Rhen. n. 1994; Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 300; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164; Sacc. Syll. Fung. I p. 667; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 214. Sphaeria — De Lacr. in Rabenh. Fungi Eur. 443.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Lx.: Laroche, Samrée (Él. M.).

123 **D. Winteri** *Kunze* Fung. Sel. exs. n. 356; *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 658.

Lg.: Louvegnez, Dolembreux (Mout.).

SECT. PHAEODIDYMEAE.

- 60 DIDYMOSPHAERIA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 140; Sacc. Syll. Fung. I p. 701.
- D. acerina Rehm Ascom. 237 (1874) et in Hedwigia (1879) p. 168;
 Sacc. Syll. Fung. I p. 714.
 La.: Spriment. Forêt (Mout.). Bt: Tervueren (Bm. et B.). N.: Yvoir
 - Lg.: Sprimont, Forêt (Mout.). Bt: Tervueren (Bm. et R.). N.: Yvoir (Bm. et R.).
- D. brunneola Niessl in Oester. bot. Zeitsch. (1875) p. 201; Lamb.
 Fl. myc. Supplém. I p. 137; Sacc. Syll. Fung. I p. 709.
 Lg.: Dolembreux, Beaufays (Mout.), Comblain-au-pont (Bm. et R.).
 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- D. conoidea Niessl in Oester. bot. Zeitsch. (1875) p. 202; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 208; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 137; Sacc. Syll. Fung. I p. 702.
 Bt: Watermael, Groenendael (Bm. et R.).
- D. diplospora (Cooke) Rehm in Hedwigia (1879) p. 167; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 208; Sacc. Syll. Fung. I p. 710. Sphaeria Cooke Seem. Journ. (1866) t. 45 fig. 7. Didymosphaeria Fuck. Symb. myc. (1869) p. 141; Lamb. Fl. myc. II
 Bt: Groenendael (Bm. et R.). Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.).
- 5 D. epidermidis (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 141; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 208; Lamb. Fl. myc. II p. 281; Sacc. Syll. Fung. I p. 709.
 - Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 499 ex p.; Kickw Fl. crypt. I p. 342.
 - Bi: Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). Flandres (Kickx).

- D. epidermidis var. microscopica Desm. Pl. crypt. fasc. 20 n. 975; Kicka Fl. crypt. I.p. 342.
 - Bt: Vlierbeek, Louvain (Leburt.), Eegenhoven, Berthem (Paque). N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Flandres (Kickx).
- 6 D. Galiorum Fuck. Symb. myc. (1869) p. 140; Sacc. Syll. I p. 711.

 M. Saccardo indique cette espèce en Belgique. N'y aurait-il pas confusion avec le Sphaeria Galiorum Desm. trouvé par Bellynck et qui de l'avis de M. Saccardo, est le Leptosphaeria Aparines (Fuck.)?
- D. oblitescens (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. I p. 713.
 Sphaeria Berk. et Br. Ann. Nat. Hist. (anno?) p. 887 t. 11 fig. 32.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 8 D. subconoidea Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 274.
 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- D. Syringae Fabre Sphér. Vaucl. (1880) p. 84 fig. 15; Sacc. Syll. Fung. I p. 712.
 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 10 D. Winteri Niessl in Oester. bot. Zeitschr. (1875) p. 165; Sacc. Syll. Fung. I p. 702.

 Lg.: Tilff (Mout.).
- 11 D. zerbina (De Not.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 703; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 137.
 Amphisphaeria De Not. Sfer. it. (1863) p. 70 t. 73.
 Zone ardenn. (Lamb.).
 - 61 MASSARIELLA Speg. Fung. Arg. Pug. I (1880) p. 2; Sacc. Syll. Fung. I p. 716.
- M. Curreyi (*Tul.*) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 717; *Lamb*. Fl. myc. Supplém. I p. 166.
 Massaria *Tul.* Sel. Fung. Carp, II (1863) p. 231.
 tg.: Beaufays (Mout.). Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 M. didymopsis Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 151; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 166. Lg.: Gomzé (Mout.).
- 3 M. vibratilis (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 716; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 166.
 Massaria Fuck. Symb. myc. (1869) p. 154.
 Lg.: Gomzé, Dolembreux (Mout.).

- 62 PROTOVENTURIA Berl. et Sacc. in Atti Soc. Veneto Trentine (1886); Sacc. Syll. Fung. IX p. 741.
- 1 P. minor Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 263; Sacc. Syll. Fung. XI p. 315. Lx.: Ebly (Él. M.).
 - 63 AMPHISPHAERIA Ces. et De Not. in Comm. Soc. critt. it. (1861) Sacc. Syll. Fung. I p. 718.
- 1 A. anceps Sacc. et Briard. Miscell. myc. I (1884) n. 2207; Sacc. Syll. Fung. IX p. 742.
 Lg.: Dolembreux (Mout.).
- 2 A. applanata (Fries) Ces. et De Not. Schem. Sfer. it. (1861) p. 224;
 Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 157; Sacc. Syll. Fung. I p. 718.
 Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 463.
 Lg.: Tilff, Forêt (Mout.).
- 3 A. culmicola Sacc. Myc. Ven. Spec. (1873) p. 113 t. XI fig. 26-29, Fung. it. t. 444 et Syll. Fung. I p. 728.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 4 A. Magnusii Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) 205.

 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 5 A. pusiola Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 57; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Bruv. p. 204; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 157; Sacc. Syll. Fung. I p. 724.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 6 A. umbrina (Fries) De Not. Sfer. it. (1863) p. 69; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 158; Sacc. Syll. Fung. I p. 720. Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 461. Zone ardenn. (Lamb.).
 - 64 DELITSCHIA Auersw. in Hedwigia (1866) p. 49; Sacc. Syll. Fung. I p. 732.
- 1 D. Auerswaldii Fuck. Symb. myc. (1869) p. 241; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 187; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 182; Sacc. Syll. Fung. I p. 732.
 - Lg.: Angleur, Boncelles, Gomzé (Mout.). Bt: Aerschot (Él. M.), Limelette (Bm. et R.). Ht: Masnuy (Él. M.).
- 2 D. canina Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1837) p. 175 pl. 1 fig. 4.
 Lg.: Gomzé (Mout.).

- 3 D. Chaetomioides Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 60; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 187; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 182; Sacc. Syll. Fung. I p. 732.
 - Lg.: Lavaeken (Bm. et R.). Bt: Aerschot, Bergh, Limelette (Él. M.). Lx.; Verbomont (Él. M.).
- 4 D. consociata Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 175 pl. I fig. 8.
 Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 5 D. insignis Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 13.
 Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 6 D. leptospora Oudemans in Hedwigia (1882) p. 163; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 181; Sacc. Syll. Fung. II add. p. LIII.

 Lx.: Hare (Él. M.). Fl. occ.: entre Ostende et Heyst (Mout.). Lb.: Lanaeken (Bm. et R.).
- 7 D. lignicola Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 151, pl. IV fig. 7; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 181.
 Lg.: Tillf (Mout.).
- 8 D. Marchalii Berl. et Vogl. Add. Syll. I-IV (1886) p. 127; Sacc. Syll. IX p. 747; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 180.

 Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (Mout.). Lg: Forêt (Mout.). Bt: entre Limelette et la Baraque (Él. M.).
- 9 D. microspora Oudemans in Hedwigia XX (1882) p. 165. Lb.: Lanaeken (Bm. et R.).
- D. minuta Fuck. Symb. myc. (1869) p. 242; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 181; Sacc. Syll. Fung. I p. 733.
 Lb.: Genck (Bm. et R.). Lx.: env. de Laroche (Él. M.).
- 11 D. moravica Niessl Not. Pyrenom. p. 47 (1876) t. IV fig. 22; Bomm. et Rouss. Fl. myc. euv. Brux. p. 187; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 181; Sacc. Syll. Fung. I p. 733.
 - Lg.: Baraque-Michel (Él. M.). Lx.: Verbomont, Poix, Ebly (Él. M.). Bt: Aerschot, Limelette, N.-D. de bonne-Odeur, Malaise (Él. M.), entre Aerschot et Rillaer (Él. M.). Lb.: Genck (Él. M.). Fl. occ.: Zone maritime (Bm. et R.). Ht: Baudour (dl. M.).
- 12 D. Winteri Plowr. in Grevillea II (1874) p. 188 t. 25 fig. 1; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 187; Sacc. Syll. Fung. I p. 734; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 182.
 - Fl. occ.: dunes (Mout.). Lg.: Francorchamps (Él. M.), env. de Liége (Mout.). Bt: Boitsfort (Él. M.). Ht: Masnuy, Baudour (Él. M.).

- 65 OTTHIA Nitschke in Fuck. Symb. myc. (1869) p. 169; Sacc. Syll. Fung. I p. 735.
- O. amica Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 244.
 N.: Yvoir, Hastière (Bm. et R.).
- O. Corylina Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 59; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 160; Lamb. Fl. myc. Supplém. I:p. 184; Sacc. Syll. Fung. I p. 735.
 Lg.: Gomzé (Mout.). Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).
- 4 0. Hazlinszkyi Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 740. Sphaeria sp. Hazsl. Sphaer. Ros. (1870) p. 217, fig. 16-17. Lx.: env. d'Herbeumont (Bm. et R.).
- 5 0. Ilicis Fabre Sphér. Vauel. II (1880) p. 47 fig. 17; Sacc. Syll Fung. II Add. p. LIV; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 183. Zone ardenn. (Lamb.).
- O. Populina (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 170; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 160; Lamb. Fl. myc. II p. 216; Sacc. Syll. Fung. I p. 736.
 Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 7 O. Quereus Fuck. Symb. myc. (1869) p. 170; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 184; Sacc. Syll. Fung. I p. 737.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 8 0. Rosae Fuck. Symb. myc. (1869) p. 169; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 160; Lamb. Fl. myc. II p. 315; Sacc. Syll. Fung. I p. 737.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

 O. Spiraeae Fuck. Symb. myc. (1869) p. 170; Sacc. Syll. Fung. I p. 784.

Cucurbitària — Fuck. Fungi Rhen. n. 975.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

 O. Ulmi Fabre Sphér. Vauel. (1880) p. 86; Sacc. Syll. Fung. I p. 738.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

11 O. Xylostei Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 307; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 160; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 184; Sacc. Syll. Fung. I 737.
Bt: Hoeylaert, Laeken (Bm. et R.).

66 MELANCONIELIA Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 740.

1 M. chrysostroma (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 741.

Valsa — Fries Summa Veg. Scand. II 1849 p. 412.

Melanconis — Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 125 t. XXIV fig. 14-20; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 167.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

2 M. spodiaea (Tul.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 740.

Melanconis — Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 127, t. 24 fig. 10-13;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 167.

Lg.: Angleur, Tilff, Forêt (Mout.). - Bl: Groenendael (Bm. et R.).

- 67 VALSARIA Ces. et De Not. in Comm. Soc. critt. it. I (1861); Sacc. Syll. Fung. I p. 741.
- V. apiculata (Curr.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 752; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 225.
 Sphaeria Curr. Trans. Linn. Soc. XXII (1859) p. 326 fig. 96.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 V. insitiva Ces. et De Not. in Comm. Soc. critt. it. I (1861); Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 224; Sacc. Syll. Fung. I p. 741.
 Lg.: Gomzé, Tilff (Mout.). Bt: Groenendael, Tervueren, Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- 3 V. foedans (Karst.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 748. Phaeosperma — Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 55. Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 4 V. rubricosa (Fries) Sacc. Myc. Ven. Spec. (1873) p. 690; Lamb.
 Fl. myc. Supplém. I p. 224; Sacc. Syll. Fung. I p. 743.
 Sphaeria Fries Elench. Fung. II (1828) p. 63.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 5 V. Sarraziniana Sacc. et Roum. in Rev. Myc. (1883) p. 235 t. 39 f. 8; Sacc. Syll. Fung. IX p. 756; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 224.

Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. PHAEOPHRAGMEAE.

- 68 MASSARIA De Not. in Giorn. bot. it. I (1844) p. 333; Sacc. Syll. Fung. II p. 2.
- M. Argus (Berk et Br.) Tal. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 227;
 Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 165; Sacc. Syll. Fung. II p. 7.
 Sphaeria Berk. et Br. Brit. Fungi (anno?) p. 626 t. 9 fig. 9.
 Bt : Villers-la-Ville, Tervueren (Bm. et R.).

- 2 M. conspurcata (Wallr.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 11. Sphaeria — Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. (1833) p. 782. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 3 M. Corni (Fries et Mont.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 4.
 Saccothecium Fries et Mont. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. I (1834) p. 340
 t. 13 f. 6.

Sphaoria gigaspora Desm. Crypt. de Fr. éd. II n. 1765; Kicka Fl. crypt. I p. 344.

Fl. or.: env. de Termonde (West.). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

4 M. foedans Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 395; Sacc. Syll. Fung. II p. 2.
Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 480.
Ht: Ath (Él. M.).

- 5 M. hirta (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 154 t. III fig. 30; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 164; Sacc. Syll. Fung. II p. 9. Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 483 p. p. Lg.: Beaufays (Mout.).
- 6 M. inquinans (Tode) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 369;
 Sacc. Syll. Fung. II p. 5; Lamb. Fl. myc. II p. 296.
 Sphaeria Tode Meckl. Sel. I (1795) fig. 85.

 $\textbf{Lg.:}\ \ Dolembreux\ \ (Mout.),\ Comblain-au-pont\ (Bm. et\ R_*).\ --- \ \textbf{Bt}:\ Gentinnes\ (de\ Limm.).$

- 7 M. loricata Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 230; Lamb. Fl. myc. II p. 298; Sacc. Syll. Fung. II p. 3.
 Lg.: Dolembreux, Beaufays (Mout.).
- M. macrospora (Desm.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 10; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 192.
 Sphaeria Desm. (1849) p. 350; Kickw Fl. crypt. I p. 335.
 Cucurbitaria Tul.; Lamb. Fl. myc. II p. 321.
 Bt: Uccle, Groenendael (Bm. et R.). Fl. occ.: Courtrai (West.).
- 9 M. Niessleana Rehm Ascom. n. 645 et in Hedwigia (1882) p. 84; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 165; Sacc. Syll. Fung. II p. 7. Lg.: Tilff (Mout.).
- 10 M. Platani Ces. in Rabenh. Fungi Eur. n. 323 et in Comm. Soc. critt. it. I (1861) p. 217; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 165; Sacc. Syll. Fung. II p. 6. Zone ardenn. (Lamb.).
- 11 M. pupula (Fries) Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 225; Lamb.

- Fl. myc. II p. 297; Sacc. Syll. Fung. II p. 3.
 - Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 484.
- Lg.: Chaudfontaine (Mout.). Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 12 M. Ulmi Fuck. Symb. myc. (1869) p. 153 pl. VI fig. 38; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 165; Sacc. Syll. Fung. II p. 6.
 Bt: Watermael (Bm. et R.).
 - 69 CERIOSPORA Niessl Not. k. Pyr. (1876) p. 9; Sacc. Syll. Fung. II p. 184.
- 1 C. Dubyi Niessl Not. k. Pyr. (1876) p. 9; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 133; Sacc. Syll. Fung. II p. 185.
 Lg.: Tilff (Mout.).
- C. xantha Sacc. in Mich. (1878) 36 et Syll. Fung. II p. 185; Lamb.
 Fl. myc. Supplém. I p. 133.
 - Lg.: Forêt (Mout.). N.: Mariembourg, Dave (Bm. et R.). Lx.: Orval (Bm. et R.).
 - 70 REBENTISCHIA Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 14; Succ. Syll. Fung. II p. 12.
- 1 R. unicaudata (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. II p. 12; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 133.

Sphaeria - Berk. et Br. Brit. Fung. (anno?) n. 886 t. 11 fig. 31.

- tg.: Angleur, Beaufays (Mout.). N.: Yvoir, Mariembourg, Rochefort (Bm. et R.).
 - 71 CHITINOSPORA Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 270; Sacc. Syll. Fung. IX p. 797.
- 1 C. ammophila Sacc. Bomm. et Rouss. loc. cit; Sacc. Syll. loc. cit. Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).
 - 72 LEPTOSPHAERIA Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) Sacc. Syll. Fung. II p. 13.
- L. abbreviata (Cooke) Sacc. Syll. Fung. II (1823) p. 26; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 206.

Sphaeria - Cooke Handb. II (1871) n. 2683.

Pleospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 276.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

2 L. Aconiti Sacc. Fungi Ven. Ser. II (1873-82) p. 315 et Syll. Fung. II p. 24; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 123. Zone ardenn. (Lamb.).

3 L. acuta (Moug. et Nestl.) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 98; Sacc. Syll. Fung. II p. 41; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 206. Sphaeria — Moug. et Nestl. Stirp. crypt. Voges. n. 181; Kickv Fl. crypt. I p. 349.

Pleospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 270.

Aposphaeria - Berk.; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 256.

Sphaeria coniformis Fries Syst. myc. II (1823) p. 508; Kicke Fl. crypt. I p. 349.

Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes., Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Vlierbeek, Hóverlé, Corbeek-Dyle (Paque). — N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 4 L. agminalis Sacc. et Morth, in Mich. I (1878) p. 498; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 125; Sacc. Syll. Fung. II p. 23.
 Lg.: Forêt (Mout.).
- 5 L. Agnita (Desm.) De Not. et Ces. Schem. sfer. (1861) p. 62; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 206; Sacc. Syll. Fung. II p. 40. Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 313. Pleospora Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 271.

Bt: Uccle (Bm. et R.). — Ht: env. de Mons (Dumont). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lb.: Beverloo (West.). — Fl. or:: env. d'Audenarde (Tosquinet).

- 6 L. albo-punctata (West.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 72.
 Sphaeria West. in Herb. Orypt. n. 1216 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2
 t. VII (1859) p. 87 pl. fig. 16; Kickw Fl. crypt. I p. 355; Lamb. Fl. myc. II p. 239.
 - N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Fl. occ.; env. de Courtrai (West.).
- 7 L. Ammophilae Rehm Ascom. n. 691; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 126.

Fl. occ.: Ostende (Mout.).

- 8 L. amphibola Sacc. Fungi Ven. Ser. II (1873-80) p. 322 et Syll. Fung. II p. 75; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 124. Rel. Westendorpianae.
- 9 L. Aparines (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 21.
 Pleospora Fuck. Symb. myc. (1869) p. 136.
 Didymosphaeria Galiorum Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 181.
 N.: Namur (Bell.).
- 10 L. Apogon Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 398; Sacc. Syll. Fung. II p. 63.
 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 11 L. argentina Speg. Fung. Arg. I (1880) p. 183; Sacc. Syll. Fung. II p. 16.
 Lx.: Orval (Bm. et R.).

12 L. arundinacea (Sow.) Sacc. Fungi Ven. Ser. II p. 320; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 206.

Sphaeria - Sow. in Smith et Sow. Engl. Bot. Fungi (1796) t. 336.

Pleospora — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 137: Lamb. Fl. myc. II p. 272. Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.).

- var. Godini (Desm.) Sacc. loc. cit. p. 63.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 49; Kickw. Fl. crypt. I p. 336.

Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). - Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

13 L. Clivensis (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. I1 (1883) p. 16; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 206; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 119.

Sphaeria - Berk. et Br. Not. Brit. Fungi (anno?) 643 t. II fig. 29.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

14 L. Coniothyrium Sacc. in Nuov. Giorn. Bot. it. VII (1875) p. 317;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 118; Syll. Fung. II p. 29.
Lg.: Beaufays (Mout.). — Lg.: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

15 L. conoidea Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 14; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 119.
 C. (Lamb.).

16 L. Crepini (West.) De Not. in Comm. Soc. critt. it. (1867) p. 487;
Sacc. Syll. Fung. II p. 79.

Sphaeria — West. in Herb. crypt. n. 911 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 88 pl. fig. 17; Lamb. Fl. myc. II p. 232.

Lx. : St-Hubert (Crépin).

17 L. cruenta Sacc. in Mich II (1880) p. 318; et Syll. Fung. II p. 25; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 206; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 123.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

18 L. culmicola (Fries) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 108; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 122.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 430.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

19 L. culmifraga (Fries) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 61; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 206; Sacc. Syll. Fung. II p. 75.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 510.

Pleospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 273.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Bergh (Del.).

20 L. cylindrospora Auersw. et Niessl ex Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 37; Lamb. Fl. myc. Supplém, I p. 127. Zone ardenn. (Lamb.).

21 L. derasa (Berk. et Br.) Thuem. Myc. Univ. 269; Sacc. Syll. Fung. II p. 41; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 126. Sphaeria — Berk. et Br. Brit. Fungi (anno?) t. XI fig. 25 b.

Lg.: Beaufays, Gomzé (Mout.).

22 L. dioica (Moug.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 18; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 119.

Sphaeria — Moug. in Fries Elench. Fung. II (1828) p. 82. Lg.: Gomzé (Mout.). — Bt.: Villers-la-Ville (Bm. et R.).

23 L. dolioloides (Auersw.) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 106; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 125; Sacc. Syll. Fung. II p. 44. Nodulosphaeria — Auersw. in Rabenh. Fungi Eur. 347.

Lg.: Beaufays (Mout.), Comblain-au-Pont (Bm. et R.). — Lx.: Laroche (Él. M.). — Bt: Elewyt (Él. M.).

24 L. doliolum (Pers.) De Not. Schem. Sfer. (1863) p. 61; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 206; Sacc. Syll. Fung. II p. 14. Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 78. Pleospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 269.

Bt: Parc, Corbeek-Loo, Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: env. de Liége (Mout.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).

- 25 L. dubiosa Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 177.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 26 L. dumetosum Niessl Beitr. (1872) t. III fig. 19; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 120; Sacc. Syll. Fung. II p. 15.

 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 27 L. endophaena Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 267; Sacc. Syll. Fung. IX p. 781.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

28 L. epicarecta (Cooke) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 65. Sphaeria — Cooke in Grevillea V (1877) p. 120. Bt: Watermael (Bm. et R.).

29 L. eustoma (Fries) Sacc. Myc. Ven. (1873) p. 210 et Syll. II p. 61. Sphaeria — Fries Elench. Fung. (1828) p. 109. Pleospora — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 139 t. III fig. 22.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

30 L. Fuckelii Niessl in Voss Zwei neue Ascom.; Sacc. Syll. Fung. II p. 71; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 122.

Lg.: Beaufays, Herstal, Liége (Mout.). — Bt: Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

- 31 L. fuscella (Berk. et Br.) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 236; Lamb. Fl. myc. Supplém. I. p. 119; Sacc. Syll. Fung. II p. 30. Sphaeria Berk. et Br. Brit. Fungi (anno?) p. 636 t. XI fig. 20. Zone calc. (Lamb.).
- 32 L. Galiorum Sacc. Myc. Ven. (1873) p. 104 t. X fig. 20-21.
 - var. Cirsiorum Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 22.
 N.: Hastière (Bm. et R.).
- 33 L. Gillotiana Sacc. et Roum. in Rev. myc. (1883) p. 235 t. 40 f. 9; Sacc. Syll. Fung. IX p. 777; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 120. Zone ardenn. (Lamb.).
- 34 L. Gnaphalii (West.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 34; Lamb. Fl. myc. II p. 272.
 Pleospora West.?; Fuck. Symb. myc. p. 136.
 Sine loco (Lamb.).
- 35 L. haematites (Rob. et Desm.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 36.
 Sphaeria Rob. et Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 311
 Kickx Fl. crypt. I p. 351; Lamb. Fl. myc. II p. 238.
 - Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Fl. or.: Gand (Kickx).
- 36 L. hederaecola (Desm.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 51. Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 115. Bt: Louvain, Eegenhoven (Paque).
- 37 L. juncicola Rehm Ascom. Diagn. n. 533; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 124; Sacc. Syll. Fung. II p. 66.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 38 L. Lathonia Sacc. Fungi Ven. Ser. II (1873-82) p. 310; Sacc. Syll. Fung. II p. 48.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 39 L. Leersiana Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 60. Sphaerella Leersiae Pass. Fung. Parm. IV 43. Fl. occ.: Knocke (Bm. et R.).
- 40 L. Libanotis (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 16.
 Sphaeria Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 24.
 Pleospora Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 274.
 Sphaeria Selysii West. in Bull. Soc. de bot. de Belg. t. V(1863) p. 38 pl. fig. 5.
 N.: Hastière (Bm. et R.), Rochefort (Crépin).
- 41 L. littoralis Sacc. in Mich. I (1878) p. 38 et Syll. Fung. II p. 78; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 127.
 Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).
 - f. Calamagrostidis-arenariae Sacc. loc. cit. (1883) p. 78. Rel. Westendorpianae.

42 L. Longchampsi (West.) Sacc. et El. March. in Rev. Myc. (1885) p. 145; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 123; Sacc. Syll. Fung. IX p. 762.

Sphaeria — West. ex. Sacc. loc. cit.

Reliquiae Westendorpianae.

43 L. Lophanti (Berk. et Qooke) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 84; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 127.

Sphaeria - Berk. et Cooke North Amer. Fungi n. 856.

Bi: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

- 44 L. Lucilla Sacc. Fungi Ven. Ser. II (1873-82) p. 310 et Syll. Fung. II p. 52; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 122.
 Zone ardenn. (Lamb.)
- 45 L. luctuosa Niessl ex Sacc. Fung. Ven. Ser. II (1873-82) 321; Sacc. Syll. Fung. II p. 72.

Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

46 L. maculans (Desm.) Ces. et De Not. in Comm. Soc. Critt. ital. I (1861) p. 235; Sacc. Syll. Fung. II p. 35; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 206.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 77; Kickx. Fl. crypt. I p. 348.

Pleospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 270.

Sphaeria Alliariae Fuck. Symb. myc. (1869) p. 135.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Kickx), env. de Louvain (Leburt.), Boendael (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

47 L. Marram (Cooke) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 60. Sphaeria — Cooke in Grevillea V (1877) p. 120.

Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

48 L. Massariella Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 393; Sacc. Syll. Fung. II p. 30.

Bi: Groenendael (Bm. et R.).

49 L. Medicaginis (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 19; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 119.

Pleospora - Fuck. Symb. myc. (1869) p. 134.

Zon'e ardenn. (Lamb.).

50 L. Michotii (West.) Sacc. Fung. it. (1878) t. 279.

Sphaeria — West. in Herb. Crypt. n. 1218 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2
 t. VII (1859) p. 87 pl. fig. 15; Lamb. Fl. myc. II p. 240.

Lg. : Beaufays, Forêt (Mout.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lb. : Beverloo (West.).

51 L. microscopica Karst. Fungi Spetsb. et Ber. p. 102; Sacc. Syll. Fung. II p. 59; Lamb. Fl. myc. Suppl. I p. 121.

307

Lg.: env. de Liége (Mout.). — N. : env. de Namur (Bell.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

52 L. molybdina (Mout. et Moug.) Sacc. in Mich. II (1882) p. 319 et Syll. Fung. II p. 25.

Sphaeria — Mout. et Moug. in Roum. F. Gall. (anno?) n. 580. N.: Yvoir (Bm. et R.).

53 L. modesta (*Desm.*) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 106; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 206.

Sphaeria — Desm. Crypt. Fr. Éd. I n. 1786 et in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 173; Kickx Fl. crypt. I p. 351.

Pleospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 277.

Fl. occ.: env. d'Ypres (West.). — Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

var. Scabiosae-Succisae Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1888) p. 177.
 Lg.: Beaufays (Mout.).

54 L. Nardi (Fries) Ces. et De Not. Schem. sfer. (1861) p. 236.
Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 520.
Pleospora — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 137 t. VI fig. 28; Lamb. Fl. myc. II p. 273.

Lg.: Gomzé (Mout.). - Lb.: Beverloo (West.). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 55 L. nectrioides Speg. in Mich. I (1878) p. 456; Sacc. Syll. Fung. II p. 45; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 124.
 Lg.: Gomzé (Mout.).
- 56 L. nigrans (Desm.) Ces. et De Not. Schem. sfer. (1861) p. 61.
 Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VJ (1846) p. 79.
 Lg.: Quarreux (Bm. et R.).
- 57 L. nigrella (Rabenh.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 21.
 Cucurbitaria Rabenh. in Hedwigia (1873) p. 140.
 Pleospora Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 128.
 Sphaeria Fries; Kickx Fl. crypt. I p. 350; Lamb. Fl. myc. II p. 239.
 Lg.: Beaufays (Mout.). Fl. occ.: Menin (West.).
- 58 L. Nitschkei Rehm Ascom. n. 15bis; Sacc. Syll. Fung. II p. 26; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 123.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 59 L. obesula Sacc. in Mich. II (1880) p. 318; Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 176 pl. I fig. 12; Sacc. Syll. Fung. II p. 15.
 Lg.: Beaufays, Forêt (Mout.).
- 60 L. Ogilviensis (Berk. et Br.) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 61; Sacc. Syll. Fung. II p. 34; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 125.

Sphaeria — Berk. et Br. Ann. nat. Hist. p. 642. t. IX fig. 28. Lg.: Louvegnez, Beaufays (Mout.), Quarreux (Bm. et R.).

- 61 L. pachycarpa Sacc. et Él. March. in Rev. myc. (1885) p. 145;
 Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 125.
 Reliquiae Westendorpianae.
- 62 L. pellita (Kl. et Rabenh.) Sacc. in Mich. II (1880) p. 63 et Syll. Fung. II p. 41.

Sphaeria — Kl. et Rabenh. sec. Sacc. loc. cit.; Kickx Fl. crypt. I p. 331.

Bt: Louvain, Eegenhoven Vosselaer (Paque). — Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

- 63 L. planiuscula (Riess) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 61; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 127; Sacc. Syll. Fung. II p. 32. Sphaeria — Riess in Hedwigia I (1878) t. IV fig. 7. Lg.: Beaufays, Tilff (Mout.).
- 64 L. pontiformis (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 78.

 Pleospora Fuck. Symb. myc. (1869) p. 139; Lamb. Fl. myc. II p. 278.

 Sine loco (Lamb.).
- 65 L. pyrenopezizoides Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 394; Sacc. Syll. Fung. II p. 23.
 Lx.: Orval (Bm. et R.).
- 66 L. riparia Sace. in Mich. I (1878) p. 39 et Syll. Fung. II p. 73.
 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 67 L. rivularis Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 269.

 Lg.: Remouchamps (Bm. et R.).
- 68 L. rubicunda Rehm Ascom. n. 92; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 122; Sacc. Syll. Fung. II p. 25.
 Lg.: Liége (Mout.). Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 69 L. Rusci (Wallr.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 74; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 206.

Sphaeria — Wallr. Comp. Fl. Crypt. Germ. IV (1833) p. 776; Kickx Fl. crypt. I p. 346; Lamb. Fl. myc. II p. 235.

- Fl. or.: Gand (Kickx). N.: Namur (Bell.). Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Leburt.).
- 70 L. salebricola Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 268. Lg.: Comblain-au-Pont (Bm. et R.).
- 71 L. Scrophulariae (Desm.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 57.
 Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1836) p. 245.
 N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 72 L. Sowerbyi (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 78.
 Pleospora Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 301; Lamb. Fl. myc. II
 p. 274.
 - Lg.: Liége (Mout.). Lx.: env. d'Herbeumont (Bm. et R.).
- 73 L. sparsa (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 77.

 Pleospora Fuck. Symb. myc. (1869) p. 138 et App. II fig. 5.

 Lx.: Ebly (Él. M.).
- 74 L. Thielensii (West.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 46.
 Sphaeria West. in Bull. Soc. roy. bot. de Belg. t. II (1867) p. 37 pl. fig. 2 d-g.
 Pleospora West. ex Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 274.
 Lb.: Beverloo (West.).
- 75 L. Thomasiana Sacc. et Roum. in Rev. myc. (1883) p. t. 40 f. 10; Sacc. Syll. Fung. IX p. 779; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 181. Zone ardenn. (Lamb.).
- 76 L. Typhae Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 99; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 120; Sacc. Syll. Fung. II p. 64. Zone ardenn. (Lamb.).
- 77 L. Typharum (Rabenh.) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 100; Sacc. Syll. Fung. II p. 64.
 Sphaeria Rabenh. Herb. myc. Ed. II n. 731.
 Sphaeria scirpicola var. Typharum Desm. Crypt. de France Éd. II n. 1428
 Bt: Parc (Paque).
- 78 L. vagabunda Sacc. Fung. Ven. Ser. II (1873-82) p. 318 et Syll. Fung. II p. 31; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 120. Zones ardenn. et arg.-sabl. (Lamb.).
 - var. caulium Sace. Rel. Lib. II p. 119 et Syll. Fung. II (1883) p. 31.
 - N.: Hastière (Bm. et R.). Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 79 L. virginica (Cooke et Ell.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 35.
 Sphaeria Cooke et Ell. in Grevillea VIII (1880) p. 16.
 Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).
 - 74 CLYPEOSPHAERIA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 117; Sacc. Syll. Fung. I p. 90.
- C. Hyperici (Plow. et Phill.) Sacc. Syll. Fung. II p. 92.
 Sphaeria Plow. et Phill. in Grevillea VIII (1880) p. 108 t. 130 fig. 5.
 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 2 C. limitata (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 117 t. IV fig. 48a, b;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 211; Sacc. Syll. Fung. II p. 91.

Sphaeria - Pers. in Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 783.

Bi : Uccle, Bois de la Cambre, Limelette (Bm. et R.).

3 C. mamillana (Fries) Lamb. Fl. myc. II (1847) p. 247; Sacc. Syll. Fung. II p. 90.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 487 p. p.; Kickx Fl. crypt. I p. 344; West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 83 pl. fig. 6.

Fl. or.: Gand (Kickx). - Lx.: Orchimont (Aub.).

4 C. Notarisii Fuck. Symb. myc. (1869) p. 117; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 211; Lamb. Fl. myc. II p. 247; Sacc. Syll. Fung. II p. 90.

Sphaeria clypeiformis De Not. Erb. critt. ital. Ser. I n. 47.

C. Morreni (West.) Sacc. in Rev. myc. (1884?) et Syll. Fung. IX p. 798; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 128.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

- 75 CHAETOSPHAERIA Tul. Sel. Carp. Fung. II (1863) p. 252; Sacc. Syll. Fung. II p. 92.
- 1 C. callimorpha (Mout.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 95; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 197; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 151.

Sphaeria — *Mout.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. I (1834) p. 306; *Kickv* Fl. crypt. I p. 330.

Lasiosphaeria — De Not.; Lamb. Fl. myc. II p. 291.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). -- N.: Louette St-Pierre (Aub.).

- 2 C. Crepini Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 203.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 3 C. innumera (Berk. et Br.) Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 252 t. XXXIII fig. 7-9; Sacc. Syll. Fung. II p. 95; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 151.

Sphaeria — Berk, et Br. in Berk. Outl. Brit. fungi (1860) 395.

Lg.: Beaufays (Mout.).

4 C. phaeostroma Fuck. Symb. myc. (1869) p. 166 t. 2 fig. 40; Sacc. Syll. Fung. II p. 93; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 151. Zone ardenn. (Lamb.).

- 76 HERPOTRICHIA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 146; Sacc. Syll. Fung. 11 p. 211.
- 1 H. macrotrichia (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 213; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 195; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 150.

Sphaeria — Berk. et Br. Brit. Fungi (anno?) p. 619 t. 9 fig. 2. Lg.: Dolembreux (Mout.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

77 LASIOSPHAERIA Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 55; Sacc. Syll. Fung. II p. 191.

- 1 L. ambigua Sacc. in Mich. I (1878) p. 46.
 - var. carbonaria Rehm Ascom. n. 537 et Diagn. n. 357;
 Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 150; Sacc. Syll. Fung. II p. 197.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 L. crinita (Pers.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 201.
 Sphaeria Pers. Syn. Fung. (1801) p. 72.
 Leptospora Fuck. Symb. myc. (1869) p. 144; Lamb. Fl. myc. II p. 288.
 Lx.: Arlon (Bm. et R.). Fl. occ.: Jabbeke (West.), env. de Courtrai (Wall.). Ardennes (West.).
- 3 L. elegans Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 184.
 Lg.: Beaufays, Tilff, Forêt (Mout.).
- 4 L. felina (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 200. Leptospora — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 134. Bt: Tervueren (Bm. et R.). — Lx.: Orval (Bm. et R.).
- 5 L. hirsuta (Fries) Ces. et De Not. Schem. sfer. (1861) p. 55; Sacc. Syll. Fung. II.p. 191.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 449; Kickv Fl. crypt. I p. 336; Lamb. Fl. myc. II p. 290.

lg.: Dolembreux (Mout.). — Bt: Groenendael, Anderghem (Él. M.), Uccle (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. de Bruges (West.).

6 L. hispida (Tode) Fuch. Symb. myc. (1869) p. 147 t. III fig. 31; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194; Lamb. Fl. myc. II p. 291.

Sphaeria — Tode Meckl. Sel. II (1791) p. 17 fig. 84.

Lg.: Dolembreux (Mout.). — Bt: Watermael (Bm. et R.).

- L. hispidula Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 406; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 149; Sacc. Syll. Fung. II p. 199; Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 8 L. ovina (Pers.) Ces. et De Not. Schem. Sfer. it. (1861) p. 229; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194; Sacc. Syll. Fung. II p. 199. Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 71. Leptospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 287. Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: Beaufays, Forêt (Mout.).
- 9 L. Racodium (Pers.) Oes. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 229; Lamb. Fl. myc. II p. 290.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 74; Kickx Fl. crypt. I p. 350. Hyphasma — West. in Bull. Ac. de Belg. t. XII, 2 (1845) p. 242.

Bt: Limelette (Bm. et R.). - Fl. occ.: env. d'Ypres (Wall.). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 10 L. radiata (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 200. Leptospora - Fuck. Symb. myc. (1869) p. 143. Lg.: Dolembreux, Tilff (Mout.).
- 11 L. rhynchospora Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 183 pl. I fig. 2. Lg.: Beaufays (Mout.).
- 12 L. rufiseda Sacc. in Rev. myc. (1881) p. 44; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 149; Sacc. Syll. Fung. II p. 191. Lg.: Rel. Libertianae, in Belg. sec. Lamb. loc. cit.
- 13 L. spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 229; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194.

Sphaeria — Hoffm. Veg. crypt. II (1790) 12 t. III fig. 3; Kickx Fl. crypt. I p. 331.

Leptospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 287.

Bt: Boitsfort (Pigneur), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). - N:: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

14 L. Sphagnorum (Crouan) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 201; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 149.

Sphaeria - Crouan Fl. du Finistère (1867) p. 24.

Lg.: Gomzé (Mout.).

15 L. subambigua (Cooke) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 193; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.. Brux. p. 194; Lamb. Fl. myc. Supplém. I . p. 149.

Sphaeria - Cooke in Grevillea VII (1879) p. 96.

Bi: Groenendael (Bm. et R.).

- 16 L. strigosa (Alb. et Schwein.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 201; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194.
 - Sphaeria Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 37 c-ic.
 - Leptospora Fuck. Symb. myc. (IS69) p. 144; Lamb. Fl. myc. II p. 288. Bi: Tervueren (Bm. et R.).
- 17 L. subcaudata Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 183 pl. I fig. 1.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
 - f. sarmentorum Mout. (1887) loc. cit. Lg.: Beaufays (Mout.).
 - 78 MELANOMMA Nitschke et Fuck. Symb. myc. (1869) p. 159; Sacc. Syll. Fung. II p. 98.
- 1 M. aculeatum Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 154; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 154.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 2 M. ambiguum Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 178 pl. 1 fig. 5-7.
 Lg.: Beaufays, Dolembreux (Mout.).
- 3 M. Buxi Fabre Sphér. Vaucl. II (1880) p. 54 fig. 31; Sacc. Syll. Fung. II Add. p. LVIII.
 N.: Hastière (Bm. et R.).
- 4 M. dissectum (Karst.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 344.
 - f. brachyspora Sacc.; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 154. Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 5 M. Epochnii (Berk. et Br.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 344; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 202; Lamb. Fl. myc. II p. 304; Sacc. Syll. Fung. II p. 104.

Sphaeria — Berk, et Br. Not. Brit. Fungi p. 1177 t. 5 fig. 36.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 6 M. fuscidulum Sacc. in Mich. I (1878) p. 450 et Syll, Fung. II p. 99; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 153. Zone ardenn. (Lamb.).
- 7 M. Hippophaës Fabre Sphér. Vaucl. (1880) p. 92 fig. 30; Sacc. Syll. Fung. II p. 108.
 Fl. occ.: Knocke (Bm. et R.).
- 8 M. hispidulum Sacc. in Mich. I (1878) p. 450 et Syll. Fung. II p. 114.
 - Bt: Groenendael (Bm. et R.). A. : Westmalle (Bm. et R.). Lg. : Baraque-Michel (Bm. et R.).

9 M. Juniperinum (Karst.) Sacc. in Mich. 1 (1878) p. 344 et Syll. Fung. II p. 110.

Sphaeria — Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 89.

Lg.: Louvegnez (Mout.).

10 M. Lenarsi (West.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 344; Lamb. Fl. myc. II p. 303.

Sphaeria — West. in Bull. Soc. de Bot. de Belg. t. V (1866) p. 36 pl. fig. 1. Fl. occ.: Ostende (West.). — Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).

- 11 M. medium Succ. et Speg. in Mich. I (1878) p. 402; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 154; Sacc. Syll. Fung. II p. 104. Zone ardenn. (Lamb.).
- 12 M. microsporum Nees Syst. d. Pilze (1816) p. 32; Kickw Fl. crypt. II p. 93; Sacc. Syll. Fung. III p. 751. Fl. occ.: Nieuport (Kickx). Fl. or.: Sleydinge (Kickx).
- 13 M. Moutonianum Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. I (1887) p. 177, pl. I fig. 18, 19.
 Lg.: Liége (Mout.).
- 14 M. Mussatianum Sacc. et Roum. in Rev. myc. (1883) p. 236 t. 40 f. 11; Sacc. Syll. Fung. IX p. 804; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 155. Zone ardenn. (Lamb.).
- 15 M. obducens (De Not.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 99; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 155.
 Sphaeria De Not. Sfer. it. (1863) p. 65 t. LXVI.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 16 M. pleiosporum Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 154; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 153.
 Lg.: Dolembreux (Mout.).
- 17 M. pulvis-pyrius (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 160; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 202; Lamb. Fl. myc. II p. 303; Sacc. Syll. Fung. II p. 98.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 86; Kickæ Fl. crypt. I p. 332.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Bois de la Cambre, Tervueren (Bm. et R.), Dilbeek (Él. M.), Gentiunes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — Lx.: Ébly, Poix, Laroche, Samrée (Él. M.).

- 18 M. Rhododendri Rehm Ascom. n. 186; Sacc. Syll. Fung. II p. 109. Gucurbitaria — Niessl Beitr. (1872) p. 50 t. IV fig. 32. Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 19 M. rhodomelum (Fries) Sacc. in Mich. I (1878) p. 345 et Syll. Fung. II p. 109.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 445.

Lg. : Beaufays, Louvegnez (Mout.).

- 20 M. setosum Mout, in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 153; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 153.
 Lg.: Beaufays, Dolembreux (Mout.).
 - — var. minus *Mout.* loc. cit. (1886) p. 154. Lg.: Beaufays (Mout.). — Lx.: Ébly (Él. M.).
- 21 M. sordidum Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1888) p. 177 pl. I fig. 13.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 22 M. truncatulum Sacc. et Roum, in Rev. myc. (1883) p. 237 t. 40 f. 12; Sacc. Syll. Fung. IX p. 807; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 154.
 Zone ardenn. (Lamb.).
 - 79 TREMATOSPHAERIA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 161; Sacc. Syll. Fung. II p. 115.
- T. Britzelmayriana (Rehm) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 120;
 Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 156.
 Melanomma Rehm Asc, diag. et in Hedwigia (1881) p. 51.
 Lg.: Liége (Mout.).
- 2 T. callicarpa Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 116.
 - f. minor Lib.; Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 157. Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 T. fallax Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 155 pl. IV fig. 11; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 156. Lg.: Beaufays (Mout.).
- 4 T. megalospora (De Not.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 120; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 156. Sphaeria — De Not. Schem. Sfer. (1863) p. 221. Zone ardenn. (Lamb.).
- T. pertusa (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 162; Lamb. Fl. myc. II p. 307.
 Sphaeria Pers. Syn. Fung. (1801) p. 13.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.). Lg.: Beaufays (Mout.).
- 6 T. pleurostoma Rehm Ascom. n. 530; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 156; Sacc. Syll. Fung. II p. 119. Zone ardenn. (Lamb.).

- 80 SPORORMIA *De Not*. Microm. it. Dec. V (1838-56) n. 6; Sacc. Syll. Fung. II p. 123.
- S. affinis Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.
 t. XXV part. 1 (1886) p. 171; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 180.
 Lb.: Genck (Bm. et R.).
- 2 S. ambigua Niesl in Oesterr. bot. Zeitschr. (1878) p. 97; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 178; Sacc. Syll. Fung. II p. 125.
 Lb.: Maeseyck (Él. M.). Lg.: Tilff, Angleur (Mout.). Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).
- 3 S. fimetaria De Not. Microm. it. Dec. V (1838-56) p. 10 Sacc. Syll. Fung. II p. 132.

 Ht: près de Stambruges (Él. M.).
- 4 S. gigantea Hansen Champ. sterc. Dan. (1867) p. 113 t. VI fig. 46, 47; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 180: Sacc. Syll. Fung. II p. 127.
 - Bt: Entre Beggynendyck et Rillaer, Rixensart (Él. M.). Fl. occ.: Ostende (Él. M.).
- 5 S. insignis Niessl in Oesterr. bot. Zeitschr. (1878) p. 167; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 186; Sacc. Syll. Fung. II p. 131.

 Lg.: entre Gomzé et Louvegnez (Mout.).
- 6 S. intermedia Auersw. in Hedwigia VII (1868) p. 67 t. I fig. IV; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 188; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 178; Sacc. Syll. Fung. II p. 126.
 - Bt: Limelette, Groenendael, Tervueren (Bm. et R.), Beggynendyck, Boitsfort, Rixensart (Él. M.). Lx.: Chiny, Poix, Laroche (Él. M.). Ht: Ath, Stambruges, Masnuy-St-Pierre (Él. M.). Lg.: Aywaille (Él. M.).
- 7 S. lageniformis Fuck. Symb. myc. (1869) p. 242; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 178; Sacc. Syll. Fung. II p. 135.
 Bt: Aerschot (Él. M.). N.: Namèche (Él. M.). Lb.: Genck (Él. M.).
- 8 S. megalospora Auersw. in Hedwigia VII (1868) p. 68; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 197; Sacc. Syll. Fung. II p. 126. Fl. occ.: Ostende (Él. M.), Knocke (Bm. et R.). Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 9 S. leporina Niessl in Oester. bot. Zeitschr. (1878) p. 96; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 177; Sacc. Syll. Fung. II p. 124. Lg.: Forêt (Mout.).
- 10 S. leptosphaerioides Speg. in Mich. I (1878) p. 459; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 177; Sacc. Syll. Fung. II p. 128.
 Lb.: Eelen, Genck (Él. M.).

- 11 S. Marchaliana Mout. in Bull. Soc. roy. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 155 pl. IV fig. 12; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 179. Zone maritime (Mout.).
- 12 S. minima Auersw. in Hedwigia (1878) p. 661; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 177; Sacc. Syll. Fung. II p. 124.
 - Lg.: env. de Liége (Mout.). Ht: Montbliart (Hardy), entre Jurbise et le Camp de Casteau. Ath (cl. M.). Lb.: Lanaeken (Bm. et R.). Bt: Rixensart, Tervueren, Limelette (Él. M.).
- 13 S. octoloculata Fabre Sphér. Vaucl. (1880) p. 52; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 188; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 179; Sacc. Syll. Fung. II Add. p. LX.
 - tg.: env. de Liége (Mout.). Bt : Rixensart, Bois de la Cambre (Él. M.), Rouge-Cloître (Nob.).
- 14 S. octomera Auersw. in Hedwigia VII (1878) p. 70; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 178; Sacc. Syll. Fung. II p. 130.
 - Lg.: Baraque-Michel (Él. M.), Forêt (Mout.). Lb.: Lanaeken (Bm. et R.). Bf: Bois de la Cambre, Etterbeek (Él. M.).
- 15 S. pascua Niessl Art. Spororm. (1878) n. 17; Sacc. Syll. Fung. II p. 130.
 - Lg.: Baraque-Michel (Él. M.). Bt : Limelette (Él. M.):
- 16 S. pulchella Hansen Champ. sterc. Dan. (1876) p. 114 t. IX fig. 28-25; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 177; Sacc. Syll. Fung. II p. 124.
 - Ht: Masnuy-St-Pierre (Él. M.). Fl. occ.: Heyst (Mout.), Ostende (Bm. et R.).
- 17 S. pulchra Hansen Champ. sterc. du Dan. (1876) p. 113 t. IX fig. 1-6; Sacc. Syll. Fuug. II p. 131; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 179.
 - Lg. : Baraque-Michel (Él. M.).
 - var. macrospora El. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV (1884) p. 92.
 - Lg.: Baraque-Michel (Él. M.). Ht: Hare (Él. M.).
- 18 S. subticinensis Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 14.
 Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 19 S. ulmicola Pass. et Winter in Hedwigia XIII (1884) p. 52; Lamb. Fl. myc. supplém. I p. 178; Sacc. Syll. Fung. II p. 128. Lg.: Beaufays (Mout.).
- 20 S. variabilis Winter in Hedwigia XIII (1884) p. 50; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 179; Sacc. Syll. Fung. II p. 129.
 Lg.: Beaufays (Mout.). Fl. occ.: Dunes (Mout.).

- 81 GIBERRIDEA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 168; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 132.
- G. Visci Fuck. Symb. myc. (1869) p. 168 t. VI fig. 17; Sacc. Syll. Fung. II p. 132; Lamb. Fl. myc. II p. 314.
 Sine loco (Lamb.).
 - 82 AGLAOSPORA De Not. in Giorn. Bot. it. (1844) p. 43; Sacc. Syll. Fung. II p. 133.
- 1 A. profusa (Fries) De Not. Microm. it. Dec. V (1838-56); Sacc. Syll. Fung. II p. 133; Lamb. Fl. myc. II p. 249.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 392.

Aglaospora anomia - Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 350.

Valsa - Fries; Kickx Fl. crypt. I p. 327.

Hypoxylon irregulare West. et Van Haes. in Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 42.

- Bt: Louvain (Leburt.), Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). Fl. occ.: Courtrai (West.). Lg.: Beaufays (Mout.).
 - 83 PSEUDOVALSA Ces. et De Not. Schem. sfer. (1861) p. 32; Sacc. Syll. Fung. II p. 135.
- P. aucta (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 138; Lamb.
 Fl. myc. Supplém. I p. 207.

Sphaeria — B. et Br. in Ann. and Mag. Nat. Hist. sér. 2 t. IX (1842) p. 320 t. 10 fig. 11.

Lg.: Beaufays (Mout.), Stoumont (Bm. et R.).

2 P. Berkeleyi (Tul.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 137; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 168.

Melanconis - Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 130.

Calospora — Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 313; Lamb. Fl. myc. II p. 358.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

3 P. hapalocystis (Berk. et Br.) in Sacc. in Mich. I (1878) p. 44 et Syll. Fung. II p. 138.

Sphaeria — Berk. et Br. Mag. of Nat. Hist. sér. II t. IX (1842) p. 317 t. 10 fig. 12.

Bt: Groenendael, Tervueren, Limelette (Bm. et R.).

4 P. Kickxii (West.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 139.

Hypoxylon — West. in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 3 (1852) p. 112 pl. fig. 1. Valsa — Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 322.

Calospora - Lamb. Fl. myc. II (1888) p. 359.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

5 P. lanciformis (Fries) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 32; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 168; Sacc. Syll. Fung. II p. 135.

Sphaeria - Fries. Syst. myc. II (1823) p. 362.

Melanconis — Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 135 c.ic; Lamb. Fl. myc. II p. 352.

Bt: Watermael, Bois de la Cambre, Villers-la-Ville (Bm. et R). — Lg.: (Lamb.).

6 P. longipes (Tul.) Sacc. Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 20;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 168; Sacc. Syll. Fung. II
p. 136.

Melanconis — Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 139; Lamb. Fl. myc. II p. 355.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

7 P. macrosperma (Tul.) Sacc. Fung. Ven. Ser. IV (1873-82) 20; Sacc. Syll.Fung. II p. 139.

Melanconis — Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 132 t. XIV fig. 13-23; Lamb. Fl. myc. II p. 353.

Lg.: Ougrée (Mout.).

- 8 P. umbonata (Tul.) Sacc. Fung. Ven. Ser. IV (1873-82) p. 20 et Syll. Fung. II p. 135; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 168. Melanconis Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 138. Bt: Tervueren (Bm. et R.).
 - 84 THYRIDARIA Sacc. in Grevillea IV (1875) p. 21 et Syll. Fung. II p. 140.
- 1 T. incrustans Sacc. Myc. Ven. (1873) p. 170 et Syll. Fung. II p. 140; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 208. Zone ardenn. (Lamb.).
 - 85 KALMUSIA Niessl Beit. z. Kenntniss d. Pilze (1872) p. 54; Sacc. Syll. Fung. II p. 142.
- K. Ebuli Niessl loc. cit. (1872) p. 55 t. VI fig. 49; Sacc. Syll. Fung. II p. 143.
 - f. Sarothamni Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.
 t. XXVI part. 1 (1887) p. 180.
 Lg.: Dolembreux, Forêt (Mout.).
- 2 K. hypotephra (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 144. Sphaeria Berk. et Br. Notes Brit. Fungi (anno) p. 624 t. IX fig. 7. Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 86 MELOGRAMMA Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 81; Sacc. Syll. Fung. II p. 144.
- 1 M. spiniferum (Wallr.) De Not. Sfer. it. (1863) p. 53 t. 51; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 170; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 190; Sacc. Syll. Fung. II p. 145.
 Sphaeria Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. 1V (1833) p. 846.

Lg.: Tilff (Mout.). — Bi: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

2 M. vagans De Not. in Act. Acad. Taur. (1857) p. 459 t. II; Sacc. Syll. Fung. II p. 144; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 170. Sphaeria melogramma Pers. Syn. Fung. (1801) p. 13.

M. Bulliardii Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 81; Kickv Fl. crypt. I p. 304; Lamb. Fl. myc. II p. 407.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Bt: bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ.: Courtrai, Kemmel, Watervliet (West.).

SECT. HYALOPHRAGMIAE.

87 MASSARINA Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 153.

1 M. Coryli (Karst.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 154; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 197.

Massaria — Karst. Myc. Fenn. VI (1871-1878) p. 33. Lg.: Beaufays (Mout.). — Bt: Watermael (Bm. et R.).

2 M. eburnea (Tul.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 153; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 168.

Massaria — Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 239 t. XXV fig. 5-9. Lg.: Angleur (Mout.).

- 88 METASPHAERIA Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 156.
- M. anarithmoides (Sacc. et Speg.) Sacc. Syll. Fuug. II (1883) p. 175.
 Leptosphaeria Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 395.
 A.: Santvliet (Bm. et R.).
- 2 M. Bellynckii (West.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 179.
 Sphaeria West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 86 pl. fig. 13.
 Pleospora Convallariae Fuck. Symb. myc. (1869) p. 138; Lamb. Fl. myc. II p. 277.

Lx.: Croix-Rouge (Virton) (Bm. et R.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

3 M. elypeosphaerioides Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de

bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 273.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 M. complanata (Tode) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 161.

Sphaeria - Tode Meckl. sel. (1791) p. 88.

Pleospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 276.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — N.: Champion (Bell.). — Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

5 M. conformis (Berk. et Br.) Sacc. in Mysc. myc. I p. 6 et Syll. Fung. IX p. 834.

Sphaeria - Berk. et Br. cf. Sacc. loc. cit.

Lg. : env. de Liége (Mout.). - Bt : Woluwe, Forêt de Soignies (Bm. et R.).

6 M. corticola (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 166; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 131.

Sphaeria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 114 t. III fig. 14

Lg.: Beaufays, Dolembreux (Mout.).

7 M. depressula Sacc. et Roum. in Rev. myc. (1883) p. 235 pl. 39 fig. 7; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 132.
Ardennes (Lamb.).

8 M. Fiedlaeri (Niessl) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 165; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 132.

Cryptospora - Niessl in Hedwigia (1874) p. 42.

Bi: Groenendael (Bm. et R.).

M. Galiorum (Rob.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 160.
Sphaeria — Rob. ex Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1846) p. 77.
N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

10 M. graminum Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 174; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 131.

Fl. occ.: Knocke (Bm. et R).

- var. culmicola Sacc. in Rev. myc. (1885) p. 146.
 Reliquiae Westendorpianae.
- 11 M. Hederae (Sow.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 169; Bomm. et Rouss, Fl. myc. env. Brux. p. 208.

Sphaeria — Sow. in Smith et Sow. Engl. Bot. Fungi (1796) t. 371 fig. 5?; Lamb. Fl. myc. II p. 286.

Bi: Boendael (Bm. et R.). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

13 M. helicicola (Desm.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 169.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 356; Kickv. Fl. crypt. I p. 353.

Sphaerella — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 221.

Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

14 M. Iridis (Desm.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 178.
Dothidea — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1847) p. 176.

Stigmatea Iridis Desm.; Kicka Fl. crypt. I p. 365; Lamb. Fl. myc. II p. 208. Fl. occ.: Courtrai (West.).

- 15 M. lejostega (Ell.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 164. Sphaeria — Ell. in Bull. Torr. bot. Club (1881) p. 91. N.: Hastière (Bm. et R.).
- 16 M. macrospora (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 158; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 132. Pleospora -- Fuck. Symb. myc. (1869) p. 138.

Lg.: Angleur (Mout.).

- 17 M. Marchaliana Sacc. in Rev. myc. (1885) p. 146; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 131. Reliq. Westendorpianae.
- 18 M. mosana Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. I (1887) p. 182 pl. I fig. 3. Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 19 M. nigro-tingens Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 156 pl. IV fig. 6; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 133. Lg. : env. de Liége (Mout.).
- 20 M. ocellata (Niessl) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 157; Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 p. 181 (1887) pl. 1 fig. 9. Leptosphaeria - Niessl in Kunze Fungi Sel. n. 334. Lg.: Sprimont (Mout.).
- 21 M. Origani Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 181 pl. 1 fig. 15. Lg.: Sprimont (Mout.).
- 22 M. Poae (Niessl) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 175. Leptosphaeria - Niessl in Rehm Ascom. n. 643. Lg.: Dolembreux, Forêt (Mout.).
- 23 M. sabuletorum (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 180. Sphaeria - Berk. et Br. Brit. Fungi (anno?) p. 650 t. 12 fig. 86; Kickx Fl. crypt. I p. 354; Lamb. Fl. myc. II p. 236. Pleospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 279.

Fl. occ. : Dunes (West.).

- 24 M. sepincola (Fries) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 164. Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 498; Lamb. Fl. myc. II p. 244. Bt: Groenendael (Bm. et R.). - N.: Vedrin (Bell.).
 - f. Betulae Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 275.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

M. sepincola var. Ruborum Fries Syst. myc. 11 (1823) p. 498.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

25 M. Vincae (Fries) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 171.

Sphaeria - Fries in Duby Bot. Gall. II (1830) p. 709.

Depazea - Ohev. Fl. Paris I (1826) p. 453.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — N.: St-Servais (Bell.).

86 SPHAERULINA Sacc. in Mich. (1878) p. 399 et Syll. Fung. II p. 186.

S. intermixta (Berk. et Br.) Sacc. Fung. it. (1878) t. 347; Lamb.
 Fl. myc. Supplém. I p. 110.

Sphaeria — Berk. et Br. Notes on Brit. Fungi n. 639.

N.: Yvoir (Bm. et R.). - Lg.: env. de Liége (Mout.).

2 S. myriadea (DC.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 186; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 211.

Sphaeria - DO. Fl. fr. V (1805) p. 145; Kickx Fl. crypt. I p. 358.

Sphaerella - Rabenh. in Fungi Eur. p. 149; Lamb. Fl. myc. II p. 224.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt; env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.).

— — var. Fagi Desm. (?)

Bt: Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque).

HYPOSPILA Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; Sacc. Syll. Fung. II p. 189.

1 H. bifrons (DC.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 211; Sacc. Syll. Fung. II p. 190.

Xyloma - DO. Fl. fr. VI (1815) p. 156.

Hypospila quercina Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; Lamb. Fl. myc. II p. 212.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

H. immunda (Fuck.) Succ. Syll. Fung. II (1883) p. 190
 Sphaeria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 108 t. III fig. 10 α b.
 Lg.: Ougrée, Tilff (Mout.).

3 H. pustula (Pers.) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 127: Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 211.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 91; Lamb. Fl. myc. II p. 232.

Isothea — Berk. Outl. of Brit. Fung. (1860) p. 392; Kickw Fl. crypt. I p. 295.

Phoma - Fries Syst. myc. II (1823) p. 547.

Phoma pustula var. Quercinae West. in Bull. Ac. Belg.t.XVIII (1851) p. 13.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.). —

N: Yvoir (Bm. et R.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Aeltre (Kickx).

H. pustula var. Fagi (West.).

Phoma pustula var. — West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 13. Bt: Louvain (Leburt.).

- var. Lysimachiae (West.).

Phoma pustula var. — West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 13.

Bt: Louvain (Leburt.). Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo, Holsbeek (Paque).

3 H. Rehmii Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 189; Lamb. Fl. myc. Snpplém. I p. 117.

Lg.: Beaufays, Angleur (Mout.).

- 91 ENCHNOSPHAERIA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 147; Sacc. Syll. Fung. II p. 205.
- 1 E. pinetorum Fuck. Symb. myc. (1869) p. 147 t. IV fig. 2; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 148; Sacc. Syll. Fung. II p. 205. Lg.: Tilff (Mout.). A.: Cappellen (Bm. et R.).
 - 92 ACANTHOSTIGMA De Not. Sfer. it. (1863) p. 85; Sacc. Syll. Fung. II p. 207.
- 1 A. punctiforme Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 260.

 Lx.: Poix (Bm. et R.).
 - 93 MELOMASTIA Nitschke et Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 306; Sacc. Syll. Fung. II p. 213.
- 1 M. Friesii Nitschke et Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 306; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 205; Sacc. Syll. Fung. II p. 213.

Sphaeria mastoidea Fries Syst. myc. II (1823) p. 463.

Sphaeria Lonicerae Sow. in Smith. et Sow. Engl. bot. Fungi (1796) t. 393 fig. 6; Kicka Fl. crypt. I p. 337.

Trematosphaeria — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 308.

Bt: Watermael, Tervueren (Bm. et R.). — N.: Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).

- 94 ZIGNOELLA Sacc. in Mich. I (1878) p. 346 et Syll. Fung. II (1883) p. 214.
- 1 Z. Campi-Silii Sacc. in Mich. I (1878) p. 348.
 - var. metasphaerioides Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de

Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 76. tg.: Beaufays (Mout.).

- Z. corticola (Fuck.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 346 et Syll. Fung. II p. 222; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 159.
 Trematosphaeria Fuck. Symb. myc. (1869) p. 162.
 Lg.: Dolembreux, Beaufays (Mout.).
- 3 Z. groenendalensis Sacc. Bomm. et Rouss. in Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 203; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 158. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 4 Z. macrospora Sacc. in Mich. I (1878) p. 346 et Syll. Fung. II p. 221.

Melanomma — Sacc. in Mich. I (1878) p. 449 et Fungi it. t. 300. N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 5 Z. ostioloidea (Cooke) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 220. Sphaeria Cooke in Grevillea IV (1875) p. 113. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- Z. ovoidea (Fries) Sacc. in Mich. I (1878) p. 346 et Syll. Fung. II
 p. 214.
 Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 459.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

7 Z. pachyspora Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 173; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 159.

Lb.: Genck (Bm. et R.).

8 Z. pulviscula (Curr.) Sacc. Fungi it. (1878) t. 297; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 203; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 158; Sacc. Syll. Fung. II p. 214.

Sphaeria — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. Lond. XXII (1859) p. 320 t. 58 fig. 52.

Melanomma — Sacc. Myc. ven. Spec. (1873) p. 114 t. XI fig. 33-36.

Bt: Boitsfort, Groenendael, Tervueren (Bm. et R.), Notre-Dame de Bonne-Odeur (Él. M.). — N.: Mariembourg (Montagne-au-buis) (Bm. et R.). — tx.: Conques (Herbeumont) (Bm. et R.).

- 9 Z. pygmaea (Karst.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 346.
 - var. subdisticha Sacc. (ubi?).

8t: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

10 Z. rhytidodes (Berk. et Br.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 346. Sphaeria — Berk. et Br. (ubi?).

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 95 CERATOSPHAERIA Niessl Notiz ueber Pyr. (1876) p. 43; Sacc. Syll. Fung. II p. 227.
- 1 C. aeruginosa Rehm Ascom. n. 531; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 163; Sacc. Syll. Fung. II p. 228. Zone calc. (Lamb.).
- 2 C. immersa Wint. in Hedwigia (1881) p. 55; Sacc. Syll. Fung. II p. 228.

Lg.: Jupille (Mout.).

3 C. lampadophora (Berk. et Br.) Niessl Not. Pyr. (1876) p. 43; Sacc. Syll. Fung. II p. 227.

Sphaeria — Berk. et Br. Not. Brit. Fungi (anno) p. 822 t. 11 fig. 28; Kickx Fl. crypt. I p. 338.

Ceratostoma - Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 262.

Fl. or. : env. de Gand (Coem.).

4 C. pusilla (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 227; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 163.

Ceratostoma — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 128.

Lg.: Forêt, Dolembreux (Mout.).

5 C. rhenana (Auersw.) Berl. et Vogl. in Sacc. Syll. Add. I-IV (1886) p. 164 et Sacc. Fung. IX p. 870.

Gnomonia - Auersw. in Myc. Eur. Heft V, VI p. 23 fig. 139.

Ceratostomella — Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 409.

Lg.: Beaufays (Mout.).

6 C. rostrata (Fries) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 227.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 473; Kickw Fl. crypt. I p. 338. Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

- 96 CRYPTODERIS Auersw. Myc. Eur. Pyr. V, VI p. 29; Sacc. Syll. Fung. II p. 229.
- 1 C. lamprotheca (Desm.) Auersw. Myc. Eur. Pyr. V, VI p. 29 t. III fig. 30 et XI fig. 150; Sacc. Syll. Fung. II p. 229.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 15; Kickw Fl. crypt. I p. 359.

Sphaerella — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 122.

Sphaeria cryptoderis Lev. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IX (1848) p. 144.

Dothidea Populina West. in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 111.

- Fl. occ.: Courtrai (West.). Bt: Gentinnes (de Limm.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 2 C. riparia (Niessl) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 220. Gnomonia — Niessl in Oesterr. bot. Zeitschr. (1875) p. 87. Lg.: Tilff (Mout.).

97 CALOSPORA Sacc. Syll. Eung. II (1883) p. 231.

1 C. Innesii (Curr.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 231; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 167; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 206.

Valsa — Curr. in Trans. Linn. Soc. Lond. XXII (1858) p. 281. t. 48 fig. 166.

Bi: Bois de la Cambre, Tervueren (Bm. et R.).

 C. minuta Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 252.

Bf: Groenendael (Bm. et R.).

3 C. Platanoidis (Pers.) Niessl in Hedwigia XIV (1875) p. 130;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 167; Lamb. Fl. myc.

Supplém. I p. 206; Sacc. Syll. Fung. II p. 231.

Spharria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 45.

Lg.: Beaufays (Mout.). - Bt.: Tervneren (Bm. et R.).

4 C. Zopfii (Kunze) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 232; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 205.

Diaporthe — Kunze Fungi sel. Exs. n. 264.

Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. DICTYOSPORAE.

- 98 PLEOMASSARIA Speg. Fungi Arg. Pug. I (1880; Sacc. Syll. Fung. II p. 238.
- 1 P. Carpini Fuck. Symb. myc. (1869) p. 153 t. VI fig. 35; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 193; Sacc. Syll. Fung. I1 p. 240; Lamb. Fl. myc. Supplém. 1 p. 167.

Bt: Uccle, Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

2 P. holoschista (Berk. et Br.) Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 234; Sacc. Syll. Fung. I1 p. 239.

Sphaeria - Berk. et Br. Brit. Fungi (anno?) p. 977 t. 17 fig. 30.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 P. siparia (Berk. et Br.) Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 232; Sacc. Syll. Fung. II p. 239; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 193.

Sphaeria — Berk. et Br. Not. on Brit. Fungi et in Ann. nat. Hist. ser. 2 t. IX (1842) p. 321 t. 9 fig. 8.

Massaria — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 296.

Lg.: env. de Liége (Mout.).

- 99 KARSTENULA Speg. Fung. Arg. I (1880) in tab.; Sacc. Syll. Fung. II p. 240.
- 1 K. dumorum Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 158 pl. IV fig. 10; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 168.

Lg.: Dolembreux, Beaufays (Mout.).

2 K. rhodostoma (Alb. et Schwein.) Speg. Dec. myc. 94; Sacc. Syll. Fung. II p. 240; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 168.

Sphaeria — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 43 t. 4 fig. 3. Pleomassaria — Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. Ed II Bd I, 2 (1887) p. 552. Lg.: Beaufays (Mout.). — A.: Westmalle (Bm. et R.).

- 100 PLEOSPORA Rabenh. Herb. myc. Ed. II n. 547; Sacc. Syll. Fung. II p. 241.
- J. P. albieans Fuck. Symb. myc. (1869) p. 131; Sacc. Syll. Fung. II p. 249; Lamb. Fl. myc. II p. 266.
 Sine loco (Lamb.).
- 2 P. Allii (Rabenh.) Ces. et De Not. in Comment. Soc. critt. It. I (1861) p. 218; Sacc. Syll. Fung. II p. 268. Sphaeria — Rabenh. Herb. myc. Ed. I n. 838.
 N.: Hastière (Bm. et R.).
- 3 P. Asparagi Rabenh. Herb. myc. Ed. II n. 750; Sacc. Syll. Fung. II p. 268; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 129.

 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 4 P. Aucubae (West.) Lamb. Fi. myc. II (1880) p. 268; Sacc. Syll. Fung. II p. 259.

Sphaeria — West. in Herb. crypt. n. 1217 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 87 pl. fig. 14.

Ht: Mons (Dumont). - A.: Turnhout (Paque). - Bt: Louvain (Paque).

5 P. Dianthi De Not. Sfer. it. (1863) p. 74 fig. 80; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 207; Lamb. Fl. myc. II p. 265; Sace. Syll. Fung. II p. 250.

Lg.: Comblain-au-Pont (Bm. et R.). - Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

6 P. Gilletiana Sacc. in Mich. I (1878) p. 357, Fung. it. t. 330 et Syll. Fung. II p. 356.

Bt: Auderghem (Bm. et R.).

7 P. herbarum (Pers.) Rubenh. Herb. myc. Ed. II n. 547.
Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 79; Kicka Fl. crypt. I p. 350.

Sphaeria herbarum var. Asparagi West., Eringii West. et Dianthi West.

Fl. occ.: Courtrai, Ostende (Wall.). — Fl. or.: Gand (Kickx). — N.: Bouge (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).

- Pleospora herbarum f. robusta Niessl; Sacc. Syll. Fung. II p. 247. Rel. Westendorpianae.
- — var. capsulicola Sacc. et Él. March. in Rev. myc. (1885) p. 146.

Rel. Westendorpianae.

- P. infectoria Fuck. Symb. myc. (1869) p. 132 t. III fig. 23; Lamb.
 Fl. myc. Supplém. I p. 128; Sacc. Syll. Fung. II p. 263.
 A.: Calmpthout (Bm. et R.).
- 9 P. leguminum (Wallr.) Rabenh. Herb. myc. II n. 548; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 207; Lamb. Fl. myc. II p. 265; Sacc. Syll. Fung. II p. 254.

Sphaeria - Wallr. Comp. Fl. crypt. germ. IV (1833) p. 771.

Bt: Jardin bot de Bruxelles (West. et Van Haes.), env. de Bruxelles (Bm. et \mathbf{R} .).

- 10 P. maritima Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 271.
 Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).
- 11 P. media Niessl Not. über Pyrenom. (1876) p. 28, t. IV fig. 12; Sacc. Syll. Fung. II p. 244.

 Lg.: Comblain-au-Pont (Bm. et R.).
- 12 P. microspora Niessl Not. über Pyrenom. (1876) p. 21 t. IV fig. 7; Sacc. Syll. Fung. II p. 269.
 Fl. occ.: Knocke (Bm. et R.).
- 13 P. oblongata Niessl Not. über Pyrenom. (1876) p. 17 t. IV fig. 3; Sacc. Syll. Fung. II p. 245.
 Lg.: Dolembreux, Embourg (Mout.).
- 14 P. oligomera Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 408; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 129; Sacc. Syll. Fung. II p. 241. Rel. Westendorpianae.
- 15 P. Pisi (Sow.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 3I; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 207; Lamb. Fl. myc. II p. 265; Sacc. Syll. Fung. II p. 248.

Sphaeria — Sow. in Smith et Sow. Engl. Bot. Fungi (1797) t. 393 fig. 8. Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

16 P. pyrenophoroides Sacc. Fungi Ven. Ser. II (1873-82) p. 309; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 130; Sacc. Syll. Fung. II p. 267. Zone ardenn. (Lamb.). 17 P. rubicunda Niessl Not. über Pyrenom. (1876) p. 31 t. IV fig. 15; Sacc. Syll. Fung. II p. 252.

N.: Hastière (Bm. et R.). - A.: Santyliet (Bm. et R.).

18 P. scirpicola (DC.) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 72; Sacc. Syll. Fung. II p. 265.

Sphaeria - DO. Fl. fr. II (1815) p. 809.

Macrospora Scirpi Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 13; Lamb. Fl. myc. II p. 280.

Lg.: Ougrée, Liége (Mout.).

- 19 P. socialis Niessl et Kunze in Niessl Not. über Pyrenom. (1876) p. 26; Sacc. Syll. Fung. II p. 264. Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 20 P. vagans Niessl Not. über Pyrenom. (1876) p. 14 t. IV fig. 1; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 129; Sacc. Syll. Fung. II p. 267. Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 21 P. vulgaris Niessl Not. über Pyrenom. (I876) p. 27; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 128; Sacc. Syll. Fung. II p. 248.

 Lg.: Liége (Mout.). N.: Yvoir (Bm. et R.). Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.).
 - 101 PYRENOPHORA Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 397; Sacc. Syll. II p. 277.
- P. calvescens (Fries) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 397; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 201.

Sphaeria - Fries Scler. Suec. Exs. n. 401.

Pleospora — Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 266; Lamb. Fl. myc. II p. 267. Bt: Groenendael (Bm. et R.).

P. coronata (Niessl) Sacc. Syll, Fung. II (1883) p. 283; Lamb. Fl. Supplém. I p. 140.

Pleospora — Niessl Not. über Pyrenom. (1876) p. 16. Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 P. pellita (Fries) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 280.
 Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 503; P Kickx Fl. crypt. I p. 331.
 Pleospora Rabenh. Herb. myc. II n. 749; Lamb. Fl. myc. II p. 268.
 ? Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). P Fl. or.: Gand (Kickx).
- 4 P. phaeocomes (Rebent.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 378.

 Sphaeria Rebent. Fl. Neom. (1804) p. 308 c. ic; Lamb. Fl. myc. II p. 390.

 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- P. phaeocomoides Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 280; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 139.
 N.: Hastière (Bm. et R.).
- 6 P. phaeospora (Duby) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 281; Lamb.

Fl. myc. Supplém. I p. 140.

Sphaeria phaeospora *Duby* in *Rabenh*. Herb. myc. Ed. II n. 1834. Zone ardenn. (Lamb.).

7 P. relicina (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 278; Lamb. Fl. myo. Supplém. I p. 140.

Pleospora — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 215. Zone ardenn. (Lamb.).

- 8 P. setigera (*Niessl*) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 281.
 Pleospora *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 19 t. IV fig. 5.
 Lx.: Auby (Bm. et R.).
- 9 P. trichostoma (Fries) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 278; Lamb. Fl. myc. II p. 390.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 504; Kicke Fl. crypt. I p. 348. Lg.: Beaufays, Angleur, Liége (Mout.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).

- 102 TEICHOSPORA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 100; Sacc. Syll. Fung. II p. 290.
- 1 T. hispidula Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 306. Lg.: env. de Verviers (Lamb.).
- 2 T. obducens (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 161; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 205; Lamb. Fl. myc. II p. p. 306; Sacc. Syll. Fung. II p. 295.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 546.

Bi: Tervueren (Bm. et R.). — Lg.: Beaufays (Mout.).

3 T. Pirei (West.) Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 305; Sacc. Syll. Fung. II p. 299.

Sphaeria — West. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. V (1866) p. 37 pl. fig. 3. Fl. occ.: Blankenberghe (West.).

- 4 T. pomiformis Karst. Myc. Feun. II (1873) p. 67; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 152; Sacc. Syll. Fung. II p. 301. Zone ardenn. (Lamb.).
- 5 T. macrothele Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 267.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 6 T. Vitalbae (De Not.) Sacc. Fungi Ven. Ser. V p. 177 et Syll. Fung. II p. 295.

Sphaeria — De Not. Schem. Sfer. (1863) p. 221.

N.: Hastière (Bm. et R.).

- 103 PLEOSPHAERIA Speg. Fung. Arg. Pug. IV (1882) p. 65; Sacc. Syll. Fung. II p. 304.
- 1 P. pulveracea Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 159; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 152. Lg.: Beaufays (Mout.).
- 2 P. sylvestris Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 158; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 152. Lg.: Beaufays (Mout.).
 - 104 RHAMPHORIA Niessl Not. über Pyrenom. (1876) p. 44; Sacc. Syll. Fung. II p. 307.
- 1 R. tympanidispora Rehm; Sacc. Syll. Fung. IX p. 913. Bt: Boitsfort (Bm. et R.). Lg.: Beaufays (Mout.).
 - 105 PLEOPHRAGMIA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 243; Sacc. Syll. Fung. II p. 307.
- 1 P. leporum Fuck. Symb. myc. (1869) p. 243 t. VI fig. 26; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 182; Sacc. Syll. Fung. II p. 307. Ht: entre Jurbise et le Camp de Casteau (Él. M.). Lg.: Angleur (Mout.).
 - 106 CUCURBITARIA Gray Nat. Arrang. I (1821) p. 519; Sacc. Syll. Fung. II p. 307.
- 1 C. acerina Fuck. Symb. myc. (1869) 172 t. IV fig. 3; Sacc. Syll. Fung. II p. 318.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 2 C. amorphae (Wallr.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 174; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 185; Sacc. Syll. Fung. II p. 311. Sphaeria Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 781. Bt: Gentinnes (de Limm.).
- 3 C. Berberides (Pers.) Gray Nat. Arrang. I (1821) 519; Sacc. Syll. Fung. II p. 308; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. 159; Lamb. Fl. myc. II p. 319.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 52; Kickx Fl. crypt. I p. 334.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lx.: Bastogne,
Bouillon (Aub.).

4 C. conglobata (Fries) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 214; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 187; Sacc. Syll. Fung. II p. 313. Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 414. Lg.: Forêt (Mout.). 5 C. Coronillae (Fries) Sacc. Fungi it. t. 523 (1879) et Syll. Fung. II p. 312; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 186.
Sphaeria — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 391.

Zone arg.-sabl. (Lamb.).

- 6 C. Coryli Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 308; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 186; Sacc. Syll. Fung. II p. 316. Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 7 C. elongata (Fries) Grev. Scott. crypt. Fl. (1823-9) t. 195; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 159; Lamb. Fl. myc. II p. 318; Sacc. Syll. Fung. II p. 309.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 422; Kickæ Fl. crypt. I p. 336. Diplodia Robiniae Sacc.; Bomm. et Rouss. loc. cit. p. 262.

Hendersonia — West. in Bull. Ac. Belg. Sér. 2 t. II (1857) p. 558; Bomm. et Rouss. loc. cit. p. 264.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Watermael, Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx), Termonde, Ledeberg (West.).

8 C. Evonymi Cooke in Grevillea III (1874) p. 67; Sacc. Syll. Fung. II p. 320.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

9 C. Laburni (Pers.) De Not. Erb. critt. it. n. 875; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 159; Lamb. Fl. myc. II p. 320; Sacc. Syll. Fung. II p. 308.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 50; Kickx Fl. crypt. I p. 335.

Hypoxylon — West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 47.

Hendersonia — West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 557 pl. fig. 2; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 263.

Diplodia Cytisi Auersw.; Bomm. et Rouss. loc. cit. p. 262.

- Bt: Louvain (Leburt.), Jardin bot. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). Fl. occ.: Menin, Courtrai (West.). Fl. or.: Gand (Kickx). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 10 C. naucosa (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 173 t. I fig. 10; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 159; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 186; Sacc. Syll. Fung. II p. 315.

Sphaeria - Fries in Schmidt et Kunze Myc. Hefte 2 (1823) p. 36.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

11 C. Rhamni (Nees) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 174; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 185; Sacc. Syll. Fung. II p. 315.

Sphaeria — Nees Syst. Pilze (1816) p. 299 f. 326.

Lg.: Beaufays, Forêt (Mout.).

12 C. Rosae Wint. et Sacc. in Mich. I (1878) p. 408; Sacc. Syll. Fung. II p. 319.

Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).

13 C. salicina Fuck. Symb. myc. (1869) p. 172; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 159; Lamb. Fl. myc. II p. 317; Sacc. Syll. Fung. II p. 320.

Bt: Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

14 C. Spartii (Nees) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 40; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 159; Lamb. Fl. myc. II p. 318; Sacc. Syll. Fung. II p. 312.

Sphaeria — Nees in Fries Syst. myc. II (1823) p. 424; Kickv Fl. crypt. I p. 336.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.), Héverlé, Parc (Paque), Gentinnes (de Limm.). — Fl. or.: Destelbergen (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

107 FENESTELLA Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 208; Sacc. Syll. Fung. II p. 325.

F. bipapillata (Tul.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 327.
 Valsa — Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 206.
 Lx.: Poix (Bm. et R.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 F. condensata (Berk. et Cooke) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 330; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 208.
White Cooke North Am. Funcin 278

Valsa — Berk. et Cooke North Am. Fungi n. 878. Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 F. Faberi Kunze Fungi Sel. Exs. n. 263; Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 330; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 209.
 N.: Hastière, Mariembourg (Bm. et R.).
- F. Lycii (Duby) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 329.
 Dothidea Duby in Mém. Soc. Genève t. XV (1859) p. 193.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 5 F. macrospora Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 313; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 210; Sacc. Syll. Fung. II p. 328.
 Lg.: Forêt (Mout.). N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 6 F. media Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 208; Succ. Syll. Fung. II p. 327.

Bi: Groenendael (Bm. et R.).

7 F. minor Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 207; Sacc. Syll. Fung. II p. 326.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

8 F. princeps Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 207; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 168; Lamb. Fl. myc. II p. 366; Sacc. Syll. Fung. II p. 325.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). - Lg.: env. de Liége (Mout.).

9 F. rostrata (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 330; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 209.

Thyridium — Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 314. Zone ardenn. (Lamb.).

10 F. vestita (Fries) Sacc. Mich. I (1878) et Syll. Fung. II p. 329; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 209.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 410.

Valsa — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412.

Lg.: Gomzé (Mout.). - Bt: Groenendael (Bm. et R.).

SECT. OPHIOBOLAE.

- 108 OPHIOBOLUS Riess in Hedwigia (1853) p. 27; Sacc. Syll. Fung. II p. 337.
- O. acuminatus (Sow.) Duby in Herb. myc. Ed. II n. 530; Kickx Fl. crypt. I p. 361; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 191. Sphaeria Sow. in Smith et Sow. Brit. Fungi (1797) t. 394 fig. 3; Fries Syst. myc. II (1814) p. 506.

Sphaeria Carduorum Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1823) p. 805.
Rhaphidospora — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 125; Lamb. Fl. myc. II p. 258.

- N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). Bt: Boendael (Bm. et R.).
- 2 0. arenarius Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 259.
 Fl. occ.: Knocke (Bm. et B.).
- O. Bardanae (Fuck.) Rehm. Ascom. Lojkani (1882) p. 61.
 Rhaphidospora Fuck. Symb. myc. (1869) p. 126.
 Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.).
- brachystomus Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 344.
 Rhaphidophora Sacc. in Mich. II (1880) p. 67.
 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- camptosporus Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 344.
 Rhaphidophora Sacc. in Mich. II (1880) p. 68.
 Lx.: Ebly (Él. M.).

- 6 O. chaetophorus (Crouan) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 353.

 Sphaeria Crouan Fl. du Finistère (1867) p. 26.
 - Lx.: Poix (Bm. et R.). Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 7 O. Characiae (Fabre) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 346; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 142.

Rhaphidophora — Fabre Sphér. Vauel. (1880) p. 109.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

- 8 O. Cirsii (Karst.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 341. Rhaphidospora — Karst. Symb. myc. Fenn. VI (1873-79) p. 35. Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).
- O. eueryptus (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 350.
 Sphaeria Berk. et Br. Brit. Fungi (anno?) 652 t. XII fig. 40.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 10 O. fruticum (Rob.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 347.
 Sphaeria Rob. ex Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 308.
 Raphidospora Fuck. Symb. myc. (1869) p. 125; Lamb. Fl. myc. II p. 258.
 Lg.: Louvegnez, Forêt (Mout.). N.: env. de Namur (Bell.).
- 11 0. graminis Sacc. in Rev. myc. (1881); Lamb. Fl. myc. Supplém. Fl. myc. Supplém. I p. 141.
 Raphidophora Sacc. Fungi Ven. Ser. II (1873-82) p. 307.
 - Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).
- 12 0. herpotrichus (Fries) Sacc. in Rev. myc. (1881) t. XX fig. 16 et Syll. Fung. II p. 352.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 504; Kickx Fl. crypt. I p. 346. Raphidophora — Fuck.; Lamb. Fl. myc. II p. 257.

Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 13 O. leptosphaerioides f. Leucanthemi Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 14.
 Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 14 O. littoralis (Crouan) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 349. Sphaeria — Crouan Fl. du Finistère (1867) p. 29. Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).
- Mathieui (West.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 342.
 Sphaeria West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. pl. fig. 12.
 Gnomonia Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 254.
 Lb.: Beverloo (West.).
- O. persolinus (De Not.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 346.
 Raphidophora De Not. Sfer. it. (1863) p. 79 t. 85.
 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- O. porphyrogonus (Tode) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 338;
 Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 191.
 Sphaeria Tode Meckl. Sel. II (1791) p. 12 t. IX f. 72.

Ophiobolus rubellus *Duby* Mém. Hystérinées (1861) p. 13 in nota; *Kickx* Fl. crypt. I p. 362.

O. — var. porphyrogonus Pers. Syn. Fung. (1801) p. 163; Kickx Fl. crypt.
 I p. 362.

Sphaeria rubella Pers. Syn. Fung. (1801) p. 63.

Rhaphidospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 125; *Lamb.* Fl. myc. I1 p. 257.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: env. de Bruges (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Bt: Rixensart, Jardin bot. de Bruxelles El. M.), Boendael (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque).

18 0. rudis (Riess) Rehm Asc. Diagn. n. 188; Sacc. Syll. Fung. II p. 339.

Entodesmium - Riess in Hedwigia (1854) p. 28 t. 4.

Lg.: Dolembreux (Mout.). - Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

19 O. Tanaceti (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 348; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 142.

Sphaerolina — Fuck. Enum. Fung. Nassauv. (1860) n. 651.

Lg.: Beaufays, Gomzé (Mout.).

- 20 0. trichellus Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. I (1891) p. 259.
 Fl. occ.: Ostende, Knocke (Bm. et R.).
- 21 **O. Urticae** (*Rabenh.*) Sacc. in Mich. II (1880) p. 324 et Syll. Fung. II p. 338.

Raphidophora — Rabenh. Herb. myc. II n. 715.

Bi: Forêt de Soignes (Bm. et R.).

22 0. Vitalbae Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 345.
 Raphidophora — Sacc. myc. Ven. (1873) p. 282 t. X fig. 7-9.
 N.: Rochefort (Bm. et R.).

23 **O. vulgaris** Sacc. in Mich. II (1880) p. 953 et Syll. Fung. II p. 338; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 191; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 141.

Rhaphidophora — Sacc. in Mich. II (1880) p. 67.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

LINOSPORA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 123; Sacc. Syll. Fung. II p. 359.

L. Capreae (DC.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 124; Lamb. Fl. myc. II p. 256; Sacc. Syll. Fung. II p. 354.
 Sphaeria — DO. Fl. fr. VI (1815) p. 130.

Isothea saligna Berk Outl. Brit. Fung. (1860) p. 392; Kickx Fl. crypt. II p. 296.

Dothidea - West. Herb. crypt. n. 524.

Phoma - Fries Syst. myc. II (1823) p. 546.

Lg.: Beaufays (Mout.). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).

- 2 L. Magnagutiana Sacc. in Mich. II (1880) p. 45; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 117; Sacc. Syll. Fung. II p. 356.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 L. populina (Pers.) Schröter in Rabenh. Fungi Eur. n. 2429; Bomm. et Rouss, Fl. myc. env. Brux. p. 190; Sacc. Syll. Fung. II p. 257. Hypospila Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; Lamb. Fl. myc. II p. 212.

Sphaeria ceuthocarpa Fries Syst. myc. II (1823) p. 439.

Hypospila - Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 366.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Elewyt (Él. M.). — Lg.: Forêt (Mout.). — Fl. or.: Melle, Gontrode (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

4 L. Tremulae Morth. in Thüm. Mycoth. n. 1154; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 190; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 118; Sacc. Syll. Fung. II p. 355.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

110 DILOPHIA Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 357.

 D. graminis (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 357; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 209.

Dilophospora — Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 300 fig. 3. Bt: Uccle (Bm. et R.).

- 111 SILLIA Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 20; Sacc. Syll. Fung. II p. 361.
- 1 S. ferruginea (Pers.) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 159 et 251; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 170; Sacc. Syll. Fung I p. 361.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 35.

Diatrype — Fries Summa veg. Scand. (1849) p. 385; Kichx Fl. crypt. I p. 303. Melogramma — Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 30; Lamb. Fl. myc. II p. 407.

Hypoxylon — West. et Van Haes. Cat. Urypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 45. Bt: Auderghem, Ottignies (Bm. et R.), Limelette, Rixensart (Él. M.) — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 112 CRYPTOSPORA Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 361;
 Sacc. Syll. Fung. II p. 361.
- 1 C. Betulae Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 149 t. XVII fig. 13-27; Sacc. Syll. Fung. II p. 364; Lamb. Fl. myc. II p. 361.

 $\mathsf{Lg.:env.}$ de Verviers (Iamb.), Liége, Beaufays (Mout.). — $\mathsf{Bt:Villers\text{-}la-Ville}$ (Bm. et R.).

2 C. Corylina (Tul.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 192; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 204; Sacc. Syll. Fung. II p. 362.

Valsa - Tul. Sel. Fung. Carp. II (I863) p. 174.

Lg.; env. de Verviers (Lamb.), Chaudfontaine (Mout.), Comblain-au-Pont (Bm. et R.).

3 C. suffusa (Fries) Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 145; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 168; Sacc. Syll. Fung. II p. 361; Lamb. Fl. myc. II p. 360.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 399.

Valsa — Fries Summa veg. scand. II (1849) p. 412; Kickw Fl. crypt. I (1867) p. 325.

Bt: Auderghem (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.). — N.: env. de Namur (Bell.). — Fl. or.: Gand (Kickx).

4 C. Tiliae Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 151; Sacc. Syll. Fung. II p. 363.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

SPHAERIACEA IMPERFECTE COGNITA.

Sphaeria caulincola Wallr. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 770; Sacc. Syll. Fung. II p. 434.

Bt: Eegenhoven (Paque). — N.: env. de Namur (Bell.). — Fi. occ.: env. d'Ypres (West.).

FAM. HYPOCREACEAE.

SECT. HYALOSPOREAE.

- 1 NECTRIELLA Sace, in Mich. I (1878) p. 279 et Syll. Fung. II p. 452.
- 1 N. furfurella (Berk. et Br.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 279 et Syll. p. 452.

Nectria - Berk. et Br. in Grevillea I (1973) p. 155.

Bi: Watermael (Bm. et R.).

2 N. Helenae Sacc. et Roum. in Rev. Myc. (1883) p. 41 f. 20; Sacc.

- Syll. Fung. IX p. 941; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 242. Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 N. Rousseliana (Mout.) Sacc. in Mich. I (1878) 51; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 184; Sacc. Syll. Fung. II p. 452. Nectria Mont. Syll. (1856) p. 224.

Stigmatea — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 97; Lamb. Fl. myc. II p. 210. Bt: Mousty (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

- 2 CHILONECTRIA Sacc. in Mich. I (1878) p. 270 et Syll. Fung. II p. 453.
- C. cucurbitula (Curr.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 270 et Syll. Fung. II p. 453.

Sphaeria — Curr. Syn. comp. Sphaeriae (1858-69) t. 49 fig. 178 p. p. N.: Han-sur-Lesse (Bm. et R.). — Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 3 ELEUTHEROMYCES Fuck. Symb. myc. (1869) p. 183; Sacc. Syll. Fung. II p. 455.
- E. subulatus (Tode) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 183; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 179; Sacc. Syll. Fung. II p. 455; Lamb. Fl. myc. II p. 337.

Sphaeria - Tode Fungi Meckl. Sel. II (1791) p. 44.

Sphaeronema — Fries Syst. myc. II (1823) p. 536; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 257.

- Bt: Watermael (Bm. et R.). N.: Dinant (Lamb.). Lx.: Bouillon (Lamb.).
 - 4 HYPONECTRIA Sacc. in Mich. I (1878) p. 250 et Syll. Fung. II p. 455.
- H. Buxi (DC.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 250 et Syll. Fung. II p. 455.
 Sphaeria DC. Fl. fr. VI (1815) p. 146.

Bt: Tervueren (Bm. et R.). - N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 5 MONOGRAPHOS Fuck. Symb. myc. App. III (1879) p. 24; Sacc. Syll. Fung. II p. 457.
- 1 M. Aspidiorum (Lib.) Fuck. Symb. myc. App. III (1879) p. 24;
 Sacc. Syll. Fung. 1I p. 457; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 254.
 Sphaeria Lib. Crypt. Arduenn. n. 342.

A.: Turnhout, Gierle (Paque).

- 6 POLYSTIGMA DC. Fl. fr. VI (1815) p. 164; Sacc. Syll. Fung. II p. 458.
- 1 P. ochraceum (Wahlenb.) Sacc. Syll. Fung. II p. 458.
 - var. aurantiacum Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 458.

Polystigma fulvum Tul. ex Lamb. Fl. myc. II p. 405. P. aurantiacum West. in Exs. fasc. 17 n. 825.

Sine loco (West.).

2 P. rubrum (Pers.) DC. in Mém. Mus. Hist. nat. Paris III (1821) p. 337, t. 4 fig. 7; Kicke Fl. crypt. I p. 300; Sacc. Syll. Fung. II p. 458; Lamb. Fl. myc. II p. 404.

Xyloma — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 105. Dothidea - Fries Syst. myc. II (1823) p. 353.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). - Bt: Gentinnes (de Limm.). - Lx.: Bouillon (Bm. et R.). - Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx). - Fl. occ.: Nieuport (Bm. et R.).

PHAEOSPORAE. SECT.

- 7 MELANOSPORA Corda Ic. Fung. I (1837) p. 24; Sacc. Syll. Fung. II p. 461.
- 1 M. chionea (Fries) Corda Ic. Fung. I (1837) p. 25 t. 7 fig. 297; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 243; Sacc. Syll. Fung. II p. 461. Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 M. Coemansii West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 562 pl. fig. 8; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 243. Fl. or.: Jardin bot. de Gand (West.).
- 3 M. lagenaria (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 126; Sacc. Syll. Fung. II p. 461.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 58. Lx.: Ébly (Él. M.).

- 4 M. Marchaliana Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 255. Lx. : Ebly (Él. M.).
- 5 M. vervecina (Desm.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 126; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 243; Sacc. Syll. Fung. II p. 461. Sphaeria - Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 103 t. V fig. A. Bt: Héverlé (Paque).

SECT. HYALODIDYMAE.

- 8 HYPOMYCES Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 382; Sacc. Syll. Fnng. II p. 466.
- 1 H. asterophorus Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 54 t. IX; Sacc. Syll. Fung. II p. 467; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 180; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 251. Sine loco (Lamb.).

- H. aurantius (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 183; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 180; Sacc. Syll. Fung. II p. 470; Lamb. Fl. myc. II p. 334.
 - Sphaeria Pers. Syn. Fung. (1801) p. 68.
 - Bt: Groenendael, Auderghem (Bm. et R.). Lg.: Forêt (Mout.).
- H. Cervinus Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) 51; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 180; Lamb. Fl. myc. II p. 477. St: Bois de la Cambre, Boitsfort (Bm. et R.).
- H. chrysospermus Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 51 t. VIII fig. 1-31; Sacc. Syll. Fung. II p. 467; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 180; Lamb. Fl. myc. II p. 233. Lg.: Gomzé (Mout.).
- H. lateritius (Fries) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 62 t. 30 fig. 5; Sacc. Syll. Fung. II p. 468; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 180; Lamb. Fl. myc. II p. 333.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 338.

- Bt: Linkebeek (Bm. et R.).
- H. Linkii Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 44; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 180; Sacc. Syll. Fung. II p. 477. Bt: Hoeylaert, La Hulpe (Bm. et R.).
- H. ochraceus (Pers.) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 41 t. VI fig. 19-20 et t. VII; Sacc. Syll. Fung. II p. 469; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 180; Lamb. Fl. myc. II p. 335. Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).
- H. Pezizae Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 52; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 180; Lamb. Fl. myc. Supplém. J. p. 253; Sacc. Syll. Fung. II p. 477.

Asterophora — Corda; Bomm. et Rouss. loc. cit. p. 275.

- Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 9 H. rosellus (Alb. et Schwein.) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 45 t. V et VI fig. 1-18; Sacc. Syll. Fung. II p. 468; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. de Brux. p. 180; Lamb. Fl. myc. II p. 334. Sphaeria — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 38 t. 9 fig. 3. Lg.: Forêt (Mout.).
- 10 H. roseus (Pers.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 469; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 252. Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 18.
 - Zone ardenn. (Lamb.).
- 11 H. terrestris Plowr. et Boud. in Grevillea VIII (1880) p. 105 t. 130

fig. 2 et XI p. 47 t. 153; Sacc. Syll. Fung. II p. 471; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 180; Lamb. Fl. myc. Supplém, I p. 252.

Bt: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

12 H. violaceus (Fries) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 60; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 180; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 251; Sacc. Syll. Fung. II p. 473. Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 441.

Bi: Groenendael (Bm. et R.).

- 13 H. viridis (Alb. et Schwein.) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 211; Sacc. Syll. Fung. II p. 472; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 252. Sphaeria - Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1803) p. 8 t. 6 fig. 8. Hypomyces luteo virens (Fries) Plowr. in Grevillea XI (1882) p. 46 t. 152 fig. 2; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 186. Bi: Limelette (Bm. et R.).
 - 9 NECTRIA Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 387; Sacc. Syll. Fung. II p. 479.
- N. aquifolia (Fries) Berk. Outl. Brit. Fung. (1860) p. 393; Sacc. 1 Syll. Fung. II p. 487; Lamb. Fl. myc. II p. 329. Sphaeria - Fries Elench. Fung. II (1828) p. 82. Sine loco (Lamb.).
- N. armeniaca Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) 75, t. X fig. 1-12; Sacc. Syll. Fung. II p. 483.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 N. Aurantium (Wallr.) Kickw Fl. crypt. I (1867) p. 321; Sacc. Syll. Fung. II p. 509.

Sphaeria — Wallr. Fl. Crypt. Germ. II (1833) p. 788.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Menin (West).

N. aurora (Fries) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 508. Sphaeria — Fries Elench. Fung. II (1828) p. 80.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

N. chrysitis (Wallr.) Rabenh. Herb. myc. Ed. II n. 632; Kickx Fl. crypt. I p. 320; Sacc. Syll. Fung. II p. 488; Lamb. Fl. myc. II p. 329.

Sphaeria — Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. (1833) p. 841. Hypoxylon — West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 387. Fl. occ. : Menin (West.).

N. cinnabarina (Tode) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 388; Kicker Fl. crypt. I p. 319; Sacc. Syll. Fung. II p. 379; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 181; Lamb. Fl. myc. II p. 328.

Sphaeria cinnabarina Tode Meckl. Sel. II (1791) p. 9 fig. 88.

Hypoxylon — West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. Anv. (1838) p. 4 n. 46.

Fl. or.: (Coemans). — Bt: Watermael (Bm. et R.), Gentiunes (de Limm.), Groenendael (Él. M.), Louvain (Leburt.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Bell.).

7 N. coccinea (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 368; Kicka Fl. crypt. I p. 319; Sacc. Syll. Fung. II p. 481; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 181; Lamb. Fl. myc. II env. Brux. p. 326.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (I80I) p. 49.

Bt: Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre (Bm. et R.), Louvain (Paque), Dilbeek (Él. M.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 8 N. Coelosphaerioides Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 256.

 Bt: bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 9 N. Coryli Fuck. Symb. myc. (1869) p. 180; Sacc. Syll. Fung. II p. 483; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 245.
 Lg.: Forêt (Mout.).
- 10 N. cosmariospora Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 195; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brax. p. 181; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 245; Sacc. Syll. Fung. II p. 508. Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 11 N. cucurbitula (Tode) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 388 p. p.; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 181; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 246; Sacc. Syll. Fung. II p. 484. Sphaeria Tode Meckl. Sel. II (1791) p. 38 p. p.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

- 12 N. dacrymycella (Nyl.) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 216. Sphaeria — Nyl. in Flora (1863) p. 322. Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 13 N. Desmazierii De Not. Sfer. it. (1863) n. 4; Sacc. Syll. Fung. II p. 482.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

14 N. ditissima *Tul*. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 73 pl. 13 fig. 1-4;
Sacc. Syll. Fung. II p. 482; *Bomm*. et *Rouss*. Fl. myc. env. Brux.
p. 181; *Lamb*. Fl. myc. Supplém. I p. 245.

Tubercularia crassostipitata Fuck. Symb. myc. (1869) p. 180; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 291.

Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

N. episphaeria (Tode) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 388; Kickv. Fl. crypt. I p. 320; Sacc. Syll. Fung. II p. 497; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 181; Lamb. Fl. myc. II p. 331. Sphaeria — Tode Meckl. Sel. II (1791) p. 21. fig. 89.

Bt: Laeken (Bm. et R.). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.). - Lx.: Ébly (Él. M.).

- 16 N. erythrinella (Nyl.) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 95; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 247; Sacc. Syll. Fung. II p. 499. Sphaeria — Nyl. in Bid. till. Finl. Naturk. (1859) p. 125. Zone ardenn. (Lamb.).
- 17 N. lecanodes Ces. in Rabenh. Herb. myc. Ed. II n. 525; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 244; Sacc. Syll. Fung. II p. 499.
 Lg.: Forêt (Mout.).
- 18 N. flava Bon. Abhandl. (1870) p. 155; Sacc. Syll. Fung. II p. 494.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 19 N. Fuckelii Sacc. in Mich. I (1878) p. 289. Nectriella coccinea Fuck. Symb. myc. (1869) p. 177 t. IV flg. 20; Lamb. Fl. myc. II p. 324. Sine loco (Lamb.).
- 20 N. impolita Mout. in Bull. Soc. roy de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 78.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 21 N. lichenicola (Ces.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 498.

 Cryptodiscus Ces. in Hedwigia (1858) n. I.

 Nectriella carnea Fuck. Symb. myc. (1869) p. 176 t. IV fig. I9; Lamb. Fl. myc. II p. 324.

 Sine loco (Lamb.).
- N. Peziza (Tode) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 388; Kickw Fl. crypt. I p. 320; Sacc. Syll. Fung. II p. 501; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 181; Lamb. Fl. myc. II p. 331.
 Sphaeria Tode Meckl. Sel. II (1791) p. 46 fig. 122.
 Bt: Gentinnes (de Limm.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 23 N. Punicea (Kunze et Schmidt) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 487; Kickx Fl. crypt. I p. 320; Sacc. Syll. Fung. II p. 480; Lamb. Fl. Myc. II p. 326.

Sphaeria - Kunze et Schmidt Myk. Hefte I (1817) p. 61.

A.: Westmalle (Bm. et R.). — Fl. or.: env. d'Audenaerde (Tosquinet). — Bt: Groenendael (Él. M.), Tervueren (Bm. et R.). — Lg.: env. de Liége (Mout.) —

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

24 N. Ralfsii Berk. et Br. Brit. Fungi (anno?) n. 780; Sacc. Syll. Fung. II p. 503.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

25 N. Ribis (Tode) Rabenh. Fungi Eur. n. 264; Sacc. Syll. Fung. II p. 480; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 246.

Sphaeria — Tode Meckl. Sel. II (1791) p. 31 fig. 103; Kickx Fl. crypt. I p. 333. Hypoxylon — Kickx Fl. crypt. env. Louvain (1835) p. 113. Cucurbitaria — Fries ex Lamb. Fl. myc. II p. 321.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Kickx). — N.: Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — FI. occ.: Courtrai (West.).

26 N. Robergei Mont. et Desm. in Bull. Soc. Bot. de France (1857) p. 999; Sacc. Syll. Fnng. II p. 499.
Ht: env. de Mons (Dumont.).

27 N. Rousseauana Sacc. et Roum. in Rev. myc. (1883) p. 238 t. 41 f. 19; Sacc. Syll. Fung. IX p. 959; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 247.

Zone arg.-sabl. (Lamb.).

28 N. sanguinea (Sibth.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 388;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 181.
Sphaeria — Sibth. Fl. Oxoniensis (1794) p. 404.

Bt: Auderghem, bois de la Cambre (Bm. et R.), Notre-Dame de bonne-Odeur, Groenendael (Él. M.). — Lg.: Beaufays, Tilff (Mout.). — Lx.: Ebly, Laroche (Él. M.).

- 29 N. Selenosporii Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 72; Sacc. Syll. Fung. II p. 489; Lamb. Fl. myc. II p. 327. Sine loco (Lamb.).
- 30 N. sinopica Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 388; Sacc. Syll. Fung. II p. 480.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 31 N. Solani Reinke et Berthold Zersetz. d. Kartoff. (1879) p. 39; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 247; Sacc. Syll. Fung. II p. 511. Zone ardenn. (Lamb.).
- 32 N. stilbosporae Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 71 t. XI fig. 11-19; Sacc. Syll. Fung. II p. 489.

 Bt: Groenendael (Bm. et R.).

33 N. umbrina (Berk.) Fries Summa Veg. Scand. (1841) p. 388; Sacc. Syll. Fung. II p. 510.

Sphaeria — Berk. Brit. Fl. V (1836) p. 264.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 10 SPHAEROSTILBE Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 103; Sacc. Syll. Fung. II p. 511.
- S. coccophila Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 105; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 178; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 247; Sacc. Syll. Fung. II p. 513.

 Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 2 S. flammea Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 104; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 178; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 248; Sacc. Syll. Fung. II p. 512.
 Bt: Boitsfort, Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- S. gracilipes Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 102; Sacc. Syll. Fung. II p. 513; Lamb. Fl. myc. II p. 339.
 Stilbum Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. V (1856) p. 114; Kickx Fl.

crypt. I p. 313.

- Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).
 - 11 APONECTRIA Sacc. in Mich. I (1878) p. 286 et Syll. Fung. II p. 516.
- 1 A. indurata (Berk. et Br.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 296 et Syll. Fung. II p. 516.

Nectria — Berk. et Br. in Ann. and Mag. Nat. Hist. Ser. 2 t. XIII (1844) p. 467; Lamb. Fl. myc. II p. 329.

- N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Bm. et R.). Lg.: Nonceveux (Bm. et R.), Dolembreux, Beaufays (Mout.).
 - 12 HYPOCREA Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 383 p. p.; Sacc. Syll. Fung. II p. 520.
- H. alutacea (Pers.) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 191;
 Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 253; Sacc. Syll. Fung. II p. 530.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 H. citrina (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 185; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 179; Lamb. Fl. myc. II p. 336; Sacc. Syll. Fung. (1801) p. 18. Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 3 H. gelatinosa (Tode) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 383;

Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 253; Sacc. Syll. Fung. II p. 524. Sphaeria gelatinosa Tode Meckl. Sel. II (1791) p. 48 fig. 123-124. Lg.: Gomzé (Mout.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 H. rufa (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 383; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 179; Lamb. Fl. myc. II p. 336; Sacc. Syll. Fung. II p. 520.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 13

Trichoderma viride Pers. var. intermedium Desm. (?)

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). - N.: Champion (Bell.).

— var. lateritia Sacc. Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 24 et Syll. loc. cit.
Sine loco (Lamb.).

SECT. PHAEODIDYMAE.

- 13 LETENDRAEA Sacc. in Mich. II (1880) p. 73 et Syll. Fung. II p. 538.
- 1 L. eurotioides Sacc. in Mich. II (I880) p. 73 et Syll. Fung. II p. 538; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 182; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 244. Bt: Groenendael (Bm. et R.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

- 14 CALONECTRIA De Not. in Comment. Soc. crit. it. II (1863) p. 477; Sacc. Syll. Fung. II p. 546.
- 1 C. Bloxami (Berk. et Br.) Sacc. Fungi Ven. Ser. IV 23; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 183; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 249; Sacc. Fungi it. t. 195 et Syll. Fung. II p. 547.

Nectria — Berk. et Br. in Ann. and Mag. nat. Hist. (1854) p. 781.

Lg.: Gomzé (Mout.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 C. flavida (Corda) Sacc. in Mich. I (1878) p. 313; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. de Brux. p. 183; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 249; Sacc. Syll. Fung. II p. 548.

Sphaeria — Corda Icon. IV (1880) p. 40 t. VIII fig. 117.

Bt: entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

3 **C.** helminthicola (*Berk*. et *Br.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 315 et Syll. Fung. II p. 551.

Nectria — Berk. et Br. Brit. Fungi (anno?) p. 896.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 4 C. hirta (Blox.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 307 et Syll. Fung. II p. 548. Nectria — Blox. sec. Sacc. loc. cit. Lg.: Env. de Eiége (Mout.).
- 5 C. pseudo-Peziza (Desm.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 307; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 183; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 249; Sacc. Syll. Fung. II p. 541.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIII (1840) p. 186. Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

6 C. pyrochroa (Desm.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 303; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 183; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 750; Sacc. Syll. Fung. II p. 544.

Sphaeria — Desm. in Bull. Soc. bot. de Fr. t. IV (1857) p. 995. Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

7 C. Richoni Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 542; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 249.

Nectria mellina *Rich.* in Bull. Soc. bot. de France (1881) p. 184 t. V flg. 3. Rel. Westendorpianae.

GIBBERELLA Sacc. in Mich. I (1878) p. 347 et Syll. Fung. II p. 552.

1 G. baccata (Wallr.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 347 et Syll. Fung. II p. 553; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 182.

Sphaeria — Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 838.

Gibbera — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 167; Lamb. Fl. myc. II p. 313.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 G. cyanogena (Desm.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 553; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 182.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 352; Kickx Fl. crypt. I p. 333.

Melanomma — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 303.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.). — Fl. or.: env. de Gand (Coemans). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

3 G. pulicaris (Fries) Sacc. in Mich. I (1878) p. 43; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 182; Sacc. Syll. Fung. II p. 552.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 417.

Gibbera — Kickx Fl. crypt. 1 (1867) p. 367; Lamb. Fl. myc. II p. 312.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Groenendael, Elewyt (Él. M.).

4 G. Saubinetii (Mont.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 513 et Syll. Fung. II

p. 554; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 182. Gibbera Saubinetii Mont. Syll. (1856) p. 252; Lamb. Fl. myc. II p. 313. Bt: Uccle (Bm.et R.). — Lg.: Beaufays (Mout.). — Lx.: Laroche, Ebly (Él. M.).

SECT. DICTYOSPORAE.

- 16 PLEONECTRIA Sacc. Fungi Ven. Ser. V (1873-82) 178 et Syll. Fung. II p. 559.
- P. Lamyi (Desm.) Sacc. in Mich. I (1878) 325 et Syll. Fung. II p. 559.
 Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836) p. 246; Kickw Fl. crypt. I p. 334.

Nectria — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 387 en note; Lamb. Fl. myc. II p. 325.

Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.).

2 P. lichenicola (Crouan) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 560; Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 p. 15 pl. A fig. 9. Nectria — Crouan Fl. Finistère (1867) p. 256.
Lg.: Beaufays (Mout.).

SECT. SCOLECOSPORAE.

- 17 OOMYCES Berk. et Br. Not. on Brit. Fungi (anno?) p. 590; Sacc. Syll. Fung. II p. 564.
- 1 O. carneo-albus (Lib.) Berk. et Br. loc. cit. (anno?) p. 590; Lamb. Fl. myc. II p. 196; Sacc. Syll. Fung. II p. 564. Sphaeria Lib. Crypt. arduenn. n. 241.
 Lg.: (Lamb.).
 - 18 CLAVICEPS Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 43; Sacc. Syll. Fung. II p. 564.
- 1 C. microcephala (Wallr.) Tul. Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) t. IV fig. 1-11; Kickw Fl. crypt. I p. 316; Sacc. Syll. Fung. II p. 565; Lamb. Fl. myc. II p. 346.

Kentrosporium — Wallr. Beitr. II (1844) t. 3 fig. 10-16.

- Bt: Gentinnes (de Limm.). A.: Brasschaet (West.). Lx.: Laroche (Él. M.).
- 2 C. nigricans Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) t. IV fig. 15-22; Sacc. Syll. Fung. II p. 565; Lamb. Fl. myc. Supplém. p. A.: Gampine anversoise (Magnus).
- 3 C. purpurea (Fries) Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 45 t. I-III; Kickx Fl. crypt. I p. 315; Sacc. Syll. Fung. II p. 564;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 177; Lamb. Fl. myc. II p. 344.

Sphaeria purpurea Fries Syst. myc. II (1823) p. 325 p. p.

Sclerotium clavus DO. Fl. fr. VI (1815) p. 115.

Lb.: Tongres (Paque). — Bt: Vilvorde, Peuthy (Del.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), env. de Louvain (Paque), Vlierbeek (Leburt.). — Fl. or.: env. de Termonde (West.), env. de Gand (Nypels). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Duncs (Landzsweert). — A.: Turnhout (Paque), env. d'Anvers (Nypels), Brasschaet (West. et Van Haes.). — Lg.: env. de Liége, Spa, Visé (Nypels). — Lx.: Ebly (Él. M.).

- 19 CORDYCEPS Fries Syst. myc. II (1823) p. 324; Sacc. Syll. Fung. II p. 566.
- 1 C. capitata (Holmsk.) Link Handb. III (1833) p. 347; Kickx Fl. crypt. I p. 314; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 179; Sacc. Syll. Fung. II p. 574.

Sphaeria — Pers. Comm. Fungi clavif. (1797) p. 145.

Clavaria - Holmsk. Otia t. I (1790) p. 38.

Xylaria — Kickx Rech. Cent. II (1843) p. 22.

Torrubia - Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 22; Lamb. Fl. myc. II p. 342.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Hoeylaert (Él. M.). — Fl. occ.: Gheluvelt (Kickx). — Lg.: Forêt (Mout.). — Ht: Masnuy (Él. M.). — Lx.: Poix (Al. M.).

2 C. militaris (L.) Link Handb. III (1833) p. 347; Sacc. Syll. Fung. II p. 572.

Xylaria - Kickx Fl. de Louvain (1835) p. 117.

Clavaria — L. in Fl. Dan. (anno?) t. 657.

Torrubia — Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 61; Lamb. Fl. myc. II p. 341.

Fl. or.: Gand (Van Bambeke), Gendbrugge (Spae). — Bt: Tervueren, Auderghem (Kickx), Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Héverlé, (Paque), Groenendael, Auderghem (Bm. et R.), Dilbeek, Rixensart (Él. M.). — Lg.: (Lamb.).

3 C. ophioglossoides (Ehrhart) Link Handb. III (1833) p. 347; Kickx Fl. crypt. I p. 314; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p, 178; Sacc. Syll. Fung. II p. 574.

Sphaeria - Ehrhart Beitr. z. Naturk. III (1788) p. 88.

Torrubia — Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 20; Lamb. Fl. myc. II p. 342.

Bt: Haut-Loo (Paque), Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Groenendael, Limelette, Rixensart (Él. M.). — Fl. or.: Melle, Gontrode (Kickx). — Lg.: Beaufays (Mout.). — Fl. occ.: Zillebeke, Gheluvelt, Kemmel, Wytschaate, Vlamertinghe (Kickx). — Lx.: Libramont (Él. M.).

4 C. Wallaysii West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 81 pl. fig. 21; Kickv Fl. crypt. I p. 315; Sacc. Syll. Fung. II p. 567. Torrubia — Tul.; Lamb. Fl. myc. II p. 343.

Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

20 EPICHLOE Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 381; Sacc. Syll. Fung. II p. 578.

1 E. Typhina (Pers.) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 24; Kickx Fl. crypt. I p. 317; Sacc. Syll. Fung. II p. 578; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 179; Lamb. Fl. myc. II p. 338;

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 29.

Dothidea - Fries Syst. myc. II (1823) p. 553.

A.: Vieux-Dieu (Nypels). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Bergh, (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Lg.: Beaufays, Dolembreux (Mout.).

FAM. DOTHIDEACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

- 1 PHYLLACHORA Nitschke in Fuck. Symb. myc. (1869) p. 216; Sacc. Syll. Fung. II p. 594.
- 1 P. Angelicae (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 219; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 94; Sacc. Syll. Fung. II p. 615.
 Dothidea Fries Syst. myc. II (1823) p. 561.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 P. Caricis (Fries) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 625; Bomm. et Rouss. Fl. myc. Brux. p. 174; Lamb. Fl. myc. II p. 398. Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 435.

Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.).

- 3 P. depazeoides (Desm.) Nitschke; Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 398.

 Dothidea Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 311; Kickx
 Fl. crypt. I p. 298.

 Flandres (Kickx).
- 4 P. gangraena (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 219; Lamb. Fl. myc. II p. 394; Sacc. Syll. Fung. II p. 604.

Sphaeria — Fries in Duby Bot. Gall. II (1830) p. 695.

Dothidea — Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 297.

Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx). - Bt: Gentinnes (de Limm.).

5 P. graminis (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 216; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 174; Lamb. Fl. myc. II p. 393; Sacc. Syll. Fung. II p. 602.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 30.

Dothidea — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 387; Kicke Fl. crypt. I p. 297.

Sphaeropsis Caricis Fries; Kicke Fl. crypt. I p. 403; Lamb. Fl. myc. III p. 56.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: env. de Blankenberghe (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

6 P. Heraclei (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 219; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 174; Lamb. Fl. myc. II p. 392; Sacc. Syll. Fung. II p. 600.

Dothidea — Fries Syst. myc. II (1823) p. 556; Kickx Fl. crypt. I p. 297. Septoria — Lib. Exs. n. 51; Bomm. et Rouss. loc cit. p. 260.

Bt: Tervueren, Boendael, Watermael (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: env. de Bruges (West.).

7 P. Junci (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 216; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 174; Lamb. Fl. myc. II p. 396; Sacc. Syll. Fung. II p. 605.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 428; Kickw Fl; crypt. I p. 347.

Dothidea - Fries loc. cit. sec. Sacc. loc. cit.

Leptostroma juncinum Lib. (ubi?).

Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Limelette (El. M.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- P. melanoplaca (Desm.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 607.
 Dothidea Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1849) p. 33.
 N.: env. de Namur (Bell.).
- 9 P. millepunctata (Desm.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 595.
 Dothidea Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 177.
 Stigmatea Kickv Fl. crypt. I (1867) p. 366; Lamb. Fl. myc. II p. 208.
 N.: Namur (Bell.).
- 10 P. Poae (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 603; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 93.
 Scirrhia Fuck. Symb. myc. (1869) p. 221 t. IV fig. 11.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 11 P. Podagrariae (Roth) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 228; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 174; Sacc. Syll. Fung. II p. 615. Sphaeria Roth Cat. bot. I (1797) p. 230. Phyllachora Aegopodii Fuck. Symb. myc. (1869) p. 218; Lamb. Fl. myc. II p. 393.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et .R.).

12 P. Pteridis (Reb.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 218; Lamb. Fl. myc. II p. 395; Sacc. Syll. Fung. II p. 607.

Sphaeria — Reb. Fl. Neom. (1804) p. 314 t. I fig. 3.

Dothidea - Fries Syst. myc. II (1823) p. 555.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

- 13 P. sylvatica Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 410; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 94; Sacc. Syll. Fung. II p. 603. Zone ardenn. (Lamb.).
- 14 P. Trifolii (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 218; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 174; Lamb. myc. II p. 391; Sacc. Syll. Fung. II p. 613.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 30.

Dothidea — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 387; Kickx Fl. crypt. I p. 296.

Bt: Watermael, Boendael (Bm. et R.), Wilsele, Kessel-Loo (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

15 P. Ulmi (Duv.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 218; Sacc. Syll. Fung. II p. 594; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 174; Lamb. Fl. myc. II p. 395.

Sphaeria - Duv. in Hoppe Bot. Tasch. (1809) p. 105.

Dothidea — Fries; Kickx Fl. crypt. I p. 298.

Lg.: Dolembreux (Mout.). — Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Louvain, Wygmael (Wilsele), Gentinnes (de Limm.). — N.: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 EURYACHORA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 220; Sacc. Syll. Fung. II p. 625.
- E. Stellariae (Lib.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 625; Sacc. Syll.
 Fung. II p. 625; Lamb. Fl. myc. II p. 400.

Dothidea - Lib. Crypt. Ard. n. 172; Kickx Fl. crypt. I p. 299.

Lx.: Ébly (Él. M.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Mont de Fraises près d'Ypres (Wall.).

2 E. stellaris (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 625; Sacc. Syll. Fung. II p. 625; Lamb. Fl. myc. II p. 400.
Xyloma — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 105.

Lx.: Ébly (Él. M.).

SECT. HYALODIDYMAE.

- 3 UOTHIDELLA Speg. Fungi Argent. Pug. I Anhang (1880); Sacc. Syll. Fung. II p. 627.
- J. D. Betulina (Fries) Sacc. Syll Fung. II (1883) p. 628.

Xyloma — Fries Obs. myc. I (1815) p. 198.

Dothidea — Fries Syst. myc. II (1823) p. 555; Kickx Fl. crypt. I p. 297.

Phyllachora — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 217; Lamb. Fl. myc. II p. 394. Fl. or.: Rooberst (Kickx).

 D. fallax Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 628; Lαmb. Fl. myc. Supplém. I p. 95.

Phyllachora — Sacc. Fung. Ven. Ser. V (1873-82) p. 181. Zone ardenn. (Lamb.).

- 4 SCIRRHIA Nitschke in Fuck. Symb. myc. (1869) p. 220; Sacc. Syll. Fung. II p. 634.
- 1 S. depauperata Fuck. Symb. myc. (1869) p. 221.

 Dothidea rimosa var. Desm. in Rabenh. Fungi Eur. n. 349.

FI. occ.: Middelkerke, Knocke (Bm. et R.).

- 2 S. rimosa (Alb. et Schwein.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 221; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 95; Sacc. Syll. Fung. II p. 634. Sphaeria — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 12 t. III fig. 1. Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
 - 5 PLOWRIGHTIA Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 635.
- 1 P. insculpta (Wallr.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 636.
 Dothidea Wallr. Consp. Fl. Crypt. Germ. IV (1833) p. 864; Lamb. Fl. myc. II p. 403.
 Lg.: Forêt (Mout.). N.: Dave (Bm. et R).
- 2 P. Mezerei (Fries) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 636. Dothidea — Fries Syst. myc. II (1823) p. 551; Kickæ Fl. crypt. I p. 299; Lamb. Fl. myc. II p. 402.
 Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickæ).
- 3 P. Ribesia (Pers.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 635; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 175.

Dothidea — Fries Syst. myc. II (1823) p. 550; Kickx Fl. crypt. I p. 299 Lamb. Fl. myc. II p. 401.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 14.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Laeken, Uccle (Bm. et R.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.):

SECT. PHAEODIDYMAE.

- 6 DOTHIDEA Fries Syst. myc. II (1823) p. 548 ex p.; Sacc. Syll. Fung. II p. 639.
- D. Bignoniae Fries Elench. Fung. II (1828) p. 122; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 96; Sacc. Syll. Fung. II p. 644.
 Zone arg.-sabl. (Lamb.).
- 2 D. puccinioides (DC.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 551; Kickx

Fl. crypt. I p. 298; Sacc. Syll. Fung. II p. 641. Sphaeria puccinioides DC. Fl. fr. VI (1815) p. 118. Phyllachora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 397.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque).

3 D. Sambuci (Pers.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 551; Sacc. Syll. Fung. II p. 639; Lamb. Fl. myc. II p. 402. Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 14.

Bt: Louvain, Eegenhoven (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Ébly (Él. M.), env. d'Herbeumont (Bm. et R.).

4 D. tetraspora Berk. et Br. Brit. Fungi (Anno?) p. 899 t. II fig. 39; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 175; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 96; Sacc. Syll. Fung. II p. 640.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

7 RHOPOGRAPHUS Nitschke in Fuck. Symb. myc. (1869) p. 219; Sacc. Syll. Fung. II p. 647.

1 R. filicinus (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 219; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 174; Lamb. Fl. myc. II p. 398; Sacc. Syll. Fung. II p. 648.

Sphaeria - Fries Syst. myc. II (1823) p. 427.

Dothidea - Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 386.

N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

FAM. MICROTHYRIACEAE.

SECT. HYALODIDYMAE.

- 1 MICROTHYRIUM Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) p. 662; Sacc. Syll. Fung. II p. 662.
- 1 M. abietis Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 97.

 Lx.: Ébly (Él. M.).
- 2 M. Cytisi Fuck. Symb. myc. (1869) p. 98; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 229; Sacc. Syll. Fung. II p. 663.
 Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.).
- 3 M. epimyces Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 209.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 4 M. gramineum Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 241.

 Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).
- 5 M. Idaeum Sacc. et Roum, in Rev. myc. (1883) p. 238; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 229.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- M. Lunariae (Kunze) Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 53 fig. 18;
 Sacc. Syll. Fung. II p. 666; Lamb. Fl. myc. II p. 478.
 Leptothyrium Kunze in Kunze et Schmidt Myk. Hefte III (1825) p. 79.
 N.: Vallé du Bocq (Bm. et R.), (Bell).
- 7 M. microscopicum Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) p. 138 t. 14 fig. 1; Kiekx Fl. crypt. I p. 366; Bomm: et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 212; Lamb. Fl. myc. II p. 478.

Bt: Louvain, Corbeek-Dyle, Regenhoven, Wilsele (Paque), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. d'Ypres (West.). — N.: env. de Namur (Bell.).

8 M.xylogenum Sacc. Bomm. et. Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1791) p. 241.

Lg.: Stoumont (Bm. et R.).

SECT. PHAEODIDYMAE.

2 SEYNESIA Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 668.

1 S. pulchella Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 242. tx.: Ébly (Él. M.).

FAM. LOPHIOSTOMACEAE

SECT. PHAEODIDYMAE.

- 1 SCHIZOSTOMA Ces. et De Not. in Comm. Soc. critt. It. I (1861); Sacc. Syll. Fung. II p. 673.
- 1 S. ammophila Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 263.

 Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

SECT. HYALODIDYMAE.

- 2 LOPHIOSPHAERIA Trev. in Bull. Soc. de Bot. de Belg. t. XVI (1877) p. 20; Sacc. Syll. Fung. II p. 875.
- 1 L. subcorticalis (Fuck.) Trev. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.

t. XVI (1877) p. 20; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 231; Sacc. Syll. Fung. II p. 676. Zone ardenn. (Lamb.).

2 L. viticola Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 676. Leptosphaeria — Sacc. in Mich. I (1878) p. 335. Bt: Groenendael (Bm. et R.).

SECT. HYALOPHRAGMIAE.

- 3 LOPHIOTREMA Sacc. in Mich. I (1878) p. 338; Sacc. Syll. Fung. II p. 678.
- L. Cookei (Nitschke) Berl. et Vogl. in Sacc. Syll. Add. I-IV (1886)
 p. 425.

Bt: Auderghem (Bm. et R.).

L. Coryli Fabre Sphér. Vaucl. I (1880) p. 107 fig. 56; Sacc. Syll. Fung. II p. 681.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 L. crenatum (Pers.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 338.
 Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 54.
 Bt: Laeken (Bm. et R.).

4 L. Hederae (Fuck.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 338 et Syll. Fung. II p. 678; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 232. Lophiostoma — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 157.
N.: Yvoir (Bm. et R.).

5 L. myriocarpum (Fuck.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 338. Lophiostoma — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 156. Bt: Tervueren (Bm. et R.).

6 L. Origani (Kunze) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 684. Lophiostoma — Kunze Fungi sel. Exs. n. 97. N.: Yvoir (Bm. et R.).

7 L. phyllophilum Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 264.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

8 L. praemorsum (Lasch) Sacc. in Mich. I (1878) p. 513 et Syll. Fung. II p. 681; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 233.
Sphaeria — Lasch in Klotzsch-Rabenh. Herb. myc. n. 1249.
Lg.: env. de Liége (Mout.). — Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.).

9. L. pusillum Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 29 fig. 37; Sacc.
 Syll. Fung. II p. 682.
 N.: Hastière (Bm. et R.).

- 10 L. rubidum Sacc. Bomm. et Rouss. in Fl. myc. env. Brux. p. 199;
 Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 233.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 11 L. Scrophulariae (Peck) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 683.
 - var. cruentulum Bizz. Fung. Ven. nov. vel crit. (1885) p. 3.
 Lophiotrema Bizz. (ubi?).
 Lg.: Forêt, Tilff, Beaufays (Mout.).
- 12 L. semiliberum (Desm.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 338 et Syll. Fung. II p. 682; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 233. Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 78. Zone calc. (Lamb.).
- 13 L. sexnucleatum (Cooke) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 683. Lophiostoma — Cooke Handb. II (1871) p. 850 fig. 392. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 14 L. vagabundum Sacc. in Mich. I (1878) p. 447 et Syll. Fung. II
 p. 684; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 232.
 Lg.: Forêt (Mout.). N.: Hastière (Bm. et R.).
- 15 L. Winteri Sacc. in Mich. I (1878) p. 358 Fungi it. t. 360 et Syll.
 Fung. II p. 688.
 6t: Tervueren (Bm. et R.).

SECT. PHAEOPHRAGMIAE.

- 4 LOPHIOSTOMA Ces. et De Not. Schema Sfer. (1861) p. 45; Sacc. Syll. Fung. II p. 689.
- L. appendiculatum Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 29 fig. 8;
 Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 230; Sacc. Syll. Fung. II p. 706.
 Bt: Auderghem (Bm. et R.). Lg.: Ougrée, Jupille, Liége (Mout.).
- L. Arundinis (Fries) Ces. et De Not. Schema Sfer. (1861) p. 220;
 Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 198; Sacc. Syll. Fung. II
 p. 699; Lamb. Fl. myc. II p. 302.
 Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 510; Kickx Fl. crypt. I p. 338.
 Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). Fl. or.: env. de Gand (Kickx). —
- 3 L. Balsamianum De Not. Micr. ital. Dec. VIII (1838-56) fig. 7; Sacc. Syll. Fung. II p. 701; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 231. Zone ardenn. (Lamb.).

Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.).

4 L. Barbeyanum Sacc. et Roum. in Rev. myc. (1883) p. 237 t. 41 f. 15; Sacc. Syll. Fung. IX p. 1083; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 230. Zone ardenn. (Lamb.).

- 5 L. Bommerianum Sacc. et Roum. in Rev. myc. (1883) p. 238 t. 41 f. 16; Sacc. Syll. Fung. IX p. 1084; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 232.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 6 L. caulium (Fries) Ces. et De Not. Schema Sfer. (1861) p. 45; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 198; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 230; Sacc. Syll. Fung. II p. 697.
 Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 509.
 Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Dilbeek (Él. M.).
- 7 L. cespitosum Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 29 t. 9; Sacc.
 Syll. Fung. II p. 690; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 229.
 Lg.: Dolembreux (Mout.). N.: Hastières (Bm. et R.).
- 8 L. Desmazierii Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 441; Sacc. Syll. Fung. II p. 693; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 231.
 Bt: Tervuereu (Bm. et R.). N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 9 L. dumeti Sacc. in Mich. I (1878) p. 448 et Syll. Fung. II p. 690
 Fungi it. t. 224.
 Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 10 L. excipuliforme (Fries) Ces. et De Not. Schema Sfer. it. (1861) p. 45; Sacc. Syll. Fung. II p. 700; Lamb. Fl. myc. p. 301.
 Sphaeria Fries Syst. myc. II (1823) p. 469; Kicki Fl. crypt. I p. 338.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.).
- 11 L. insidiosum (Desm.) Ces. et De Not. Schema Sfer. (1861) p. 220; Sacc. Syll. Fung. II p. 703.
 Sphaeria Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) p. 16 t. 14.
 Lg.: Comblain-au pont (Bm. et R.), Dolembreux (Mout.).
- 12 L. intermedium Sacc. in Mich. I (1878) p. 322, Fungi it. t. 225 et Syll. Fung. II p. 704..

 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 13 L. macrostomum (Tode) De Not. Schema Sfer. it. (1861) p. 45; Sacc. Syll. Fung. II p. 700; Lamb. Fl. myc. II p. 300. Sphaeria — Tode Meckl. Fung. II (1791) p. 12 fig. 56; Kickw Fl. crypt. I p. 337.
 - N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Groenendael (Bm. et R.).
- 14 L. maculans Fabre Sphér. Vauel. (1880) p. 59 fig. 39; Sacc. Syll.
 Fung. II p. 691.
 N.: Hastière (Bm. et R.).

- 15 L. pileatum (Tode) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 158; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 231; Sacc. Syll. Fung. II p. 701. Sphaeria Tode Nachtr. II (1991) p. 13 fig. 18.
 Lg.: Gomzé (Mout.).
- 16 L. pseudo-macrostomum Sacc. in Mich. I (1878) p. 339 et Syll. Fung. II p. 695; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 230. Zone ardenn. (Lamb.).
- 17 L. quadrinucleatum Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 85; Sacc. Syll. Fung. II p. 689.
 N.: Yvoir, fond d'Auffe (Bm. et R.).
- 18 L. simile Nitschke sec. Rehm Asc. n. 483; Sacc. Syll. Fung. II p. 696.
 Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 19 L. simillimum Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 84; Sacc. Syll. Fung. IIp. 707.
 Lg.: Gomzé (Mout.).
- 20 L. vagans Fabre Sphér. Vauel. (1880) p. 103 fig. 48-49; Sacc.
 Syll. Fung. II p. 698.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).

SECT. DICTYOSPORAE.

- 5 LOPHIDIUM Sacc. in Mich. I (1878) p. 340 et Syll. Fung. II p. 710.
- L. compressum (Pers.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 340 et Syll. Fung. II. p. 711.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 56.

Lophiostoma — Ces. et De Not. Schema Sfer. it. (1861) p. 41; Lamb. Fl. myc. II p. 301.

Sphaeria angustata Pers. Syn. Fung. (1801) p. 55.; Lamb. Fl. myc. II p. 301. Lophiostoma — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 158.

N.: env. de Namur, Bouges (Bell.), Yvoir (Bm. et R.). — Lg.: Dolembreux, Forêt, Tilff, Liége (Mout.).

2 L. diminuens (Pers.) Ces. et De Not. Schema Sfer. (1861) p. 220; Sacc. Syll. Fung. II p. 714.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 57.

Sphaeria macrostoma var. — Desm Fl. crypt. fasc. 26 n. 1272; Kickx Fl. cpypt. I p. 338.

Fl.: occ. : env. de Courtrai (West.).

3 L. purpurascens Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 77.

Lg.: Près de Liége (Mout.).

4 L. subcompressum (Karst.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 712.

Mytilostoma — Karst. Myc. Fenn. VI (1871-76) p. 36.

Lg.: Comblain-au-pont (Rm. et R.).

FAN. HYSTERIACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

- 1 SCHIZOTHYRIUM Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1849) p. 360; Sacc. Syll. Fung. II p. 723.
- 1 S. Ptarmicae Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1849) p. 360; Kickw Fl. crypt. I p. 467; Sacc. Syll. Fung. II p. 724; Lumb. myc. II p. 473.

Lx.: Florenville (Bm. et R.).

SECT. PHAEOSPORAE.

- 2 FARLOWIA Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 727.
- F. repanda (Blox.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 727. Hysterium — Blox. in Duby Mém. Hyst. (1862) p. 27 t. I fig. 63. Bt: Groenendael (Bm. et R.).

SECT. HYALODIDYMAE.

- 3 AULOGRAPHUM Lib. Crypt. Ard. n. 272; Sacc. Syll. Fung. II p. 727.
- 1 A. maculare Berk. et Br. Brit. Fungi n. 968 t. 16 fig. 21; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 542; Sacc. Syll. Fung. II p. 730; Lamb. Fl. myc. II p. 463.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 A. Pinorum Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 314; Kickx Fl. crypt. I p. 466; Sacc. Syll. Fung. II p. 728; Lamb. Fl. myc. II p. 463.

Fl. occ. : Clemskerke (Kickx).

3 A. vagum Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 362; Kickx Fl. crypt. I p. 466; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 142;

- Sacc. Syll. Fung. II p. 727; Lumb. Fl. myc. II p. 462.
- 8t: Louvain, Eegenhoven, Héverlé. Zoetwater (Paque), Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.). Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).
 - 4 GLONIUM Muhl. Cat. Ann. (1813) p. 101; Sacc. Syll. Fung. II p. 731.
- 1 G. lineare (Fries) De Not. in Giorn. bot. it. II (1862) p. 594; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 141; Sacc. Syll. Fung. II p. 732; Lamb. Fl. myc. II p. 461.

Hysterium — Fries Syst. myc. II (1823) p. 383; Kickx Fl. crypt. I p. 463 Bt: N.-D.-au-bois (Él. M.). — Fl. occ.: Marcke (West.).

- 2 G. minusculum Sacc. et Penz. in Mich. II (1878) p. 609; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 237; Sacc. Syll. Fung. II p. 735. Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 G. nitidum Ellis in Grevillea VIII (1879-80) p. 12; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 236; Sacc. Syll. Fung. II p. 736. Zone argilo-sablonneuse (Lamb.).
- 4 G. striola (Fries) Karst. Myc. Feun. (1869) p. 260; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 236; Sacc. Syll. Fung. II p. 737.
 Hysterium Fries Elench. Fung. II (1828) p. 141.
 Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).
- 5 G. strobiligenum (Desm.) Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.
 t. XXVIII part. 2 (1890) p. 79.
 A.: Campine anversoise (Mout.).

SECT. PHAEODIDYMAE.

- 5 LEMBOSIA Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1845) p. 58; Sacc. Syll. Fung. II p. 741.
- 1 L. aulographoides Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 238.

 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 2 L. copromyxa Sacc. Bomm. et Rouss, in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 239.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).

SECT. PHAEOPHRAGMIAE.

- 6 HYSTERIUM Tode Fungi Meckl. II (1791) p. 4; Sacc. Syll. Fung. II p. 743.
- 1 H. angustatum Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 55; Sacc.

Syll. Fung. II p. 744; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 141. Hysterium pulicare var. angustum Fries Syst. myc. II (1823) p. 580; Kickx Fl. crypt. I p. 462.

Fl. or.: Gand (Kickx). - Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

- 2 H. ellipticum Fries Obs. myc. I (1815) p. 195; Sacc. Syll. Fung. II p. 746.
 - Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- H. Prostii Dub. Mém. Hyst. (1862) p. 26; Kickv Fl. I p. 463; Sacc.
 Syll. Fung. II p. 746; Lamb. Fl. myc. II p. 458.
 Fl. or.: Destelbergen (Coem.).
- 4 H. pulicare Pers. Syn. Fung. II (1801) p. 98; Kickx Fl. crypt. I p. 461; Sacc. Syll. Fung. II p. 743; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 141; Lamb. Fl. myc. II p. 459.

Hysterium striatum *Ohev.* Fl. env. Paris (1836) p. 433; *Kickx* Fl. crypt. I p. 462.

- N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Fl. or.: Ursele (Kickx). Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Meerdael (Paque). Fl. occ.: env. de Bruges (West.).
- var. subglobosum (Chev.) Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 462.
 H. pulicare var. -- Chev. Fl. env. Paris (1836) p. 433.
 Fl. or.: Gendbrugge (Coemans).
- var. Acerinum Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 744.
 Hysterographium West. in Herb. crypt. n. 927 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 89 pl. fig. 18.

Hysterium pulicare var. minus Coem. ex Kickx loc. cit. p. 462.

- Fl. occ. : Courtrai (Wall.). Fl. or. : Gand, Rooborst (Kickx).
- 5 H. Sambuci Schum. Saell. II (1803) p. 152; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 237; Sacc. Syll. Fung. II p. 754.

 Bt: Louvain (Paque).
- 6 H. vulgare De Not. Pir. Ister. (1847) p. 18; Sacc. Syll. Fung. II p. 745.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 7 MYTILIDION Duby Mém. Hyst. (1881) p. 62; Sacc. Syll. Fung. II p. 760.
- 1 M. fusisporum (Cooke) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 764.

 Lophium Cooke in Grevillea (Anno?)

 Lx.: Poix (Bm. et R.).

SECT. HYALOPHRAGMIAE.

- 8 GLONIELLA Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 705.
- 1 G. filicina (Lib.) Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 80.
 - f. Pieridis Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 80.
 Lg.: ? (Mout.).
- 2 G. Moliniae (De Not.) Sace. Syll. Fung. II (1883) p. 768. Hysterium -- De Not. in Comm. Soc. critt. it. II (1862) p. 491. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 3 G. pusilla Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part.
 2 (1890) p. 80.
 Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 4 G. Scortechiniana Sacc. et Roum. in Rev. Myc. (1883) p. 238 t. 41 f. 17; Sacc. Syll. Fung. IX p. 1112; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 238.
 Zone ardenn. (Lamb.).
 - 9 PSEUDOGRAPHIS Nyl. Herb. Fenn. p. 96 et in Karst. Myc. Fenn. I (1869) p. 31; Sacc. Syll. Fung. II p. 769.
- 1 P. elatina (Ach.) Nyl. Herb. Mus. Fenn. p. 96; Sacc. Syll. Fung. II p. 769.

Lichen - Ach. Lichen. Suecica Prodr. (1798) p. 22.

Hysterium — Pers. Syn. Fung. Add. p. XXVIII (1801); Lamb. Fl. myc. II p. 460.

Campine (Lamb.).

- 10 DICHAENA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 403; Sacc. Syll. Fung. II p. 771.
- D. faginea (Pers.) Fries Elench. Fung. II (1828) p. 141; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 140; Sacc. Syll. Fung. II p. 771.
 Opegrapha Pers. in Ust. Ann. bot. VII (1794) p. 32.
 Bt: Groenendael, La Hulpe (Bm. et R.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 2 D. quercina (Pers.) Fries Elench. Fung. II (1828) p. 141; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 140; Sacc. Syll. Fung. II p. 771. Opegrapha Pers. in Ust. Ann. bot. VII (1794) p. 31 t. 3 fig. Bi: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 3 D. strobilina Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 40; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 140; Lamb. Fl. myc. Supplém. I

p. 238; Sacc. Syll. Fung. II p. 771.

Bt: bois de la Cambre (Bm. et R.).

SECT. HYALODICTYAE.

- 11 GLONIOPSIS De Not. Pir. Ister. (1847) p. 23; Sacc. Syll. Fung. II p. 772.
- 1 G. biformis (Fries) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 773; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 239.

Hysterium — Fries Syst. myc. II (1823) p. 582.

Bi: Groenendael (Bm. et R.).

2 G. curvata (Fries) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 775; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 239.

Hysterium — Fries Elench. Fung. II (1828) p. 138; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 141.

Bt: Laeken, Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), entre Tervueren et Auderghem (Él. M.).

SECT. PHAEODICTYAE.

- 12 HYSTEROGRAPHIUM Corda Icon. Fung. V (1849) p. 34 ex p.; Sacc. Syll. Fung. II p. 776.
- H. Fraxini (Pers.) De Not. Pir. Ister. (1847) p. 22; Sacc. Syll. Fung. II p. 776.

Hysterium — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 98; Kickx Fl. crypt. I p. 463; Lamb. Fl. myc. II p. 461.

- N.: Yvoir (Bm. et R.), Bois d'Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). Ht: env. de Tournay (Dumortier). Bt: Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Louvain (Paque). Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). Fl. or.: env. de Gand (Kickx). Lg.: Beaufays (Mout.).
- 2 H. Rousselii (De Not.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 779; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 240.

Hysterium — De Not. Pir. Ister. (1847) p. 19. Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. SCOLECOSPORAE.

- 13 HYPODERMA DC. Fl. fr. II (1805) p. 304; Sacc. Syll. Fung. II p. 784.
- H. commune (Fries) Dub. Mém. Hyst. (1862) p. 41; Sacc. Syll.
 Fung. II p. 788; Kickx Fl. crypt. I p. 465; Bomm. et Rouss. Fl.

myc. env. Brux. p. 142; Lamb. Fl. myc. II p. 455.

Hysterium commune Fries Syst. myc. I (1823) p. 589.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.), — Bt: Watermael (Bm. et R.). — Fl. or.: env. d'Audenarde (West.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

2 H. conigenum (Pers.) Cooke Handb. II (1871) p. 710; Sacc. Syll. II p. 787.

Hysterium — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 102.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). - Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 3 H. Corni (Fries) De Not. Pir. Ister. (1847) p. 37; Kickw Fl. crypt. I p. 466; Sacc. Syll. Fung. II p. 787; Lamb. Fl. myc. II p. 457. Hysterium Fries Syst. myc. II (1823) p. 586.
 Flandres (Kickx).
- 4 H. Hederae (Mart.) De Not. Pir. Ister. (1847) p. 36; Lamb. Fl. myc. II p. 454; Sacc. Syll. Fung. II p. 784.

Hysterium — Mart. Fl. Erl. (1843) p. 472.

Hysterium foliicolum var. Hederae Fries Syst. myc. II(1823) p. 593.

- N.: Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). Bt: Gentinnes (de Limm.).
- 5 H. Scirpinum DC. Fl. fr. VI (1815) p. 166; Kickw Fl. crypt. I p. 465; Sacc. Syll. Fung. II p. 788; Lamb. Fl. myc. II p. 457. Hysterium Fries Syst. myc. II (1823) p. 590.

Lx.: Dohan (Bm. et R.). — Bt: Gentinnes (de Limm.). — Lh.: Genck (Bm. et R.). — Fl. or.: entre Exaarde et Moerbeke (Kickx). — N.: Coubry, Willerzie (Aub.).

6 H. virgultorum DC. Fl. fr. VI (1871) p. 165; Kickv Fl. crypt. I p. 464; Sacc. Syll. Fung. II p. 786; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 141; Lamb. Fl. myc. II p. 455.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Zoetwater (Paque).

- 14 LOPHODERMIUM Chev. Fl. Par. I (1836) p. 436; Sacc. Syll. Fung. II p. 791.
- 1 L. apiculatum (Fries) Duby Mém. Hyst. (1862) p. 47; Sacc. Syll. Fung. II p. 797.

Hysterium — Fries Syst. myc. II (1823) p. 593.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

2 L. Arundinaceum (Schrad.) Chev. Fl. Par. I (1836) p. 435; Kickx Fl. crypt. I p. 468; Sacc. Syll. Fung. II p. 795; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 142; Lamb. Fl. myc. II p. 450.

Hysterium — Schrad. Journ. f. die Bot. II (1799) p. 63.

Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — FI. occ.: env. d'Ypres (West.), env. de Nieuport (Kickx), Knocke (Bm. et R.). — Lg.: Tilff (Mout.).

L. Arundinaceum var. abbreviatum Rob. et Desm.; Kicka Fl. crypt. I p. 469; Sacc. Syll. Fung. II p. 795.

Hysterium culmigenum var. abbreviatum Desm.

- Fl. occ.: Nieuport, Blankenberghe (West.), Ostende (Bm. et R.). -- Bt: Gentinnes (de Limm.).
- var. gramineum (Fries) Kickæ Fl. crypt. I (1867) p. 469.
 Hysterium culmigenum var. -- Fries Syst. myc. II (1823) p. 591.

N.: env. de Namur (de Limm. et Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.).

3 L. Caricinum (Rob. et Desm.) Duby Mém. Hyst. (1862) p. 47; Sacc. Syll. Fung. II p. 797.

Hysterium — Rob. et Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847). p. 180.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 L. culmigenum (Fries) Karst. Fungi Spets. (1872) n. 28; Sacc. Syll. Fung. II p. 795.

Hysterium - Fries Syst. myc. II (1823) p. 591.

Bt: Gentinnes (de Limm.). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

5 L. herbarum (Fries) Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 50 fig. 15;
Sacc. Syll. Fung. II p. 798.

Hysterium - Fries Syst. myc. II (1883) p. 593.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

6 L. hysterioides (Pers.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 791.

Xyloma - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 106.

Hysterium foliicolum Fries Syst. myc. II (1823) p. 592.

Hypoderma xylomoides DO. Fl. fr. VI (1815) p. 164.

Lophodermium — Ohev. Fl. Par. I (1836) p. 487; Kickw Fl. crypt. I p. 467; Lamb. Fl. myc. II p. 452.

N.: Yvoir (Bm. et R.), Géronsart (Bell.). — Bt: Gentinnes (de Limm.). — Fl. or.: env. d'Audenarde, Gand (Kickx). — Lg.: Gomzé (Mout.).

7 L. Juniperinum (Fries) De Not. Pir. Ister. (1847) p. 40; Kickx Fl. crypt. I p. 468; Sacc. Syll. Fung. II p. 794; Lamb. Fl. myc. II p. 449.

Hysterium - Fries Syst. myc. II (1823) p. 588.

N.: Mariembourg, Hastière (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Bloemendael, Aeltre (Kickx).

8 L. melaleucum (Fries) De Not. Pir. Ister. (1847) p. 40; Lamb. Fl. myc. II p. 451; Sacc. Syll. Fung. p. 791.

Hysterium — Fries Syst. myc. II (1823) p. 582.

Lb.: Genck (Bm. et R.). — Lx.: Baraque de-Fraiture (Crép.). — Lg.: Francorchamp (El, M.).

 L. Oxycocci (Fries) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 244; Sacc. Syll. Fung. II p. 792.

Hysterium - Fries Syst. myc. II (1823) p. 588.

Lg.: Baraque-Michel (Bm. et R.).

- 10 L. petiolicolum Fuck. Symb. myc. (1869) p. 793; Lamb. Fl. myc. II p. 449; Sacc. Syll. Fung. II p. 793. Sine loco (Lamb.).
- 11 L. Pinastri (Schrad.) Chev. Fl. Par. I (1836) p. 430; Kickx Fl. crypt. I p. 468; Sacc. Syll. Fung. II p. 794; Bomm. et Rouss. Fl. env. Brux. p. 142; Lamb. Fl. myc. II p. 450.

Hysterium - Schrad. Journ. f. d. Bot. II (1799) p. 69 t. 3 fig. 4.

- Bt: Louvain, Héverlé, Gierle, Vosselaer (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). Fl. or.: Aeltre (Kickx). Lb.: Beverloo (West.). Fl. occ.: Clemskerke (Kickx). N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Lx.: Poix, Barvaux (Él. M.).
- 12 L. punctiforme (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 255; Lamb. Fl. myc. II p. 449; Sacc. Syll. Fung. II p. 793.

 Hysterium Fries Syst. myc. II (1823) p. 593.

 N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 13 L. Robergei (Desm.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 796. Hysterium — Desm. Nonv. not. (1843) p. 30. Bt: Gentinnes (de Limm.).
- 14 L. seriatum (Lib.) De Not. Pir. Ister. (1847) p. 47; Sacc. Syll. Fung. II p. 796.
 Hysterium Lib. Crypt. Ard. n. 371.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 15 L. tumidulum Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 240.
 A.: Westmalle (Bm. et R.).
 - 15 LOPHIUM Fries Syst. myc. II (1823) p. 533; Sacc. Syll. Fung. II p. 799.
- L. mytilinum (Pers.) Fries Syst. Myc. II (1823) p. 593; Lamb. Fl. myc. II p. 198; Sacc. Syll. Fung. II p. 799.
 Hysterium Pers. Syn. Fung. (1801) p. 97.
 Lx.: Poix, Ebly (Bm. et R.). Bt: Groenendael (Bm. et R.).
 - 16 SPOROMEGA Corda Icon. Fung. V (1842) p. 34 Sacc. Syll. Fung. II p. 801.
- 1 S. cladophila (Lév.) Duby Mém. Hist. (1862) p. 48; Bomm. et Rouss.

Fl. myc. env. Brux. p. 142; Lamb. Fl. myc. II p. 453; Sacc. Syll. Fung. II p. 801.

Hysterium cladophilum Lév. in Moug. et Nestl. n. 1243.

- Bt: Boitsfort (Bm. et R.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
 - 17 COLPOMA Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 422; Sacc. Syll. Fung. II p. 803.
- 1 C. Quercinum (Pers.) Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 423; Kicka Fl. crypt. I p. 469; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.; Sacc. Syll. Fung. II p. 803; Lumb. Fl. myc. II p. 454. Cenangium - Fries Syst. myc. II (1823) p. 189.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Linden (Leburt.) -N.: Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 18 OSTROPA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 401; Sacc. Syll. Fung. II p. 804.
- 1 O. cinerea (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 401; Lamb. Fl. myc. II p. 195; Sacc. Syll. Fung. II p. 804. Hysterium - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 99.

Bt: Bois de la Cambre (Mathieu). — Lg.: Beaufays (Mout.).

- 19 ROBERGEA Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 177; Sacc. Syll. Fung. II p. 806.
- 1 R. unica Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 177; Sacc. Syll. Fung. II p. 806.

Ostropa cubicularis Fuck. Symb. myc. (1869) p. 92 non Sphaeria cubicularis Fries sec. Sacc. loc. cit.; Lamb. Fl. myc. II p. 195.

Lg.: Beaufays (Mout.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 20 ACROSPERMUM Tode Meckl. Sel. I (1791) p. 8; Sacc. Syll, Fung. II p. 807.
- 1 A. compressum Tode Meck. Sel. I (1791) p. 8 t. II fig. 13; Kickx Fl. crypt. I p. 360; Sacc. Syll. Fung. II p. 807; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 142; Lamb. Fl. myc. II p. 197.

Clavaria herbarum Pers. (?)

- Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Groenendael (Bm. et R.), Zoetwater (Paque).
- 2 A. gramineum Lib. Crypt. Ard. n. 33; Kicka Fl. crypt. I p. 361; Sacc. Syll. Fung. II p. 807; Lamb. Fl. myc. II p. 197.

Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.). - Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — Fl. occ.: Ostende (West.).

FAM. PYRENOLICHENES.

EPHEBEAE.

- 1 SPILONEMA Bornet in Mém. Soc. Cherb. IV (1856) p. 226; Crombie Brit. Lich. I p. 19.
- S. paradoxum Bornet in Mém. Soc. Cherb. IV (1856) p. 226 t. I fig. 2.
 Lx.: Bouillon, Mortehan, Frahan (Del.).
 - 2 EPHEBE Fries Pl. Hom. (1825) p. 256.
- E. pubescens (L.) Nyl. Syn. I (1858) p. 90 t. II fig. 1, 17-20;
 Crombie Brit. Lich. p. 28:

Lichen — L. Fl. Suec. (1745) n. 1126 p. p. Lx.: Frahan (Del.).

DACAMPIEAE.

- 3 PLACIDIOPSIS Beltr. Lichen. Bassanese (1858) p. 213.
- 1 P. Custnani (Mass.) Koerb. Parerga (1869) p. 305.

Placidium -- Mass. Sert. lichen. (1856).

- N.: Lenne, entre Waulsort et Hastière-Lavaux (Tonglet).
 - 4 ENDOPYRENIUM Flotow ex Schuch. in Bot. Zeit. (1855) p. 131.
- E. pusillum Koerb. Syn. Lich. Germ. (1855) p. 1323 p. p.; Kickx
 Fl. crypt. I p. 280.

Endocarpon rufescens var. trapeziforme Anzi Cat. 103.

Endocarpon hepaticum Ach. Lich. univ. (1810) p. 298.

Endocarpon Hedwigii Ach. Lich. univ. (1810) p. 298.

Lg.: env. de Huy (M.), entre Esneux et Hout-si-Plout (Gravis), Sougnez (Del.). — N.: Orchimont (Aub.), env. de Couvin (G. L.), Olloy (Aigret), env. de Dinant (Tonglet), Hastière (Dens et Piet.), Bouges et env. (Bell.). — Fl. or.: Gand (Coem.).

- 5 DERMATOCARPON Eschweiler Syst. Lich. (1824) p. 21.
- 1 D. pallidum (Ach.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 264.

Endocarpon - Ach. Lich. univ. (1810) p. 301.

N.: Moniat, Leffe, Bouvignes, entre Waulsort et Onhaye (Tonglet).

VERRUCARIEAE.

- 6 THELIDIUM Mass. Framm. Lich. (1855) p. 15.
- 1 T. absconditum Krempell.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 269.
 N.: Bouvignes (Tonglet).

7 VERRUCARIA Wigg. Prim. fl. Holsat. (1780) p. 85.

1 V. anceps Kremp. ex Koerb. Parerg. (1865) p. 378; Kicka Fl. crypt. I p. 285; Sydow Flecht. Deutschl. p. 288. Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx).

V. biformis Borr. in Engl. Bot. Suppl. I (1829) t. 2617 fig. 1.
 Acrorordia — Borr.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 293.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

3 V. calciseda DC. Fl. fr. II (1805) p. 317.

V. rupestris var. — Nyl.; Kickx Fl. crypt. I p. 285.
N.: env. de Dinant, fréquent (Tonglet). — Fl. or.: Gand (Kickx).

- 4 V. calcivora Nyl. Lich. Pyren. or. (1891) p. 27.
 - var. belgica Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 429.

N.: Hastière-Lavaux (Tonglet).

- V. cinerea-pruinosa Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 221.
 N.: Bouvignes, Waulsort (Tonglet).
- 6 V. conoidea Fries Lich. Eur. (1860) p. 432 p. p.

Acrocordia — Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 358; Sydow Flecht. Deutsch. p. 293.

Sagedia - Hepp Eur. ?

N.: Waulsort (Dens et Piet.), env. de Dinant (Tonglet), Olloy (Aigret et Franç.), entre Samson et Goyet (Delhaise), Olloy, Montagne-au-buis (G. L.).

- 7 V. dionantensis Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 430.
 - N.: Leffe (Tonglet).
 - var. lecideiformis Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 430.

N.: Bouvignes (Tonglet).

- 8 V. Dufourei DC. Fl. fr. II (1805) p. 318; Sydow Flecht. Deutschl. p. 285.
 - A.: env. d'Anvers (West. et Van Haes.). N.: Houx, Anseremme (Tonglet).
- 9 V. gemmata Ach. Meth. Lich. (1803) p. 120.

Pyrenula — Hepp Flecht. Eur. II n. 104; Kickx Fl. crypt. I p. 285. Acrocordia — Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 356; Sydow Flecht. Deutschl. p. 292.

Fl. occ.: Ypres (West.), env. de Fnrnes (Kickx). — Bt: Ruysbroeck (West. et Van Haes.), Nivelles (Dens et Piet.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht: Chimay (G. L.).

— — var. alba (Schrad.).

Verrucaria - Schrad. Spic. Fl. Germ. (1794) p. 109 t. 2 fig. 3; Schaer.

Lich. Eur. p. 319.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

10 V. fuscella (Turn.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 215.

Lichen - Turn. in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 90 t. 8 fig. 2.

Sagedia - Fries Lich. Eur. (1860) p. 412.

Lithoicea — Mass. Mém. (1853) p. 142; Sydow Flecht. Deutschl. p. 283.

Verrucaria subfuscella Nyl. Scand. (1861) p. 271.

N.: Anseremme, Bouvignes, Dinant, Moniat, Waulsort (Tonglet). — Lx.: Frahan (Del.).

— var. glaucina (Ach.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 215.

Verrucaria — Ach. Syn. (1814) p. 335.

Lithoicia fuscella var. — Sydow Flecht. Deutschl. p. 283.

N.: Hastière, Moniat, Dinant, Bouvignes (Dens et Piet.).

11 V. hymenogonia Nyl. (?) (1881) p. 540.

- f. minor Nyl. in Lojka Lich. Hung. exsic. n. 103.
 - N.: Herbuchenne (Dinant) (Tonglet).
- — f. nubilata Nyl.

Verrucaria — Nyl. Lich. Pýr. or. (1891) p. 21.

N.: Houx (Tonglet).

12 V. integra Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 376.

N.: Bouvignes (Tonglet).

— var. elaeodes Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 430.

N.: Bouvignes, Anhée (Tonglet).

13 V. Mortarii Arn. in Lamy Cat. Lich. Mont-Dore p. 162.

N.: Hastière (Tonglet).

14 V. muralis Ach. Meth. (1803) p. 115; Schaer. Lich. Eur. p. 218; Sydow Flecht. Deutschl. p. 287.

V. ruderum DC. in Herb. Duf. sec. Schaer. Lich. Eur. p. 219.

N.: Anseremme (Tonglet). — Bt: Virginal, Chateau de La Motte à Court-St-Étienne (Dens et Piet.).

15 V. muscicola var. moniacensis Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 431.

N.: Moniat (Tonglet):

16 V. myriocarpa Hepp; Sydow Flecht. Deutsch. p. 288.

N.: Samson (J. M.), Anseremme (Tonglet), Couvin (G. L.).

— — var. tersa (Koerb.).

Perenula gemmata var. — *Kickv* Fl. crypt. I (1867) p. 286. Acrocordia — *Koerb*. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 350.

Fl. occ.: Dixmude (Kickx.).

17 V. nigrescens Pers. in Ust. Ann. XIV p. 36; Kicka Fl. crypt. I p. 244.

Lithoicea — Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 282.

Pyrenula - Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 210.

Verrucaria subnigrescens Nyl. sec. Sydow loc. cit.

N.: Beaumont, Couvin, Dinant (G. L.), Samson, Mosseroux (J. M.), Houx (Tonglet). — Lg.: Esneux (G. L.). — Flandres (Kickx).

- var. areolata (Schaer.)

Pyrenula nigrescens var. — Schaer. Enum. Lich. Eur. (1855) p. 210. Verrucaria nigrescens var. controversa Kickx Fl. crypt. I p. 284.

Fl. or.: Gand (Kickx).

var. macrostoma (Duf.) Nyl.; Kickx Fl. crypt. I p. 284.
 Verrucaria — Duf. in DC. Fl. fr. II (1805) p. 319.
 Lithoicea — Sydow Flecht. Deutschl. p. 281.

Fl. or.: Entre Zevecote et Ghistelles (Kickx).

- 18 V. pinguis West. in Bull. Ac. de Belg. t. XII, 2 (1845) p. 241. Fl. occ.: Mont de Fraises (Ypres) (West.).
- 19 V. plumbea Ach. Syn. (1814) p. 54; Sydow Flecht. Deutschl. p. 285.

N.: Bouvignes, entre Waulsort et Onhaye (Tonglet).

- 20 T. polysticta Borr. in Engl. Bot. Suppl. II (1832) t. 2741; N.: Hastière-par-delà, Heer, Moniat (Tonglet).
- 21 V. purpurascens Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 217.
 N.: Bouvignes, Champalle, Dinant, Moniat (Tonglet).
- 22 V. rupestris Schrad. Spic. Fl. Germ. (1794) p. 109; Schaer. Lich. Eur. p. 217; Kickx Fl. crypt. I p. 284; Sydow Flecht. Deutschl. p. 285.
 - N.: Samson, Marche-les-Dames, Mosseroux (J. M.), Hastière, Anthée, Onhaye, Waulsort (Dens et Piet.), env. de Dinant (Tonglet). Fl. or.: Renaix (Kickx). Ht: Beaumont (G. L.).
- 23 V. Sprucei Church. Babingt. ap. Leighton Brit. Lich. (?) p. 54.
 N.: Fond des Rivaux (Tonglet).
- 24 V. Tongleti Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 430.
 N.: Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).
- V. umbrosa (Mass.) Stiz. Lich. helvet. p. 244.
 Thelidium Mass. in Lotos (1856) p. 81.
 N.: Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).
- 26 V. vicinalis Arn. Lichen. Ausfl. in Tirol XX p. 377.
 N.: Dréhance (Tonglet).
- 27 V. viridula (Schrad.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 215.
 Endocarpon Schrad. Spic. Fl. Germ. (1794) t. 2 fig. 41.

Lithoicea viridula Mass. Mem. Lich. (1853) p. 142; Sydow Flecht. Deutschl. p. 284.

Verrucaria nigrescens var. — Nyl.; Kickx Fl. crypt. I p. 284. Fl. or.: Gand (Coem.).

8 POLYBLASTIA Mass. Mém. Lich. (1853) p. 147.

P. rufa Mass. loc. cit. (1853).
 N.: Dréhance (Tonglet).

PYRENILEAE.

9 SAGEDIA Ach. Lich. univ. (1810) p. 71.

1 S. carpinea (Pers.) Mass. Ricerch. (1852) p. 160; Sydow Flecht. Deutsch. p. 300.

Verrucaria - Pers. in Ach. Meth. (1810) p. 120.

Arthopyrenia - Müll.-arg.

Bt: Nivelles (Dens et Piet.).

2 S. chlorotica (Ach.) Mass. Ricerch. (1852) p. 159; Sydow Flecht. Deutschl. p. 298.

Verrucaria - Schaer, Enum. Lich. Eur. (1850) p. 213.

Lithoicea - Hepp; Sydow Fl. Deutschl. p. 284.

Verrucaria macularis Wallr. Crypt. Germ. I (1833) p. 304?

N.: Houx, Champalle (Tonglet). -- Lg.: entre Poulseur et Esneux (G. L.). -- Lx.: Neufchâteau, Nolinfaing, Longlier (Verheggen).

3 S. persicina Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 364; Sydow Flecht. Deutschl. p. 298.

Sagedia Harrimanni Mass. Ricerch. sull. auton. dei Licheni (1852) p. 160. Lx.: Frahan (Del.).

10 PYRENULA Ach. Lich. univ. (1810) p. 64.

1 P. laevigata Pers.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 302.

P. glabrata (Ach.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 360; Kicke Fl. crypt. I p. 286. Verrucaria — Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 222.

Fl. or. : Renaix (Kickx).

2 P. leucoplaca (Wallr.) Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 361; Kicka Fl. crypt. I p. 286; Sydow Flecht. Deutschl. p. 303.

Verrucaria — Wallr. Crypt. Germ. I (1833) p. 299 p. p.

Verrucaria cinerea Kickx Rech. cent. II (1843) p. 24.

Fl. occ.: env. d'Ypres (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Coem.), St-Gilles-Waas (Kickx).

3 P. nitida (Schrad.) Ach. Lich. Eur. (1850) p. 212; Kickw Fl. crypt. I p. 287; Sydow Flecht. Deutschl. p. 302.

Verrucaria — Schrad. Jour. d. Bot. (1801) p. 79; DO. Fl. fr. II p. 316.

Lx.: Neufchâteau, Nolinfaing, Straimont (Verheggen). — Fl. or.: Rooborst (Kickx). — Bt: Bois de la Cambre, Rouge-Cloître (A. D.), Woluwe-St-Pierre (Nob.), Héverlé (Paque). — Ht: Gallaix (G. L.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

P. nitida var. nitidella (Floerke) Schaer. Lich. Eur. (1858) p. 212;
Kicka Fl. crypt. I p. 287; Sydow Flecht. Deutsch. p. 302.

Verrucaria nitida var. - Floerke Deutsch. Lich. (1815) p. 9 n. 10.

FI. occ.: env. d'Ypres (West.). — FI. or.: Swynaarde (Coem.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 11 ARTHOPYRENIA Mass. Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 165.
- 1 A. analepta (Ach.) Mass. Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 165; Sydow Flecht. Deutschl. p. 294.

Verrucaria - Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 221.

Lichen - Ach. Prodr. (1798) p. 15.

Lx.: Rochehaut (Del.).

- 2 A. Cerasi (Schrad.) Mass. Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 167; Kickw Fl. crypt. I p. 288; Sydow Flecht. Deutschl. p. 296). Verrucaria — Schrad. fide Ach. Lich. Univ. (1810) p. 276. Pyrenula — Hepp. (ubi?)
 - Fl. or.: Renaix (Coem).
- 3 A. fraxinea Mass. Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 167; Kickx Fl. crypt. I p. 288; Sydow Flecht. Deutschl. p. 295. Fl. or.: Zwynaarde (Coem.).
- 4 A. ryponta (Ach.) Mass. Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 166.

Verrucaria — Ach. Lich. univ. (1810) p. 262.

Sine loco (West. et Van Haes.).

- 12 LEPTORHAPHIS Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 371.
- 1 L. epidermidis (Ach.) Sydow Flecht. Deutsch. (1887) p. 301.

Lichen - Ach. Prod. (1798) p. 16.

Verrucaria - Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 219.

Arthopyrenia — Kicka Fl. crypt. I (1867) p. 288.

Verrucaria - var. albissima Ach. Lich. univ. 1810 p. 276.

V. albissima Nyl. Scand. (1861) p. 282.

Ht: Leuze, Gallaix. Blicquy (G. L.). — Fl. or.: Gand (Kickx). — Lx.: Neufchâteau, Longlier, Hamipré (Verheggen). Maissin (Aigret et Dolisy). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Dinant (Tonglet). — Bt: Nivelles. Moustreux, Arquennes (Dens et Piet.).

2 L. oxyspora Nyl. Obs. ad Syn. Lich. Holm. n. 10; Kickw Fl. crypt. I p. 289.

Verrucaria oxyspora Nyl. Pyrenoc. (1858) p. 61. Flandres (Kickx).

13 MICROTHELIA Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 372.

1 M. scabrida Lahm ex Koerb. Parerg. (1865) p. 399; Sydow Flecht. Deutschl. p. 271.

Lg.: Poulseur (G. L.).

14 AMPHORIDIUM Mass. in Flora (1852) p. 593.

A. Leightonii Mass. loc. cit.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 279.
 N.: Dréhance (Tonglet).

ENDOCARPEAE.

15 ENDOCARPON Hedw. Stirp. crypt. II (1789) p. 56 t. 20.

1 E. aquaticum (Weiss) Sydow Flecht. Deutsch. (1887) p. 67.

Lichen - Weiss Fl. crypt. Gott. (1770) p. 77.

E. miniatum var. - Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 232.

E. fluviatile (Web.) DO. Fl. fr. II (1805) p. 413.

Lx.: Nolinfaing, Straimont (Verheggen), env. de Bastogne (Germain), Vallée des Tombes, Laroche (Él. M.), Vielsalm (Aigret), Bouillon (Dens et Piet.), Mortehan, Les Hayons, Frahan (Del.). — N.: Olloy (Aigret). — Lg.: Challes (Aigret).

2 E. Guepini Moug. in Fries Lich. Eur. (1831) p. 410; Sydow Flecht. Deutschl. p. 68.

Lx.: Frahan (Del.).

3 E. leptophyllum Ach. Meth. (1803) p. 127.

Lichen - Ach. Prodr. (1798) p. 141.

Endocarpon miniatum var. - Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 232.

Lx.: env. de Bastogne (Van Bastelaer).

4 E. miniatum (L.) Ach. Syn. Meth. Lich. (1814) p. 101; Sydow Flecht. Deutschl. p. 67.

Lichen — L. Spec. pl. (1763) p. 1617.

tg.: Statte, Modave (G. L.), Petit-Modave (M.). — N.: Samson, Mosseroux (J. M.), Louette-St-Pierre (Aub.), Montaigle, Burnot, Warnant, Bauche, Argenteau (Él. M.). — tx.: Straimont (Verheggen), Laroche (Troch et G. L.). — N.: Marche-les-Dames, La Plante (Paque), Olloy (Aigret et Franç.), Bouvignes (Tonglet), Belvaux (Aigret), Amée, Bouges (Bell.).

- var. complicatum (Sw.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 232. Lichen - Sw. in N. Act. Ups. IV p. 250.

N.: Spontin (Él. M.), Olloy (Aigret), Hastière, Anthée (Dens et Piet.). — Lx.: Straimont (Verheggen), route de Bastogne, Queue de Vache, Laroche (El. M.).

16 LENORMANDIA Delise in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1844) p. 159.

1 L. Jungermanniae Delise loc. cit. (1844); Sydow Flecht. Deutschl. p. 68.

Normandina - Nyl. (?).

N.: Olloy (Aigret et Franç.).

SPHAEROPHOREAE.

- 17 SPHAEROPHORUS Pers. in Ust. Ann. d. Bot. VII (1794); Crombie Brit. Lich. I p. 103.
- S. compressus Ach. Meth. (1803) p. 135; Crombie Brit. Lich. I p. 104.
 S. melanocarpus Schaer. Spic. (1823-42) p. 243.
 Lx.: Bois de Rolle (Germain).
- 2 S. coralloides Pers. in Ust. Ann. VII (1794) p. 23; Crombie Brit Lich. I p. 104.

Lg.: env. de Stavelot (Aigr. et Dolisy). — Lx.: env. de Neufchâteau (Verheggen), Maissin (Aigr. et Dolisy), Dohan (Dens et Piet.), Laroche (G. L.), Bouillon, Frahan, Rochehaut (Del.). — N.: Gedinne, Louette-St-Pierre, Graide (Aub.). — Lg.: Heyd (Aigret).

3 S. fragilis (L.) Ach. Meth. (1803) p. 135; Crombie Brit. Lich. I p. 104.

Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1159.

Lg.: env. de Stavelot (Aigret). — Lx.: Villance, Framont (A. D.), Laroche, entre Villez et Maboge (Dens et Piet.).

GEN. DUB.

LEPRA Hall. Helvet. II (1768) p. 102; Schaer. Enum. Lich. eur. p. 239 in App.

1 L. flava DC.; Kickx Fl. Louv. p. 106.

Lichen - L.

Bt: env. de Louvain (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Warnant (Tonglet).

- 2 L. lactea Wigg.; Kickx Fl. Louv. p. 106. Bt: env. de Louvain (Kickx).
- 3 L. rubens Hoffm.; Kickx Fl. Louv. p. 106.

Lepra cinnabarina Baumg.; Lichen - Hag.

Bt: env. de Louvain (Kickx).

4 L. sulphurea Dub.; Kickx Fl. Louv. p. 106. Bt: env. de Louvain (Kickx).

SPILOMA 379

SPILOMA Ach. Meth. Lich. (1808) p. XXXIX, 9.

1 S. viridans Schaer. in Naturw. Anz. Wintermonat (1821) p. 34. Fl. occ.: Ypres (Wall.). — Bt: env. de Louvain (Coem.).

CONIOCARPON DC. Fl. fr. II (1805) p. 323.

1 C. olivaceum DO. Fl. fr. II (1805) p. 323.

Spiloma - Ach. ?

Fl. occ.: env. d'Ypres (Wall.).

Discomycetineae.

FAM. HELVELLACEAE.

SUBFAM. MORCHELLAE.

- 1 MORCHELLA Dill. Nov. Gen. (1719) p. 74; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 8.
- M. conica Pers. Comm. (1800) p. 257; Kickx Fl. crypt. I p. 505;
 Sacc. Syll. Fung. VIII p. 9; Lamb. Fl. myc. II p. 587.
 Lb.: Mall, Sluze (Paque). Fl. or.: env. de Renaix (Kickx).
 - var. acuminata Kickw Fl. crypt. I (1867) p. 505; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 9.
 - FI. or.: Gand (Scheidweiler).
- 2 M. esculenta (L.) Pers. Syn. Fung. (1801) p. 618; Kickx Fl. de Louvain. p. 132; Kickx Fl. crypt. I p. 504; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 118; Lamb. Fl. myc. II p. 586; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 8.
 - Bt: Groenendael, Boendael, parc de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Bruxelles (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque). Fl. or.: env. de Sottegem et d'Heldergem (Kickx). Lb.: Mall, Sluse, env. de Tongres (Paque). —— Lg.: Visé (Paque).
 - var. rotunda Fries Syst. myc. II (1823) p. 6; Kickx Fl. crypt. I p. 504; Sacc. loc. cit. p. 9.
 - Fl. or.: Gendbrugge (Scheidweiler). Lb.: Mall, Sluze, env. de Tongres (Paque).
 - var. minima Wein.; Kickv Fl. crypt. I p. 604. Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx).
- 3 M. crassipes (Vent.) Pers. Syn. Fung. (1801) p. 621; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 12; Bomm et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 118;

Lamb. Fl. myc. II p. 589.

Phallus crassipes Vent. in Mém. Mus. (?) p. 589 f. 2.

Bt: Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

4 M. hybrida Pers. Syn. Fung. (1801) p. 620; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 13.

Morchella semilibera DC. Fl. fr. II (1805) p. 212; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 118.

Bt: Bois de la Cambre (Kickx), Groenendael (Bm. et R.).

- 2 GYROMITRA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 346; Succ. Syll. Fung. VIII p. 15.
- 1 G. esculenta (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 346; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 16.

Helvella - Pers. Comm. (1800) p. 220 t. 4.

Lg. : Angleur (Mout.).

- 3 HELVELLA L. Spec. pl. (1763) p. 1648; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 17.
- 1 H. atra König. Fl. Isl. (?) p. 20; Kicka Fl. crypt. I p. 503; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 27; Lamb. Fl. myc. II p. 585? Fl. or.: env. d'Ypres (Wall.).
- 2 H. crispa (Scop.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 14; Kicke Fl. crypt. I p. 504; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 18; Lamb. Fl. myc. II p. 583; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 117.

Phallus — Scop. Carn. II (1772) p. 475.

Bt: Bois de la Cambre (Vervoort), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). —
Fl. occ.: env. d'Ypres (Kickx). — Fl. or.: Melle, Gand (Kickx), Lemberge (Coem.).

- var. Grevillei Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 504. Fl. or.: Exacrde (Kickx).
- var. incarnata Fries Syst. myc. II (1822) p. 14; Kickv Fl. crypt. I p. 504.

 Fl. occ.: env. de Thourout (Kickx).
- 3 H. elastica Bull. Herb. Fr. (1785) t. 242; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 118; Lamb. Fl. myc. II p. 585; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 24.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.). — Lg.: env. de Verviers (Lamb.), Beaufays, Tilff (Mout.).

4 H. ephippium Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) p. 240 t. 16 fig. 7; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 28; Bomm. et Rouss. Fl. myc.

env. Brux. p. 118.

Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

- 5 H. lacunosa Afzel. in Vet. Ac. Handl. (1783) p. 303; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 118; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 19; Lamb. Fl. myc. II p. 584.
 - Lg.: env. de Verviers (Lamb.), Tilff (Mout.). Bi: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 6 H. Ludovicae Kickw Fl. crypt. I (1867) p. 503; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 20; Lamb. Fl. myc. II p. 586.
 Fl. or.: Gand (Kickw).
- 7 H. macropus (Pers.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 37; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 28.

Peziza — Pers. Obs. II (1796) p. 26 t. I f. 2; Kickv Fl. crypt. I p. 496; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Macropodia — Fuck.; Lamb. Fl. myc. II p. 577.

Bt: Bois de la Cambre, Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or.: Ursele, Oosterzeele (Kickx). — Fl. occ.: Woesten (Ypres) (Kickx).

8 H. Monachella (Scop.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 18; Kicke Fl. crypt. I p. 503; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 22; Lamb. Fl. myc. II p. 584.

Fl. or. : Aeltre (Kickx).

- 9 H. sulcata Afz. in Vet. Ac. Handl. (1783) p. 305; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 20; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 118. Bt: entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).
 - 4 VERPA Sw. in Vet. Ak. Handl. Stockh. (1815) p. 129; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 29.
- 1 V. digitaliformis Pers. Myc. Eur. (1822-28) p. 202 t. 7 fig. 1-3; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 29; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 118; Lamb. Fl. myc. II p. 582.

Bt: Auderghem (Bm. et R). - Lg.: Liége (Lamb.).

2 V. helvelloides Krombh. Nat. Abbild. Beschreib. d. Schwämme Heft VIII (1838-47) p. 27 t. V f. 36; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 31. Verpa Krombholzii Corda in Sturm Deutschl. Fl. II (1813) f. 1; Kicka Fl. crypt. I p. 502; Lamb. Fl. myc. II p. 582.

Fl. occ.: entre Blankenberghe et Heyst (Kickx).

SUBFAM. GEOGLOSSAE.

- 5 MITRULA Fries Syst. myc. I (1822) p. 491; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 33.
- 1 M. eucullata Fries Epicr. (1836-38) p. 384; Sacc. Syll. Fung. VIII

p. 33; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 119.

Elvella cuculiata Batsch Elench. Fung. Cont. I (1786) p. 1 fig. 132.

Verpa ferruginea Wallr. Comp. Fl. Germ. t. 1V (1833) p. 549.

Lg.: Beaufays (Mout.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.). — Lx.: Mirwart (Él. M.).

2 M. olivacea (Pers.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 38.

Geoglossum — Pers. Obs. myc. I (1796) p. 40 t. V f. 7.; Lamb. Fl. myc. II p. 580.

Lg.: Bois Fierraind (Verviers) (Lamb.).

3 M. phalloides (Bull.) Ohev. Fl. Par. (1836) p. 114; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 33.

Clavaria - Bull. Champ. (1789) p. 214 t. 463 f. 3.

Mitrula paludosa Fries Syst. myc. I (1821) p. 491; Lamb. Fl. myc. II p. 579; Kickx Fl. crypt. I p. 501.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Oisquercq (J. M.). — Fl. or.: Bloemendael (West.), entre Wetteren et Clerscamp (Kickx). — Lb.: Lanaeken (Gravis). — Lg.: env. de Liége (Mout.), Spa (Nypels).

4 M. viridis (Pers.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 29; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 38.

Geoglossum — Pers. Comm. (1800) p. 40; Kickx Fl. crypt. I p. 501; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 119.

Leotia — Fuck. Symb. myc. (1869-70) p. 284; Lamb. Fl. myc. II p. 501.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Boitsfort, Groenendael, Auderghem (Bm. et R.).

Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx). — N.: Marche-les-Dames (Bell.). — Lx.: Awennes (Él. M.).

- 6 GEOGLOSSUM Pers. Obs. myc. I (1795) p. 11; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 42.
- 1 G. difforme Fries Obs. myc. I (1815) p. 159; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 44; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 119; Lamb. Fl. myc. II p. 581.

Bt: Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

- 2 G. glutinosum Pers. Obs. I (1795) p. 11; Kickx Fl. crypt. I p. 500; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 42; Lamb. Fl. myc. II p. 531. Fl. or.: Sleydinge (Kickx).
- 3 G. hirsutum Pers. Comm. (1800) p. 37; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 46; Lamb. Fl. myc. II p. 581.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — Lg.: env. de Verviers (Lamb.), Beaufays (Mout.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

4 G. ophioglossoides (L.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 43.
Clavaria — L. Sp. pl. II (1763) p. 1652.

- Geoglossum glabrum Pers. Obs. II (1799) p. 61; Kickx Fl. de Louv. p. 177; Kickx Fl. crypt. I p. 500; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 119; Lamb. Fl. myc. II p. 581.
- Bt: Linkebeek, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Pellenberg, Auderghem (Kickx). Fl. occ.: env. d'Ostende (Mac Leod). N.: Marcheles-Dames, citadelle de Namur (Bell.).
 - 7 SPATHULARIA Pers. Tent. disp. (1797) p. 3; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 48.
- 1 S. clavata (Schaeff.) Sacc. in Mich. II (1879) p. 77 et Syll. Fung. VIII p. 48.

Elvella — Schaeff. Fung. Bavaria (1774) p. 149.

- Spathularia flavida *Pers.* Comm. fung. clav. (1797) p. 34; *Lamb.* Fl. myc. II p. 580; *Kickx* Fl. crypt. I p. 501; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118.
- Bt: Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). Fl. or.: Renaix (Musiekberg) (Coem.). Lg.: Beaufays, Gomzé (Mout.). Lx.: Ébly (Él. M.).
 - 8 VIBRISSEA Fries Syst. myc. II (1822) p. 31; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 51,
- 1 V. truncorum (Alb. et Schwein.) Fries Syst. Myc. II (1823) p. 31;
 Sacc. Syll. Fung. VIII p. 51; Lamb. Fl. myc. II p. 579.
 Leotia Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1865) p. 297 t. 3 f. 2.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.), Dolembreux (Mout.).

FAM. PEZIZACEAE.

SECT. HYALOSPORAE

- 1 RHIZINA Fries Obs. myc. I (1815) p. 161; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 57.
- 1 R. inflata (Schaeff.) Quél. Ench. Fung. (1815); Sacc. Syll. Fung. VIII p. 57.

Elvella - Schaeff. Fung. Bavaria (1774) t. 153.

Rhizina undulata Fries Obs. I (1815) p. 101; Lamb. Fl. myc. II p. 578; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 119.

- 8t: Rixensart, Élewyt, Beggynendyck (Él. M.), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). Lg.: (Lamb.).
 - 2 ACETABULA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 339; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 59.
- 1 A. sulcata (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 230; Lamb. Fl. myc. II p. 574; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 62.

Peziza sulcata Pers. Syn. Fung. (1801) p. 643 t. 5 f. 1.

Lg.: (Lamb.).

2 A. vulgaris Fuck. Symb. myc. (1869-70) p. 330; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 59.

Peziza acetabulum L. Sp. pl. II (1763) p. 1650; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 121.

- Bt: Uccle (Bm. et R.). Lg.: Beaufays (Mout.).
 - 3 GEOPYXIS Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 42; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 63.
- 1 G. ammophila (Dur. et Lev.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 70. Peziza — Dur. et Lev. in Bory et Durieu Expl. Algér. (1850) t. 28 f. 2. Tarzetta — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 325.

Fl. occ. : entre Mariakerke et Ostende (Bm. et R.).

2 G. arduennensis (Él. March.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 70. Peziza — Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 69.

Tarzetta — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 325.

Ardennes (Él. M.).

3 G. carbonaria (Alb. et Schwein.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 71.
Peziza — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 314 t. IV f. 2.
Tarzetta — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 325.

Lg.: Abondant (Lamb.).

4 G. cupularis (L.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 72.

Peziza — L. Fl. Suec. (1745) n. 1273; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Tarzetta — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 570.

Bt: Auderghem, Watermael, Bois de la Cambre (Bm. et R), Eegenhoven (Paque). — Lg.: (Lamb.).

- 4 PEZIZA Dill. Nov. Gen. pl. (1719) p. 76; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 73.
- 1 P. Adae Sadler in Trans. Bot. Soc. Edinb. (1877) p. 45; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 80.

Cochlearia — Lumb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 323. Zone ardenn. (Lamb.).

2 P. aurantia Pers. Obs. myc. II (1799) p. 76; Kickx Fl. de Louvain p. 176; Kickx Fl. crypt. p. 495; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 122; Sacc. Syll. Fung. p. 74.

Aleuria — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 566.

N.: Marche-les-Dames (Bell.). — Bt: Neeryssche, Dilbeek (Kickx), env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Héverlé, Vieux-Héverlé (Paque). — Fl. or.: Rooborst, Melle, Meirelbeke (Coem.), entre Oostacker et Loochristy, Sleydinge, Luchteren (Kickx). — Ht: Hormeignies (Él. M.).

3 P. badia Pers. Obs. myc. II (1799) p. 78; Kickw Fl. crypt. I p. 495; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 82; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Plicaria - Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 567.

Bt: Groenendael (Él. M.), Louvain, Héverlé (Paque), bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.), Bergh (Del.). — Fl. or.: Wetteren (Scheidweiler). — Lx.: Laroche (Él. M.).

4 P. cerea Sow. Fung. t. 3; Kicka. Fl. crypt. I p. 495; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 78; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 122. Plicaria — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 568.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

- 5 P. clavellata Desm. Crypt. Voges. exs. n. 175, cf. Sacc. VIII p. 511. Sine loco (West. et Van Haes.).
- 6 P. cochleata L. Sp. pl. (1763) p. 1625; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 86; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 122. Otidea — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 329.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.).

7 P. lividula Phill. in Cooke Mycogr. (1879) fig. 277; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 92. Geoscypha — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 321.

Lg.: Forêt (Mout.).

- 8 P. parvula Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. de Brux. (1885) p. 127. Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 9 P. perpusilla Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 166.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

10 P. pustulata (*Hedw.*) Pers. Syn. Fung. (1801) p. 646; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 85.

Octospora — Hedw. Musc. frond. (?) p. 19 t. VI f. A.

Plicaria — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 568.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg.: Liége (Lamb.).

11 P. sepiatra Cooke Mycogr. (1879) f. 261; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 91.

Geoscypha — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 321. Zone ardenn. (Lamb.).

12 P. tectoria Cooke Mycogr. (1879) f. 263; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 89; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 123. Geoscypha — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 321.

Bt: Watermael, Université de Bruzelles (Bm. et R.).

13 P. umbrina Boud, in Gooke Mycogr. (1879) f. 378; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 86; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brax. p. 122.

Cochlearia - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 323.

Bi: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

14 P. vesiculosa Bull. Champ. (1791-1798) p. 27 t. 457 f. 1; Kickx. Fl. crypt. I p. 494; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 83; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 122; Lamb. Fl. myc. II p. 570.

 ${\tt Bt}:$ Bois de la Cambre, Boendael (Bm. et R.), Schaerbeek (Él. M.). — Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

- 5 OTIDEA Fuck. Symb. myc. (1869-70) p. 329; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 94.
- O. leporina (Batsch) Fuck. Symb. myc. (1869-70) p. 229; Sacc. Syll.
 Fung. VIII p. 94; Lamb. Fl. myc. II p. 572.

Peziza — Batsch Elench. Fung. (1783) p. 217; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Bt: Boitsfort, Auderghem (Bm. et R). - Lg.: Dolembreux (Mout.).

O. onotica (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869-70) p. 329; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 94; Lamb. Fl. myc. II p. 575; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 637.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 6 DISCINA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 348; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 99.
- 1 D. repanda (Wahl.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 100.

Peziza — Wahl. Fl. Upsal. (1820) p. 466; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux, p. 122.

Plicaria - Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 568.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Humbeek (Él. M.). — Lg.: (Lamb.).

2 D. venosa (Pers.) Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 324; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 104.

Peziza — Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 220; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Acetabula - Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 574.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

7 DETONIA Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 105.

D. trachycarpa (Curr.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 105.
 Peziza — Curr. in Trans. Linn. Soc. t. XXIV (1860) p. 493 t. 51 f. 3-5;
 Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Discina - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 324.

 \mathbf{Bt} : Groenendael, Ottignies, Rixensart (Bm. et R.). — \mathbf{Lg} .: env. de Verviers (Lamb.).

- 8 GALACTINIA Cooke Mycogr. (1879) p. 253; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 106.
- 1 G. succosa (Berk.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 106.

Peziza — Berk. Brit. Fungi n. 156 t. X f. 5; Kickv Fl. crypt. I p. 494; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Pustularia - Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 570.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or.: Melle (Kickx). — Lg.: Beaufays. Tilff (Mout.). — Ht: Baudour (Él. M.).

- 9 PYRONEMA Carus Nov. Acta Nat. Cur. XVII (1835) p. 370; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 107.
- P. domestica (Sow.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 109; Lamb.
 Fl. myc. Supplém. I (1880) p. 298.

Peziza — Sow. (nbi?) t. 351; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 125. Tapesina — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 305.

Peziza pluvialis Cooke Mycogr. (1879) p. 60.

Bt: Ixelles (Bm. et R.), Louvain (Paque). - Lg.: Beaufays (Mout.).

2 P. Franzoniana De Not. Discom. (1864) p. 12; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 108; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 298.

Peziza — Cooke Mycogr. (1879) p. 68.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 P. melaloma (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 319; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 107; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 298. Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 68.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 P. omphalodes (Bull.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 107.

Peziza — Bull. Champ. (1791-1798) p. 264 t. 485 f. 1; Kickx Fl. crypt. I p. 493; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 123; Lamb. Fl. myc. II p. 556.

Bt: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.). - Fl. or.: Gand (Coem.).

- var. aurantio-lutea Sacc. loc. cit.

Peziza confluens Pers. Obs. myc. II (1799) p. 81 t. 5 f. 6-7.

Bt: Boitsfort (Kickx).

5 P. subhirsutum (Schum.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 108; Lamb. Fl. myc. II p. 556.

Peziza — Schum. Fl. Dan. t. 1787 f. 2 et t. 1788 f. 1; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 BARLAEA Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 111.

1 B. constellatio (Berk. et Broome) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 111.

Peziza — Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. (1876); Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

- var. Fuckelii Cooke Mycogr. (1879) f. 82; Sacc. loc. cit.
 Crouania constellatio var. Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 318.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 B. convexella (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 114).
 Peziza Karst. Monogr. Pez. (1869) p. 123.
 Crouania Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 319.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 B. Crec'hqueraultii (Crouan) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 113. Ascobolus — Crouan in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. X (1858) t. 13. Peziza auriflava Cooke Mycogr. (1879) p. 16 f. 23. Crouania — Lamb. Fl. myc Supplém. I (1887) p. 319.

Lg.: Gomzé (Mout.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

4 B. hinnulea (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 117. Peziza — Berk. et Br. Brit. Fungi n. 1230; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Crouania - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 319.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Ht: Stambruges (Él. M.). — Lg.: Dolembreux (Mout.).

5 B. miniata (Crouan) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 111.

Ascobolus — Crouan in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. X (1858) t. 197 t. XIII f. 44-47.

Crouania — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 320; Lamb. Fl. myc. II p. 558.

Crouania Crouani Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 319.

Peziza — Cooke Mycogr. (1879) t. 5 f. 17; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 B. modesta (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 113.

Peziza — Karst. Fragm. myc. XI (1883-1892) p. 1.

Crouania — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 319.

Zone ardenn. (Lamb.).

7 B. Persoonii (Crouan) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 116.

Ascobolus - Crouan Flor. Finist. (1867) p. 56 t. ult. f. 4.

Peziza violascens Cooke Mycogr. (1879) p. 46 pl. 21 f. 83; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Geoscypha — Lamb. Fl. myc. Suppl. I (1887) p. 321.

Bt: Tervueren (Él. M.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

8 B. Polytrichi (Schum.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 113.

Peziza — Schum. Enum. pl. Saell. (1801-1803) p. 423; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Crouania — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 319.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

9 B. sub-aurantia (Bomm. et Rouss.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 114.

Peziza — Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 122.

Cochlearia - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 323.

Bt: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

- 11 MACROPODIA *Fuck*. Symb. myc. (1869) p. 331; *Sacc*. Syll. Fung. VIII p. 158.
- 1 M. fibrosa (Wallr.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 160; Lamb. Fl. myc. II p. 577.

Peziza — Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. (1883) p. 498; Kickæ Fl. crypt. I p. 496.

Fl. occ.: Knocke (Kickx). — Bt: Limelette (Él. M.).

- 12 PSEUDOPLECTANIA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 329; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 165.
- P. nigrella (Pers.) Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 563; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 165.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 643; Kickæ Fl. crypt. I p. 492.

Fl. or. : Entre Nederbrakel et Renaix (Kickx).

- 13 HUMARIA Fries Syst. myc. II (1823) p. 42; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 118.
- H. ascophanoides (Él. March.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 136.
 Peziza Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXV (1886) part. 1 p. 49.

Leucoloma - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 317.

Lx.: Recogne (Él. M.). — Lg.: Gomzé (Mout.).

2 H. convexula (Pers.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 139.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 666; Kicka Fl. crypt. I p. 490; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Leucoloma — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 318; Lamb. Fl. myc. II p. 554.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). - Fl. or.: env. de Gand (Coem.).

3 H. crassiuscula (Él. March.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 136.

Peziza — Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 2 (1886) p. 49.

Leucoloma - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 316.

Ardennes (El. M.).

4 H. Gerardi (Cooke) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 150.

Peziza — Cooke in Hedwigia (1875) p. 81.

Leucoloma — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 318.

Lg.: Beaufays (Mout.).

5 H. glumarum (Desm.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 130; Lamb. Fl. myc., II p. 562.

Peziza — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1841); Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

6 H. granulata (Bull.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 129.

Peziza — Bull. Champ. (1791-1798) p. 258, t. 433 f. 3; Kickw Fl. crypt. I p. 493; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Peziza granulosa Pers. Syn. Fung. (1801) p. 667; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Bt: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Saventhem (West. et Van Haes.), Bruxelles (Él. M.).

7 H. Hepatica (Batsch) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 140.
Peziza — Batsch Elench. Fung. Cont. I (1786) f. 138.
Lg.: Gomzé (Mout.).

8 H. humosa (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 120.

Peziza — Fries Obs. myc. I (1815) p. 309; Kickx Fl. crypt. I p. 494; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Crouania — Fuck.; Lamb. Fl. myc. II p. 557.

N.: Louette-St. Denis (Aub.). — Bt: Linden, Kessel-Loo, Kesselberg, Héverlé, Louvain (Leburt.), Auderghem, Rouge-Cloître (Bm. et R.). — Fl. or.: Wetteren, Poldres (Kickx). — Fl. occ.: env. d'Ypres (Wall.).

9 H. Jungermanniae Fries Syst. myc. II (1823) p. 144 sec. Sacc. Syll. Fung. VIII p. 146; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 192. Pseudopeziza — Fuck. Symb. myc. (1869-70) p. 29.

Peziza — Nees ex Fries Syst. myc. II p. 144.

Zone ardenn. (Lamb.).

10 H. leporum (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 138.

Ascobolus — Fuck. Symb. myc. (1869-70) p. 288.

Ascophanus — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 280.

Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (Mout.).

— var. macrospora El. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 130.

Lx.: Hatrival (Él. M.).

11 H. leucoloma (Hedw.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 118. Octospora — Hedw. Musc. frond. (?) p. 13t. IV f. A.

Peziza leucoloma Fries Syst. myc. II (1823) p. 71; Kickx Fl. crypt. I p. 493. Leucoloma Hedwigii Fuck. Symb. myc. (1869) p. 317; Lamb. Fl. myc. II p. 553.

Fl. or.: Ledeberg (Coem.). - Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

H. leucoloma var. ricciaecola Cord.; Kickx Fl. crypt. I p. 493.

Fl. or. : St-Gilles-Waas (West.).

12 H. maurilabra (Cooke) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 124.

Peziza — Cooke Mycogr. (1879) p. 231 f. 288; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Leucoloma — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 317.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

13 H. orthotricha (Berk. et Cooke) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 119.

Peziza — Berk. et Cooke in Grevillea VI (1867) p. 7 t. 96 f. 33; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

14 H. psilopezizoides (Cooke et Phil.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 144.

Peziza - Cooke et Phil. in Grevillea IX (1870) p. 104.

Leucoloma — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 317.

Zone ardenn. (Lamb.).

H. Schenkii (Batsch) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 145;
 Lamb. Fl. myc. II p. 563.

Peziza - Batsch Elench. Fung. (1783) f. 52.

Lg. : Vallée de Hombret (Verviers) (Lamb.).

16 H. semi-immersa (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 143.
Peziza — Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 45; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Leucoloma — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 318.

Bt: Hoeylaert (Bm. et R.).

17 H. tristis Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 216.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

18 H. umbrosa (Schrad.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 128; Lamb. Fl. myc. II p. 560.

Peziza — Schrad.; Fries Syst. myc. II p. 66; Kickx Fl. crypt. I p. 491.

Fl. or. : Gand (Kickx).

19 H. violacea (Pers.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 149.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 639; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Geoscypha - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 320.

Bt: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: Dolembreux, Angleur (Mout.).

14 LACHNEA Fries Syst. myc. II (1823) p. 77; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 166.

1 L. albo-spadicea (Grev.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 184.

Peziza — Grev. Fl. Edin. (1824) p. 420; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Scutellinia - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

2 L. arctispora (Cooke et Phil.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 104. Peziza — Cooke et Phil. in Grevillea IX (1870) p. 104.

Scutellinia — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300 (err. arețespora). Zone ardenn. (Lamb.).

3 L. brunnea (Alb. et Schwein.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 170.
Peziza — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 317 t. IX f. 8; Bomm. et
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Sepultaria - Lamb. Fl. myc. Supplém I (1887) p. 302.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 L. fusco-atra (Reb.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 184.

Peziza — Reb. Prodr. Fl. Neom. (1804) p. 315; Kickx Fl. crypt. I p. 492; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Humaria — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 561.

? Peziza strigosa Pers. Syn. Fung. (1800) p. 648 cf. Fries Syst. myc. II p. 82.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ.: entre Furnes et Ysenberg (Kickx). — Ht: env. de Mons (Paque).

5 L. gregaria (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 170.

Peziza — Rehm Ascom. n. 6; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124. Sepultaria — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 301.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

6 L. hemisphaerica (Wigg.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 166.

Peziza — Wigg. Fl. Hols. (1870) p. 107; Kickx Fl. crypt. I p. 492; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Humaria — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 561.

Dermatea fascicularis Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 362; Kickæ Fl. crypt. I p. 475; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 136; Lamb. Fl. myc. II p. 491.

Bt: Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — Fl. or.: Wetteren, St-Amand (Kickx).

- var. subsolitaria Alb. et Schwein.; Kickv Fl. crypt. I p. 475. Fl. or.: Gand (Coem.).
- 7 L. hemisphaerioides Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 21 pl. A fig. 10.

Lg. : Beaufays, Gomzé (Mout.).

8 L. lanuginosa (Bull.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 167.

Peziza — Bull. Champ. (1791-1798) t. 396 f. 2; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Sepultaria - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 302.

Bt: Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

9 L. livida (Schum.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 187.

Peziza — Schum. Enum. pl. Saell. II (1803); Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Scutellinia - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.

Bt: Elewyt (Él. M.). - Lg.: Dolembreux (Mout.). - Lx.: Laroche (Él. M.).

10 L. melaloma (Alb. et Schwein.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 181.
Peziza — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 336 t. I f. 5; Bomm.

Peziza — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 336 t. 1 f. 5; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Bt: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

11 L. miniata (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 174.

Humaria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 323.

Peziza — Cooke Mycogr. (1879) p. 127; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Scutellinia - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300.

Bi: Tervueren (Bm. et R.).

12 L. oligotricha (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 173.

Peziza - Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 71.

Scutellinia - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.

Bt: Bruxelles (West.).

13 L. pulcherrima (Crouan) Cooke Mycogr. (1879) p. 154; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 181.

Ascobolus — Crouan in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. X (1858) p. 190 t. 13 G fig. 32-37; Kickx Fl. crypt. I p. 476; Lamb. Fl. myc. II p. 505.

Peziza - Crouan (?).

Lg.: Forêt (Mout.). — Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — Fl. or.: Gand (Coem.). — Ht: Ormeignies (Él. M.).

14 L. scutellata Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 173.

Peziza — L. Fl. Suec. (1745) p. 458; Kickx Fl. crypt. I p. 491; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Humaria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 321; Lamb. Fl. myc. II p. 558.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

15 L. sepulta (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 170.

Peziza - Fries Nov. Symb. myc. (1851) p. 230.

Sepultaria - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 301.

Lg. : Beaufays (Mout.).

16 L. stercorea (Pers.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 183.

Peziza — Pers. Obs. myc. II (1799) p. 89.

Humaria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 321.

Fl. or.: Cherscamp (Kickx). - Lg.: Angleur (Mout.).

- var. breviseta (Kickx).

Peziza stercorea var. breviseta Kicka Fl. crypt. I (1867) p. 491.

Fl. occ. : Knocke, Hoogen-blikker (Kickx).

17 L. theleboloides (Alb. et Schwein.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 179.

Peziza — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 321 t. 12 f. 4; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Scutellinia — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

18 L. umbrarum (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 174.

Peziza - Fries Syst. myc, II (1813) p. 85.

Scutellinia - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

19 L. umbrata (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 174.

Peziza - Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 351; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

20 L. vitellina (Pers.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 179. Peziza — Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 257.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 15 SPHAEROSPORA Sacc. in Mich. I (1879) p. 594 et Syll. Fung. VIII p. 186.
- S. lasioboloides (Él. March.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 189. Scutellinia - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.

Lachnea — Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 68.

Bt: Bruxelles (Él. M.).

S. trechispora (Berk. et Broome) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 188.

Peziza — Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. (1846) p. 17; Bomm. et Rouss. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.

Scutellinia — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.

Lg.: (Lamb.). — Bt: env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.), Mousty (Él. M.).

- 16 NEOTIELLA Cooke Mycogr. (1879) p. 261; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 190.
- N. ascoboloides (Berk.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 193.
 Peziza Berk. ex Mont. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VIII (1837) n. 47.
 Leucoloma Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 318.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- N. erminea (Bomm. et Rouss.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 193.
 Peziza Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 124.
 Sepultaria Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 302.
 Bt: Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).
 - 17 SCLEROTINIA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 330; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 195.
- 1 S. baccarum Schroet. in Hedwigia (1879) p. 177; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 199.

 Lx.: Auby (Bm. et R.).
- 2 S. Candolleana (Lév.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 330; Sacc. Syll. Fung. VIII (1887) p. 198.

Peziza — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XX (1843) p. 233 t. VII fig. 4. Sclerotium pustula DC.; Kickv Fl. crypt. II p. 468; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 294.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.) et d'Ypres (West.).

3 S. Curreyana (Berk.) Karst. Rev. monogr. (?) p. 123; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 198; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 303.

Peziza — Berk. in Trans. Linn. Soc. (1865) p. 495; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Bi : entre Uccle et Boitsfort (L. Errera).

4 S. Durieuana Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 200, 203 t. XXII fig. 20-24; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 199.

Sclerotium sulcatum Rob. (Ubi ?).

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

5 S. Libertiana Fuck. Symb. myc. (1869) p. 831; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 190; Lamb. Fl. myc. II p. 576.

Peziza sclerotiorum Lib. Crypt. Ard. n. 326: Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Peziza Coemansii Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 485.

Sclerotium compactum DC.; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 294.

S. — var. Tagetis Desm., var. Juglandini West. et Van Haes., var. Geranii West. et Van Haes. et var. Cardui West.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Louvain, Linden (Leburt.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. or.: (Coem.).

6 S. trifoliorum Eriks. in Kongl. Landtbr. Ak. Handb. o Tidskr. (1880) p. 28-42; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 196
N.: Institut agricole de Gembloux (Él. M.). — Fl. or.: Gand (Staes).

7 S. tuberosa (*Hedw.*) Fuck. Symb. myc. (I869) p. 331; Lamb. Fl. myc. II p. 576; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 195.

Octospora — Hedw. Musc. frond. II (1789) t. 10.

Peziza — Bull. (1790) t. 485 f. 2-3: Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — Ht: Bois du Coucou lez-Tournay (Marissal). — Lg.: Dolembreux, Tilff (Mout.).

- 18 CIBORIA Fuch. Symb. myc. (1869) p. 311; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 201.
- 1 C. amentacea (Balb.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 31I; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 201.

Peziza — Balb. in Mem. Ac. Taur. II (1885) p. 79 t. 2.

Peziza pulacea Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 311.

Helotium - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 308.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 C. bolaris (Batsch) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 311; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 204.

Peziza - Batsch Elench. Fung. Cont. I (1786) p. 221 f. 155.

A.: Hérenthals (Bm. et R.).

- 3 C. ciliatosporum Fuck. Symb. myc. (1869) p. 311 t. IV f. 36; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 205; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 306. Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Dilbeek (Él. M.).
- 4 C. echinophila (Bull.) Sacc. Fung. Ven. Ser. IV (1873-82) n. 88 et Syll. VIII p. 202; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 135; Lamb. Fl. myc. II p. 544.

Peziza — Bull. Champ. (1791-98) p. 235 t. 500 f. 1.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 5 C. fallax Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 135; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 205; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 306. Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 6 C. firma (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 312; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 203; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 135; Lamb. Fl. myc. II p. 543.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 658.

Bi: Groenendael (Bm. et R.). - Fl. or.: Oostacker (Kickx).

7 C. luteo-virescens Rob. et Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 206; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 206.

Peziza pallido-virescens Phill. in Grevillea VII (1868) p. 24.

Helotium — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 311.

Zone ardenn. (Lamb.).

8 C. subularis (Bull.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 203.

Peziza - Bull. Champ. (1791-98) p. 236 t. 500 f. 2.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 19 PITYA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 317; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 209.
- 1 P. Cupressi (Batsch) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 317; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 209.

Peziza - Batsch Elench. Fung. (1783) p. 119.

Peziza cupressina Fries Syst. myc. II (1823) p. 135; Kicke Fl. crypt. I p. 488; Lamb. Fl. myc. II p. 552.

Geoscypha Leineri Rabenh; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 322.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.). — Fl. oc.: Gendbrugge (Coem.).

- 20 HELOTIUM Fries Summa Veg. Scand. (1854) p. 354; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 210.
- 1 H. aciculare (Bull.) Pers. Syn. Fung. (1801) p. 677; Sacc. Syll. Fung, VIII p. 217; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128. Peziza Fries-Syst. myc. II (1823) p. 156. Helvella Bull. Champ. (1791-98) t. 473 f. 1.
 - Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). Lg.: Chaudfontaine (Mout.). Lx.: Laroche (Él. M.).
- 2 H. album Schum. Enum. pl. Saell. II (1803) p. 412; Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 212; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 308. Zone ardenu. (Lamb.).
- 3 H. chioneum Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 356; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 211.

Peziza — Fries Syst. myc. II (1883) p. 132.

Lg.: Hestreux (Bm. et R.).

4 H. citrinum (Hedw.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 224; Kickx Fl. crypt. I p. 497; Lamb. Fl. myc. II p. 545; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129.

Octospora - Hedw. Musc. frond. II (?) t. VIII f. B.

Peziza citrina Batsch Elench. Fung. Cont. II (1789) f. 218.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Oostacker (Kickx). — Bt: Kessel-Loo (Leburt.), Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- H. claroflayum (Grev.) Berk. Outl. Brit. Fung. (1860) p. 372; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129; Lamb. Fl. myc. II p. 546; Sacc. Syll. Fung. VII p. 225. Peziza — Grev. Fl. Edin. (1824) p. 424.
 - Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- H. conigenum (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 221; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129; Lamb. Fl. myc. II p. 551. Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 634.

Bt: Uccle (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

- 7 H. discretum Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 116; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 251. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- H. epiphyllum (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 356; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 227; Lamb. Fl. myc. II p. 548. Peziza — Pers. Disp. Meth. Fung. (1797) p. 72. Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- H. fagineum (Pers.) Fries Summa Veg. Scand (1849) p. 356; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 210; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129; Lamb. Fl. myc. II p. 548.

Peziza - Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 296.

- Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.). Lg.: Beaufays (Mout.).
- 10 H. fimetarium Pers. Syn. Fung. (1801) p. 678; Kicke Fl. crypt. I p. 498; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 219; Lamb. Fl. myc. II p. 549. Leota - Pers. Obs. myc. II (1799) p. 21 t. 4 f. 4-6. Peziza - Fries Syst. myc. II (1823) p. 157.

* Fl. occ. : Nieuport (Kickx). *

11 H. geogenum Cooke in Grevillea VI (1867) p. 65; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 213.

Bt: Beaufays Forêt (Mout.).

12 H. herbarum (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 356; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 217; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129; Lamb. Fl. myc. II p. 551.

Peziza - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 664.

- Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). N.: Louette-St-Pierre
- 13 H. Humuli (Lasch) De Not. Comm. Soc. critt. it. 1 (1864) p. 379; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 243; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 312.

Peziza Humuli Lasch in Rabenh. Herb. myc. Éd. II p. 221.

Peziza humilis Desm. XIV Not. n. 84; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Lg.: Forêt (Mout.). — Bi: Boitsfort (Bm. et R.).

- 14 H. Libertianum Sacc. et Roum.; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 242;
 Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 308.
 8t: Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 15 H. pallescens (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; Kickx Fl. crypt. I p. 497; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 216; Lamb. Fl. myc. II p. 545.

Peziza - Pers. Obs. myc. I (1796) p. 35.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Forêt de Soignies, Tervueren (Él. M.). — Fl. or.: env. de Gand (Scheidweiler).

- 16 H. parvulum Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 552. Lg.: Hertogenwald (Lamb.).
- 17 H. repandum Phill. Discom. (1887) p. 161; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 226.

 Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 18 H. rhizophilum (Fuck.) Cooke Handb. II (1871) p. 714; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 251.

Ciboria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 312; Lamb. Fl. myc. II p. 543. Bt: Watermael (Bm. et R.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

- 19 H. robustius Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 119; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 233; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 311. Zone ardenn. (Lamb.).
- 20 H. salicellum Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 356; Kicka Fl. crypt. I p. 497; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 230; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129; Lamb. Fl. myc. II p. 546. Peziza Fries Syst. myc. II (1823) p. 135.
 - Bt: Watermael, Boendael, Boitsfort (Bm. et R.).
- 21 H. serotinum (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 222; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 551.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 661.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

- 21 PHIALEA Fries Obs. myc. II (1818) p. 305; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 251.
- P. albida (Rob.) Gill. Disc. de France) 1879-82) p. 105; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 254.

Peziza albida Rob. in Desm. Pl. crypt. Fr. In. 2004; Kickv Fl. crypt. I p. 483; Lamb. Fl. myc. II p. 538.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Ste-Anne-lez-Courtrai (West.). — Lg.: Beaufays (Mont.).

2 P. amenti (Batsch) Sacc. Syll. Fung. VIII p. 257.

Peziza — Batsch Elench. Fung. Cont. I (1786) p. 211 f. 148.

Helotium -- Fuck. Symb. myc. (1869) p. 313; Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 309.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

Lamb. Fl. myc. II p. 538.

3 P. bryophila (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 263
Phialea — Fries Syst. myc. II (1823 p. 119; Kickx Fl. crypt. I p. 486;

Bt: Winxele (Paque). - Fl. or.: env. de Gand (Coem.).

4 P. Cacaliae (*Pers.*) Gill. Disc. de France (1879-82) p. 104; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 268.

Peziza — Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 285; Lamb. Fl. myc. II p. 536. Helotium — Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 129.

Bt: Watermael (Bm. et R.). - Fl. occ.: Marcke (West.).

5 P. calyculus (Sow.) Gill. Disc. de France (1879-82) p. 108.
Peziza — Sow. Fung. (P) t. 116; Pers. Syn. Fung. p. 660.

Helotium - Fries; Kicker Fl. crypt. I p. 497; Lamb. Fl. myc. II p. 545.

Bt: Watermael (Bm. et R.). - Flandres (Kickx).

- infundibulum Fries; Kicka loc. cit. Flandres (Kickx).
- 6 P. cyathoidea (Bull.) Gill. Disc. de France (1879-82) p. 106; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 251.

Peziza — Bull. Champ. (1791-1798) t. 316 f. 2; Kickw Fl. crypt. I p. 485; Lamb. Fl. myc. II p. 536.

Helotium — Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 136; Bomm. et Rouss; Fl. myc. env. Brux. p. 129.

Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

7 P. fructigena (Bull.) Gill. Disc. de France (1879-82) p. 99 c. ic; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 265.

Peziza — Bull. Champ. (1891-98) p. 236 t. 228.

- var. herbarum (West.).

Peziza fructigena var. herbarum West. in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 238.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).

8 P. glanduliformis (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 268.

Helotium — Rehm Ascom. Lojk. (1882) n. 14.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

9 P. hirtipes Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 255.

Phialea — Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 83.

Lg.: Beaufays (Mout.).

10 P. hymenula (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 262.

Peziza - Fuck. Symb. myc. (1869) p. 308.

Helotium — Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 129; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 310.

Bi : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

11 P. rubicola (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 253.

Helotium — Fuch. Symb. myc. (1869) p. 314; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129.

Peziza fructigena var. - Fries Syst. myc. II (1823) p. 119.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

12 P. scutula (*Pers.*) Gill. Disc. de France (1879-82) p. 108; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 266.

Peziza — Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 284; Kicka Fl. crypt. I p. 485; Lamb. Fl. myc. II p. 537.

Bt: Louvain, Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). - Fl. or.: Gand (Coem.).

13 P. strobilina (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 256.

Peziza - Fries Syst. myc. II (1825) p. 125.

Helotium — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 313; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 309.

Lx.: Herbeumont (Bm. et R.).

14 P. tuba (Bolt.) Gill. Disc. de France (1879-82) p. 99; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 261.

Helotium — Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; Kicke Fl. crypt. I p. 498; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129; Lamb. Fl. myc. II p. 546.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). - Fl. or.: Gand (Coem.).

15 P. Urticae (Pers.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 253.

Peziza — Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 286.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). - Bt: Groenendael (Bm. et R.).

16 P. virgultorum (Vahl) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 266.

Peziza - Vahl Fl. Dan. (1790) t. 1016 f. 2.

Helotium — Kickw Fl. crypt. I (1867) p. 498; Bomm, et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128; Lamb. Fl. myc. II p. 549.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). - Fl. occ.: env. Courtrai (West.). - Fl. or.: env.

de Gand (Kickx). - Lx.: Laroche (Él. M.).

17 P. vitellina (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 262.

Helotium — Rehm Ascom. n. 513; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 313 (err. vitulinum).

Sine loco (Lamb.).

- 22 PEZIZELLA *Fuck*. Symb. myc. (1869) p. 299; *Sacc*. Syll. Fung. VIII p. 275.
- P. acerina Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 17 pl. A fig. 15.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- P. albella (With.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 280.
 Peziza With. Bot. Arr. IV (1796?) p. 350.
 Peziza Avellanae Lasch in Fungi Eur. n. 28.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- P. albula (Phill.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 282.
 Mollisia Phill. Discom. (1887) p. 192.
 A.: Calmpthout (Bm. et R.).
- 4 P. chrysostigma (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 289.
 Peziza Fries Syst. myc. II (1823) p. 128.
 Helotium Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 310.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 5 P. dilutella (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 300; Saec. Syll. Fung. VIII p. 277; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 292.
 Péziza Fries Syst. myc. II (1823) p. 147; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

- P. juncina (Pers.) Fuch. Symb. myc. (1869) p. 299; Lamb. Fl. myc. II p. 527; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 290.
 Peziza Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 314; Kickw Fl. crypt. I p. 482.
 Lx.: Samrée (Bm. et R.). Fl. occ.: Gheluvelt (Wall. et Marissal).
- 7 P. leucostigmoides (Sacc.) Rehm Ascom. n. 855; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 277.

Calloria — Sacc. in Mich. II (1879) p. 77.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

8 P. myriadea Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 17.

Lg.: Beaufays, Gomzé (Mout.).

9 P. resinicola Rehm ex Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1879) p. 16.

Lg. : env. de Liége (Mout.).

10 P. rubescens *Mout*, in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 18.

Lg.: Beaufays (Mout.).

11 P. turgidella (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 281.

Helotium — Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 158.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

12 P. vulgaris (*Fries*) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 278; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 292.

Pseudopeziza - Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 513.

Peziza - Fries Syst. myc. II (1823) p. 146; Kicka Fl. crypt. I p. 480.

Calloria — Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 134; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 292.

Bi : Watermael (Bm. et R.).

23 PSEUDOHELOTIUM Fuck. Symb. myc. (1869) p. 298; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 291.

- P. aspideorum (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 303.
 Helotium Rehm Ascom. n. 563; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 311.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- P. ceracellum (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 292.
 Peziza Fries Syst. myc. II (1823) p. 114.
 Helotium Lamb. Fl. myc. Supplém. 1 (1887) p. 314.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 P. hyalinum (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 298; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 291; Lamb. Fl. myc. II p. 526.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 655; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bi: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 P. Jerdoni Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 296.

Helotium pruinosum Jerd. ex Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. (1866) n. 1174 t. 5 f. 33; Bomm. et Rouss, Fl. myc. env. Brux. p. 129; Lamb. Fl. myc. II p. 548.

Bit: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.).

5 P. pineti (Batsch) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 298; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 296; Lamb. Fl. myc. II p. 526.

Peziza — Batsch Elench. Fung. (1869) p. 201 f. 140; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — Lg.: Beaufays (Mout.).

- 6 P. separabile (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 297. Helotium — Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 118. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 7 P. Teucrii (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 294.
 Niptera Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 355.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 8 P. vitreolum (Kurst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 291. Helotium — Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 145. Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: Baraque-Michel (Bm. et R.).
 - 24 CYATHICULA De Not. in Comm. Soc. critt. it. I (1864) p. 381; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 304.
- C. Aquilinae (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 307.
 Coronellaria Rehm in Hedwigia (1885) p. 231.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 2 C. coronata (Bull.) De Not. in Comm. Soc. critt. it. I (1864) p. 381; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 304.

Peziza — Bull. Champ. (1791-1798) p. 251 t. 416 f. 4; Kickw Fl. crypt. I p. 484; Lamb. Fl. myc. II p. 536.

Helotium — Karst. Pat. t. 593; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129. Bt: Groenendael (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

- 3 C. incarnata (Quél.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 306. Phialea — Quél. V Suppl. (1877-1889) p. 239 t. VI fig. 9. Belonidium — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 315. Lg.: Dolembreux (Mout.).
- 4 C. inflexa (Bolt.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 305.
 Peziza Bolt. Hist. fung. (1788-1791) t. 106 fig. 2; Kickx Fl. crypt. I p. 484; Lamb. Fl. myc. II p. 539.
 Lg.: (Lamb.). Fl. occ.: Courtrai (West.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 5 C. lepidula (Él. March.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 308.
 Helotium Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIV part. 1 (1885) p. 70; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 310.
 Bt: Tervueren (Él. M.).
- 6 C. petiolorum (Desm.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 305. Helotium — De Not. Comm. Soc. critt. it. I (1864) p. 378; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 314.

Peziza — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVIII (1842) p. 91. Lg.: Beaufays (Mout.).

- 25 PEZICULA Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 182; Succ. Syll. Fung. VIII p. 310.
- P. carpinea (Pers.) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 183; Sacc.
 Syll. Fung. VIII p. 310; Lamb. Fl. myc. II p. 494.

Peziza - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 673.

Dermatea — Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 362; Kickx Fl. crypt. I p. 474; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Ht: env. de Mons (Tosquinet). -- Fl. occ.: env. de Courtrai (West.) P

2 P. conigena (Phill.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 489.

Dermatea — Phill. in Rev. myc. (1883) p. 23; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 268.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 P. Myrtillina Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 165; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 312.

Bt: Groenendael (Bm. et R).

4 P. rhabarbarina (Berk.) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 183; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 311; Lamb. Fl. myc. II p. 493.

Peziza - Berk. Engl. Fl. V 2 (1836) p. 197.

Patellaria — Kickx Fl. crypt. 1 (1867) p. 471; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 135.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: Forêt (Mout.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

26 CHLOROSPLENIUM Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 356; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 315.

1 C. aeruginosum (Oeder) De Not. Discom. (1864) p. 22; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 315.

Peziza — Pers. Obs. myc. I (1796) p. 27.

Helvella - Oeder Fl. Dan. (?) t. 354. f. 2.

Helotium — Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; Lamb. Fl. myc. II p. 550.

Bt: Gentinnes (de Limm.). - Lg.: Hestreux (Bm. et R.).

2 C. luteo-virens (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 320. Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 133. 5t: Groenendael (Bm. et R.).

3 C. versiforme (Pers.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 102; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 316.

Peziza — Pers. Ic. et descr. Fung. (1798-1800) p. 25 t. 7 f. 7.

Fl. occ.: Bruges (West.).

- 27 CORONELLARIA Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 14: Sacc. Syll. Fung. VIII p. 320.
- C. caricinella Karst. Symb. myc. (1873-1879) p. 248; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 321.

Hyalopeziza — *Lamb*. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 293. Zone ardenn. (Lamb.).

- 28 PEZICULA Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 182; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 310.
- 1 P. Callunae Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 15 pl. A fig. 12.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
 - 29 MOLLISIA Fries Syst. myc. II (1822) p. 137; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 321.
- 1 M. advena Karst. Fungi Spetsb. (1872) n. 24; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 352.

Lg.: Baraque-Michel (Bm. et R.).

2 M. arenivaga (Desm.) Phill. Discom. (1887) p. 186; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 344.

Peziza - Desm. XX Note p. 19.

Neptera — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 287.

Fl. occ.: Ostende (Mac Leod), Middelkerke (Bm. et R.).

3 M. arundinacea (DC.) Phill. Discom. (1887) p. 177; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 344.

Xyloma — DO. Fl. fr. VI (1815) p. 162.

Eustegia — Fries Elench. Fung. II (1828) p. 112; Kickx Fl. crypt. I p. 456; Lamb. Fl. myc. II p. 477.

Lx.: Poix (Bm. et R.). - Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.).

4 M. atro-cinerea Cooke in Phill. Discom. (1887) p. 176; Succ. Syll. Fung. VIII p. 323.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

5 M. benesuada (Tul.) Phill. Discom. (1887) p. 174; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 333.

Peziza — Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 161-171 t. 15 f. 8-9. Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 M. caespiticia Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 188; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 335.

Niptera — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 286.

Bi: Tervueren (Bm. et R.).

7 M. cinerea (Batsch) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 189; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 336.

Peziza — Batsch Elench. Fung. Cont. I (1786) p. 196 f. 137; Kickv Fl. crypt. I p. 483; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Niptera — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 292; Lamb. Fl. myc. II p. 516.

Peziza callosa Bull. Champ. Fr. (1791-98) p. 252 t. 416 f. 1.

Peziza salicaria Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 300; Kicka Fl. crypt. I p. 483. Pseudopeziza — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 515.

Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Laeken (Él. M.), Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. or.: St-Amand (Kickx), Gand (Coem.). — Lx.: Ébly, Longlier (Él. M.). — Fl. occ.: env. d'Ypres (Wall.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

8 M. cinerella Sacc. Fungi it. (1882) f. 1379 et Syll. Fung. VIII p. 338.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

9 M. complicata Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 192; Sacc. Syll. Fang. VIII p. 339.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

10 M. hydrophila Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 196; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 345.

Peziza — Karst. Monog. Peziz. Fenn. (1870) p. 163; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Bi: env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.).

11 M. juncina (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 346.
Peziza — Rehm Ascom. n. 856.
Lx.: Samrée, Poix (Bm. et R.).

12 M. junciseda Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 198; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 347.

Niptera — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 287.

Peziza — Karst. Monogr. Peziz. Fenn. (1870) p. 164.

Zone ardenn. (Lamb.).

13 M. livido-fusca (Fries) Gill. Disc. de France (1879-82) p. 127; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 342.

Peziza - Fries Syst. myc. II (1823) p. 147.

Niptera — Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 58; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 287.

Zone ardenn. (Lamb.).

14 M. luzulina Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 194; Sacc. Syll. Fung. VI p. 349.

Phacidium — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 265.

Zone ardenn. (Lamb.).

15 M. melaleuca (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 337.
Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 150.
Bt: Limelette (Bm. et R.).

16 M. melatephra (Lasch) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 197; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 346.

Peziza — Lasch in Rabenh. Herb. myc. n. 825; Kickx Fl. crypt. I p. 481. Pyrenopeziza — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 519.

Fl. occ.: env. d'Ypres (Wall.). - Lg.: Gomzé (Mout.).

17 M. Mercurialis (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 326.

Niptera — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 293; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 286.

Peziza — Fuck. Fung. Rhen. n. 2186.

Lg.: Forêt (Mout.).

- 18 M. microsperma Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 16 pl. A fig. 11.

 Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 19 M. microstigme Passer. in Nuovo Giorn. bot. it. (1875); Sacc. Syll. Fung. VIII p. 325.

Niptera — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 288.

Lg.: Baraque-Michel (Bm. et R.).

20 M. nervicola (*Desm.*) Gill. Disc. de France (1879-82) p. 128; Succ. Syll. Fung. VIII p. 330.

Peziza — Desm. VIII Note p. 5; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128. Niptera — Lamb. Fl. myc. Suppl. I (1887) p. 288.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

21 M. palustris (*Rob.* et *Desm.*) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 196;
Sacc. Syll. Fung. VIII p. 346.

Peziza — Rob. et Desm. XIV Note p. 187.

Niptera — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 286.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). - Lx.: Poix (Bm. et R.).

22 M. paulula (*Rob.* et *Desm.*) Phill. Discom. (1887) p. 186; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 348.

Peziza — Rob. et Desm. XIX Note p. 29.

Pyrenopeziza — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 289.

Lg.: Forêt, Gomzé (Mout.).

23 M. petiolaris (Alb. et Schwein.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 353; Lamb. Fl. myc. II p. 445.

Hysterium — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 59.

Stictis - Desm.; Kickx Fl. crypt. I p. 455.

Propolis - Desm.; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 143.

Peziza erumpens Grev. Scott. Crypt. Fl. (1823-1829) t. 99; Kickx Fl. crypt. I p. 480; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Pseudopeziza - Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 513.

Bt: Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque).

- 24 M. plicata (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 326.
 Niptera Rehm Ascom. n. 570; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 286.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 25 M. Poae (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 343; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 291.

Micropeziza — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 291.

Zone ardenn. (Lamb.).

26 M. Polygonii (Lasch) Gill. Disc. de France (1879-82) p. 120; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 322.

Peziza — Lasch in Rabenh. Herb. myc. n. 1127; Kickx Fl. crypt. I p. 483; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Pseudopeziza -- Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 514.

Bt: Corbeek-Dyle (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx, Donkelaer). — Lb. : Beyerloo (West.).

27 M. Pteridina Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 194; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 349.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 28 M. sarmentorum Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 323. Niptera — Sacc. Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) n. 72. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 29 M. stictella (Sacc. et Speg.) Sacc. Syll. Fung. VIII p. 333.

 Niptera Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 425.

 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 30 M. sublividula (Nyl.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 193; Sacc.
 Syll. Fung. VIII p. 341.
 Peziza Nyl. Obs. (1861) p. 61 in nota.
 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 31 M. urnicola Sace. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 83.
 Lg.: Gomzé (Mout.).
 - 30 PYRENOPEZIZA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 293; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 350.
- 1 P. Agrostemmatis Fuck. Symb. myc. (1869) p. 363; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 363; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 290. Zone ardenn. (Lamb.).

P. arenula (Alb. et Schwein.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 370. Peziza - Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 341; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Niptera — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 288.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

P. atrata (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 294; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 354; Lamb. Fl. myc. II p. 518.

Peziza - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 669; Kickx Fl. crypt. I p. 482; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Lg.: Forêt (Mout.). — Bt: Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ.: Bruges (West.).

- 4 P. betulicola Fuck. Symb. myc. (1869) p. 294; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 365; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 289. Lg.: Forêt (Mout.).
- P. Chaillettii (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 274; Sacc. Syll. Fung. VI p. 356. Peziza - Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 288. Lg.: env. de Liége (Mout.).
- P. digitalina (Phill.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 358. Mollisia — Phill. Discom. (1887) p. 190. Lx.: env. d'Herbeumont, Poix (Bm. et R.).
- P. Ebuli (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 360. Peziza atrata var. - Fries Syst. myc. II (1823) p. 143. Fl. occ.: Bruges (West.).
- 8 P. Galii-veri (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 356. Mollisia — Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 203. Lx.: Poix (Bm. et R.).
- P. Gentianae (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 295; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 356; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 290. Peziza — Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 310. Zone ardenn. (Lamb.).
- 10 P. Karstenii Sacc. in Mich. II (1879) p. 329 et Syll. Fung. VIII p. 367.
 - Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 11 P. ligni (Desm.) Sacc. in Mich. II (1879) p. 611 et Syll. Fung. VIII p. 366; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 289. Zone ardenn. (Lamb.).
- 12 P. Plantaginis Fuck. Symb. myc. (1869) p. 294; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 364; Lamb. Fl. myc. II p. 519. N.: env. de Namur (Bell. sec. Lamb.).

13 P. Rubi (Fries) Rehm Ascom. n. 416; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 316; Lamb. Fl. myc. Suppl. I p. 289.

Excipula - Fries Syst. myc. II (1823) p. 190.

Cenangium — Duby Bot. Gall. II (1830) p. 736; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 137.

Tympanis — Wallr. Comp. Fl. germ. t. IV (1833) p. 424; Kickx Fl. crypt. I p. 475.

Fl. or.: env. d'Audenarde (West.). — Bt: Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Watermael (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

14 P. sphaerioides (Pers.) Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 335: Sacc. Syll. Fung. VIII p. 364.

Xyloma — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 106.

Lg.: Tilff, Forêt (Mout.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

15 P. Tamaricis (Roum.) Sacc. in Mich. II (1879) p. 536 et Syll. Fung. VIII p. 362.

Mollisia - Bres. Fungi Tridentini (1881-1882) p. 42 t. 45 f. 2.

Peziza - Roum. Fungi Gall. n. 263.

Bt: Jardin de l'Observatoire à Uccle (Bm. et R).

16 P. thallophila (Karst.) Sacc. Syll. Fung. (1889) p. 370.

Mollisia — Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 205.

Trochila - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 266.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 31 TAPESIA *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p.220; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 371.
- 1 T. caesia (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 301; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 381; Lamb. Fl. myc. II p. 530.

Peziza — Pers. Ic. et descr. Fung. (1798-1800) p. 29 t. 7 f. 1; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Peziza lichenoides Pers. Ic. et descr. Fung. (1798-1800).

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 T. Chavetiae (Lib.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 301; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 382.

Peziza — Lib. Crypt. Ard. n. 26; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 T. chlorotica (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 303; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 380; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 304. Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 110.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 T. eriobasis (Berk.) Phill. Discom. (1887) p. 278; Sacc. Syll. Fung.

VIII p. 383; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 385.

Peziza — Berk. in Ann. Nat. Hist. n. 312; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Bi: Groenendael (Bm. et R.).

5 T. fusca (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 302; Lamb. Fl. myc. II p. 531; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 374.

Peziza - Pers. Obs. myc. II (1799) p. 29; Kicka Fl. crypt. I p. 487.

Bt: Louvain (Paque). - Fl. or.: Gand (Coem.).

6 T. prunicola Fuck. Symb. myc. (1869) p. 302; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 383.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

7 T. Rehmiana (Sacc. Bomm. et Rouss.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 383.

Peziza — Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 189.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

8 T. Rosae (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 301; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 374; Lamb. Fl. myc. II p. 530.

Peziza — Pers. Obs. myc. II (1799) p. 28.

Mollisia - Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 208.

P Stictis — Fuck. ex Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXV part. 1 (1886) p. 142.

Bt: Tervueren (Bm. et R.). — Lg.: Tilff (Mout.).

9 T. Torulae Fuck. Symb. myc. (1869) p. 302; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 375; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 304.

Peziza — Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 125.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 T. undulata Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 219.

A.: Westmalle (Bm. et R.).

- 32 PIROTTAEA Sacc. in Mich. I (1878) p. 424 et Syll. Fung. VIII p. 386.
- P. gallica Sacc. in Mich. II (1879) p. 82 et 59 et Syll. Fung. VIII p. 387; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 297.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- P. microspora Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 220.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 3 P. veneta Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 424; Sacc. Syll. Fung.

VIII p. 386; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 298. N.: Yvoir, Hastière (Bm. et R.).

- 33 LACHNELLULA Karst. in Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fenn. II (1884) p. 138; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 390.
- 1 L. calycina (Schum) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 391.

Peziza — Schum. p. p. vide Vuill. in Bull. Soc. Bot. de France XXXV (1888) p. LXIV; Kickæ Fl. crypt. I p. 488; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bi: Watermael (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Elewyt (Él. M.). — Lg.: Solières (Gravis).

- 34 LACHNELLA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 365; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 391.
- 1 L. albido-fusca Sacc. Misc. myc. V (1884) p. 9 et Syll. Fung. VIII p. 397; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 297.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

2 L. barbata (Kunze) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 365; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 392; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 297; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Peziza - Kunze in Fries Syst. myc. II (1823) p. 99.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

3 L. corticalis (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 365; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 393; Lamb. Fl. myc. II p. 495.

Peziza — Pers. Obs. myc. I (1796) p. 28; Kickæ Fl. crypt. I p. 490; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bt: Ucele (Bm. et R.). - Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx).

4 L. escharoides (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 397. Peziza — Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. n. 1322 t. XIX f. 15. Bi: Watermael (Bm. et R.).

5 L. papillaris (Bull.) Phill. Discom. (1887) p. 257; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 394.

Peziza — Bull. Champ. (1791-98) p. 244 t. 467 f. 1.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

6 L. rufo-olivacea (Alb. et Schwein.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 398.

Peziza - Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 320 t. XI f. 4.

Velutaria — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 528.

Lg.: Gomzé (Mout.), Visé (Lamb.). — Bi: Watermael (Bm. et R.).

35 TRICHOPEZIZA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 295; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 401.

1 T. albo-lutea (Pers.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 412.

Peziza - Pers. Icon. et descr. Fung. (1798-1800) p. 31 t. 8 f. 4.5.

Peziza variecolor Fries Syst. myc. II (1823) p. 100; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Tapesia - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 304.

Trichopeziza — Lamb. Fl. myc. Sapplém. I (1887) p. 204.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 T. albo-testacea (Desm.) Sacc. Syll. Fung. VIII p. 419; Lamb. Fl. myc. Suppl. I p. 296.

Peziza - Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 368.

Lg.: Gomzé (Mout.).

3 T. brevipila (Rob. et Desm.) Sacc. Syll. Fung. VIII p. 404.

Peziza — Rob. in Desm. XVII Note p. 36.

Belonidium — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 315.

Pyrenopeziza — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 290.

Lg.: Gomzé, Beaufays (Mout.).

4 T. cinerella (Crouan) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 408.

Peziza — Crouan Fl. Finist. (1867) p. 51; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Bi: Watermael (Bm. et R.).

5 T. dumorum (Rob. et Desm.) Sacc. in Mich. II (1879) p. 80 et Syll. Fung. VIII p. 418; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 295.

Peziza — Rob. et Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 110; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

6 T. episphaeria (Mart.) Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 524; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 432.

Peziza — Mart. Fl. Erl. (1817) p. 465; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bi: Watermael (Bm. et R.).

7 T. leucophaea (Pers.) Rehm Ascom. n. 65; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 402.

Peziza sulphurea var. - Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 250.

N.: Yvoir (Bm, et R.).

8 T. molissima (Lasch) Fuch. Symb. myc. (1869) p. 296; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 403; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 295.

Peziza - Lasch in Rabenh. Herb. myc. II n. 708.

Zone ardenn. (Lamb.).

9 T. nidulus (Schum. et Kunze) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 297; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 408; Lamb. Fl. myc. II p. 521.

Peziza — Schum. et Kunze Exs. n. 72; Kickx Fl. de Louvain p. 177; Kickx Fl. crypt. I p. 490; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

N.: St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Jardin botanique de Bruxelles (Kickx). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

10 T. plano-umbilicata (Grev.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 425.
Peziza — Grev. Fl. Edin. (1824) p. 240.

Hyalopeziza — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 292.

Zone ardenn. (Lamb.).

11 T. Pteridis (Alb. et Schwein.) Rehm Ascom. n. 411; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 423.

Peziza — Alb. et Schwein Consp. Fung. (1885) p. 338 t. 12 f. 7; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Trichopeziza pulveracea Fuck. Symb. myc. (1869) p. 297; Lamb. Fl. myc. II p. 522.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

12 T. punctiformis (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 296; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 416.

Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 105; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Bt: Mousty (Bm. et R.).

- 13 T. pygmaea Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 19 pl. A fig. 14.
 Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 14 T. spirotricha (Oud.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 405.
 Peziza Oud. in Arch. Néerl. t. V et in Hedwigia (1874) p. 87.
 Trichopeziza longeciliata Rehm Ascom. exsic. n. 510.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 15 T. sulphurea (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 296; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 401; Lamb. Fl. myc. II p. 521.

Peziza — Pers. Tent. Disp. Meth. Fung. (1797) p. 33; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.). — Bi: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

16 T. Ulmariae (Lasch) Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 524; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 408.

Peziza — Lasch in Herb. myc. n. 1723 et in Flora (1853) p. 201; Bomm et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 17 T. velutina (Wallr.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 427.

 Peziza Wallr. Comp. Fl. germ. t. IV (1833) p. 487.

 Hyalopeziza Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 312.

 Zone ardenn. (Lamb.).
- 18 T. virescentula Mout, in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 19 pl. A fig. 13.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
 - 36 DASYSCYPHA *Fuck*. Symb. myc. (1869) p. 304; *Sacc*. Syll. Fung. VIII p. 432.
- D. acuum (Alb. et Schwein.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 443. Helotium Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 307. Peziza Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 330.
 - Lg.: Angleur (Mout.). Bt: Boitsfort (Bm. et R.).
- D. aspidiicola (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 451.
 Peziza Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. n. 771; Bomm. et Rouss. Fl. myc.
 env. Brux. p. 127; Lamb. Fl. myc. II p. 540.
 - Bt: Groenendael (Destrée). Lg.: Forêt (Mout.).
- 3 D. bicolor (Bull.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 305; Lamb. Fl. myc. II p. 533; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 439.

Peziza — Bull. Champ. Fr. (1791-98) p. 243 t. 410 f. 3; Kickx Fl. crypt. I p. 489; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

- Bt: Louvain, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), Uccle (Bm. et R.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Lx.: Ébly (Él. M.).
- 4 D. brunneola (Desm.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 460.
 Peziza Desm. Crypt. Fr. I n. 1156; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.
 - ${\tt Bt}: {\tt Rouge-Cloître,\ Ottignies\ (Bm.\ et\ R.)}. \leftarrow {\tt Lb.}: {\tt Stalle\ pr\`es\ Beverloo\ (West.)}.$
- D. calycina (Schum.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 305; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 437; Lamb. Fl. myc. II p. 533.
 Peziza Schum. Enum. pl. Saell. (1801-1803) p. 424 p. p.
 Lg.: Hertogenwald (Lamb.).
- 6 D. calycioides (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 467.
 Peziza Rehm Ascom. n. 159; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.
 Helotium Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 309.
 Bt: Uccle, Watermael (Bm. et R.).
- D. caulicola (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 463.
 Peziza Fries Syst. myc. II (1823) p. 94.

Helotium — Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 134; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129.

Lx.: Poix (Bm. et R.), Laroche (Él. M.). — Bt: Auderghem (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.).

8 **D. cerina** (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 305; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 453; Lamb. Fl. myc. II p. 534.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 651; Kicka Fl. crypt. I p. 489; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), entre Auderghem et Tervueren (Él. M.). — N.: Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Gand (Coem.).

9 D. ciliaris (Schrad.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 443; Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 525.

Peziza — Schrad. Journ. f. d. Bot. (1799) p. 63; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Lg.: (Lamb.). - Bt: Watermael (Bm. et R.). - N.: Marche-les-Dames (Bell.).

- var. carpinea (Mout.).

Lachnum ciliaris var. — Mout. in Bull. Soc. roy. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 20.

Lg.: Beaufays (Mout.).

10 D. clandestina (Bull.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 305; Lamb. Fl. myc. II p. 534; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 457.

Peziza — Bull. Champ. (1791-98) p. 251; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bt: Watermael (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg.: Beaufays (Mout.).

11 D. clavispora Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 18 pl. A fig. 6.
Lg.: Gomzé (Mout.).

12 D. controversa (Cooke) Rehm Ascom. n. 114; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 447.

Peziza - Oooke in Grevillea IV (1874) p. 41 t. 51 f. 264.

Lx.: Poix (Bm. et R.). - Fl. occ.: Knocke (Bm. et R.).

13 D. crucifera (Phill.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 440. Peziza — Phill. in Gard. Chron. (1878) p. 397 f. 71.

A.: Westmalle (Bm. et R.).

14 D. diminuta (Rob. et Desm.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 449; Lamb. Fl. myc. II p. 535.

Peziza — Rob. et Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3:t. VIII (1847) p. 185; Kickx Fl. crypt. I p. 488; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bt: Bergh (Bm. et R.). - Fl. or.: Audenarde (Tosquinet). - Lg.: Forêt (Mout.).

15 D. echinulata (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 444. Trichopeziza — Rehm Ascom. n. 259.

Hyalopeziza — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 293. Zone ardenn. (Lamb.).

16 D. fuscescens (Pers.) Rehm Ascom. n. 457; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 461.

Peziza - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 654; Bomm. et Rouss. Fl. myc. cnv. Brux. p. 126.

Lachnella — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1987) p. 297.

Bt: env. de Bruxelles A R. (Bm. et R.). - Lg.: env. de Liége (Mout.).

17 D. fusco-sanguinea Rehm Ascom. n. 112; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 459.

Trichopeziza — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 294. Zone ardenn. (Lamb.).

- 18 **D. laetior** (*Karst.*) Sacc. Syll. Fung. VIII (1869) p. 441. Lachnum - Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 173. Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 19 D. Moutoni (Rehm).

Lachnum - Rehm ex Mout, in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 19.

Lg.: Gomzé (Mout.).

20 D. nivea (Hedw.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 437.

Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 90; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Propolis — Kicka Fl. crypt. I (1867) p. 455.

Octospora — Hedw. f. Musc. frond. t. VIII f. B.

Fl. occ.: entre Ostende et Blankenberghe (Kickx). - Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael, entre Auderghem et Tervueren (El. M.).

21 D. parvula (Bomm. et Rouss.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 460. Lachnella - Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 127. Trichopeziza - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 296.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

22 D. patens (Fries) Rehm Ascom. n. 156; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 466.

Peziza clandestina var. - Fries Syst. myc. II (1823) p. 94.

Peziza palearum Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 365; Kickw Fl. crypt. I p. 489; Bomm. et Rouss: Fl. myc. env. Brux. p. 127; Lamb. Fl. myc. II p. 537.

Trichopeziza — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 296.

Fi. occ. : Knocke (Bm. et R.). - Bt: Groenendael (Bm. et R.). - Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.).

- D. pudica (Bomm. et Rouss.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1887) p. 448.
 Peziza Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 126.
 Trichopeziza Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 296.
 Bi: Watermael (Bm. et R.).
- 24 D. pulverulenta (Lib.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 462.
 Peziza Lib. Crypt. Arduenn. n. 125.
 Bt: Auderghem (Bm. et R.), Héverlé, Vosselaer (Paque).
- 25 D. solfatara (Cooke et Ell.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 463. Peziza Cooke et Ell. in Grevillea VII (1878) p. 7.

 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 26 D. spiraeicola (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 442. Lachnum — Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 170.
 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 27 D. vernalis (Schum.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 442. Peziza — Schum. Enum. pl. Saell. (1801-1803) p. 425. Trichopeziza — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 294. Zone ardenn. (Lamb.).
- D. virginea (Batsch) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 305; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 432; Lamb. Fl. myc. II p. 534.
 Peziza Batsch Elench. (1783) p. 125.
 Bt: Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). Lg.: (Lamb.).
 - 37 COMESIA Sacc. Consp. gen. Disc. (1884) p. 6 et Syll. Fung. VIII p. 468.
- C. cunicularia (Boud.) Succ. Syll. Fung. VIII (1889) p. 468.
 Peziza Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 68.
 Ascobolus Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 133.
 Ascozonus Renny; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 283.
 Lg.: Angleur, Forêt (Mout.). Bt: Auderghem (Él. M.). N.: Marche-les-Dames (Él. M.).
- 2 C. Leveillei (Crouan) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 468. Thecotheus — Crouan Fl. Finist. (1867) p. 57. t. ult. f. 1; Lawb. Fl. myc. Supplém. I p. 282. Zone calc. (Lamb.).
 - 38 TROMERA Mass. ex Arnold in Flora (1858) p. 507; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 469.
- T. difformis (Fries) Rehm Ascom. n. 577; Sacc. Syll. Fung. VIII.
 p. 469.

Patellaria — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 275. Zone ardenn. (Lamb.).

- 2 T. olivacea (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 470. Retinocyclus — Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 332. Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 3 T. resinae (Fries) Koerb. Par. Lich. (1865) p. 453; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 469.

Lecidea — Fries Obs. myc. I (1815) p. 180. Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 149. Lx.: Ébly (Él. M.).

SECT. PHAEOSPORAE.

- 39 PHAEOPEZIA Sacc. in Mich. I (1877) p. 71 et Syll. Fung. VIII p. 471.
- P. crinita (Bull.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 474.
 Peziza Bull. Champ. (1791-98) p. 249 t. 416 f. 2.
 Scutellinia Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 301.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 P. murina (Fuck.) Sacc. Consp. gen. Disc. (1884) p. 6 et Syll. Fung. VIII p. 471.

Plicaria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 326.

Peziza — Fuck. Fungi Rhen. n. 1597.

Crouaniella - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 320.

Lx.: Neufchateau (Él. M.). - Bt: Evere (Él. M.). - Fl. occ.: Ostende (Él. M.).

3 P. radula Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. XVIII p. 77; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 471.

Pustularia — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 322. Lg.: Forêt (Mout.).

SECT. HYALODIDYMAE.

- 40 HELOTIELLA Sacc. Consp. gen. Disc. (1884) p. 6; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 474.
- H. Drosodes (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 476.
 Helotium Rehm Ascom. n. 566; Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887)
 p. 308 (err. Drowdes).
 Zone ardenn. (Lamb.).
 - 41 SOLENOPEZIZA Sacc. Syll. Fung. VIII p. 477.
- 1 S. consimilis (Oud. et Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 478.
 Lachnum Oud. et Rehm in Oud. Contrib. à la flore myc. des Pays-bas
 XV (1888) p. 25.

Bi: Groenendael (Bm. et R.).

2 S. vulpina (Cooke) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 478.

Peziza - Cooke in Hedwigia (1875) p. 82,

Bi: Groenendael (Bm. et R.).

- 42 BISPORELLA Sacc. Consp. gen. Disc. (1884) p. 479 et Syll. Fung. VIII p.
- B. monilifera (Fuck.) Sacc. Consp. gen. Disc. (1884) p. 5 et Syll.
 Fung. VIII p. 479; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128.
 Bispora Fuck. Symb. myc. (1869) p. 310 t. IV f. 54.

Bt: env. de Bruxelles A.C. (Bm. et R.).

- 43 NIPTERA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 359; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 480.
- 1 N. lacustris Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 359; Lamb. Fl. myc. II p. 516.

Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 143; Kickx Fl. crypt. I p. 481; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.

N.: Coubry, Willerzie (Aub.). — Bt: Bergh, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. or.: Gand (Kickx). — Lx.: Samrée (Él. M.).

2 N. laricina (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 481.

Pyrenopeziza — Rehm Ascom. III p. 511; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 289.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 N. perpusilla Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 222.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

- 44 DERMATELLA Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 209; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 489.
- D. eucrita (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 491.
 Pezicula Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 166.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 D. Frangulae (Fries) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 209; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 489.

Tympanis — Fries Syst. myc. II (1823) p. 174.

Dermatea — Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 161.

Cenangium — Tul.; Kickx Fl. crypt. I p. 472.

Pezicula — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 279; Lamb. Fl. myc. II p. 494.

N.: Patignies, Gedinne (Aub.). — Lg.: Gomzé (Mout.). — Fl. or.: env. d'Audenarde (Tosquinet).

3 D. livida (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 490.

Patellaria — Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. (?) n. 775 sec. Sacc. loc. cit.

Pezicula - Rehm Ascom. n. 462.

Lecanidion — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 274.

Zone ardenn. (Lamb.).

45 BELONIUM Sacc. Consp. gen. Disc. (1884) p. 7 et Syll. Fung. VIII p. 492.

1 B. graminis (Desm.) Sacc. Consp. gen. Disc. (1884) p. 7 et Syll. Fung. VIII p. 493; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 314.

Peziza — Desm. VIII Note p. 5; Kickx Fl. crypt. I p. 481; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Pseudopeziza — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 514.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Watermael (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — Fl. occ.: env. d'Ypres (Wallays), Ostende (Bm. et R.).

B. pullum Phillips et Keith in Grevillea VI (1877) p. 75 t. 97
 f. 8-11; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 494.
 Lb.: Genck, Kinroy (J. Massart).

3 B. retincolum (Rabenh.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 495i
Helotium — Rabenh. in Kalchbr. A. Szepesi Gomb. (1865) t. II fig. 1.
Tapesia — Karst. Rev. (1885) p. 137; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 305.
Zone ardenn. (Lamb.).

46 BELONIDIUM Mout. et Dur. Fl. Alg. (1846) t. XXVIII f. 8; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 496.

B. aurelia (*Pers.*) De Not. in Comm. Soc. crit. it. I (1863) p. 381;
 Sacc. Syll. Fung. VIII p. 499.

Peziza — Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 270; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Bt: Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — Lg.: Angleur, Forêt (Mout.).

2 B. campanula (Nees) De Not. in Comm. Soc. crit. it. I (1863) p. 380; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 503.

Peziza — Nees Syst. d. Pilze (1816) p. 71 f. 295.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

3 B. citrinellum Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1891) p. 223.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 B. fimisedum Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 20.

Lg.: env. de Liége (Mout.)

- 5 B. glabro-virens (Boud.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 498.

 Helotium Boud. in Bull. Soc. Bot. de France. (1881) p. 95 pl. II f. 2.

 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 6 B. imperspicuum Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 222.

 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 7 B. Marchalianum Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 167; Lamb. Fl. myc. Suppl. I p. 315.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 8 B. vexatum De Not. in Comm. Soc. critt. it. I (1863); Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 315; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 503.
 Lx.: Auby (Bm. et R.). Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).
 - var. litoreum Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 504.
 Belonidium Karst. Symb. myc. (1869) p. 213.
 Peziza Fries Syst. myc. (1869) p. 212; Kickw Fl. crypt. I p. 485;
 Lamb. Fl. myc. II p. 539.

Helotium — Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 129.

Bi: Auderghem (Bm. et R.), Bergh (Del.). — Fi. occ.: Zillebeke, Dickebusch (Wall.).

SECT SCOLECOSPORAE.

- 47 GORGONICEPS Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 15; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 504.
- G. Guernisaci (Crouan) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 505.
 Vibrissea Orouan in Ann. Sc. nat. sér. 4 (1857) pl. 4 fig. 24-27.
 N.: Mariembourg (Bm. et R.).
- 2 G. micrometra (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 506.
 Peziza Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. n. 773.
 Lg.: Gomzé (Mout.).
- 3 G. obscura Rehm Ascom. II et Exs. n. 714; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 506.

Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).

48 ERINELLA Sacc. Syll. Fung. VIII p. 507.

- 1 E. albo-carnea (*Crouan*) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 510. Peziza *Crouan* Fl. Finistère (1867) p. 52. Lg.: Gomzé, Dolembreux (Mout.).
- 2 E. discolor *Mout*. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 20 pl. A fig. 16.

 Lg.: env. de Liége (Mout.).

3 E. rhaphidophora (Berk. et Cooke) Sacc. Syll. Fung. VIII (1869)

Peziza — Berk. et Cooke Cub. Fungi n. 683.

Lg.: Hestreux (Bm. et R.).

FAM. ASCOBOLACEAE.

SECT. PHAEOSPORAE.

- 1 BOUDIERELLA Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXIV (1895) p. 131.
- 1 B. cana Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXIV part. I (1895) p. 131 pl. I fig. 4-4c.
 Ardennes (Él. M.).
 - 2 ASCOBOLUS Pers. in Gmel. Syst. (1791) p. 1461; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 514.
- 1 A. aerugineus Fries Obs. myc. II (1818) p. 310; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 514; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 132; Lamb. Fl. myc. II p. 511.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 A. atrofuscus Phill. et Plow. in Grevillea II (1873-1874) p. 186 t. 24 fig. 1; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 520; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 132; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 279. Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 3 A. Crouani Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 26 pl. V fig. 2; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 131; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 522; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 278.
 Lg.: Gomzé (Mout.). Bt: Bruxelles (Él. M.), Uccle, Watermael, Groenen-
- dael (Bm. et R.). Bergh (Del.).

 4 A. denudatus Fries Syst. myc. II (1823) p. 164; Sacc. Syll. Fung.
 - VIII p. 521. Lg.: Tilff, Beaufays (Mout.).
- 5 A. furfuraceus Pers. Obs. myc. I (1796) p. 33 t. IV f. 3-6; Kickw Fl. crypt. I p. 479; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 516; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 132; Lamb. Fl. myc. II p. 510.
 - Bt: Groenendael (Bm. et R.). Fl. occ.: dans les dunes (Coem.), Ypres (Wall.). Lx.: Awennes (Él. M.). Fl. or.: env. de Gand (Coem., et Kickx).— Ht: Ath, Belœil (Él. M.).
 - var. nudus Kickw Fl. crypt. I (1867) p. 479; Sacc. loc. cit. Fl. occ.: dans les dunes (Kickx). Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

- 6 A. glaber Pers. Obs. myc. I (1796) p. 34 t. 4 f. 5 b, t. 7 a b c; Kickv Fl. crypt. I p. 478; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 517; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 132; Lamb. Fl. myc. II p. 509.
 - Fl. occ.: depuis Ostende jusqu'à La Panne (Coem.). Fl. or.: Gand (Coem.). Bt: Laeken (Él. M.). Lg.: Spa (Él. M.). Lx.: Ébly (4l. M.).
 - var. albidus Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXIV part. I (1896 p. 131.

Lx.: Werbomont, Ébly (Él. M.).

- 7 A. immersus Pers. Obs. myc. I (1796) p. 35 t. 4 f. 7; Kickx Fl. crypt. I p. 478; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 523; Lamb. Fl. myc. II p. 509. Fl. occ.: entre Nieuport et La Panne (Coem.). Bl: Etterbeek (Él. M.). Lg.: Barraque-Michel (Él. M.).
 - var. a Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 130. Bt: Etterbeek (Bm. et R.), Champ de l'Exposition nationale (Él. M.).
 - var. γ Bomm. et Rouss. loc. cit.
 Bt: Limelette (Bm. et R.).
- 8 A. Leveillei Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 35 t. VII f. 16; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 519.
 Lg.: Dolembreux (Mont.). Lx.: Arville (St-Hubert) (Él. M.).
- 9 A. Marchalii Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. de Brux. (1885) p. 131; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 516; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 278.

Bt: Avenue de Cortenberg (env. Bruxelles) (Él. M.).

- 10 A. marginatus Patouillard Tab. Anal. Fung. (1883) p. 32 fig. 76;
 Sacc. Syll. Fung. II p. 516.
 Bt: Aerschot (Él. M.).
- 11 A. viridis Curr. in Trans. Linn. Soc. XXIV (1863) p. 154; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 132; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 519; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 279.

 Lg.: env. de Liége (Mout.). Bt: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).
 - 3 SACCOBOLUS Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 38; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 525.
- J. S. neglectus Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 41 pl. IX f. 20; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 526; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 285.

Ascobolus - Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 132.

Ht: Belœil (Él. M.). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.), Aerschot, entre Aerschot et Rillaer, Beggynendyck (Él. M.). — N.: Olloy (Él. M.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

2 S. Kerverni (Crouan) Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 229 pl. VIII f. 18; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 524; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 284.

Ascobolus - Crouan Fl. Finist. (1867) p. 57.

Lg.: env. de Liége (Mout.). - Fl. or.: Denderwindeke (V. W.).

3 S. violascens Bond. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 230 pl. VIII f. 19; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 525.

Ascolobus - Bomm. et Rouss.; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 279.

N.: Yvoir (Bm. et R.). - Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

SECT. HYALOSPORAE.

- 4 ASCOPHANUS Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 51; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 528.
- 1 A. argenteus (Curr.) Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 245 pl. XI f. 32; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 133; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 280.

Ascolobus — Curr. in Berk. et Br. Ann. nat. Hist. n. 1088 t. XVII f. 32. Bt: Bruxelles (culture) (Bm. et R.).

2 A. aurora (Crouan) Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 248 pl. XI f. 36; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 529; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 133.

Peziza - Crouan Fl. Finist. (1867) p. 53.

Ascophanus auroreus Crouan; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 282.

Bt: Villers-la-ville (Bm. et R.). — Lg.: Genck (Él. M.).

3 A. carneus (Pers.) Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 250 pl. XII f. 38; Lamb. Fl. myc. II p. 507; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 532; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux., p. 133.

Ascobolus - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 666; Kicka Fl. crypt. I p. 477.

Bt: env. de Bruxelles A. C. (Bm. et R., Él. M.). — Fl. occ.: dans les dunes (Coem.). — Lb.: Maeseyck (Él. M.). — Fl. or.: Gand (Coem.). — Ht: Ormeignies (Él. M.). — Ardennes (Él. M.).

4 A. cinerellus (Karst.) Speg. Fung. Arg. II (1881) p. 97; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 279; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 532.

Pezicula — Karst. Myc. Fenn. (1871) p. 51.

Lx.: Awenne (Él. M.).

5 A. cinereus (Crouan) Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1669) p. 249 pl. XI f. 37; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 531.

Ascobolus — Crouan Fl. Finist. (1867) p. 56; Kickx Fl. crypt. I.p. 477; Lamb. Fl. myc. II p. 508.

Lg.: Gomzé (Mout.). — Fl. or.: Gand (Coem.).

6 A. Coemansii Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 244 pl. X fig. 30; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 280.

Ascolobus — Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 133.

- Lg.: Angleur (Mout.). Bt: Vilvorde, Champ de l'exposition nationale (Él. M.).
- 7 A. conformis (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 533.
 Pezicula Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 83.
 Lx.: Samrée (Bm. et R.).
- 8 A. granuliformis (Crouan) Boud. in Ann. Sc. nat. Sér. 5 t. X (1869) p. 245 pl. X f. 31; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 530; Lamb. Fl. myc. II p. 508; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 135. Ascobolus Crouan Fl. Finist. (1867) p. 56; Kickx Fl. crypt. p. 477 p. p. Peziza Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 50.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ.: Nieuport à La Panne (Coem.). — Fl. or.: Gand (Coem.).

- 9 A. Holmskjoldii Hansen Fungi fim. Dan. (1876) p. 12 t. VI f. 1-8; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 530; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 281. Ascobolus — Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 133. Bt: Tervueren (Él. M.). — Lg.: Gomzé (Mout.). — N.: Namèche (Él. M.).
- 10 A. lacteus (Cooke et Phil.) Phil. Discom. (1887) p. 306; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 528; Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887 p. 280. Ascobolus — Cooke et Phil. in Grevillea V (1876) p. 119. Ardennes (Lamb.).
- 11 A. minutissimus Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 243 pl. 10 f. 29; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 533; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 281.
 Ascobolus Bomm. et Rouss Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 133.

Ascobolus — Bomm. et Rouss Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 133. Bt: Etterbeek (Él. M.).

- 12 A. ochraceus Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 247 pl. II fig. 34; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 531; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 282.

 Lg.: Aywaille (Él. M.), Liége, Beaufays (Mout.).
- 13 A. Oudemansii El. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 71; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 534; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 281.

Lg.: Aywaille (Él. M.).

14 A. saccharinus (Curr.) Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869)
p. 251 pl. XII fig. 40; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 251.
Ascobolus — Curr.; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 281.
Bi: Boitsfort (Bm. et R.). — Lg.: Beaufays (Mout.).

15 A. subfuscus Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 242 pl. X f. 28; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 532; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 281.

tg.: Angleur (Mout.). — Bt: Champ de l'exposition nationale (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.).

- 16 A. vicinus Boud. in Ann. Sc. nat. Sér. 5 t. X (1869) p. 246 pl. XI fig. 33; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 530; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 282.
 - Bt: Malaise (El. M.). Lg.: Beaufays (Mout.). Lx.: Hives (Él. M.).
 - 5 LASIOBOLUS Sacc. Consp. gen. Discom. (1834) p. 8 et Syll. Fung. VIII p. 536.
- L. brachyascus Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.
 t. XXIV part. 1 (1885) p. 73; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 285.
 tg.: Werbomont (Él. M.).
- 2 L. ciliatus (Berk.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 537.

Ascobolus — Berk. Engl. Fl. V (1936-1843) p. 374; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 133.

Ascophanus — Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 253; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 281.

Ascobolus papillatus var. - Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 476.

Fl. or.: Gand (Coem.). — Bt: Bois de la Cambre (Él. M.), Tervueren (Bm. et R.). — Ht: Ath (Él. M.).

3 L. equinus (Muell.) Karst. Rev. (1885) p. 112; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 536.

Peziza - Muell. in Fl. Dan. (1778) t. 779 f. 3.

Ascobolus pilosus var. equinus Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 134.

Ascophanus pilosus var. — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 280.

Peziza papillata Pers. Syn. Fung. (1801) p. 650.

L'asiobolus — Sacc. in Bot. Centr. (1884); Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 285; cf. Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 p. 72.

Ascobolus — Wallr. Consp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 513; Kickv Fl. crypt. I p. 476; Lamb. Fl. myc. II p. 506.

Ascophanus — Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 254 pl. XII f. 41. Peziza diversicolor Fries Syst. myc. II (1823) p. 88; Kickx Fl. crypt. I p. 491.

Scutellinia — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 301.

Plicaria — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 567.

? Fl. or.: Gand (Coem.). — Bt: Bruxelles, Laeken (Él. M.). — Lx.: Grupont (Él. M.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.)?, Namèche (El. M.). — Fl. occ.: P Nieuport (West.), Gand (Él. M.).

L. equinus f. minor El. March.

Lasiobolus papillatus f. minor Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. I (1885) p. 63.

Minutus 0,2-0,4 mm. applanatus, 8 sporis subglobosis 12-14 μ diam.

Bi : Bruxelles (Él. M.).

4 L. pilosus (Fries) Sacc. Consp. gen. Discom. (1884) p. 8 et Syll. Fung. VIII (1889) p. 537.

Ascobolus - Fries Syst. myc. II (1823) p. 164.

Ascophanus — Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 254 pl. XII f. 42-44; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 280.

Ht: Belœil, Camp de Castiau (Él. M.). — Bt: Tervueren, Etterbeek (Él. M.). — Lb.: Maeseyck (Él. M.). — Lx.: Chiny, Ébly, Awennes (Él. M.).

- 6 RYPAROBIUS Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 47; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 539.
- R. brunneus Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 237 pl. IX
 f. 23; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 540; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 284.
 Lg.: Liége (Mout.).
- 2 R. crustaceus (Fuck.) Rehm Ascom. p. 52; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 539; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 283.

Ascobolus — Fuck. in Hedwigia (1866) p. 4.

Ascobolus Cookei Crouan Fl. Finist. (1867) p. 56 pl. suppl. f. 3.

Ryparobius — Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 238 pl. IX f. 24. Ardennes (Él. M.). — Lg.: Liége (Mout.).

- 3 R. dubius Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 240 t. X f. 26; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 541; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 284. Ascobolus — Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 133.
 - Bt: Aerschot (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.) Ht: Stambruges (Él.M.). N.: La Plante (Él. M.). Lx.: Barvaux (Él. M.).
- 4 R. myriosporus (Crouan) Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 240 pl. X fig. 27; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 540; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 283.

Ascobolus - Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) pl. X fig. 27.

Lg.: Angleur (Mout.). - A.: Wesmalle (Bm. et R.). - Lb.: Lanacken, Genck (Bm. et R.).

- 5 R. oligoascus (Heimerl) Sacc. Syll. Fung. X (1892) p. 33.
 Ascobolus -- Heimerl Nieder Oest. Ascob. (1889) p. 27 t. I f. 1.
 Bt: St-André (Bruges) (Van Aerdschot).
- 6 R. Pelletieri (Crouan) Sacc. in Mich. I (1878) p. 605; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 547.

Ascobolus — Oronan Fl. Finist. (1867) p. 56; Kickx Fl. crypt. I p. 477; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 132; Lamb. Fl. myc. II p. 507. Thecotheus — Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 236 pl. IX fig. 22.

Ht: au Happart (Sirault), Belwil (Él. M.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or.: Denderwindeke (V. Wilder), Gand (Coem.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

7 R. polysporus (Karst.) Sacc. in Mich. II (1879) p. 571 et Syll. Fung. VIII p. 539.

Pezicula - Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 82.

Lx.: Poix (Él. M.).

8 R. sexdecimsporus (Crouan) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 541.
Ascobolus — Crouan in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. IX (1858) p. 195 pl. XIII
f. 21-26; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 133.

Ascosphanus — Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 227 pl. XI f. 35.

Bi: Etterbeek (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — Lx.: Ébly (Él. M.). —

Hi: Ath, Stambruges (Él. M.).

9 R. Winteri El. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIV part. 1 (1885) p. 71 pl. IV fig. 1-7; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 284.

Bt: Tervueren (Él. M.). - Lg.: Beaufays (Mout.).

FAM. DERMATEACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

- 1 DERMATEA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 362; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 550.
- D. Ariae (Pers.) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 160; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 551; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 269.
 Peziza Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 325.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 D. Cerasi (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 362; Kickw Fl. Crypt. I p. 474; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p, 136; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 550.

Peziza — Pers. Tent. Disp. meth. Fung. (1897) p. 35.

Cenangium — Fries Syst. myc. II (1823) p. 180; Lamb. Fl. myc. II p. 482. Bt: Louvain (Paque), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ.: Menin (West.). — N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. oc.: Gand (Kickx).

- 3 D. Haughtonii Phill.; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 569. Zone ardenn. (Lamb.).
- 4 D. Padi Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 362; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 551.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

- 2 CENANGIUM Fries Syst. myc. II (1822) p. 177; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 556.
- 1 C. Abietis (Pers.) Rehm Discom. p. 227; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 560.

Peziza - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 671.

Cenangium ferruginosum Fries Syst. myc. II (1823) p. 187; Kickx Fl. crypt. I p. 472; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 137; Lamb. Fl. myc. II p. 484.

Bt: Groeneudael (Bm. et R.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl.occ. Bruges (West.). — Fl.or.: Rooborst (Kickx).

2 C. aparine (Wallr.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 271; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 563.

Tympanis — Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. t. IV (1883) p. 424; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 270.

N.: Hastière (Bm. et R.).

- 3 C. Coryli Corda Ic. Fung. V (1842) p. 78 t. IX f. 63; Kicka Fl. crypt. I p. 473; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 559; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 137; Lamb. Fl. myc. II p. 485. Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). Fl. or.: env. d'Audenarde (West.).
- 4 C. furfuraceum (Roth) De Not. in Comm. Soc. critt. it. I (1863) p. 30; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 565; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 137.

Peziza — Roth Cat. bot. II (1800) p. 257 t. IX f. 3.

Dermatea — Fuck.; Lamb. Fl. myc. II p. 492 et Supplém. I p. 268.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 5 C. helotioides Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 p. 81; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 262.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 6 C. laricinum Fuck. Symb. myc. (1869) p. 270. Lg.: Dolembreux (Mout.).
- 7 C. Prunastri (Pers.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 180; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 556; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 137; Lamb. Fl. myc. II p. 483.

Peziza - Pers. Tent. disp. Meth. Fung. (1797) p. 35.

Bt: Laeken (Bm. et R.).

8 C. pulveraceum (Alb. et Schwein.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 181; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 557; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.

Brux. p. 137; Lamb. Fl. myc. II p. 487. Peziza — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 442 t. VIII f. 2. Bt: Groenendael (Bm. et R.).

9 C. Sarothamni Fuck. Symb. myc. (1869) p. 270; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 558; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 266.

Bt: Villers-la-ville (Bm. et R.).

- 3 TYMPANIS Tode Fung. Meckl. I (1790) p. 23; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 578.
- 1 T. alnea (Pers.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 174.

Cenangium — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 271; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Peziza - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 673.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 T. conspersa Fries Syst. myc. II (1823) p. 175; Kickx Fl. crypt. I p. 475: Sacc. Syll. Fung. VIII p. 578; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 270.

Cenangium — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 272; Lamb. Fl. myc. II p. 487.

- N.: Citadelle de Namur (Bell.). Lg.: Beaufays (Mout.). Bt: Gentinnes (de Limm.). Fl. or.: St-Amand (Kickx).
- 3 T. Ligustri Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 154; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 580; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 270. Cenangium Fuck. Symb. myc. (1869) p. 268.

N.: Hastière (Bm. et R.).

4 T. pinastri Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 151 c. ic.; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 579.

Cenangium — Fuck. Symb. myc. (1889) p. 269; Lamb. Fl. myc. Suppl. I p. 266.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 5 T. populina (Fuck.) Sacc. Consp. gen. Disc. (1884) p. 8 et Syll. Fung. VIII p. 582; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 269. Cenangium Fuck. Symb. myc. (1869) p. 268. Zone ardenn. (Lamb.).
- 6 T. Syringae Fuck. Fungi Rhen. n. 2144; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 580.

Cenangium - Fuck. Symb. myc. (1869) p. 270.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

SECT. DIDYMOSPORAE.

- 4 CENANGELLA Sacc. Consp. gen. Disc. (1884) p. 9 et Syll. Fung. VIII p. 587.
- 1 C. Carpini (Hazsl.) Succ. Syll. Fung. VIII (1889) p. 589.
 Cenangium Hazsl. Einige n. oder wenigbekannte Discom. (1887) p. 10.
 Bt: Groenendæl (Bm. et R.).
- 2 C. Ericae (Niessl) Rehm Disc. (1888) p. 232; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 590.

Cenangium — Niessl Beitr. (1872) p. 61 t. VII f. 4-6; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 268.

A.: Calmpthout (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

3 C. Fraxini Sacc. Consp. gen. Disc. (1884) p. 9 et Syll. Fung. VIII. (1889) p. 390.

Cenangium - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 268.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 C. vermicosa (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 589.

Cenangium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 590; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 268.

Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

- 4 SCLERODERRIS Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 324; Sacc. Syll. Fung. VIII.
- S. amphibola (Mass.) Gill. Disc. de Fr. (1879-1882) p. 198; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 596.

Tympanis — Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 230.

Lecanidion — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 480 et Supplém, I p. 273.

Patellaria - Nyl.; Kickx Fl. crypt. I p. 470.

Fl. or. : Renaix (Coem.), Aeltre (Kickx). - Fl. occ. : Gheluvelt (Kickx).

2 S. fuliginosa (Pers.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 216; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 595.

Sphaeria - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 52.

Fl. or.: Termonde (West.). - N.: Géronsart (Bell.). - Lb.: Beverloo (West).

3 S. ribesia (Pers.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 215; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 594.

Peziza — Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 35.

Cenangium Ribis Fries Syst. myc. II (1823) p. 179; Kickw Fl. crypt. I

p. 472; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 137; Lamb. Fl. myc. II p. 481.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

4 S. seriata (Fries) Rehm Disc. (1888) p. 211; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 595.

Cenangium — Fries Syst. myc. II (1823) p. 185.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 6 CRUMENULA De Not. Disc. (1864) p. 9; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 600.
- 1 C. pinicola (Rabenh.) Karst. Myc. Fenn. (1871) p. 210; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 600.

Peziza — Rabenh. Fl. Neom. (1804) p. 385.

A.: Calmpthout (Bm. et R.).

SECT. SCOLECOSPORAE.

- 7 GODRONIA Moug. Cons. génér. vég. des Vosges. (1845); Sacc. Syll. Fung. VIII p. 601.
- 1 G. rhabdospora (Berk. et Cooke) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 602.

Tympanis - Berk. et Cooke N. Am. Fungi n. 762.

Lg.: Gomzé, Forêt (Mout.).

2 G. urceolus (Alb. et Schwein.) Sacc. Fungi it. p. 40 et Syll. Fung. VIII p. 601.

Peziza - Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 322 t. III f. 4.

Cenangiella - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 271.

Cenangium - Fries Syst. myc. II (1823) p. 182.

Peziza globularis Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 326.

Cenangium — Fries Summa Veg. Scand. (1844) p. 364.

Lg. : Forêt (Mout.).

- 8 POCILLUM De Not. Prof. Disc. (1864) p. 361; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 605.
- 1 P. Cesatii (Mont.) De Not. Prof. Disc. (1868) p. 361; Sacc. Syll. Sacc. Syll. Fung. VIII p. 605; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 316. Helotium Mont. Syll. Crypt. (1856) p. 187. Zone ardenn. (Lamb.).

FAM. BULGARIACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

- 1 LEOTIA Hill. Hist. Plant. (1751) p. 49; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 609.
- 1 L. platypoda (DC.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 28; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 610; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 130; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 277.

Helvella - DC. Fl. fr. VI (1815) p. 29.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

2 L. lubrica (Scop.) Pers. Syn. Fung. (1801) p. 613; Kickw Fl. crypt. 1 p. 500; Kickw Fl. de Louv. p. 181; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 130; Lamb. Fl. myc. II p. 501.

Elvella — Scop. Fl. Carn. II (1772) p. 477.

- N.: Marche-les-Dames, Géronsart (Bell.). Fl. occ.: env. d'Ypres, de Courtrai et de Bruges (West.). Bt: Cortenberg, Auderghem (Kickx), Gentinnes (de Limm.), La Hulpe, Uccle (Bm. et R.), Linkebeek (Gravis). Fl. or.: Grammont (Kickx).
- 3 L. atrovirens Pers. Myc. Eur. (1822) p. 202 t. 9 f. 1-3; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 610.

Bt: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

- 2 OMBROPHILA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 357; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 613.
- 1 0. Limosella (Karst.) Rehm Ascom. n. 508; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 613.

Ombrophila violacea var. — Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 88.

Geoscypha - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 320.

Peziza janthina Fries Syst. myc. II (1823) p. 130.

Helotium - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 307.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 STAMNARIA Fuck. Symb. myc. (1860) p. 309; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 620.
- 1 S. Equiseti (Hoffm.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 620.

Peziza - Fries; Kicka Fl. crypt. I p. 484.

Lycoperdon — Hoffm. Crypt. (1790) t. V f. 1.

Stamnaria Persooni Fuck. Symb. myc. (1869) p. 309; Lamb. Fl. myc. II p. 540.

Peziza - Moug. in Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 288 c. ic.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Lx.: Ardennes AC: (Él. M.).

- 4 ORBILIA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 357; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 621.
- Calamaria (Ces.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 632.
 Peziza Ces. in Klotzsch Herb. myc. n. 1926 et in Flora (1855) p. 267.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 O. chrysocoma (Bull.) Sacc. Syll, Fung. VIII (1889) p. 624.
 Calloria Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 359; Lamb. Fl. myc. II
 p. 500.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). - N.: Yvoir (Bm. et R.).

3 O. coccinella (Somm.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 98; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 628.

Peziza — Somm. Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 226.

Calloria — Fries Summa Veg., Scand. (1849) p. 357; Lamb. Fl. myc. Snpplém. I p. 277.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 0. diaphana (Sow.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 633.

Peziza - Sow. t. 389 f. 7; Kicka Fl. crypt. I p. 480.

Calloria - Phill. Discom. (1887) p. 335.

Pezizella — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 527.

Ubi? (Coem.).

- O. epipora Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 100; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 626.
 Sine loco (Él. M.).
- 6 0. fugax Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 228. Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 7 0. leucostigma Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 357; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 629.

Peziza — Fries. Obs. I (1815) p. 165; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Niptera - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 287.

Bt: La Hulpe, Auderghem (Bm. et R.).

O. luteo-rubella (Nyl.) Karst. Myc. Fenn. (1871) p. 101.
 Peziza — Nyl. Obs. (1861) p. 55.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

9 **0.** rosella (*Rehm*) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 63. Calloria — *Rehm* Ascom. III.

N.: Hastière (Bm. et R.).

Rozei Quél. X Suppl. Champ. du Jura et des Vosges (1877-1889)
 14 t. IX fig. 15; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 623.

- N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 11 0. rubella (Pers.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 102; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 621.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 635; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Pezizella — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 299; Lamb. Fl. myc. II p. 527.

8t: Rouge Cloître (Bm. et R.). — N.: St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- O. rubicunda (Sacc. et Speg.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 622.
 Calloria Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. p. 429.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 13 0. vinosa (Alb. et Schwein.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 101; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 622.

Peziza - Alb. et Schwein; Kickx Fl. crypt. I p. 480.

Calloria — Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 134; Lamb. Fl. myc. II p. 500.

Bi: Groenendael (Bm. et R.), Notre-Dame de bonne-Odeur (Él. M.). — Fl. occ.: Menin (West.). — Lg.: Beaufays, Tilff (Mout.).

14 O. xanthostigma Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 357; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 629.

Peziza — Fries Obs. myc. I (1815) p. 166.

Calloria — Phill. Discom. (1887) p. 329; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 134; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 277.

Pezizella - Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 528.

Bt: Auderghem, Groenendael (Bm. et R.). - Ht: Blicquy (El. M.).

SECT. PHAEOSPORAE.

- 5 BULGARIA Fries Syst. myc. II (1823) p. 166; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 636.
- B. inquinans (Pers.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 167; Kickx Fl. crypt. I p. 499; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 636; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 130; Lamb. Fl. myc. II p. 504.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — .N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Meirelbeke (Gand) (Kickx).

SECT. DIDYMOSPORAE.

- 6 CALLORIA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 359; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 639.
- C. fusarioides (Berk.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 359;
 Sacc. Syll. Fung. VIII p. 639; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.

Brux. p. 134; Lamb. Fl. myc. II p. 499.

Peziza fusarioides Berk. in Mag. Zool. et Bot. n. 12 t. II f. 4; Kicka Fl. crypt. I p. 479.

Peziza neglecta Lib. Crypt. Arduen. n. 29.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Fl. oc.: env. de Gand (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

2 C. Winteri Kunze Exsic. n. 283 cf. Sacc. Syll. VIII p. 641; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 277.
Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

7 CORYNE Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 190; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 641.

1 C. atrovirens (Pers.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 641.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 635.

Coryne virescens Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 193 t. XVIII f. 12-15;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 130; Lamb. Fl. myc. II p. 502.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lg: Beaufays (Mout.).

2 C. sarcoides (Jacq.) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 190 t. XVII fig. 1-10; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 130; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 642; Lamb. Fl. myc. II p. 502 et Supplém. I p. 276.

Lichen - Jacq. Misc. aust. II (1781) t. 20.

Bulgaria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 168; Kichw Fl. crypt. I p. 499. Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 633.

Bit: Groenendael, La Hulpe, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fi. or.: Aeltre (Kickx.).

3 C. urnalis (Nyl.) Sacc. Fung. Ven. Ser. IV (1873-1882) n. 69 et Syll. Fung. VIII p. 642; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 276.

Ombrophila — Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 87.

Bulgaria — *Nyl.* Obs. (1861) p. 73.

Zone ardenn. (Lamb.).

FAM. STICTACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

- 1 PROPOLIS Fries Syst. Veg. Scand. (1849) p. 372; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 648.
- P. Betulae Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 327; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 650.

Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).

2 P. faginea (Schrad.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 244; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 648.

Hysterium - Schrad. Journ. f. die Bot. II (1799) p. 68.

Stictis versicolor Fries Syst. myc. II (1823) p. 198.

Propolis — De Not. Disc. (1864) p. 9; Lamb. Fl. myc. II p. 446 et Supplém. I p. 260.

Stictis alba Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 372.

Propolis versicolor var. — Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 144.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Auderghem (Bm. et R.), Notre-Dame de bonne-Odeur (Él. M.). — N.: Fond d'Arquet (Bell.).

- 3 P. Rosae Fuck. Symb. myc. (1869) p. 254; Lamb. Fl. myc. II p. 447; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 649.
 N.: Hastière (Bm. et R.).
- 4 P. rubella Fuck. Symb. myc. (1869) p. 254; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 649; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 143; Lamb. Fl. myc. II p. 447.

 Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 5 P. tetraspora Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 170 t. I fig. 11.

 Lg: Chaudfontaine, Dolembreux (Mout.).
- 6 P. transversalis Fuck. Symb. myc. (1869) p. 254; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 143; Lamb. Fl. myc. II p. 448. Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
 - 2 OCELLARIA Tul. Sel. Carp. Fung. III (1865) p. 129; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 654.
- O. aurea Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 129; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 655.

Peziza - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 667.

Peziza ocellata Pers. Syn. Fung. (1801) p. 667.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ.: Middelkerke (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 3 NAEVIA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 373; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 658.
- N. circinata (Lib.) Rehm Disc. (1888) p. 144; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 661.

Stictis — Lib. Crypt. Ard. n. 232; Kickx Fl. crypt. I p. 454; Lamb. Fl. myc. II p. 444.

Fl. occ.: env. d'Ypres (Wall.).

2 N. exigua Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII

part. 2 (1890) p. 82; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 658. Lg.: près de Liége (Mout.).

3 N. Jenensis (Kunze) Rehm Disc. (1888) p. 140; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 659.

Calloria — Kunze Fungi select. n. 284; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 278. Zone ardenn. (Lamb.).

4 N. minutula (Sacc. et Malbr.) Rehm Disc. (1888) p. 146; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 659.

Propolis — Sacc. et Malbr. Fung. Gall. sér. V (1883) n. 2172.

Bi: Auderghem (Bm. et R.). — Lx.: Orval (Bm. et R.).

5 N. pusilla (*Lib.*) Rehm Disc. (1888) p. 143; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 662.

Stictis — Lib.

Lx.: Poix (Bm. et R.). — A.: Calmpthout, Hérenthals (Bm. et R.).

5 N. valvata Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 373; Kickx Fl. crypt. I p. 453; Lamb. Fl. myc. II p. 441.

Stictis - Mont. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836) p. 337.

Fl. occ.: Blankenberghe (West.), Ostende (Bm. et R.).

PRHAGMOSPORAE. Sect.

- 4 CRYPTODISCUS Corda Ic. Fung. II (1838) p. 37; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 669.
- 1 C. atro-virens (Fries) Corda Ic. Fung. II (1838) p. 37 t. XV fig. 130; Sacc. Syll. Eung. VIII p. 670; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 143.

Pseudostictis — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 261.

Bi: Groenendael, Ternath (Bm. et R.), Limelette (El. M.). - Lg.: (Lamb.).

2 C. Libertianus Sacc. et Roum. Misc. myc. I p. 10; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 673.

Pseudostictis - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 261.

- Bt: Boitsfort (Bm. et R.).
- 3 C. Moutonianus Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1889) p. 82 et Syll. Fung. VIII p. 671. Lg.: Beaufays (Mout.).
- 4 C. pallidus (Pers.) Corda Ic. Fung. II (1838) p. 37 t. XV fig. 129; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 669; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 143.

Stictis - Pers. Obs. myc. II (1799).

Pseudostictis punctiformis Lamb. Fl. myc. Supplém. II (1889) p. 261.

Bi: Groenendael (Bm. et R.), Tervueren, Hoeylaert (Él. M.).

- 5 PHRAGMONAEVIA Rehm Disc. (1888) p. 160 ex p.; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 674.
- 1 P. exigua (Desm.) Rehm Discom. (1888) p. 163; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 674.

Stictis — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 183; Kickx Fl. crypt. I p. 454; Lamb. Fl. myc. II p. 444.

Lg.: Francorchamps (Él. M.). — Fl. occ. : Raversyde (West.).

2 P. Hyperici (West.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 676.

Phacidium — West. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. V (1866) p. 40 pl. f. 7; Lamb. Fl. myc. II p. 467.

Lx.; env. de Virton (West.).

3 P. laetissima (Ces.) Rehm Disc. (1888) p. 167; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 675.

Naevia — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 249: Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 144; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 259.

Bi: Groenendael (Bm. et.R.).

- 6 XYLOGRAMMA Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 509; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 677.
- 1 X. caulincola (Fuck.) Rehm Disc. (1888) p. 170; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 678.

Xylographa - Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 48.

Lg.: Beaufays, Dolembreux (Mout.).

- 7 ODONTOTREMA Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 241; Sacc.
 Syll. Fung. VIII p. 679.
- O. inclusum (Pers.) Karst. Rev. (1885) p. 146; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 680.

Peziza — Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 307.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

SECT. SCOLECOSPORAE.

- 8 STICTIS Pers. Obs. myc. II (1799) p. 73; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 681.
- S. arundinacea *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 336; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 691.

Stictis graminum Desm. Crypt. Fr. 1845.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 S. radiata (L.) Pers. Obs. myc. II (1799) p. 73; Kickx Fl. crypt. I

(1867) p. 454; Sacc. Syll. Fung. VIII. p. 682. Lamb. Fl. myc. II p. 442.

Lycoperdon radiatus L. Syst. pl. ed. Reich. 4 p. 624.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 674.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — Fl. or.: Heusden (Kickx). — Lg.: Dolembreux (Mout.). — N.: Amée (Bell.), Han-sur-Lesse (Bm. et R.).

Stictis. radiata var. minor Fries; Kickx Fl. myc. I p. 454. Fl. or.: (Verhaegen).

- 9 SCHIZOXYLON Pers. in Ann. Wett. I (1810) p. 11; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 697.
- S. Berkeleyana (Dur. et Lev.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 251;
 Sacc. Syll. Fung. VIII p. 698.
 Stictis Dur. et Lév. Expl. sc. de l'Alg. Atl. (1850) t. 29 f. 8.

Lg.: Tilff (Mout.). — N.: Hastière (Bm. et R.).

- 2 S. immersum Pass. in Nuov. Giorn. bot. ital. (1875) n. 14; Succ. Syll. Fung. VIII p. 698.
 N.: Hastière (Bm. et R.).
 - 10 NEMACYCLUS Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 49; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 701.
- N. fimbriatulus Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 169.
 A.: Westmalle (Bm. et R.).
- 2 N. hysterioides Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 231.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 3 N. niveus (Pers.) Sacc. Consp. gen. Disc. (1884) p. 12 et Syll. Fung. VIII p. 701.

Stictis — Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 339; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 143.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Elewyt (Él. M.). — Campine (Dumont).

FAM. PHACIDIACEAE.

- 1 PHACIDIUM Fries Syst. myc. II (1823) p. 371; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 709.
- P. abietinum Kunze et Schm. Myc. Hefte I (1817) p. 35; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 714; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 265. Zone ardenn. (Lamb.).

- 2 P. Cytisi Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 40; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 717; Lamb. Fl. myc. Supplém. f p. 264. Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 P. discolor Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 80; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 716.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 4 P. fuscella Karst. Rev. (1885) p. 160; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 720. Trochila — Fuck. Myc. Fenn. I (1871) p. 248.
 Lg.: env. de Liége (Mout.).
- 5 P. geographicum Kickw Rech. cent. V (1855) p. 22; Kickw Fl. crypt. I p. 459; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 719; Lamb. Fl. myc. II p. 468.
 Flandres (Kickx).
- 6 P. lacerum Fries Obs. myc. II (1818) p. 313; Kickx Fl. crypt. I p. 458; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 713; Lamb. Fl. myc. II p. 467. Lg.: env. de Liége (Mout.). -- Bt: Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). Fl. or.: Aeltre (Kickx).
- 7 P. minutissimum Auersw. in Rabenh. Fungi Eur. n. 228; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 712; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 139; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 265.
 Lg.: Beaufays (Mout.). Lx.: Laroche (Él. M.).
- 8 P. multivalve (DC.) Kunze et Schm. Myc. Hefte I (1817) p. 42; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 710. Xyloma — DO. Fl. fr. II (1805) p. 303.
 - Phacidium Ilicis Fres.; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 139; Lamb. Fl. myc. II p. 470.
 - Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). N.: Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). Lg.: Vallée de la Lienne (Bm. et R.).
- P. Vaccinii Fries Syst. myc. II (1823) p. 575; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 709; Lamb. Fl. myc. II p. 465.
 Lx.: (Grépin).
- 10 P. verecundum Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg; t. XXIV part. 1 (1891) p. 233.
 BI: Groenendael (Bm. et R.).
- P. verrucosum (Wallr.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 717.
 Colpoma Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 422.
 Lx.: Poix (Bm. et R.).

- 12 P. Vincae Fuck. Symb. myc. (1869) p. 261; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 710; Lamb. Fl. myc. II p. 471. Sine loco (Lamb.).
 - 2 PSEUDOPEZIZA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 290; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 723.
- 1 P. cerastiorum (Wallr.) Fuch. Symb. myc. (1869) p. 291; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 725.

Peziza — Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. (1833) p. 465; Kickw Fl. crypt. I p. 481; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Niptera — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 517.

Bt: Watermael, Rouge-Cloître (Bm. et Ri), Gentinnes (de Limm.).

P. medicaginis (Lib.) Sacc. Fungi Ard. n. 90 et Syll. Fung. VIII p. 724.

Phacidium — Lasch in Klotzsch Herb. myc. n. 1729; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 139.

Phacidium — Lib. Crypt. Ard. (1832) n. 176; Kickx Fl. crypt. I p. 458; Lamb. Fl. myc. II p. 469.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Uccle (Bm. et R.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg.: env. de Liége (Van der Ryst).

3 P. radians (Rob. et Desm.) Sacc. in Rev. myc. (1885) p. 147 et Syll. Fung. VIII p. 724.

Phacidium — Rob. ex Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1842) p. 116; Kickx Fl. crypt. I p. 459; Lamb. Fl. myc. II p. 468.

Fl. or.: env. de Termonde (West.).

4 P. Ranunculi (Wallr.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 290; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 726.

Phlyctidium - Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 420.

Phacidium — Lib. Crypt. Ard. n. 69; Kicks Fl. crypt. I p. 458; Bomm. et Rouss. Fl. env. Brux. p. 139; Lamb. Fl. myc. II p. 468.

Dothidea - Fries Syst. myc. II (1322) p. 562.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

5 P. repanda (Fries) Karst. Rev. (1885) p. 161; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 727.

Phacidium — Fries Syst. myc. II (1823) p. 578; Kîckw Fl. crypt. I p. 457; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 134; Lamb. Fl. myc. II p. 466.

Bt: Watermael (Bm. et R.). - Fl. occ.: Oostvleteren (Kickx).

6 P. Trifolii (Bernh.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 290; Lamb. Fl. myc. II p. 512; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 723.

Ascobolus — Bernh. Stirp. rar. Sic. man. IV (?) p. 27 t. VI f. 5.

Phacidium Trifolii Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1869) p. 69; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 139; Lamb. Fl. myc. Suppl. I p. 264.

Trochila — De Not. Comm. Soc. critt. it. V p. 358; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 267.

Peziza trifoliorum Lib. Crypt. Ard. cent. IV (1834) n. 324; Kicke Fl. crypt. I p. 482.

Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N.: Citadelle de Namur (Bel.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: env. de Gand (Coem.). — Fl. occ.: env. de Menin (West.).

- 3 TROCHILA Fries Summa Veg. Scand. (1844) p. 367; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 728.
- 1 T. Buxi Capron in Cooke Handb. (1871) p. 768; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 139; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 267. Phacidium Lasch in Herb. myc. II n. 717. Trochila craterium var. Auct. sec. Cooke Handb. p. 768.
 Fl. occ.: env. de Bruges et d'Ypres (West.). Bt: Mousty (Bm. et R.).
- 2 T. craterium (DC.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 367; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 728; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 139; Lamb. Fl. myc. II p. 490.

Sphaeria - DO. Fl. fr. II (8865) p. 299.

Propolis — Mont. ap. Cast.; Kicka Fl. crypt. I p. 455.

Peziza Hederae Lib.

A.: Lierre (Paque), Campine anversoise (West. et Van Haes.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Bt: Jardin botanique Bruxelles (Él. M.), Eegenhoven (Paque). — N.: env. de Namur (Bell.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

- 3 T. Salieis (Tul.) Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 181; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 730; Lamb. Fl. myc. II p. 491. Flandres (West.).
- 4 T. Laurocerasi (Desm.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 367; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 729; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 139; Lamb. Fl. myc. II p. 490 et Supplém. I p. 266. Phacidium Desm. Exs. n. 188; Kicker Fl. crypt. I p. 458.

Bt: Louvain (Leburt.), Eegenhoven (Paque), Watermael (Bm. et R.). — N.: Namur (Bell.) — Fl. occ.: env. d'Ypres (West.). — Fl. oc.: env. de Gand (Kickx). — Ht: Mons? (Dumont).

— var. smaragdina (Lév.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 729.

Peziza — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 252.

Trochila — Sacc. in Rev. myc. (1885) p. 147.

Rel. Westendorpianae.

5 T. Tini (Duby) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 367; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 729.

Phacidium — Duby Bot. Gall. II (1830) p. 722.

Phacidium Laurocerasi var. — Kickw Fl. crypt. I (1867) p. 458.

Fl. occ. : Courtrai (Wall.).

- 4 STEGIA Fries Obs. myc. II (1818) p. 312; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 733.
- 1 S. Ilicis Fries Obs. myc. II (1818) p. 312; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 783; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 141.

Eustegia — Chev. Fl. env. Paris (1836) p. 443; Kickv Fl. crypt. I p. 456 Lamb. Fl. myc. II p. 477.

Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.). — Fl. or.: Bois d'Ursele (Kickx). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

SECT. DIDYMOSPORAE.

- 5 FABRAEA Sacc. in Mich. II (1881) p. 331 et Syll. Fung. VIII p. 735.
- 1 F. litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 735.
 Phacidium Rob. et Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1847) p. 181; Lamb.
 Fl. myc. Supplém. I p. 264.
 Reliquiae Westendorpianae.
- 2 F. Rousseauana Sacc. et Bomm. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 168; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 266. Bt: Ottignies (Bm. et R.).

SECT. SCOLECOSPORAE.

- 6 COCCOMYCES De Not. in Giorn. bot. it. II (1847) p. 38; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 744.
- 1 C. coronatus (Schum.) De Not. in Erb. critt. it. Ser. I n. 236; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 744; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Ascobolus - Schum. Enum. pl. Saell. II (1803) p. 437.

Phacidium — Fries Obs. myc. I (1815) p. 167; Kickx Fl. crypt. I p. 457; Lamb. Fl. myc. II p. 464.

- N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Bt: Gentiunes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). Lg.: Beaufays (Mout.).
- 2 C. dentatus (Kunze et Schm.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 59; Sacc.

Syll. Fung. VIII p. 745; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Phacidium dentatum Kunze et Schm. Myc. Hefte I (1817) p. 41; Kicker Fl. crypt. I p. 457; Lamb. Fl. myc. II p. 465.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Zoetwater (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

3 C. Pini (Alb. et Schwein.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 254; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Phacidium — Fries Syst. myc. II (1823) p. 573; Lamb. Fl. myc. II p. 470. Xyloma — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 60 t. 5 f. 8.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg.: Gomzé (Mout.). — Bt: Rixensart, Groenendael (Bm. et R.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

4 C. Rubi (Fries) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 258; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 751; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Phacidium — Fries Syst. myc. II (1823) p. 578; Kickv Fl. crypt. I p. 457; Lamb. Fl. myc. II p. 467.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael. (Bm. et R.). — Fl. occ.: dans les dunes (Kickx). — Fl. occ.: Melle (Kickx).

5 C. tumidus (Fries) De Not. in Giorn. bot. it. II (1847) p. 38; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 747; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Hysterium - Fries Syst. myc. II (1823) p. 591.

H. tumidum var. trigonum Fries Syst. myc. II (1823) p. 592.

Lophodermium trigonum Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 452.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Boitsfort (Bm. et R.). — N.: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 7 RHYTISMA Fries Syst. myc. II (1823) p. 569; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 752.
- 1 R. acerinum (Pers.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 569; Kickx Fl. crypt. I p. 461; Kickx Fl. de Louvain p. 127; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 140; Lamb. Fl. myc. II p. 475; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 753.

Xyloma - Pers. Syn. Fung. (1801) p. 104.

Lx.: env. d'Arlon (Paque). — A.: env. de Turnhout (Paque). — Bt: Parc de Bruxelles (Kickx), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Louvain (Paque). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette St-Pierre (Aub.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

- var. Pseudo-platani Fries; Kickx Fl. crypt. I p. 461.
 N.: Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 2 R. Andromedae (Pers.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 567; Sacc.

Syll. Fung. VIII p. 754; Lamb. Fl. myc. II p. 474.
Xyloma Andromedae Pers. Syn. Fung. (1801) p. 104.

Lx.: entre Sauve et Laroche (Crépin).

3 R. punctatum (Pers.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 569; Kicky Fl. erypt. I p. 400; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 753; Lamb. Fl. myc. II p. 474.

Xyloma — Pers. Obs. myc. II (1799) p. 101.

Lx.: env. de Grupont (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Meirelbeke (Kickx.).

4 R. salicinum (Pers.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 568; Kickæ Flor. de Louvain p. 127; Kickæ Fl. crypt. I p. 460; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 753; Lamb. Fl. myc. II p. 475.

Xyloma - Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 5 t. 2 f. 4.

- N.: Géronsart, Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). Lx.: Corbion (Bm. et R.). Bt: Héverlé (Kickx), Gentinnes (de Limm.).
- 5 R. Urticae Fries Syst. myc. II (1823) p. 570; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 755; Lamb. Fl. myc. II p. 474.

Sine loco (West. et Van Haes.).

SECT. DICTYOSPORAE.

- 8 DOTHIORA Fries Summa Veg. Scaud. (1849) p. 419; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 764.
- 1 D. Rhamni Fuck. Symb. myc. (1869) p. 276; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 272; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 765.
 Lg.: Dolembreux (Mout.).
- 2 D. Sorbi (Wahl.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 275; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 766; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 272. Hysterium Wahl. Fl. Lapp. (1812) p. 523

Bi: Groenendael (Bm. et R.). - Lg.: Baraque-Michel (Bm. et R.).

3 D. sphaeroides (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 419;

Sclerotium — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 125.

Sacc. Syll. Fung. VIII p. 764.

Dothidea - Fries Obs. myc. II (1818) p. 348.

Dothiorella — Sacc. ex Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 257. Sphaeropsis Fraxini Lamb. Fl. myc. III (1880) p. 59.

Bt: Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Louvain, Eegenhoven (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: Liége (Lamb.). — Lx.: Poix (Él. M.).

FAM. PATELLARIACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

- 1 PATINELLA Sacc. in Grevillea (1875) p. 22 et Syll. Fung. VIII p. 769.
- 1 P. artemisioides (Roum. et Pat.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 772.

Patellaria — Roum. et Pat. in Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 136; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 275.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 P. sanguineo-atra (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 773.
Patellaria — Rehm ex Rehm et Britzelm. in 24 Bericht d. Naturhist.
Vereins Augsburg (1877).

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 2 HETEROSPHAERIA Grev. Scot. Crypt. Fl. II (1824); Sacc. Syll. Fung. VIII p. 775.
- 1 H. Patella (Tode) Grev. Scot. Crypt. Fl. II (1824) t. 103; Kickw Fl. crypt. I p. 471; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 775: Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 138; Lamb. Fl. myc II p. 479.

Bt: Eegenhoven, Zoetwater (Paque), Attenhoven (Leburt.) Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). -- N.: Louette-St-Pierre (Aub.), citadelle de Namur (Bell.). -- Lx.: Laroche (Él. M.).

- var. Lojkae Rehm Ascom. (1881) n. 15; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 776.

Pyrenopeziza — (Poykae) Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 290. Z. ardenn. (Lamb.).

- 3 PSEUDOPHACIDIUM Karst. Rev. (1885) p. 155; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 776.
- P. rugosum (Fries) Karst. Rev. (1885) p. 96; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 778.

Phacidium — Fries Elench. Fung. II (1828) p. 135; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 264.

Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. DIDYMOSPORAE.

- 4 KARSCHIA Koerb. Parerga Lich. (1865) p. 459; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 779.
- 1 K. lignyota (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 779.

Patellaria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 150; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Bruges p. 156.

Lecanidion — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 275.

Lx.: Moustreux (Bm. et R.).

2 K. perexigua Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 235.

Fl. occ.: Knocke (Bm. et R.).

- 5 PATELLEA Fries Syst. myc. II (1823) p. 149; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 783.
- 1 P. stygia (Berk. et Cooke) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 783.

 Patellaria Berk. et Cooke North Amer. Fungi n. 757.

 Lg.: Stoumont (Bm. et R.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

- 6 PATELLARIA Wahl. Suec. (1826) p. 988; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 786.
- P. alba Duby Bot. Gall. II (1830) p. 648.
 Louette-St-Pierre (Aub.).
- 2 P. olivaceo-virens (Schwein.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 159; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 788.

Peziza — Schwein. (?) n. 1334; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 P. triseptata (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 787.

Mycolecidea — Karst. Symb. XXVI (1879?) p. 26.

Bt: Auderghem (Bm. et R.).

- 7 DURELLA Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 177; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 790.
- D. compressa (Pers.) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 177
 t. XXII f. 8-14; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 790; Bomm. et Rouss.
 Fl. myc. env. Brux. p. 137; Lamb. Fl. myc. II p. 497.
 Peziza Pers. Syn. Fung. (1801) p. 670.

Patellaria compressa Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 470.

Fl. or.: Audenhove-Ste-Marie (Kickx), Gand (Coem.). — Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — N.: Bouges (Bell.).

2 D. connivens (Fries) Rehm Ascom. (1881) n. 18; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 790.

Patellaria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 151.

Lecanidion - Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 274.

Lg.: Gomzé (Mout.).

3 D. livida (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 795.

Patellaria — Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. n. 775 sec. Sacc. loc. cit.; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.).

4 D. melanochlora (Somm.) Rehm Ascom. Alp. n. 27; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 792.

Peziza - Somm. Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 297.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lx.: Poix (Bm. et R.).

5 D. parvula (Cooke) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 793.

Patellaria - Cooke Handb. (1871) p. 720.

Lg.: Gomzé, Angleur (Mout.).

- 8 LECANIDION Rabenh. Krypt. Fl. I (1844) p. 342; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 795.
- L. atratum (*Hedw.*) Rabenh. Krypt. Fl. I (1844) p. 342; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 795; Lamb. Fl. myc. II p. 480.

Patellaria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 160; Kickw Fl. crypt. I p. 470; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 135.

Peziza Patellaria Pers. Syn. Fung. (1801) p. 670.

Bt: Watermael (Bm. et R.), env. de Bruxelles (West. et Van Haes.). - Fl. or.: Gand (Coem.), Sleydinge (Kickx), près de Heyndonck (Kickx). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

2 L. atro-album (Cooke) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 798; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 274.

Patellaria — Cooke Handb. (1871) p. 718; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 L. Bagnisianum Sacc. in Mich. I (1878) p. 58 et Syll. Fung. VIII p. 799.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 L. bicolor (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 798; Lamb.

Fl. myc. Supplém. I p. 273.

Patellaria — Karst. in Rev. myc. (1889) p. 205; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bi: Groenendael (Bm. et R.).

- 5 L. dermatella Sacc. Bomm. et Rouss, in Bull. Soc, roy. de Bot. de Belgique t. XXIX part. 1 (1891) p. 235.
 Bt: Laeken (Bm, et R.).
- 6 L. fusco-atrum Rehm Ascom. (1881) n. 464; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 796.
 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 7 L. maurum (Phill.) Sacc. Syll. Fung. VIII p. 797.
 Patellaria Phill. Discom. (1887) p. 368.
 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 8 L. proximum (Berk. et Br.). Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 796; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 996; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 275. Patellaria Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. n. 965 t. XVI f. 18; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 136, Bt: Groenendael (Bm. et R.). Lg.: Dolembreux (Mout.).
 - 9 BLITRYDIUM De Not. Discom. (1864) p. 20; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 802.
- 1 B. caliciiforme (*Reb.*) De Not. Disc. (1864) p. 20; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 802.

Tryblidum - Reb. Fl. Neom. (1804) p. 388.

Phacidium - Spreng. Syst. IV (1827) p. 410.

Cenangium — Fries Syst. II (1823) p. 183.

Lg.: Beaufays (Mout.).

- 10 MYCOBILIMBIA Rehm in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1890) p. 327; Sacc. Syll. Fung. X p. 60.
- 1 M. obscurata (Sommerf.) Rehm in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1890) p. 328; Sacc. Syll. Fung. X p. 60.

Lecidea sphaeroides var. - Sommerf. Supp. lich. (1826) p. 165.

Bilimbia fusca Loennr. in Vet. Ak. Forhandl. (1858) p. 274.

Biatora - Hepp Fung. Eur. 11 p. p.

Bilimbia sphaeroides Koerb. Syst. (1855) p. 213 p. p.; Kickv Fl. crypt. I p. 261.

Fl. occ.: Menin (West.), entre Furnes et Nieuport, et entre Ostende et Blankenberghe (Kickx).

SECT. SCOLECOSPORAE.

- 11 MYCOBACIDIA Rehm in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1890) p. 337; Sacc. Syll. Fung. X p. 66.
- 1 M. herbarum (Hepp) Rehm in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1890) p. 337; Sacc. Syll. Fung. X p. 66.

Bacidia - Arn. in Flora (1865) p. 596.

Lecidea bacillifera var. - Nyl. Lapp. p. 155.

Secoliga — Hepp in Stiz. Crit. (1863) p. 46.

N.: Couvin (G. L.).

- 12 BACTROSPORA *Mass.* Ric. (1852) p. 133; Sacc. Syll. Fung. X p. 67.
- B. dryina (Ach.) Mass. Ric. (1852) p. 133; Sacc. Syll. Fung. I p. 67;
 Kickx Fl. crypt. I p. 279.

Lecidea - Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 16.

Fl. occ.: Eerneghem (Ricourt).

FAM. CALICIACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

- 1 ROESLERIA Thüm. et Pass. Symb. myc. Austr. I (1877) n. 1; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 826.
- 1 R. pallida (Pers.) Sacc. in Mich. II (1879) p. 299 et Syll. Fung. VIII p. 826.

Calicium — Pers. in Ust. Ann. Bot. VII (1794) p. 20 t. III f. 1-3.

Coniocybe - Koerb. Parerga (1865) p. 300.

Roesleria hypogaea *Thüm*. et *Pass*. Pilze d. Weinst. (1878) p. 120 t. IV fig. 9. Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.), Vilvorde (Laurent).

- 2 CONIOCYBE Ach. in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1816) p. 288.
- 1 C. furfuracea (L.) Ach. in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1816) p. 288; Kickx Fl. Louv. p. 105; Kickx Fl. crypt. I p. 248; Crombie Brit. Lich. I p. 919; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 828.

Mucor - L. Sp. pl. ed. 3 (1764) p. 1655.

Lg.: Pailhe (G. L.). — Bt: env. de Louvain et de Bruxelles (Kickx), entre Court-St-Étienne et Mousty, Groenendael (Él. M.), Héverlé (Coem.), Héverlé, Kessel-Loo (Paque). — Lx.: Longlier, Straimont (Verheggen), Vielsalm (Aigret), Laroche (Él. M.), Bouillon, Dohan (Dens et Piet.). — Fl. or.: entre Eecloo et St-Laurent, Baalegem, Hautem-St-Liévin (Kickx). — N.: env. de Namur (Leburt.).

* SECT. PHAEOSPORAE.

- 3 SPHINCTRINA Fries Pl. Homon. (1825) p. 120; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 829.
- 1 S. microcephala (Tul.) Nyl. in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 91; Crombie Brit. Lich. I p. 84.

Calicium — Tul. Mém. Lich. (1852) p. 78 t. 15 fig. 20. Sine loco (Dumont).

2 S. turbinata (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 366; Succ. Syll. Fung. VIII p. 829.

Calicium — Pers. Disp. meth. Fung. Suppl. (1797) p. 59.

Cyphelium - Hepp; Kicke Fl. crypt. I p. 247.

Fl. or.: Wetteren (Kickx).

- 4 CYPHELIUM Ach. in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1816) p. 215; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 830.
- C. trichiale Ach. Lich. Univ. (1810) p. 242; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 830.

Calicium — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 242; Crombie Brit. Lich. I p. 85. Bt: La Houssière (Dens et Piet.).

SECT. DIDYMOSPORAE.

- 5 CALICIUM Pers. in Ust. Ann. Bot. VII (1794) p. 20; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 834.
- C. chlorinum (Ach.) Stenh. Sched. crit. (1833) p. 271?; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 836.

Lichen — Ach. Lich. Suec. (1798) p. 6.

Lepraria - Ach. Svet. Flocklaf. sec. Ach. Lich. Suec. loc. cit.

- N.: Willerzie (Del. et Gravet). Ht: Stambruges (G. L.).
- 2 C. curtum Turn. et Borr. Lich. Brit. (1839) p. 148; Orombie Brit. Lich. I p. 93; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 838.
 - Bt: Bois de la Cambre (West. et Van Haes.). N.: Fond des Rivaux (Tonglet).
- 3 C. hyperellum Ach. Meth. (1803) p. 93; Kickx Fl. crypt. I p. 246; Crombie Brit. Lich. I p. 91; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 838. Lichen Ach. Prodr. (1798) p. 85.

 $Lg.: Modave (G. L.). \longrightarrow Bt: Zoetwater (Coem.). \longrightarrow Fl. occ.: Ursele (Kickx).$

4 C. pusillum (Floerke) Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 308; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 835; Kickx Fl. crypt. I p. 247.
Non encore trouvé en Belgique.

C. pusillum var. minutellum (Nyl.).

Calicium - Nyl. in Herb. Mus. fenn. (1859) p. 78.

Cyphelium parietinum var. - Kicka Fl. crypt. I (1867) p. 247.

Calicium subtile Kickx Rech. cent. II (1843) p. 21.

Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).

5 C. quercinum Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 59; Kickx Fl. crypt. I p. 246; Crombie Brit. Lich. I p. 92; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 837.

Calicium lenticulare Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 30.

Fl. or.: Onckerzeele, Grammont (Kickx). - Bt: Héverlé (Coem.).

6 C. sessile Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 59.
O. inquinans var. — Schaer. Lich. eur. (1850) p. 164.
Bt: Héverlé (Coem.).

7 C. trachelinum Ach. in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1816) p. 272 t. 8 fig. 7; Kickx Fl. crypt. I p. 246; Crombie Brit. Lich. I p. 94; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 838.

FI. occ.: Warneton, Dickebusch (Ypres) (Kickx). — FI. or.: Waarschot, Aaltre, Gand (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), St-Servais, Citadelle (Namur) (Bell.).

- 6 ACOLIUM Ach. Lich. Univ. (1814) p. 232; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 839.
- 1 A. tympanellum Ach.; Koerb. Syst. p. 303; Kicka Fl. crypt. I p. 245; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 840.

 Fl. or.: Rooborst (Kickx).

FAM. ARTHONIACEAE.

- 1 LECIDIOPSIS Almq. Mon. Arth. Scand. p. 46; Sacc. Syll. Fung. X p. 76.
- 1 L. galactites (DC.) Rehm in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 I, 3 (1884) p. 433.

Verrucaria — DO. Fl. fr. II (1805) p. 315.

Arthonia — Koerb. Parerga Lich. (1865) p. 267; Kickv Fl. Louv. p. 95; Kickv Fl. crypt. I p. 279.

Fl. occ.: env. de Bruges (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx.). — Bt: env. de Louvain (Kickx). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 ARTHONIA Ach. Lich. Univ. (1810) p. 25; Sacc. Syll. Fung. X p. 77.
- 1 A. dispersa (Schrad.) Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 279; Sacc. Syll. Fung. X p. 77.

Opegrapha dispersa Schrad. Crypt. (?) p. 467.

Fl. or.: entre Meirelbeke et Melle (Kickx). — Bt: Louvain (Coem.), env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

2 A. elegans Ach.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 241.

Arthonia ochracea Duf. in Journ. de Phys. LXXXVII p. 205; Kickv Fl. crypt. I p. 278.

Fl. occ.: Ypres (West.).

3 A. gregaria (Weig.) Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 291.

Sphaeria - Weig. Obs. bot. (1772) 53 t. 2 fig. 10.

Coniocarpon - Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 242.

Arthonia cinnabarina Wallr. Comp. Fl. Germ. III (1831) p. 320; Kicka Fl. crypt. I p. 277.

Ht: Leuze, Gallaix (G. L.). — Fl. occ.: env. d'Ypres (West.), env. de Gand et d'Audenarde (Kickx). — Bt: Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Héverlé (Paque).

— var. pruinata (Del.).

A. cinnabarina var. pruinata Del.; Kickx Fl. crypt. I p. 277.

Fl. or. : Exaarde (Kickx).

— var. anerythrea (Nyl.).

A. cinnabarina var. — Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 257; Kickw Fl. crypt. I p. 277.

Spiloma elegans Kickx Rech. cent. I (1840) p. 17.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

- var. obscura Schaer.; Koerb. Syst. Lich. p. 291.

Arthonia cinnabarina var. - Kickw Fl. crypt. I (1867) p. 277.

Fl. or.: St-Denis (Kickx).

4 A. impolita (Ehrh.) Schaer. Enum. Lich. eur. (1850) p. 242; Sydow Flecht. Deutschl. p. 239.

Lichen - Ehrh. Crypt. n. 274.

Parmelia — Fries Lich. Eur. (1831) p. 133.

Leprantha - Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 295.

Arthonia pruinosa (Ach.) Wallr. Comp. Fl. Germ. (1833) p. 321; Kickx Fl. crypt. I p. 278.

Fl. occ.: Eerneghem (Kickx). — Fl. or.: Aaltre, Beirlegem (Kickx). — N.: Chaleux (Tonglet.)

5 A. lineola *Ohev*. in Journ. de Physique (1822) et in Fl. env. Paris (1836) p. 542.

Fl. occ. : env. de Bruges et d'Ypres (West.).

6 A. macularis Chev. in Journ. de Physique (1822) et Hist. Graph. Ic.; Kickx Fl. Louv. p. 95.

Opegrapha - Ach. in Lich. Suec. Prodr. (1798).

N.: env. de Namur (Bell.). - Bt: env. de Louvain (Kickx).

- A. macularis var. conglomerata Mérat; Kickæ Fl. Louv. p. 95.
 N.: env. de Namur (Bell.). Bt: env. de Louvain (Kickæ).
- 7 A. marmorata (Ach.) Nyl.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 292.
 Spiloma Ach. (†).
 Spiloma melaleucum Ach. Lich. univ. (1810) p. 137.
 Trachylia Fries Sched. sec. Ohev. Fl. Paris I (1836) p. 582.
 Fl. occ.; Mont. de Fraises (Ypres) (West.).
- 8 A. vulgaris Schaer.; Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 290.
 - var. radiata Pers.; Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 290. Lx.: Rochehaut (Del.).
 - var. astroidea Ach.; Koerb. loc. cit.
 A. astroidea Ach.; Kickx Fl. Louv. p. 95; Kickx Fl. crypt. I p. 278.
 Opegrapha vulgaris var. Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 155.
 N.: env. de Namur (Bell.). Flandres (Kickx). Bt: env. de Louvain (Kickx).
 - 3 ARTHOTHELIUM Mass. Ric. Lich. (1852) p. 54; Sacc. Syll. Fung. X p. 77.
- 1 A. spectabile (Flot.) Mass. Ric. (1852) p. 58. Arthonia — Flot. ex Mass. loc. cit. Ht: Flobecq (G. L.).

Leptoascineae.

FAM. SACCHAROMYCETACEAE.

- 1 SACCHAROMYCES Mey. in Wiegm. Arch. IV (1838) p. 100; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 916.
- 1 S. albicans (Robin) Rees in Sitzungsb. phys. med. Soc. zu Erlangen 9 Juli 1877; Sacc. Fung. VIII p. 918; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 251. Occasionne la maladie appelée Muguet.
- 2 C. cerevisiae Mey. in Wiegm. Arch. IV (1838) p. 109; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 916; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 251; Lamb. Fl. myc. II p. 593. Fermentation de la bière.
- 3 S. exiguus Rees Bot. Unt. (1870) p. 82 t. II f. 7-8; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 917; Lamb. Fl. myc. II p. 594. Fermentation de la bière (Lamb.).
- 4 S. globulosis Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 595. Gilkinet ex Lamb. loc. cit.

5 S. Mycoderma Rees Bot. Unt. (1870) p. 83 t. IV f. 10-11; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 917; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 251.

Mycoderma vini Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 1 t. X (1838) p. 59; Lamb. Fl. myc. II p. 596.

Dans la fermentation du vin et de la bière.

FAM. PROTOMYCETACEAE.

- 1 PROTOMYCES Ung. Exanth. (1833) p. 341; Sacc. Syll. Fung. VII p. 319.
- P. endogenus *Ung*. Exanth. (1833) p. 342 t. V f. 27.
 N.: Hastière (Bm. et R.).
- 2 P. macrosporus Ung. Exanth. (1833) p. 344 t. VI fig. 34; Sacc. Syll. Fung. VII p. 319; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 235. Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). Lx.: Ébly (Él. M.).
- 3 P. radicicolus Zopf in Nova Acta Bd 47 (1884); De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII (1893) p. 28 pl. II fig. 26-28 pl. III fig. 26-30.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

FAM. DISCOLICHENES.

COLLEMEAE.

- 1 PHYSMA Mass. Geneacaena Lich. (1854) p. 6.
- 1 P. compactum Koerb. Parerga (1865) p. 408. Lx.: Bouillon (Del.).
 - 2 SYNALISSA Nyl. in Mém. Soc. Sc. Cherbourg II (1854) p. 9; Crombie Brit. Lich. I p. 36.
- S. symphorea Nyl. Syn. (1858) p. 94 t. 3 fig. 2; Crombie Brit. Lich. I p. 37.
 - N.: Bouvignes, Champalle, Froidvaux (Dinant), Fond des Rivaux (Houx), Waulsort, Fonds de Leffe (Dinant) (Tonglet).
 - 3 OMPHALARIA Dur. et Mont. in Orb. Dict. (1847) t. VII p. 351.
- Coralloides (Mass.) Nyl. Syn. I (1858) p. 101; Sydow Flecht. Deutschl. p. 322.

Peccania - Mass. in Flora (1858) p. 93.

N.: Fonds de Leffe (Tonglet).

2 0. pulvinata (Schaer.) Nyl. Syn. I (1858) p. 99; Sydow Flecht. Deutschl. p. 322.

Collema stygium var. - Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 260.

- N.: Froidvaux, Fonds de Leffe (Dinant), Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).
- f. canaliculata Tonglet in Bull. Soc. bot. de Belg. t. XXXVII part. 2 (1898) p. 18.
 - N.: Fonds de Leffe, Fond des Rivaux (Tonglet).
 - 4 COLLEMA Wigg. Prim. Fl. Hols. (1780) p. 89; Crombie Brit. Lich. I p. 39.
- 1 C. auriculatum Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 98; Crombie Brit. Lich. I p. 42.

Lx.: Bouillon (Del.). — N.: Hant-le-Wastia (Él. M.), Fond des Rivaux (Tonglet).

2 C. cheilum Ach. Lich. Univ. (1810) p. 630; Crombie Brit. Lich. I p. 49; Kickx Fl. crypt. I p. 206.
Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 134.

Fl. or.: env. de Renaix, env. de Gand (Kickx). — Ht: Beaumont (G. L.). — N.: Falmignoul, Anseremme, Fond des Rivaux (Tonglet).

- 3 C. chalazanum Ach. Lich. Univ. (1810) p. 630; Orombie Brit. Lich. I p. 38.
 - N.: Leffe, Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).
- 4 C. chalazanodes Nyl. in Flora (1869) p. 293; Crombie Brit. Lich. I p. 40.

N.: Bouvignes, Champalle, Houx, Leffe, Moniat, Rouillon (Tonglet).

5 C. cristatum (L.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 255; Sydow Flecht. Deutschl. p. 317.

Lichen — L. Spec. pl. (1763) p. 1610.

Parmelia multifida var. - Schaer. Lich. Helv. Spic. (1842) p. 531.

tg.: Sougnez (Del.). — N.: Bauche, Burnot (Él. M.), Falmignoul, Fonds de Leffe, Bouvignes, Dinant, Champalle, Houx, Moniat, Waulsort (Tonglet). — Bt: Groenendael, Bois de la Cambre, Laeken, Ixelles (A. D.).

6 C. crispum Ach. Syn. (1814) p. 311; Crombie Brit. Lich. I p. 47; Kickx Fl. Louv. p. 82; Kickx Fl. crypt. I p. 206.

Lichen - Ach. Prodr. (1798) p. 126.

Collema furvum West. Herb. crypt. n. 356 p. p.

Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — N.: env. de Namur (Bell.), Dréhance (Tonglet). — Bt: Héverlé, Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — A.: Schoorvoort, Weelde (Paque). — Fl. occ.: Menin (West.).

C. cyanescens (Ach.) Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 250.
 Leptogium tremelloides var. — Ach. Syn. (1814) p. 326.
 Lx.: Frahan (Del.).

8 C. fasciculare (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 639; Crombie Brit. Lich. I p. 56; Kickx Fl. Louv. p. 81.
Lichen — L. Mant. II (1771) p. 153.
Jodoigne (Kickx).

9 C. fiaccidum Ach. Syn. (1814) p. 322; Crombie Brit. Lich. I p. 44. Lichen — Ach. N. Act. Stockholm (1795) p. 14 t. 1 fig. 4. Synechoblastus — Mudd Man. Brit. Lich. (1867) p. 42.

Lx.: Laroche (Él. M.), Frahan (Del.). — Ht: Leuze (G. L.). — N.: Yvoir (Él. M.), Rouillon, Burnot (Tonglet).

var. furvum Ach. Lich. Univ. (1810) p. 650; Crombie Brit.
 Lich. I p. 43.

N.: Moniat, Fond des Rivaux (Tonglet).

10 C. granosum Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 253; Crombie Brit. Lich. I p. 43.

Lichen — Wulf. in Jacq. Coll. III (1789) p. 131 t. 10 fig. 3.

Lx.: Bouillon (Del.).

11 C. granuliferum Nyl. in Flora (1875) p. 103; Crombie Brit. Lich. I p. 50.

N.: Fond des Rivaux (Tonglet).

12 C. melaenum Ach. Lich. Univ. (1810) p. 636; Combrie Brit. Lich. I p. 51.

Lichen — Ach. Prod. (1798) p. 130.

N.: Anseremme, Fonds de Leffe (Tonglet).

13 C. jacobaefolium DC.; Kickx Fl. Louv. p. 82.

N.: Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet). — Bt: entre Wavre et Jodoigne (Kickx).

14 C. multipartitum Sm. Engl. Bot. XXXVI (1814) t. 2582; Crombie Brit. Lich. I p. 56.

N.: Fonds de Leffe, Fond des Rivaux, Champalle, Hastière-Lavaux (Tonglet).

15 C. nigrescens (Huds.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 646; Crombie Brit. Lich. p. 54; Kickx Fl. crypt. I p. 204.

Lichen — Huds. Fl. Angl. (1762) p. 450.

Bt: Corbeek-Dyle, Winxele (Paque). — Fl. occ.: Blankenberghe (West.), entre Nieuport et Oostduinkerke (Kickx).

- 16 C. orbiculare Arn. Lich. Frank. Jura (1890) p. 280.
 N.: Fonds de Leffe, Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).
- 17 C. polycarpon (Schaer.) Koerb. Par. Lich. (1865) p. 417; Crombie Brit. Lich. I p. 53.

Collema multifidum var. — Schaer. Lich. Helv. spic. (1842) p. 532. N.: Leffe (Tonglet).

18 C. pulposum (Berhn.) Ach. Syn. (1814) p. 311; Kickx Fl. crypt. I p. 205; Crombie Brit. Lich. I p. 45.

Lichen — Bernh. in Schrad. Journ. (1799) p. 7 t. 1 fig.

Ht: env. d'Angre (G. L.). — N.: env. de Dinant, C. (Tonglet), env. de Namur (Bell.), Orchimont (Aub.). — Fl. occ.: entre Blankenberghe et Heyst (G. L.), env. de Nieuport (Kickx). — Lb.: env. de Genck (G. L.). — Lx.: Neufchâteau (Verheggen). — Bt: Bois de la Cambre (A. D.), Schaerbeek (Nob.).

- var. granulatum Sw.; Koerb. Syst. Lich. p. 405.
 N.: Fond des Rivaux (Tonglet).
- var. palmatum (Ach.) Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 205.
 Collema Ach. Lich. Prodr_(1798) p. 136.
 Lichen Dill. Hist. musc. t. 19 fig. 30.
 Fl. occ.: env. de Nieuport (Kickx).
- 19 C. tenax (Swartz) Ach. Syn. (1814) p. 314; Crombie Brit. Lich. p. 46. Lichen Swartz in N. Act. Ups. IV (1784) p. 249. Lx.; Tournay (Del.).
 - 5 COLLEMODIUM Nyl. ex Lamy in Bull. Soc. bot. France t. XXV (1878) p. 341; Crombie Brit. Lich. I p. 57.
- C. plicatile (Ach.) Nyl. ex Lamy in Bull. Soc. bot. France t. XXV (1878) p. 341; Grombie Brit. Lich. I p. 57.
 Lichen Ach. in Ach. Holm. XVI (1795) p. 11 t. 1 fig. 2.

Collema — Ach. Svet. Follof.; Kickw Fl. Louv. p. 82.

A.: Tongerloo (Van Haes.).

- f. subplicatile (Hue).

Leptogium plicatile f. subplicatile *Hue* Lich. d'Aix-les-Bains p. 10. N.: Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

- 6 LEPTOGIUM Gray Nat. arr. I (1821) p. 395; Crombie Brit. Lich. I p. 62.
- 1 L. muscicolum (Sw.) Fries Samma Veg. Scand. (1846) p. 122;

Orombie Brit. Lich. I p. 68.

Lichen muscicolum Sw. in N. Act. Ups. IV (1784) p. 248.

Polychidium — Gray Nat. arr. I (1821) p. 402.

Collema — Hook. Fl. Scot. II (1821) p. 72.

Lx.: Laroche (Él. M.), Oisy, Corbion, Bouillon (Del.).

2 L. lacerum (Sw.) Gray Nat. arr. I (1821) p. 401; Kickx Fl. crypt. I p. 207; Crombie Brit. Lich. I p. 69.

Lichen - Sw. in Ach. Prodr. (1798) p. 113.

Collema — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 657; Kickx Fl. Louv. p. 82.

FI. occ: Nieuport (Kickx). — A.: Westerloo (West. et Van Haes.). — Lx.: Straimont (Verheggen), Mortehan (Del.). — N.: Olloy (Aigret et François), Montaigle, Bauche (Él. M.), Yvoir, Anseremme (G. L.), Couvin (G. L.), env. de Namur (Bell.), Orchimont (Aub.), Bouvignes, Dréhance (Tonglet). — Bt: La Cambre (Kickx).

- var. lophaeum (Ach.) Crombie Lich. Brit. (1870) p. 8.
 Leptogium Nyl. ex Crombie in Grevillea XV (1896) p. 13; Crombie Brit. Lich. I p. 71.
 - N.: Anseremme (Tonglet).
- var. pulvinatum (Hoffm.) Mudd Man. Brit. Lich. (1867) p. 47; Kickx Fl. crypt. I p. 207.

Collema - Hoffm. Deutsch. Fl. (1795) p. 104.

Leptogium — Nyl. in Flora (1878) p. 345; Crombie Brit. Lich. I p. 70.

Fl. occ.: Knocke (Coem.). — Lx.: Mortehan (Del.). — N.: Banche, Beausaint (Él. M.), env. de Dinant C. (Tonglet), Couvin (G. L.).

- 3 L. Schraderi (Bernh.) Koerber Parerg. Lich. (1865) p. 423.
 - var. muscicola Hepp ex Müller Princ. class. Lich. (1862)
 p. 83.

N.: Leffe, Bouvignes, Fond des Rivaux (Tonglet).

4 L. scotinum (Ach.) Fries Summa Veg. Scand. (1846) p. 122; Kickæ Fl. crypt. I p. 206; Crombie Brit. Lich. I p. 71.
Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 128.

Fl. occ.: Ostende (Mac Leod). — Fl. or.: Melle (Kickx.).

— var. sinuatum (Huds.) Malbr. in Bull. soc. Sc. nat. Rouen (1866) p. 363; Crombie Brit. Lich. I p. 72.

Lichen — Huds. Fl. Angl. ed. 2 (1778) p. 535.

Leptogium - Mudd Man. Brit. Lich. (1867) p. 47 p. p.

Lx.: Bouillon, entre Bouillon et Cordemoy (Del.).

5 L. saturninum (Dicks.) Nyl. Syn. I (1858) p. 127; Crombie Brit. Lich. I p. 75.

Lichen — *Dicks*. Crypt. fasc. II (1790) p. 21 t. 6 fig. 8. Collema — *Hook*. Fl. Scott. II (1821) p. 71.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

6 L. subtile (Schrad.) Nyl. in Mém. Soc. Cherb. V (1857) p. 90; Kickæ Fl. crypt. I p. 207; Crombie Brit. Lich. I p. 65.

Lichen - Schrad. Spic. (1764) p. 95.

Collema tennissimum Ach. Lich. Univ. (1910) p. 328.

Leptogium - Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 419.

Lichen - Dicks. Crypt. Brit. t. 2 fig. 8.

Fl. occ.: Westvleteren (Kickx.). — N.: Bouges (Bell.). — Bt: Héverlé (Coem.). — Lx.: Samrée (Él. M.).

- 7 LECOTHECIUM Trevis. sec. Mass. Mem. Lich. (1853) p. 109.
- 1 L. corallinoides (Hoffm.) Kalchbr.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 305; Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 398.

Patellaria nigra Wallr. Comp. Fl. germ. (1833) p. 430.

Collema - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 628. Kicka Fl. Louv. p. 83.

N.: Vallée du Goyet, Samson, Marche-les-Dames (J. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg.: env. de Huy (Mansion), entre Esneux et Hout-si-plout (Goffart), entre Poulseur et Esneux (G. L.), Comblain-au-Pont (Del.). — Lx.: Mortehan (Del.). — Bt: Rouge-Cloître (Kickx). — Ht: Beaumont (G. L.).

GRAPHIDEAE

- 8 LECANACTIS Eschw. Syst. Lich. (1824) p. 14.
- 1 L. lyncea (Sm.) Fries; Mass. Ricerche (1852) p. 53.
 - var. fuliginosa (Turn. et Borr.).

Spiloma - Turn. et Borr. Lich. Brit. (1839) p. 37.

Arthonia biformis var. spilomatica Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 243.

Bt: Héverlé (Coem.).

2 L. Stenhammari Fries; Sydow Flecht. Deutschl. p. 228.

Opegrapha grumulosa Duf. in Jour. de Phys. LXXXVII p. 216.

- N.: Vallée de la Meuse (Tonglet), Samson (J. M.).
 - 9 OPEGRAPHA Eschw. Syst. Lich. (1824) p. 14.
- 1 0. atra Pers. in Ust. Ann. Bot. VII (1794) p. 30 t. 1 fig. 2; Kickw Fl. crypt. I p. 273; Sydow Flecht. Deutschl. p. 230.

Verrucaria leucocephala West. Herb. crypt. n. 15.

Ht: Leuze, Tertre-lez-Baudour, Stambruges (G.L.). — Fl. occ.: env. d'Ypres (West.). — Fl. or.: env. de Gand (West.), Baarle, Rooborst (Kickx). — Lx.: Neufchateau, Warmifontaine (Verheggen). — A.: Campine (West. et Van Haes.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — Bt: env. de Louvain (Kickx), Héverlé (Coem.), Laeken (A.D.), Nivelles (Dens et Piet.).

atra var. herbarum (Mont.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 153;
 Kickx Fl. crypt. I p. 274.

O. herbarum Mont. in Arch. Bot. (1833) p. 302 t. 15 fig. 1.

Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx). — Fl. occ.: Warneton (West.). — Bt: Louvain (Paque).

- var. parallela Leight.; Kicke Fl. crypt. I p. 274. Fl. or.: Gand (Coem.).
- var. reticulata (Lam. et DC.) Schaer. Lich. Eur. (1850)
 p. 153; Kicka Fl. crypt. I p. 274.

O. reticulata Lam. et DC. Fl. fr. VI (1815) p. 170; Kicka Fl. Louv. p. 94. Flandres (Kicka). — Bt: env. de Louvain (Kicka).

var. stenocarpa (Ach.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 153;
 Kicka Fl. crypt. I p. 274.

Opegrapha - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 257.

Fl. or.: Munten (Kickx). - Lx.: env. de St-Hubert (Van Bastelaer).

2 0. betuligna Ach. Meth. (1803) p. 21.

Lichen — Ach. Lich. Prod. (1798) p. 23.

Opegrapha betulina *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VII (1794) p. 31 t. 3 fig. 5 A a. Bt: Héverlé (Coem.).

3 0. Chevallieri Leight.; Kicke Fl. crypt. p. 274; Sydow Flecht. Deutschl. p. 238.

Fl. occ. : Damme (Kickx).

4 0. lithyrga Ach. Lich. Univ. (1810) p. 247.

O. atra var. — Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 154.

O. murorum Fée in Dict. class. (?).

Bt: Louvain (Coem.). - Fl. occ.: Damme (Kickx).

5 0. rubella Pers. in Ust. Ann. Bot. VII (1794) p. 31 t. 1 fig. 2 Aa. Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 22.

N: env. de Namur (Bell.). — Bt.: Vlierbeek (Leburt.), Héverlé (Coem.).

- 6 0. saxicola Ach. Syn. (1814) p. 71; Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 157.
 N.: Moniat (Tonglet).
- 7 0. varia Pers. in Ust. Ann. Bot. VII (1794) p. 30; Kicka Fl. crypt. I p. 275; Sydow Flecht. Deutschl. p. 231.

Fl. oc.: Zeverdonck (G. L.). — Flandres (Kickx). — Bt: Nivelles (Dens. et Piet.), Bergh, Groenendael (G. L.). — Ht: Angre (G. L.), Beaumont (G. L.). — N.: Han-sur-Lesse (Aigret). — Lx.: Neufchateau, Longlier (Verheggen), Laroche (G. L.).

var. abbreviata Fries; Kickx Fl. crypt. I p. 276.
 Fl. or.: Munte (Kickx). — Bt: Héverlé (Paque).

varia var. chlorina (Pers.) Schaer. Lich. Eur. (1853) p. 157.
 Opegrapha — Pers. in Act. Wetter. II (1811).

Bt: Héverlé (Paque).

- var. lichenoides (Pers.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 156; Sydow Flecht. Deutschl. p. 231.

Opegrapha - Pers. in Ust. Ann. Bot. VII (1794) p. 50 t. 2.

Opegrapha notha Ach. Syn. (1814) p. 76.

N.: Hastière-Lavaux (Tonglet).

— var. pulicaris (Hoffm.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 156; Kickx Fl. crypt. I p. 276; Sydow. Flecht. Deutschl. p. 231.

Lichen - Hoffm. Enum. (?) p. 14 t. 3 fig. 2c.

O. vulvella Ach. Soet Kynslelaf ex Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 22; Kickw Fl. Louv. p. 94.

Flandres (Coem.). — N.: env. de Namur (Bell.), Moustreux (Dens et Piet.). — Bt: env. de Louvain (Kickx).

var. signata (Ach.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 157; Kicka
Fl. crypt. I p. 275; Sydow Flecht. Deutschl. p. 231.
Lichen — Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 23.

Fl. or.: Gand (Kickx). - Bt: Corbeek, Héverlé (Paque). - Lb.: Mall (Paque).

- var. lichenoides (Pers.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 156; Sydow Flecht. Deutschl. p. 231.

Opegrapha - Pers. in Ust. Ann. Bot. VII (1794) p. 30.

O. notha Ach. Svet. Sveklaf ex Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 19.

Bt: env. de Bauxelles (West. et Van Haes.).

8 D. herpetica Ach. Meth. Lich. (1803) p. 23; Kicka Fl. crypt. I p. 276; Sydow Flecht. Deutschl. p. 232.

Lichen - Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 20.

Bt: Héverlé (Coem.). — Fl. or.: entre Meulestede et Langebrugge, Gand (Kickx).

var. fuscata (Turn.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 156; Kickw
 Fl. crypt. I p. 276.

O. denigrata var. - Turn. in Ach. Lich. Univ. (1810) p. 261.

Fl. or. : Swynaarde (Coem.).

var. rubella (Ach.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 155; Kickæ
 Fl. crypt. I p. 276.

Lichen - Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 22.

FI. occ. : Gheluvelt (West.).

— var. subocellata (Ach.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 156; Kicka Fl. crypt. I p. 276.

O. rubella var. - Ach: Lich. Univ. (1810) p. 250.

Fl. occ. : Dixmude (Kickx). - Fl. or. : Baarle (Kickx).

o. rufescens Pers. in Ust. Ann. d. Bot. VII (1794) t. 2 fig. 3 A a;
 Kicka Fl. Louv. p. 94; Sydow Flecht. Deutschl. p. 232.
 Opegrapha siderella Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 24.

Bi: env. de Louvain (Kickx).

10 0. serpentina (Ach.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 311; Kickx Fl. Louv. p. 93.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

vulgata Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 21; Kicka Fl. crypt. I p. 275; Sydow Flecht. Deutschl. p. 232.
 O. atra var. — Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 174.

Lx.: entre Arlon et Pont-de-Lagland (G. L.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Bt: env. de Bruxelles (A. D.).

12 **0.** zonata *Koerb*. Syst. Lich. (1855) p. 279; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 229.

Lx.: Neufchateau (Verheggen).

- 10 GRAPHIS Adans. Fam. II (1763) p. 11; Ach. Lich. univ. (1810) p. 46.
- G. elegans Borr.; Kickx Fl. crypt. I p. 273.
 Opegrapha elegans Borr. in Engl. Bot. (1807) t. 1812.

Opegrapha sulcata Pers. in DO. Fl. fr. VI (1815) p. 171.

Bt: Héverlé (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: env. de de Bruges (West.). — Lx.: Laroche (Dens et Piet.).

2 G. scripta (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 265; Kickw Fl. crypt. I p. 271; Sydow. Flecht. Deutschl. p. 233.

Lichen — L. Spec. plant. (1753) p. 1606.

Opegrapha — Chev. Fl. Paris (1836) p. 536; Kickx Fl. Louv. p. 93.

Ht: Beloeil, Stambruges, Flobecq (G. L.). — Flandres (Kickx). — Bt: Ophain (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx), Héverlé (Paque), Strombeek (Nob.), Groenendael (G. L.). — Lx.: Neufchâteau, Longlier, Nolinfaing, Straimont (Verheggen), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Frahan (Del.), env. de Bastogne (Germain). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Han-sur-Lesse (Aigret), Moniat (Tonglet).

- var. horizontalis Leight.; Kicke Fl. crypt. I p. 272. Flandres (Goem.).
- var. limitata (Pers.) Arn. in Flora (1881) p. 138.
 Opegrapha scripta var. Schaer. Lich. Eur. (1856) p. 150; Kickx Fl. Louv. p. 93.

O. limitata Pers. in Ust. Ann. d. Bot. VII (1794) p. 30.

Bt: env. de Louvain (Kickx).

G. scripta var. macrocarpa (Pers.) Arn. in Flora (1881) p. 138.

Opegrapha scripta var. — Chev. Fl. env. Paris (1836) p. 537; Sydow Flecht. Deutchl. p. 233; Kickx Fl. Louv. p. 93.

Bt: env. de Louvain (Kickx).

— var. pulverulenta (Pers.) Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 272;
 Sydow Flecht. Deutschl. p. 233.

Opegrapha scripta var. -- Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 15.

Ht: Flobecq (G. L.). — Flandres (Kickx). — Lx.: Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen), Clairefontaine, Waltzing (Paque). — N.: env. de .Namur (Bell.).

- var. pulverulenta f. stellaris (Meyer) Arn. in Flora (1881)
 p. 139.
 - N.: Hastière (Dens et Piet.).
- var. serpentina (Ach.) Kickv Fl. crypt. I p. 272; Sydow
 Flecht. Deutschl. p. 233.

Lichen - Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 25.

Lx.: Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen). - Flandres (Kickx).

- var. typographa (Willd.) Arn. in Flora (1881) p. 139.
 N.: Olloy (Aigret).
- var. varia Arn. in Flora (1881) p. 138.
 N.: Hastière (Dens et Piet.).
- 3 G. Smithii Leight.; Kicka Fl. crypt. I p. 273.

Graphis dendroides var. - Leight.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 234.

Fl. or.: Destelberghen (Kickx). - Fl. occ.: env. d'Ypres (Coem.).

LECIDEAE.

- 11 RHIZOCARPON Ramond sec. DC. Fl. fr. II (1805) p. 365.
- 1 R. atroalbum Arn. in Flora (1871) p. 146; Sydow Flecht. Deutschl. p. 198.

Rhizocarpon distinctum Th. Fries Lich, Scand. (1871) p. 625.

Lecidea - Nyl. in Stiz. Lich. Hyperb. (?) p. 47.

N.: entre Rouillon et Rivière (Tonglet).

2 R. calcareum (Weiss) Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 631; Sydow Flecht. Deutschl. p. 199.

Lichen - Weiss Crypt. Gött. (1772) p. 40.

Diplotomma — Krempelh, in Flora (1853) p. 220.

N.: Leffe (Tonglet).

3 R. concentricum (Dav.) Poetsch; Sydow Flecht. Deutschl. p. 199.

Lichen concentricum Dav. in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 284.

Lecidea - Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 234 (subsp.); Kicka Fl. crypt. I p. 271.

N.: Rochefort, Han-sur-Lesse (Aigret), env. de Couvin (G. L.), Mosseroux (J. M.), Anseremme (Tonglet). — Lg.: entre Poulseur et Esneux (G. L.). — Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx)

R. concentricum var. excentricum (Ach.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 199.

Lx.: Laroche (Dens et Piet.). — N.: Néviau (Olloy), env. de Rochefort (Aigret).

4 R. confervoides DC. Fl. fr. II (1805) p. 366; Kicka Fl. crypt. I p. 270.

Lecidea - Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 113.

FI. occ.: Gheluvelt (West.). - FI. or.: Aeltre, Eecloo (Kickx).

5 R. geographicum (L.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 365; Kicka Fl. crypt. I p. 271.

Buellia — Br. et Rostr. Dan. (1869) p. 114.

Lichen — L. Spec. plant. (1753) p. 1607.

Fl. or.: env. de Renaix (Kickx). — Fl. occ.: Damme (Kickx). — Ht: Montagne-pelée (G. L.). — Bt: Héverlé (Coem.), Virginal (Dens et Piet.). — Lx.: Viel-Salm, Odeigne, Salm-Chateau (G. L.), Frahan (Del.), env. de Bastogne (Germain), Laroche (Dens et Piet.). — N.: Anseremme, Bouvignes (Tonglet), vallée de la Meuse et de la Sambre, entre Sambre et Meuse (G. L.).

— var. atrovirens (L.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 263.

Lecidea — Ach. Meth. (1803) p. 45.

Lx.: Neufchateau (Verheggen).

- var. contiguum Fries; Sydow Flecht. Deutschl. p. 197.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- var. sphaericum Schaer. (?)
 Lx.: Neufchateau (Verheggen).

6 R. Montagnei (Flot.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 258; Sydow Flecht. Deutschl. p. 197.

Lecidea - Flot. sec. Koerb. loc. cit.

Lx.: Laroche (G. L. et Troch). — Ht : env. de Mons (Dumont).

7 R. obscuratum Schaer. in Naturw. Anz. (1818) p. 9; Sydow Flecht. Deutschl. p. 199.

Lecidea petraea var. - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 156 p. p.

Lx.: Laroche (G. L.), Frahan (Del.), Mosseroux (J. M.).

8 R. rubescens Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 631; Sydow Flecht. Deutschl. p. 199.

Ht: Beaumont (G. L.).

9 R. viridiatrum (Floerke) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 262; Sydow

Elecht. Deutschl. p. 197.

Lecidea viridiatra Floerke in litt. sec. Koerb. loc. cit.

Lx.: Frahan (Trou-Perpète) (Del.).

- 12 LECIDELLA Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 233.
- 1 L. aglaea (Sommerf.) Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 240; Sydow Flecht. Deutsch. p. 202.

Lx.: Rocher de Morsehan (Bouillon) (Del.).

- 2 L. episema Nyl. in Flora (1868) p. 165.
 N.: Moniat (Tonglet).
- 3 L. goniophila (Floerke) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 235; Sydow Flecht. Deutschl. p. 204.

Lecidea - Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 127.

Lecidea immersa var. - Floerke in Berl. Mag. (1809) p. 311.

N.: Samson (J. M.).

4 L. lapicida (Ach.) Arn.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 206.
 Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 61.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

5 L. latypea (Ach.) Sydow Flecht. Deutsch. (1887) p. 208. Lecidea — Ach. Meth. Suppl. (1803) p. 10.

L.: Laroche (G. L. et Troch).
L. parasema (Ach.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 210.

Kický. Fl. Louv. p. 96.

Lecidella enteroleuca Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 243.

Lx.: Frahan (Del.), Neufchâteau, Stoumont (Verheggen). — N.: Hastière par delà (Tonglet), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: env. de Louvain (Kickx), Héverlé, Parc, Eegenhoven (Paque). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

Lecidea - Fries Lich. Eur. (1831) p. 33 p. p. Kickw Fl. crypt. I p. 268;

— var. granulosa Fries; Sydow Flecht. Deutsch. p. 210. Lecidea enterolenca var. — Flot.; Kickw Fl. crypt. I p. 368. Lecidea enterolenca West. Herb. crypt. fasc. 4 n. 163.
Flandres: (West., Kickx).

- f. flavens Nyl. Lich. Scand. (1871) p. 217.
 N.: Lenne (Tonglet).
- var. elaeochromae Ach. Meth. Lich. (1803) p. 36.
 Lecidea enteroleuca var. Kickw Fl. Louv. (1835) p. 97; Kickw Fl. crypt. I p. 268.

Bt: Héverlé (Paque), env. de Louvain (Kickx). — Flandres (Kickx). — N.: Lenne (Tonglet), Louette-St-Pierre (Aub.).

- L. parasema f. olivacea Nyl. ex Lamy Cat. Lich. Mont-Dore p. 111.
 N.: Bouvignes (Tonglet).
- var. rugulosa Ach.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 210; Kickw Fl. crypt. I p. 268.

Fl. occ.: Langemarck (Kickx).

- var. similis Mass. (ubi?).

7 L. tenebrosa (Flot.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 203.

Lecidea — Flot. ex Koerb. Parerga Lich. (1865) p. 99.

Aspicilia - Koerb. Parerga Lich. (1865) p. 99.

N.: Sensenruth (Dens. et Piet.).

13 PYRENOTHEA Fries in Vet. Ac. Handl. (1821) p. 332.

1 P. fuscella Fries Lich. Eur. (1831) p. 452.
N.: Moniat (Tonglet).

14 LECIDEA Ach. Meth. (1810) p. 32:

 L. Arnoldi (Koerb.) Tonglet in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVII part. 1 (1898) p. 33.

Biatora - Hepp Exsice. n. 507.

Biatorina - Koerb. Parerg. Lich. (1865) p. 139.

N.: Moniat, Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

- 2 L. atrofusca (Flot.) Nyl.; cf. Hue Add. Lich. Eur. n. 897.
 N.: Anseremme, Dinant, Leffe, Moniat, Bouges, Waulsort (Tonglet).
- 3 L. chalybeia Borr. in Engl. Bot. Suppl. I (1831) t. 2687 fig. N.: Houx (Tonglet).
- 4 L. chondrodes (Mass.) Malbr. Cat. Lich. Norm. (1870) p. 206.
 N.: Bouvignes, Moniat (Tonglet).
- L. cinereoatra Ach.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 216.
 Lecidea contigua Fries Lich. Succ. exs. n. 378.

Lx.: Laroche (Él. M.). — Bt: Villers-la-Ville (Dens et Piet.).

6 L. cinereo-fusca (Web.) Ach. Syn. (1814) p. 43.

Lichen - Web. Spic. Fl. Gott. (1778) p. 188.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

7 L. crustulata (Ach.) Floerke; Kicke Fl. crypt. I p. 267; Sydow Flecht. Deutschl. p. 216.

Lecidea parasema var. — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 176.

Fl. or.: env. de Renaix (Coem.), env. d'Audenarde et de Gand (Kickx). — Bt: Louvain, Hérent, entre Louvain et Winxele (Paque), Héverlé (Coem.).

L. crustulata var. macrospora Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 249; Sydow Flecht. Deutschl. p. 216.

Lecidea meiospora Nyl. Pyr. or. nov. (1891) p. 38.

N.: entre Freyr et Onhaye (Tonglet).

8 L. entochrysoides Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 427.

N.: Moniat (Tonglet).

9 L. fusco-atra (L.) Wahl. Fl. Lapp. (1812) p. 473; Sydow Flecht. Deutschl. p. 215.

tg.: Poulseur (G. L.). — N.: Wanlin (Aigret), Vallée de l'Hermeton (Dens et Piet.). — tx.: Baraque de Fraiture (G. L. et Troch), Samrée, Laroche (Dens et Piet.), Frahan (Del.).

- var. subcontigua Fries Lich. Eur. (1831) p. 317.
 Lecidea fumosa var. grisella Floerke ex Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 110.
 Lx.: Vielsalm (G. L.). Ht: sine loco (Dumont).
- var. fumosa (Hoffin.) Fries; Sydow Flecht. Deutschl. p. 215.
 Patellaria Hoffin. Pl. Lich. III, 3 (1801) t. 49 fig. 2.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 10 L. glomerulosa Steud. Nomencl. Bot. II (1821) p. 244.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 11 L. hypnorum Lib. Crypt. arduenn. n. 12; Mass. Mem. Lichen. p. 124. Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).
- 12 L. incana Ach.; Kickx Fl. Louv. p. 95. Bt: env. de Louvain (Kickx).
- 13 L. latypiza Nyl. Pyr. or. nov. (1891) p. 57.N.: Dinant (Tonglet).
- 14 L. lavata Ach.; Hue Add. Lich. Eur. n. 1368.
 N.: Houx, Waulsort (Tonglet).
- 15 L. leptoclinis Flot.; Hue Add. Lich. Eur. n. 1399.
 - f. Tongleti Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 428.

N.: Rouillon, Rivière (Tonglet).

- L. luteola (Schrad.) Ach. Syn. (1814) p. 41.
 Lichen Schrad. Spic. Fl. Germ. (1794) p. 85.
 N.: entre Waulsort et Onhaye (Tonglet).
- 17 L. macrocarpa (DC.) Th. Fries; Sydow Flecht. Deutschl. p. 217. Patellaria — DC. Fl. fr. II (1805) p. 347.

Lg.: Poulseur (G. L.). — Lx.: Mortehan (Del.), env. de St-Hubert (Él. M.).

L. macrocarpa var. tumida (Mass.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 216.

Lecidea — Mass. Ricerche Lich. (1852) p. 68.

Lx.: Mortehan (Del.).

var. platycarpa (Ach.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 216.
 Lecidea — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 172 t. 2 fig. 6.

Lg.: Poulseur, entre Poulseur et Esneux (G. L.). — Lx.: env. de St Hubert (Él. M.), Frahan, Libramont (Del.), — N.: Petite-Marlagne (Namur) (J. M.).

(West. et Van Haes.).

18 L. porphyrica Nyl. ex Hue Add. Lich. Eur. (1886) p. 222. Diplotomma — Arn. Lich. ausfl. in Tir. VIII p. 22. N.: Dinant (Tonglet).

19 L. subcarnea Ach. Meth. Lich. (1803) p. 365.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

20 L. vernalis Ach. Meth. Lich. (1803) p. 68.

— var. muscorum Nyl.

Lecidea decolorans var. granulosa West. Herb. crypt. n. 359. Bt: env. de Louvain (Coem.). — Fl. occ.: Menin (West.).

15 THALLOIDIMA Mass. Mém. Lich. (1853) p. 95.

1 T. candidum (Web.) Koerb. Syst. (1855) p. 179.

Lichen — Web. Spic. Fl. Gott. (1798) p. 193.

Lecidea — Ach. Meth. (1803) p. 79.

Toninia — Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 338.

Psora — DC. Fl. fr. II (1805) p. 369.; Kickx Fl. Louv. p. 99.

N.: Hastières, Onhaye, Waulsort (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Han-sur-Lesse (Aigret), Leffe (Tonglet). — Bt: Boendael (Kickx).

2 T. coeruleonigricans (Lightf.) Sydow Flecht. Deutschl. (1867)p. 145.

Lichen — Lightf. Fl. Scott. (1777) p. 805.

Toninia — Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 236.

Thalloidima vesiculare Koerb. Syst. (1855) p. 179; Kicka Fl. crypt. I p. 259.

Psora - Hoffm.; Kickx Fl. Louv. p. 98.

N.: Anthée, Hastière, Onhaye, Waulsort (Dens, et Piet.), Matagne, env. de Rochefort (Aigret), Bouvignes (Tonglet), Leffe, Anseremme, Fond d'Auffe, Beaumont (G. L.), Dinant (Del.) entre Olloy et Nismes (El. M.), Bouges (Bell.). — Lx.: Bouillon (Del.). — Fl. occ.: entre Furnes et Nieuport (West.), Lombartzyde, Knocke (Kickx), env. d'Adinkerke (Piré). — Bt; env. de Wavre (Kickx).

- var. grisea (Gmel.).

Psora vesicularis var. — Kickx Fl. Louv. (1835) p. 99.

Lichen - Gmel. Syst. II (1767).

Campine (West. et Van Haes.).

16 TONINIA Mass. Mem. Lich. (1853) p. 107.

1 T. aromatica (Sm.) Mass. Symm. (?) 54; Kickx Fl. crypt. I p. 260.

Lichen - Sm. in Engl. Bot. (1807) t. 1777.

Lecidea - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 168.

Fl. oc.; Gand (Kickx). — Bt: Fauquez (Virginal) (Dens et Piet.). — N.: Burnot (Él. M.), Olloy (Aigret et François), Dinant (Del.).

var. acervulata (Nyl.) Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 332.
 Lecidea — Nyl. (?).

H .: Leffe (Tonglet.).

2 T. mesenteriforme Vill. Hist. pl. Dauph. II (1789).

Thalloidema mammillare Koerb. Syst. (1855) p. 180.

Lichen - Gouan Herb. Montp. (1796) p. 88.

Toninia - Flagey Fl. Lich. de Franche-Comté II (1885) p. 346.

Lg.: Esneux, Comblain-au-Pont (Del.). — N.: Bouvignes, Moniat, Waulsort, Houx, Champalle (Tonglet).

17 MYCOBLASTUS Norm.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 221.

1 M. sanguinarius (L.) Th. Fries Gen. Heterolich. Eur. (1861); Sydow Flecht. Deutschl. p. 221.

Megalospora — *Koerb*. Syst. Lich. (1855) p. 257; *Kickx* Fl. crypt. Ip. 265. Lecidea — *Ach*. Lich. Univ. (1810) p. 170 t. 2 fig. 4.

Lichen - L. ex Engl. Bot. (1794) t. 155.

Fl. or.: Aeltre (Kickx).

18 DIPLOTOMMA Flotow in Bot. Zeit. (1850) p. 380.

1 D. albo-atrum (Hoffm.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 218; Kickx Fl. crypt. I p. 270; Sydow Flecht. Deutschl. p. 188.

Lichen - Hoffm. Enum. Lich. (1784) p. 30.

Lecanora - Nul: Lich. Scand. (1861) p. 235.

Flandres: (Kickx). — N.: Moniat, Bouvignes, Dinant, Moniat, Waulsort (Tonglet), Olloy (Aigret).

- var. ambiguum (Ach.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 188. Lx.: Frahan (Del.).
- var. epipolia (Ach.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 188.
 Lichen Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 58.

Lecidea — Kicka Fl. Louy. (1835) p. 96.

Lecidea albo-atra var. — Schaer. Enum. (1850) p. 122.

Bt: Abbaye-de-Villers (Dens et Piet.), remparts de Louvain (Kickx). — N.: Moniat (Tonglet).

2 D. athroum (Ach.) Fries; Sydow Flecht. Deutschl. p. 188.

Lecidea parasema var. athroa Ach. Meth. Lich. (1803) p. 36.

- var. pharcidia (Ach.) Sydow Flecht. (1887) p. 188.

Diplotomma populorum Mass. Mem. Lich. (1852) p. 99. Bt: Nivelles (Dens et Piet.).

12 BUELLIA De Not. in Giorn. Bot. it. II, 1 (1851) p. 195.

1 B. myriocarpa (DC.) Mudd; Kicka Fl. crypt. I p. 267; Sydow Flecht. Deutschl. p. 193.

Lecidea - Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 237.

Buellia punctata Floerke sec, Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 229.

Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Bt: Corbeek-Loo (Paque), Louvain (Coem.). — A.: Mall (Paque). — N.: Serville (Tonglet).

— — var. myriocarpella (Nyl.).

Buellia - Nyl. Pyr. or. nov. (1891) p. 59.

N.: Moniat (Tonglet).

- var. punctiformis (Hoffm.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 193.

Lecidea punctata var. punctiformis Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 129.

Bt: Héverlé (Coem.).

2 B. parasema (Th. Fries) Ach.; Kicke Fl. crypt. I p. 266; Sydow Flecht. Deutschl. p. 193.

Lecidea — Th. Fries Lich. Eur. (1860) p. 330 p. p.

Fl. occ.: Waereghem (G. L.). — Fl. or.: Eyne (Nob.). — Flandres (Kickx). — Ht: Leuze, Ligne, Stambruges (G. L.). — Lx.: Neufchateau, Longlier, Nolinfaing (Verheggen), Rochehaut (Del.). — Bt: Bois de la Cambre (A. D.), Woluwe-St-Pierre (Nob.).

BAEOMYCAE.

- 20 BAEOMYCES Pers. in Ust. N. Ann. I (1794) p. 19; Crombie Brit. Lich. I p. 108.
- 1 B. aeruginosus (Scop.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 343; Crombie Brit. Lich. I p. 113.

Lichen — Scop. Fl. Carn. I (1760) p. 78.

Icmadophila — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 151; Trev. in Mass. Rich. Lich. (1852) p. 26; Kickx Fl. crypt. I p. 235.

Lecidea Icmadophila Ach.; Kickx Fl. Louv. p. 97.

Lb.: Zolder (Dens et Piet.), entre Kinroy et Maeseyck (G. L.). — A.: Weelde (Paque), entre Tremeloo et Betecom (Kickx). — Ht: Masnuy (Él. M.), Stambruges, Bandour, Tertre, Camp de Casteau (G. L.). — N.: Bois de Marlagne (Paque). — Fl. or.: entre Eecloo et St-Laurent, env. de Renaix (Kickx).

2 B. placophyllus Ach. Meth. (1803) p. 323 pl. 7 fig. 4; Crombie Brit. Lich. I p. 111.

Sphyridium - Th. Fries Lich. Arct. Eur. (1860) p. 177.

Biatora - Fries Lich. Eur. (1831) p. 257.

Lx.: entre Laroche et Samrée (Dens et Piet.), près du Saiwet (Villers-la-

bonne-Eau) (Germain). entre Vivy et Rochehaut (Del.), bois de Rollé, Odeigne, Baraque de Fraiture (G. L.).

- 3 B. roseus Pers. in Ust. N. Ann. I (1794) p. 19; Kicka Fl. Louv. p. 104; Kicka Fl. crypt. I p. 259; Crombie Brit. Lich. I p. 111.
 - Lb.: Kinroy (G. L.). Fl. occ.: Houthulst, env. de Bruges (Kickx). Lg.: Spa (Nob.). Fl. occ.: Aeltre (Kickx). Ht: Baudour, Casteau, Maisières, Blaton, Flobecq (G. L.). A.: Raevels, Weelde (Paque), Campine (Kickx). Bt: Groenendael (Él. M.), Héverlé, Kessel-Loo (Paque), Braine-l'alleud, Villers-la-ville (Dens et Piet.), St. Job, Mousty (Él. M.), Sept-Fontaines (Kickx). Lx.: Mont-Plainchamp, Petit-Voir (Verheggen), Arlon (F.), Bois de Rollé, Saiwet (Germain), env. de St-Hubert (Él. M.). Fl. oc.: Lokeren (Paque). N.: Hives. Arbre, Burnot (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Gedinne (Tonglet), Dave (Bell.).
 - var. sessilis Oliv. Lich. de l'Orne (1882-84) p. 176.

 Bt: Tilly (Dens et Piet.).
- 4 B. rufus (Huds.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 342; Kickx Fl. crypt. I p. 258; Crombie Brit. Lich. I p. 109.

Lichen — Huds. Fl. Angl. (1762) p. 443.

Baeomyces byssoides Mudd Man. (1867) p. 63.

Sphyridium - Fries Lichen. Scand. (1843) p. 328.

Baeomyces rupestris Ach. Meth. (1803) p. 321.

Sphyridium byssoides var. - Pers. (?).

- Ht: Casteau, Stambruges, Angre, Blaton, Baudour, Ellezelles (G. L.). Fl. occ.: Gheluvelt (West.), Bloemendaal, Ruisselede (Kickx). Lb.: Zolder (Dens et Piet.). Fl. or.: Renaix (G. L.), Oostacker (V. Bambeke). A.: Bonheyden (V. Melckebeke). Bt: Héverlé, Eegenhoven, Corbeek-Dyle, Winxele (Paque). N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret), env. de Namur (Bell.), Spontin (Él. M.), Freyr, Godinne, Burnot (Tonglet). Lx.: Laroche, env. de Bouillon (Dens et Piet.), Montagne du Mardasson (Germain). Lg.: Stavelot (Aigret), Vierset (Mansion).
- var. sessilis Nyl. Syn. Lich. I (1858) p. 177.

Bt: Virginal, Braine-l'Alleud (Dens et Piet.).

BIATORAE.

- 21 BACIDIA De Not. in Giorn. bot. it. II, 1 (1851) p. 189.
- 1 B. albescens (Arn.) Zw. in Flora (1862) p. 495; Sydow Flecht. Deutschl. p. 153.

Scolicosporum atrosanguineum f. albescens Arn. in Flora (1858) p. 475. Bacidia phacodes Koerber Parerg. Lich. (1865) p. 130.

- N.: entre Furfooz et Chaleux (Tonglet, G. L. et Troch).
- 2 B. citrinella (Koerb.) Oliv. Lichens de l'Orne (1882-84) p. 179.
 - N. : entre Bièvre et Louette-St-Denis (Tonglet).

3 B. endoleuca (Nyl.) Kickx Fl. crypt. I (1887) p. 261; Sydow Flecht. Deutschl. p. 152.

Biatora luteola f. - Nyl. in Bot. Not. (1853) p. 98.

Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

3 B. muscorum (Sw.) Arn. in Flora (1871) p. 52; Sydow Flecht. Deutschl. p. 155.

Lichen - Sw. Meth. Musc. (1781) p. 36.

Lecidea - Ach. Meth. (1803) p. 33.

Lecidea bacillifera var. - Nyl. Lapp. or. (1861) p. 155.

Lx.: Ortho, Beaulieu (Del.), Laroche (G. L. et Troch). - N.: Lenne (Tonglet).

4 B. rosella (Pers.) De Not.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 151.

Lichen - Pers. in Ust. Ann. d. Bot. VII (1794) p. 25.

Lecidea - Schaer. Enum. Lich. (1850) p. 186.

Biatora - Fries Lich. Eur. (1831) p. 259.

Bt: Héverlé (Coem.). - Fl. or.: Gand (Kickx).

5 B. rubella (Ehrh.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 185; Kickx Fl. crypt. I p. 262; Sydow Flecht. Deutschl. p. 152.

Lichen - Ehrh. Pl. crypt. (1785) n. 196.

Lecidea - Schaer. Enum. (1850) p. 142; Kickx Fl. Louv. p. 97.

Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Bt: Dilbeek (Él. M.), env. de Louvain (Kickx). — Lx.: Laroche (Él. M.).

6 B. umbrina (Ach.) Br. et Rostr. Dan. (1869) p. 109.

Lecidea - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 183.

Secoliga — Stiz. Krit. Bem. (1863) p. 25.

Lx.: Botasart (Dens et Piet.).

22 BILIMBIA De Not. in Giorn. bot. it. II, 1 (1851) p. 190.

1 B. cupreorosella (Nyl.) Stizenb.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 157. Lecidea — Nyl. En. génér. d. Lich. (1858) p. 122.

N.: Anseremme (Tonglet).

2 B. hypnophila (Ach.) Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 376; Sydow Flecht. Dentschl. p. 159.

Lecidea - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 199.

Bilimbia sphaeroides var. sabuletorum Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 204.

Lecidea sabuletorum Floerk. in Mag. Bot. (1808) p. 309.

Lecidea sabuletorum var. muscorum West. in Bull. Ac. Belg. XXI, 3 (1854) p. 231.

Bt: Court-St-Etienne (Dens et Piet.). — Fl. occ.: Furnes, Nieuport, Gheluvelt (West.), env. d'Adinkerke (Piré). — Lx.: Laroche (Dens et Piet.), Vallée des Tombes (Laroche) (Él. M.).

3 B. milliaria (Fries) Koerb. Syst. (1855) p. 214; Sydow Flecht. Deutschl. p. 160.

Lecidea - Fries Lich. Eur. (1831) p. 342 p. p.

Lecidea vernalis var. milliaria Nyl. Prodr. Lich. (1857) p. 107 p. p.

Lecidea sabuletorum West. Herb. crypt. n. 263.

Lx.: Laroche (Dens et Piet.). — Flandres (West.). — Lg.: Poulseur (G. L.), Godinne (Tonglet). — Lx.: St-Hubert (Al. M.).

4 B. premnea (Fries) Kickx Fl. crypt. I (p. 266).

Catillaria - Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 231.

Lecidea - Fries Lich. Eur. (1831) p. 329.

Catillaria grossa (Pers.) Blomb.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 200.

Fl. occ.: Zillebeke (Kickx).

5 B. trisepta (Naeg.) Arn.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 161.

Biatria - Naeg. in Muell.-Arg. Gen. (1862) p. 60.

Lecidea sabuletorum f. trisepta Stizenb. Lec. subfusca (1868) p. 47. Ht: Blaton (Él. M.).

23 BIATORINA Mass. Mem. Lich. (1858) p. 134.

1 B. diluta (Pers.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 191; Sydow Flecht. Deutschl. p.

Lecidea - Schaer. Enum. Lich. (1850) p. 126.

Biatora — Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 93; Kickv Fl. crypt. I p. 262. Fl. or.: Ledeberg (Coem.).

2 B. globulosa (Floerke) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 191; Sydow Flecht. Deutschl. p. 166.

Lecidea - Floerke Deutsche Lich. n. 181.

Biatora — Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 93; Kicha Fl. crypt. I p. 263. Fl. or.; env. de Renaix (Coem.).

3 B. lenticularis (Flot.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 191; Sydow Flecht. Deutschl. p. 168.

Zeora - Flot. Lich. Fl. S. (?) p. 32, 45 p. p.

N.: Leffe, Dinant, Bouvignes (Tonglet).

4 B. sphaeroides Mass. Mem. Lich. (1852) p. 135; Sydow Flecht. Deutschl. p. 164.

Lx.: Frahan (Del.).

5 B. tricolor (With.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 165.

Lichen - With. Arr. IV (1796) p. 20.

Lecidea - Nyl. (1886) p. 102 ex Hue Add. Lich. Eur. p. 323.

Lecidea anomala Ach. Syn. (1814) p. 38.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

24 BIATORA Fries Lich. Dianome nova (1817).

1 B. atrofusca Flotow.

Biatora fusca var. — Th. Fries; Sydow Flechten Deutschl. p. 177.

N.: Anseremme, Dinant, Leffe, Moniat (Tonglet).

2 B. coarctata (Sm.) Arn. Lich. Jura (1890); Sydow Flecht. Deutschl. p. 169.

Lichen - Sm. in Engl. Bot. V 8 (1798) pl. 534.

Zeora — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 132; Kickx Fl. crypt. I p. 240.

Parmelia - Ach. Meth. Lich. (1803) p. 158.

Lx.: Laroche (G. L. et Troch). — Bt: Nivelles (Dens et Piet.). — N.: Samson, Mosseroux (J. M.).

- var. cotaria (Ach.).

Lecidea - Ach. Meth. Suppl. (1803) p. 11.

Zeora coarctata var. - Ach.; Kicka Fl. crypt. I p. 240.

Lecanora elacista var. granulata Kickv Rech. cent. V (1855) p. 17.

Fl. or. : Audenarde, Bottelaare, Munte (Kickx).

var. elacista (Ach.) Th. Fries; Sydow Flecht. Deutschl. p. 168.
 Lecanora — Kickx Rech. cent. V (1855) p. 17.

Zeora coarctata var. — Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 76; Kichx Fl. crypt. I p. 240.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) t. 4 fig. 4.

Fl. occ.: Gheluvelt (West.).

var. ornata (Sommerf.) Th. Fries; Sydow Flecht. Deutschl.
 p. 168.

Lecanora coarctata var. - Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 77.

Lg.: Poulseur (G. L.). — Bt : Bois des Tors, Virginal (Dens et Piet.).

- var. prominula (Borr.).

Lecidea - Borr. in Engl. Bot. t. 2687 (1831) fig. 1.

Zeora coarctata var. - Kicka Fl. crypt. I (1867) p. 240.

Lecanora coarctata var. — Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 77.

Fl. or.: Audenarde, Bottelaare, Munte (Kickx).

3 B. flexuosa Fries; Sydow Flecht. Deutschl. p. 175.

Lecidea granulosa — Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 138.

N.: Monstreux (Dens et Piet.).

4 B. fuscorubens (*Nyl.*) *Sydow* Flecht. Deutschl, (1887), p. 177. Lecidea — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 199.

N.: Dréhance, Haut-le-Wastia, Waulsort (Tonglet.).

5 B. granulosa (Ehrh.) Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 93; Sydow. Flecht. Deutschl. p. 174.

Biatora decolorans Fries Lich. Eur. (1831) p. 266; Kicka Fl. crypt. I p. 264.

B. decolorans var. desertorum Ach.; Kickx Fl. crypt. I p. 264.

Patellaria decolorans var. granulosa Duby Bot. Gall. II (1830) p. 653.

Fl. occ.: Gheluvelt (Wcst.). — Fl. or.: Kluyzenberg (Renaix) (Kickx.). — Bt: Héverlé, Winxele, Corbeek-Loo (Paque). — A.: Weelde, Ravels (Paque).

6 B. immersa (Web.) Arn.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 181. Lichen — Web. Spic. Fl. Gott. (1798) p. 188. Hymenelia immersa. Web.; Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 328.

Lecidea — Kickx Fl. Louv. (1835) p. 96; Kickx Fl. crypt. I p. 269.

Ht: Roisin, Beaumont (G. L.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Anseremme, Hau-sur-Lesse, Couvin, Auffe (G. L.), Mosseroux (J. M.), env. de Rorhefort (Aigret), Waulsort (Dens et Piet.). — Lg.: Statte (G. L.), Poulseur (G. L.). — Flandres (Kickx). — Lx.: Laroche (Él. M.). — Bt: Pellenberg (Paque), env. de Louvain (Kickx).

7 B. Lightfootii (Sm.) Hepp; Kickx Fl. crypt. I p. 263; Sydow Flecht. Deutschl. p. 173.

Lecidea — Sm. in Engl. Bot. (1805) t. 1451.

Lecidea — Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 138.

Fl. or.: env. de Gand (Coem.).

8 B. Metzleri Koerb. Parerga Lich. (1865) p. 162; Sydow Flecht. Deutschl. p. 181.

Lecidea - Th. Fries (?).

N.: Moniat (Waulsort) (Tonglet).

9 B. proteiformis Mass. Exs. n. 144.

Lecania — Flagey Fl. Lich. Franche-Comté (1885) p. 305.

Dimerospora - Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 103. .

N.: Hastière (Dens et Piet.).

10 B. rivulosa (Ach.) Fries Lich, Eur. (1831); Sydow Flecht. Deutschl. p. 173.

Lecidea - Ach. Meth. (1803) p. 38.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

11 B. rupestris (Scop.) Ach.; Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 90; Kickx Fl. crypt. I p. 265; Sydow Flecht. Deutschl. p. 169.

Lichen — Ach. Lich. Prodr. (1798) p. 43.

Lecidea - Ach.; Kickx Fl. Louv. p. 98.

Caloplaca pyracea var. — Malbr. Lich. arr. de Bernay (1878) p. 8.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx). — Bt: Melsbroeck (Kickx). — N.: Leffe (G. L.), Hastières, Blaimont, Waulsort (Dens et Piet.), Olloy (Aigret). Rochefort, Han (Aigret). — Lg.: entre Poulseur et Esneux (G. L.). — Lx.: Neufchâteau, Longlier (Verheggen).

- var. rufescens (Hoffm.) Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 90; Sydow Flecht. Deutschl. p. 169.

Verrucaria - Hoffin. Pl. Lich. I (1790) p. 80 pl. 17 fig. 1.

Lg.: entre Poulseur et Esneux (G. Li.).

var. calva (Dicks.) Schaer.; Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845)
 90; Sydow Flecht. Deutschl. p. 169.

Lecanora - Nyl. (P).

N.: Moniat, Hastière-par-delà (Tonglet).

B. rupestris var. incrustans (DC.) Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 90; Sydow Flecht. Deutschl. 169.

Lecanora calva var. — Hepp. (?).

N.: Bouvignes (Tonglet).

— var. irrubata (Ach.).

Lichen - Ach. Lich. Prodr. (1798) p. 75.

N.: Fond des Rivaux (Houx), Moniat (Tonglet).

12 B. uliginosa (Schrad.) Fries Lich. Suec. exs. n. 218, Lich. eur. (1831) p. 275; Sydow Flecht. Deutschl. p. 178; Kickx Fl. crypt. I p. 264.

Lichen - Schrad. Spic. Fl. Germ. (1794) p. 88.

Lecidea — Ach. Meth. (1803) p. 43.

Lx.: Route de Samrée, près Laroche (Él. M.), Frahan (Del.) — A.: entre Vevel et Tongerloo (West. et Van Haes.). — Bt: Héverlé (Coem.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- var. argillacea Krempelh.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 178. Ht: Leuze (G. L.).
- var. coenosa Fries; Kickx Fl. crypt. I p. 265.
 Collema Ach. Lich. Univ. (1810) p. 629.

Fl. occ. : Ysenberg (Furnes) (Kickx).

— var. fuliginea Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 91; Kicke Fl. crypt. I p. 265.

Lecidea - Ach. Syn. (1814) p. 35.

Fl. or.: Ledeberg (Coem.).

— var. humosa Fries; Kicka Fl. crypt. I p. 264; Sydow Flecht. Deutschl. p. 178.

Fl. or.: Ledeberg (Coem.).

13 B. viridescens (Schrad.) Fries; Sydow Flecht. Deutschl. p. 174. Lichen — Schrad. in Gmel. Syst. II (1767) p. 1361.

Lecidea — Ach.; Kickx Fl. Louv. p. 96.

Lx.: Straimont (Verheggen). - Bt: env. de Louvain (Kickx).

25 CATOLECHIA Flotow in Bot. Zeit. (1850) p. 382.

C. badia (Fries) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 143.
 Lecidea — Fries Syst. Orb. Veg. (1825) p. 287.
 Lx.: Frahan, Rochehaut (Del.).

2 C. canescens (Dicks.) Fries; Sydow Flecht. Deutschl. p. 142. Lichen — Dicks. Fasc. Crypt. I (1785) p. 10 t. 2 fig. 5; Kickx Fl. Louv. p. 88. Placodium — DC. Fl. fr. II (1805) p. 379. Lecidea — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 216. Diploicia canescens Mass. Mem. Lich. (1852) p. 86; Kickv Fl. crypt. I p. 259.

Bt: Bornival, Nivelles (Dens et Piet.), Héverlé, Terbank (Paque), env. de Louvain (Kickx). — Lx.: env. de Bouillon (Del.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), entre Hastière-par-delà et Heer, Rouillon, Waulsort (Tonglet). — Lb.: Tongres (Paque). — Flandres (Kickx).

- 3 C. epigaea (Pers.) Th. Fries; Sydow Flecht. Deutschl. p. 142.
 - var. intermedia (Schaer.).

Lecidea epigaea var. — Schaer. Lich. Helv. Spic. (1823-42) p. 118. Lb.: Lanaye (Maertens).

PSORAE.

26 PSORA Hoffm. Pl. Lichen. (1790) t. 22 fig. 5-6, t. 41 fig. 1-3.

1 P. lurida Koerb. Syst. (1855) p. 176; Sydow Flecht. Deutschl. p. 144.

Lichen — Sw. in N. Act. Ups. IV (1784) p. 247.

Lichen - Ehrh. in Stirp. crypt. II p. 7 t. 1 fig. B.

Biatora - Fries Lich. Eur. (1831) p. 253.

Lecidea - Ach. Meth. (1803) p. 77.

Ht: Beaumont (G. L.). — Lx.: Rochers du Petit-Moulin (Bastogne) (Germain). — N.: Bouvignes (G. L.), Hastière, Waulsort, Onhaye (Dens et Piet.), Olloy, Matagne (Aigr. et François), Bouges (Bell.), env. de Dinant C. (Tonglet), Anseremme (Troch), Jamagne (Mansion), Rochefort, Han (Aigret), Vonèche (Aub.). — Lg.: Statte (G. L.), Comblain-au-pont (Del.), env. de Huy (Mansion).

2 P. testacea Hoffm.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 143.

Lecidea — Ach. Meth. (1803) p. 80.

Biatora - Fries Lich. Eur. (1831) p. 251.

N.: Bouvignes, Champalle, Fond des Rivaux (Houx), Moniat, Waulsort, Anseremme (Tonglet), Han-sur-Lesse (G. L.).

PERTUSARIAE.

- 27 PHLYCTIS Wallr. Naturg. d. Flechten (1825) p. 527; Crombie Brit. Lich. p. 512.
- P. agelaea (Ach.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 391; Kickv Fl. crypt.
 I p. 244.

Lichen — Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 30.

Fl. or.: Destelbergen (Coem.). - Fl. occ.: env. de Menin et de Roulers (Coem.).

28 THELOTREMA Ach. Meth. (1803) p. 130; Crombie Brit. Lich. I p. 513.

1 T. lepadinum Ach. Meth. (1803) p. 132 p. p.; Kicka Fl. crypt. I p. 244; Crombie Brit. Lich. I p. 515.

Lichen - Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 30.

Fi. or.: env. de Renaix (Kickx). — Bt: La Houssière (Dens et Piet.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Profondeville (Tonglet).

- 29 PERTUSARIA DC. Fl. fr. II (1805) p. 139; Crombie Brit. Lich. I p. 491.
- P. amara (Ach.) Nyl. in Flora (1873) p. 22; Crombie Brit. Lich. I p. 496.

Variolaria — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 324; Kickx Fl. Louv. p. 103.

Ht: Leuze, Flobecq (G. L.). — N.: entre Rouillon et Rivière (Tonglet). — Fl. occ : Sysseele (G. L.). — Bt: env. de Louvain (Kickx).

2 P. coccodes Nyl. in Mém. Soc. Cherbourg V (1857) p. 146; Kickv Fl. crypt. I p. 283; Orombie Brit. Lich. I p. 502.
Isidium — Ach. Meth. (1803) p. 139.

Bt: Héverlé (Coem.).

- var. isidioidea Kickv Fl. crypt. I (1867) p. 283.
 Fl. occ.: env. de Bruges (Coem.).
- 3 P. communis DC. Fl. fr. II (1805) p. 320; Crombie Brit. Lich. I p. 499; Kickx Fl. crypt. I p. 281.

Verrucaria — Ach.; Kickx Fl. Louv. p. 103.

Ht: Leuze, Gallaix, Stambruges (G. L.). — Lg.: Spa (Nob.). — Lx.: Herbeumont, Bertrix, Smuid (A. D.), Laroche (Él. M.), env. de Bouillon C. (Del.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Spontin (Él. M.), Hastière (Dens et Piet.), env. de Namur (Bell.). — A.: Gierle, Vosselaar (Paque). — Flandres (Kickx). — Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque), Limelette, Malaise, Dilbeek, Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), Nivelles, Braine-l'Alleud, Court-St-Étienne (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx).

— var. discoidea (Pers.).

Variolaria - Pers. in Ust. Ann. VII (1794) p. 23.

Bt: Nivelles (Dens et Piet.). - Lx.: Neufchâteau, Petit-Voir (Verheggen).

- var. leiotora Nyl. in Flora (1873) p. 303.
 Lx.: Mogimont, Libramont (Dens et Piet.).
- var. pertusa (L.) Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 229.

Lx.: Neufchâteau, Warmifontaine, Straimont (Verheggen), env. de Bastogne (Germain).

- var. sorediata Fries; Kickx Fl. crypt. I p. 281; Nyl. Prodr. p. 97.
 - A.: Gierle, Vosselaer (Paque). Flandres (Kickx). CC. (Dens et Piet. err. cal. var. sorediosa).
- var. variolosa Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 229.

Ht: env. d'Angre (G. L.). — Bt: Malaise, Limelette, Dilbeek (Él. M.), env. de Bruxelles (A. D.). — N.: Spontin (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Laroche (Él. M.), env. de Bastogne (Germain), Mont-Plainchamps (Verheggen).

4 P. dealbata (Ach.) Nyl. ex Crombie Lich. Brit. (1870) p. 59.

P. dealbata f. corallina (L.) Crombie in Grevillea XII (1883) p. 59; Crombie Brit. Lich. I p. 501.

N.: env. de Couvin (G. L.).

5 P. globulifera (Turn.) Nyl. in Mém. Soc. Cherbourg V (1857) p. 116; Crombie Brit. Lich. I p. 495.

Variolaria - Turn. in Trans. Linn. Soc. IX (1808) p. 139.

Lx.: Bouillon (Dens et Piet.). - Sine loco (Dumont).

P. lactea (L.) Nyl. in Flora (1881) p. 639; Crombie Brit. Lich. I p. 198.
 Lichen — L. Mant. (1767) p. 132.

N.: Burnot (Tonglet).

7 P. leioplaca (Ach.) Schaer. Spic. Lich. (1823) p. 66; Kicka Fl. crypt. I p. 283; Crombie Brit. Lich. I p. 509.

Porina - Ach. in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1809) p. 159.

Flandres (Kickx). — Bt: Groenendael (G. L.). — Lx.: Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen). — Ht: Leuze, Gallaix. Flobecq (G. L.). — N.: St-Servais (G. L.).

8 P. lutescens (Hoffm.) Lamy in Bull. Soc. bot. de France t. XXV (1878) p. 427; Crombie Brit. Lich. 1 p. 507.

Lepra -- Hoffm. Pl. Lich. (1784) t. 23 fig. 1-2.

Isidium - Turn. et Borr. Lich. Br. (1839) p. 87.

Bt: Héverlé (Coem.).

9 P. multipunctata Nyl. Not. Sallsk. pro Fauna et Fl. Fenn. Forh. XI (1870) p. 185; Crombie Brit. Lich. I p. 494.

Ht: Baudour, Leuze, Gallaix (G. L.). — Bt: Groenendael (G. L.), Strombeek (Nob.). — N.: St-Servais, Pont-à-Lesse, Dinant (G. L.).

P. pustulata (Ach.) Nyl. in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3 t. 1 (1856)
 p. 441; Crombie Brit. Lich. I p. 504.

Porina - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 309.

N.: Insémont (Hastière) (Dens et Piet.).

11 P. Westringii Nyl. Pyr. Or. (1872) p. 35; Hue Add. Lich. Eur. p. 120.

Isidium — Ach. Meth. (1803) p. 138.

Lx.: (Aub., Dumont).

- var. pseudo-corallina Fries (?).

Lg.: Stavelot (Aigret). - Lx.: Maissin (Aigret et Dolisy).

12 P. Wulfeni DC. Fl. fr. II (1805) p. 320; Kicka Fl. crypt. I p. 282; Crombie Brit. Lich. I p. 505.

Fl. or.: Gand, Onckerzeele (Kickx). — Lx.: Neufchâteau, Longlier, Nolinfaing (Verheggen).

— var. sorediata Kickv Fl. crypt. I (1867) p. 282. Flandres (Kickv).

· LECANORAE.

30 CALLOPISMA De Not. in Giorn. bot. it. II, 2 (1851) p. 198.

1 C. erythrocarpia (Pers.) De Not.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 99.

Lichen - Pers. in Ach. Lich. Univ. (1810) p. 205.

Lecidea - Ach.; Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 145.

Parmelia - Fries Lich. Eur. (1831) p. 119.

Bt: Tervueren (A. D.).

31 THELENELLA Nyl. in Mém. Soc. Cherb. II (1854) p. 15.

T. modesta Nyl. Prod. (1857) p. 192; Kichx Fl. crypt. I p. 280.
 Verrucaria — Nyl. Coll. Lich. p. 16.

- var. grisella Nyl. Prodr. (1857) p. 192; Kickx loc. cit. Fl. or.: Meulestede (Coem.).

32 SECOLIGA Mass. in Flora (1857) p. 492.

S. clausa (Hoffin.) Flagey Fl. Lich. Franche-Comté II (1885) p. 371.
 Lichen — Hoffin. Enum. (1874) p. 48.

лиспен — доут. Епин. (1674) р. 46.

Gyalecta exanthematicum Fries Lich. Eur. (1831) p. 197.

Thelotrema - Schaer. Spic. (1823) p. 68.

N.: Onhaye (Dens et Piet.), Moniat, Bouvignes, Fond des Rivaux (Houx), Waulsort (Tonglet), Olloy (G. L.) — Lx.: env. de Bastogne (Van Bastelaer).

2 S. gyalectoides (Mass.) Koerb. Parerg. (1865) p. 110.

Petractis - Koerb. Lich Germ. Exs. n. 25.

Patellaria - Hepp Exs.

Thelotrema - Mass. Ricerche (1852) p. 142.

N.: Anseremme, Falmignoul (Tonglet).

33 LECANIA Mass. Alc. gen. di Lich. (1853) p. 12.

1 L. fuscella Mass. Alc. gen. d. Lich. (1853) p. 12.

Lecanora syringea Th. Fries; Sydow Flecht. Deutschl. p. 104.

Lx.: Neufchâteau, Longlier, Nolinfaing, Straimont (Verheggen).

2 L. Koerberiana Lahm ex Koerb. Parerga (1865) p. 168.
Bt: La Houssière (Dens et Piet.).

34 RINODINA Ach. Lich. Univ. (1810) p. 344.

1 R. lecanorina Mass. Sched. crit. (1855) p. 48; Sydow Flecht. Deutschl. p. 94.

Mischoblastia - Mass. Ricerche (1852) p. 41.

N.: Anseremme, Bouvignes, Champalle, Dinant, Moniat, Waulsort (Tonglet). — Lx.: Bouillon (Del.). — Lg.: Quarreux (Goffart).

- 35 LECANORA Ach. Lich. Univ. (1810) p. 7.7; Crombie Brit. Lich. I p. 348.
- 1 L. albella (Pers.) Ach. in Vet. Ak. Handl. (1810) p. 137; Crombie Brit. I p. 418.

Lichen - Pers. in Ust. Ann. Bot. XI (1794?) p. 18.

L. angulosa var. — Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 238.

Lx.: Straimont (Verheggen). — N.: env. de Namur (Bell.). — Bt: Héverlé (Coem.). -- Fl. or.: Destelbergen, Herzeele (Kickx).

2 L. angulosa (Schreb.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 364; Kickx Fl. Louv. p. 101; Crombie Brit. Lich. I p. 419.

Lichen - Schreb. Spicil. (1771) p. 136.

- N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). Bi: Kessel-Loo, Héverlé, Eegenhoven (Paque). Flandres (Kickx).
- var. leptyrea Ach.; Kicke Fl. Louv. p. 101.

 Bt: env. de Louvain (Kicke).
- 3 L. atra (Huds.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 334; Crombie Brit. Lich. I p. 450; Kickx Fl. Louv. p. 102; Kickx Fl. crypt. I p. 236. Lichen Huds. Fl. Angl. I (1762) p. 445.

Ht: Angre, Beaumont (G. L.). — Flandres (Kickx). — Lg.: Poulseur (G. L.). — Bt: Louvain (Paque), St-Gilles (Aigret), env. de Louvain (Kickx). — Lx.: Neufchâteau, Longlier, Straimont, Warmifontaine (Verheggen), Bertrix, Villance (A. D.), Metzert (G. L.), Bouillon (Dens et Piet.), env. de Bastogne (Germain), Frahan (Del.). — N.: Couvin (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.), Hastière, Bornival (Dens et Piet.), env. de Namur (Bell.), Olloy (Aigret), Waulsort (Dens et Piet.), env. de Dinant (Tonglet).

4 L. atrocinerea (Dicks.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 345; Nyl. in Flora (1870) p. 38.

Lichen - Dicks. Crypt. (1785-1801) t. 9 fig. 2.

N.: Burnot (Tonglet).

5 L. atrynea (Ach.) Nyl. in Flora (1872) p. 250 nota 2; Crombie Brit. Lich. I p. 414.

Lecanora subfusca var. — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 395; Kicke Fl. Louv. p. 102; Kicke Fl. crypt. I p. 237.

Fl. or. : Gand, St-Amand (Kickx). — Lb. : Sluse (Paque). — Ht : Beaumont (G. L.).

6 L. aurantiaca (Lightf.) Nyl. in Mém. Soc. Cherb. V (1858) p. 112; Crombie Brit. Lich. I p. 373.

Lichen - Lightf. Fl. Scott. II (1777) p. 810 p. p.

Calophaca - Th. Fries Arctoi. (1861) p. 219; Kicky Fl. crypt. I p. 234.

Callopisma - Mass. Blast. (1853) p. 70.

Lecidea - Schaer, Lich. Eur. (1850) p. 148; Kicky Fl. Louv. p. 98.

- N.: Hastière, Waulsort (Dens et Piet.), Leffe, Moniat, Anseremme (Tonglet), Samson, Mosseroux, bois de la Petite-Marlagne (J. M.), Olloy (Aigret), Roisin (G. L.). Lx.: Frahan (Del.). Flandres (Kickx). Bt: env. de Louvain (Kickx).
- 7 L. badia (Pers.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 407; Crombie Brit. Lich. I p. 451.

Lichen — Pers. in Ust. Ann. Bot. VI (1794) p. 37.

Sine loco (Él. M.).

8 L. Bischoffii (Hepp) Nyl. ex Stiz. in St Gall. Nat. Ges. (1876) p. 217: Crombie Brit. Lich. I p. 399.

Psora - Hepp Lich. Eur. (1853) n. 81.

N.: Bouvignes, Moniat (Tonglet). — Lx.: Frahan (Del.).

- var. immersa (Koerb.) Stizenb.; Oliv. Lich. Ouest France p. 258.
 - N.: Leffe (Tonglet).
- 9 L. caesio-rufa Nyl. in Flora (1880) p. 388.
 N.: Heer (Tonglet).
- L. calcarea (L.) Somm. Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 192; Crombie Brit. Lich. I p. 473.

Lichen - L. Sp. pl. (1753) p. II40.

Aspicelia — Koerb. Parerga Lich. (1865) p. 94; Kickw Fl. crypt. I p. 241. Urceolaria — Ach. Meth. (1803) p. 142 t. 4 fig. 1.

Fi. or.: Env. de Renaix (Kickx). — Ht: Roisin, Beaumont (G. L.), Tournai (West.). — N.: entre Burnot et Arbre (Él. M.), Samson (J. M.), Vallée de la Meuse (Dens et Piet.), Olloy, env. de Rochefort (Aigret), Couvin, Olloy (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— var. contorta (Hoffm.) Nyl. in Flora (1872) p. 564; Crombie Brit. Lich. I p. 474.

Verrucaria — Hoffm. Pl. Lich. I (1789) fig. 1, 3, 4.

Lichen — Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 186.

Aspicilia calcarea var. contorta (Floerke) Koerb. Parerga (1865) p. 95; Kickv Fl. crypt. I p. 241.

Urceolaria calcarea var. contorta Schaer.; Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 26.

Bt: Louvain, Héverlé (Coem.). — Lg.: Esneux (G. L.). — Fl. or.: Audenarde, Alost, Melsen (Kickx). — N.: Olloy (G. L.), Samson (J. M.).

- var. Hoffmanni (Ach.) Somm. Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 102; Crombie Brit. Lich. I p. 475.

Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 31.

N.: Heer (Dens et Piet.).

— var. opegraphoides (DC.).

Aspicilia calcarea var. — Nyl. Prodr. (1857); Kickx Fl. Crypt. I p. 241.

Urceolaria opegraphoides DC. Fl. fr. II (1805) p. 371.

Fl. or.: Gand (Coem.). - Fl. occ.: Courtrai (Coem.).

L. calcarea var. concreta Schaer. Enum. (1850) p. 91; Oliv. Lich. Ouest p. 301.

N.: Hastière, Onhaye (Dens et Piet.).

var. caesio-alba (Duby) Oliv. Lich. Ouest. (1897) p. 301.
 Urceolaria — Duby Bot. Gall. (1830) p. 671.

N.: Dohan (Dens et Piet.).

11 L. callopisma Ach. Lich. Univ. (1810) p. 437; Crombie Brit. Lich. I p. 362.

Placodium - Mérat Fl. Paris I (1836) p. 331.

Parmelia murorum var. — E. Fries Scand. (1831) p. 165.

Bt: Feluy, Villers-la-Ville, Nivelles (Dens et Piet.). — N.: Hastière, Waulsort, Onhaye, Anthée (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Samson (Delhaise), Beaumont, Couvin, Montagne-au-buis, Han-sur-Lesse, Fond d'Auffe (G. L.), Marche-les-Dames, Mosseroux (J. M.).

12 L. candicans (*Dicks.*) Schaer. Spic. (1828) p. 119; Crombie Brit. Lich. I p. 390.

Lichen - Dicks. Crypt. fasc. III (1793) p. 15 t. 9 fig. 5.

Parmelia - Fries Lich. Eur. (1831) p. 123.

Placodium - Dub. Bot. Gall. (1830) p. 661.

N.: Waulsort, Hastière, Anthée (Dens et Piet.), Moniat, Fonds de Leffe, Bouvignes (Tonglet), Olloy (Aigret), Renlies (Delhaise), Han-sur-Lesse, Fond d'Auffe (G. L.).

13 L. cerina (Ehrh.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 390; Kickx Fl. Louv. p. 100; Crombie Brit. Lich. 1 p. 380.

Lichen — Ehrh. Exs. (1785) n. 216.

Caloplaca — Th. Fries; Kicks Fl. Louv. p. 233.

Callopisma — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 127.

Lx.: Laroche (Trochet G. L.). — Fl. occ.: env. de Bruges (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Bt: Moustreux (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx). — N.: Hastière (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.), Samson, Mosseroux (J. M.), Burnot (Él. M.).

var. cyanolepra (DC.) Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 144;
 Kickx Fl. Louv. (1835) p. 100; Crombie Brit. Lich. I p. 380.

Patellaria — DO. Fl. fr. II (1805) p. 560.

Caloplaca cerina var. - Nyl.; Kicka Fl. crypt. I p. 233.

Flandres (Kickx).

— var. stillicidiorum (Hornem.) Nyl. in Mém. Soc. Cherb. t. V (1857) p. 112; Crombie Brit. Lich. I p. 381.

Lichen - Hornem, Fl. Dan. (1792) t. 1063 fig. 2.

N.: Moniat (Tonglet).

14 L. chalybaea (Duf.) Schaer. Enum. (1850) p. 60; Crombie Brit. Lich. I p. 390.

Parmelia - Duf. in Fries Lich. Eur. (1831) p. 125.

Caloplaca — Muell.-Arg. Princ. de class. (1862) p. 388.

15 L. cineracea Nyl. ap. Hue Add. Lichen. Eur. (1886) p. 114.

N.: entre Rouillon et Rivière (Tonglet). — N.: Hastière, Onhaye (Dens et Piet.), Moniat, Waulsort, Dinant (Tonglet).

16 L. cinerea (L.) Somm. Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 99; Crombie Brit. Lich. I p. 466.

Lichen - L. Mant. I (1767) p. 132; Ach. Prodr. (1798) p. 32.

Aspicilia - Mudd Man. (1867) p. 162 p. p.

Urceolaria - Sm. Engl. Fl. V (1833) p. 172.

Urceolaria polygonia Ach.; Kicka Fl. Louv. p. 102.

Lx.: Longlier (Verheggen).

17 L. eircinata (Pers.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 427; Crombie Brit. Lich. I p. 403.

Lichen - Pers. in Ust. Ann. Bot. VII (1794) p. 25.

Squamaria — Mudd Man. (1867) p. 130.

Placodium — DO. Fl. fr. II (1805) p. 380.

Placodium radiosum Duby Bot. Gall. (1830) p. 660; Kickx Fl. Louv. p. 87.

Psoroma - Muell.-Arg. Princ. de class. (1862) p. 378.

Bt: Virginal (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx). — N.: env. de Rochefort (Aigret), Olloy (G. L.). — Ht: Beaumont, Roisin (G. L.). — Lg.: Statte, Poulseur (G. L.), env. de Huy (Mansion).

18 L. citrina (Hoffm.) Ach. Lich. Univ. (1870) p. 402; Kickx. Fl. Louv. p. 99; Crombie Brit. Lich. I p. 371.

Verrucaria — Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 198 p. p.

Caloplaca - Th. Fries Arctoi (1861) p. 118.

N.: env. de Namur (Bell.). — Bt: env. de Louvain (Kickx). — Bt: Louvain (Paque), Ways (Dens et Piet.). — Fl. or.: Gaud (Coem.), entre Zevecote et Ghistelles (Kickx).

19 L. coccinea (Dicks.) Crombie in Grevillea VIII (1890) p. 70; Crombie Brit. Lich. I p. 455.

Haematomma - Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 153.

Lichen — Dicks. Crypt. fasc. I (1785) p. 8 t. t. 2 fig. 1.

Lecanora Haematomma Ach. Lich. Univ. (1810) p. 338; Kickw Fl. Louv. p. 101.

Lepra leiphaemia (Ach.) DO. Fl. fr. Suppl. (1815) p. 173; Kicka Fl. Louv. (Kickx).

Bt: St Gilles, Waterloo (Kickx), Bois de la Cambre (A. D.), env. de Louvain (Kickx), Waulsort (Dens et Piet.). — Lx.: Laroche, Dohan (Dens et Piet.), entre Bouillon et Rond-le-Duc (Del.).

— var. porphyrium (Pers.).

Lichen — Pers. in Ust. Ann. XI (1794) p. 17.

Haematomma coccineum var. porphyrium Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 297.

Lx.: Laroche (Troch. et G. L.).

L. coccinea var. ochroleucum (Neck.).

Lichen - Neck. Meth. musc. (1771) p. 52.

Haematomma coccineum var. - Th. Fries. Lich, Scand. (1871) p. 297.

Lx.: Laroche (Troch. et G. L.).

20 L. confragosa (Ach.) Nyl. ex Lamy in Bull. Soc. bot. de Fr. t. XXV (1878) p. 404; Crombie Brit. Lich. I p. 397.

Parmelia - Ach. Meth. Suppl. (1803) p. 33.

Lecanora sophodes var. — Orombie Lich. Brit. (1870) p. 49 p. p.

Lecidea atra var. - Ach.; Kickx Fl. Louv. p. 102.

Bi: env. de Louvain (Kickx).

21 L. crassa (Huds.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 413; Crombie Brit. Lich. I p. 351.

Lichen - Huds. Fl. Angl. ed. 2 (1778) p. 530.

Parmelia — Ach. Meth. (1803) p. 185.

Psoroma - Koerb. Syst. (1855) p. 119.

Squamaria — DO. Fl. fr. II (1805) p. 475.

Lg.: Statte (G. L.), Comblain-au-pont (Del.). — N.: Olloy (Aigret et François), Vallée de la Meuse C. (Dens et Piet.). — Ht: Beaumont (G. L.).

— var. Dufourei Fries.

Parmelia - Fries Lich. Eur. (1831) p. 99.

Squamaria — Kickx ex Bell. in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 58.

S. Dufourei var. minor Kickx loc. cit. (1852).

N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Rochers des Grands-malades, Namur (Collège de la Paix) (Bell.). — Lx.: Petit-Moulin (Germain).

22 L. cirrochroa (Ach.) Syn. (1814) p. 181.

Placodium - Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 137.

Gasparrinia - Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 76.

N.: Olloy (Aigret et François), Samson (J. M.).

23 L. crenulata (*Dicks.*) *Nyl.* (1872) p. 250; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 111.

Lichen - Dicks.

N.: Mosseroux (J. M.), Lenne (Tonglet).

24 L. decipiens (Ehrh.) Ach.

Lichen - Ehrh. in Stirp. crypt. II 7 t. 1 fig. B.

Lecidea - Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 95.

N.: Vonêche (Aub.), Olloy (Aigret et François), Bouges (Bell.).

25 L. dispersa (Pers.) Floerke Deutsch. Lich. (1815) p. 4; Sydow Flecht. Deutschl. p. 108.

Lichen - Pers. in Ann. d. Bot. VII (1794) p. 27.

Parmelia - Ach. Meth. Lich. (1803) p. 168.

N.: Bonneville (Delhaise), Dréhance (Touglet).

26 L. Dubyanoides (Hepp) Stizenb.

N.: Bouvignes (Tonglet).

27 L. effusa (Pers.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 386; Crombie Brit. Lich. I p. 441.

Lichen - Pers. in Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 174.

Patellaria — DC. Fl. fr. II (1805) p. 356.

Bt: Ruysbroeck (West. et Van Haes.).

28 L. elegans (Link) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 435; Crombie Brit. Lich. I p. 358.

Lichen - Link in Ann. Bot. I (1794) p. 37.

Placodium — DC. Fl. fr. II (1805) p. 379.

Amphiloma - Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 110; Kicke Fl. crypt. I p. 229.

Ht: Erpion (Dens et Piet.). — N.: entre Rochefort et Han, Olloy (Aigret). — Bt: env. de Louvain (Kickx). — Lx.: Libramont (Dens et Piet.). — Fl. occ.: Ostende (Coem.).

29 L. endoleuca Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 426.

N.: Dréhance (Tonglet).

30 L. epixantha (Ach.) Nyl. in Act. Soc. Linn. Bord. XXV (1864) p. 8; Crombie Brit. Lich. I p. 370.

Gasparrinia - Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 77.

Lecidea - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 208.

Patellaria — Duby Bot. Gall. II (1830) p. 656.

N.: Samson (J. M.), Dréhance (Tonglet).

31 L. erythrella (Ach.) Nyl. in Flora (1873) p. 549; Crombie Brit. Lich. I p. 373.

Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 43.

Lecanora aurantia var. — Crombie Lich. Brit. (1870) p. 46.

N.: Hastière (Dens et Piet.).

— var. rubescens (Ach.) Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 142; Crombie Brit. Lich. Ip. 374.

Lecidea aurantiaca var. rubescens Ach. Meth. (1803) p. 69.

Lg.: entre Poulseur et Esneux (G. L.).

32 L. exigua (Ach.) Nyl. in Flora (1873) p. 197; Crombie. Brit. Lich. I p. 395.

Parmelia sophodes var. — Ach. Meth. (1803) p. 156.

Lecanora periclea var. — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 356.

Rinodina - Th. Fries Arctoi (1861) p. 229.

Lx.: Frahan (Del.). — A.: env. d'Anvers (West. et Van Haes.).

33 L. expallens Ach. Lich. Univ. (1810) p. 374; Crombie Brit. Lich. I.p. 432. L. expallens var. lutescens (DC.) Nyl. in Flora (1872) p. 248.

Patellaria — DC. Fl. fr. II (1805) p. 354.

Lecanora — Duby Bot. Gall. II (1830) p. 668; Kicke Fl. Louv. p. 900.

Bt: env. de Louvain (Kickx).

34 L. ferruginea (Huds.) Nyl. in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3 t. 1 (1856) p. 322; Crombie Brit. Lich. I p. 375.

Lichen - Huds. Angl. II (1762) p. 444.

Caloplaca — Th. Fries Arctoi (1861) p. 223; Kickx Fl. crypt. I p. 235.

Patellaria — Hoffm. Pl. Lich. (1794) p. t. 36 fig. 1.

Bt: Bruxelles (Aigret), env. de Louvain (Kickx), Héverlé (Paque). — Ht: Baudour (G. L.). — Flandres (Kickx). — Lx.: Bouillon, Dohan (Del.), env. de Bastogne (Germain), Neufchâteau, Mont-Plainchamos, Petit Voir (Verheggen). — N.: Hastière (Dens et Piet.), env. de Dinant (Tonglet), Olloy. Fagniolle (Aigret), Leffe (G. L.).

- f. muscicola (Schaer.).
 - N.: Moniat (Tonglet).
- var. festiva (Ach.) Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 143; Crombie Brit. Lich. I p. 376.

Lecidea caesia-rufa var. — Ach. Syn. (1814) p. 44.

Bt: Virginal (Dens et Piet.). — N.: Hastière, Zeer (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François).

— var. fusciuscula (Lamy).

Caloplaca ferruginea var. — Lamy Lich. Mont-Dore (1880) p. 60 note.

N. : Bornival (Dens et Piet.).

- var. obscurum Th. Fries.

Callopisma ferruginea var. — Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 98.

Ht: Burnot, Angre (G. L.).

35 L. fuscata (Schrad.) Nyl. in Flora (1872) p. 364; Crombie Brit. Lich. I p. 483.

Lichen - Schrad. Spic. Fl. Germ. (1794) p. 83.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 189 a.

Lx.: Bouillon (Dens et Piet.).

36 L. fuscoatra (Bayrh.) Nyl. in Flora (1872) p. 427; Crombie Brit. Lich. I p. 377.

Biatora ferruginea var. — Bayrh. Uebers. (1849) p. 82.

Caloplaca ferruginea var. — Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 143.

N.: Heer (Dens et Piet.).

37 L. fulgens (Sw.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 437; Crombie Brit. Lich. 1 p. 357.

Lichen -- Sw. in N. Act. Upsal. IV (1794) p. 246.

Squamaria — Tul. Mém. (1852) p. 150.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 192.

Psoroma fulgens Koerb. Syst. (1855) p. 118.

Placodium — DC. Fl. fr. II (1805) p. 378.

N.: Authée (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François), Mouiat, Dinant (Tonglet), Louette-St-Pierre (Aub.), Bouvignes, Anseremme, Couvin, env. de Dinant (Del.).

38 L. galactina Ach. Lich. Univ. (1810) p. 424; Crombie Brit. Lich. I p. 404.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 190.

Psora albescens DC; Kickx Fi. Louv. p. 88.

Psoroma galactina Mueller.

Bt: env. de Louvain (Kickx). — Lx.: Bouillon (Dens et Piet.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Samson, Mosseroux (J. M.), Olloy (G. L.), env. de Dinant (Tonglet), Waulsort, Hastière-par-de-là (Dens et Piet.), Samson, Bonneville (Delhaise).

39 L. gangaleoides Nyl. in Flora (1872) p. 354; Crombie Brit. Lich. I p. 416.

Lecanora subfusca var. — Nyl.

N.: Hermeton (Dens et Piet.), Profondeville (Tonglet).

40 L. gelida (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 428; Crombie Brit. Lich. I p. 550.

Lichen - L. Mant. II (1771) p. 133.

Squamaria — Duby Bot. Gall. (1830) p. 659.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 188.

Placodium — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 117.

Lx.: Frahan (Del.).

- 41 L. glaucoma (Hoffm.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 362; Crombie Brit. Lich. I p. 420.
 - var. Swartzii (Ach.) Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 159; Crombie Brit. Lich. I p. 421.

Lichen - Ach. Prodr. (1798) t. 1 fig. 2.

Lecanora sordida var. — Sydow Flecht. Deutschl. (1887) 106.

Lx.: Laroche (Troch et G. L.).

42 L. gibbosa (Dicks.) Nyl. in Not. Sällsk p. Fauna et Fl. Fenn. Förh. n. s. V (1866) p. 137; Crombie Brit. Lich. I p. 470.

Lichen - Dicks. Crypt. fasc. II (1790) p. 20 t. VI fig. 5.

Aspicilia — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 163.

Urceolaria — Smith Engl. Fl. V (1833) p. 172.

Ht: Beaumont (G. L.). — Lx.: Bouillon, Dohan, Botassard (Dens et Piet.), Laroche (G. L.), Frahan, Mortehan, Bouillon (Del.). — N.: Burnot, Rivière (Tonglet), Olloy (Aigret et François), env. de Couvin (G. L.).

var. lusca Nyl. Pyr. or. Obs. Nov. (1891) p. 59 nota 1;
 Crombie Brit. Lich. I p. 471.

Lecanora — Nyl. in Flora (1873) p. 69 nota 1.

Aspicilia gibbosa var. sylvatica Zwackh.

N.: Burnot (Tonglet). - Lx.: Laroche (G. L.), Frahan (Del.).

43 L. glaucocarpa (Wahl.) Ach. in Vet. Ak. Handl. (1810) p. 151; Crombie Brit. Lich. I p. 481.

Lichen — Wahl. in Vet. Ak. Handl. (1806) p. 143 t. IV fig. 4. Parmelia — Ach. Meth. (1803) p. 182.

N.: Anseremme (Tonglet).

44 L. haematites Chaub. Fl. Agen. (?) p. 492; Kicka Fl. Louv. p. 100.

Callopisma - Koerb. Parerga Lich. (1865) p. 64.

Bt: env. de Louvain (Kickx).

45 L. Hageni Ach. Lich. Univ. (1810) p. 367; Crombie Brit. Lich. I p. 425.

Lichen - Ach. Prodr. (1798) p. 57.

N.: Bois de la Petite-Marlagne, Mosseroux Marche-les-Dames (J. M.). — Lx.: Rochehaut, Frahan (Del.). — Ht: Flobecq (G. L.).

var. umbrina (Ehrh.) Arn. Lich. Jura (1890) p. 116.
 Lecanora subfusca var. — Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 237.
 Lecanora — Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 162.
 Fl. or.: Baalegem (Kickx).

46 L. Heppii (Naeg.) Nyl. Pyr. or. (1872) p. 54.
N.: entre Bouvignes et Anhée (Tonglet et G. L.).

47 L. Heppiana Hue Lich. d'Aix-les-Bains.

Amphiloma — Mueller. Princ. de class. (1862) p. 39.

Placodim callopisma Hepp.

N.: env. de Dinant, assez fréquent (Tonglet).

- 48 L. intricata Schrad.; Hue Add. Lichen. Eur. p. 97.
 N.: Burnot, Anseremme (Tonglet).
- 49 L. intumescens (Rebent.) Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 143; Crombie Brit. Lich. I p. 417.

Parmelia - Rebent. Prodr. Fl. neom. (1804) p. 301.

Lecanora subfusca var. — Flotow; Kickx Fl. crypt. I p. 236.

Fl. or.: Destelbergen (Kickx). — Lx.: Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen).

50 L. laciniosa (Duf.) Nyl. in Flora (1881) p. 454; Crombie Brit. Lich. I p. 567.

Parmelia parietina var. — Duf. in Fries Lich. Eur. (1831) p. 73.

Lichen concolor Dicks. Crypt. Fasc. III (1785-1801) p. 18 t. IX fig. 8. p. p.

Bt: Thuin-lez-Nivelles, Lillois (Dens et Piet.). — Lx.: Frahan (Del.), Hamipré, Neufchâteau (Verheggen). — Ht: Leuze, Gallaix (G. L.). — N.: Olloy Aigret et François), Rouillon, Viet (Touglet).

51 L. lentigera (Web.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 423; Crombie Brit. Lich. I p. 353.

Lichen — Web. Spic. (1778) p. 192.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 192.

Psoroma - Koerb. Syst. Lich. (1855) p, 119.

Placodium - Th. Fries Arctoi (1861) p. 181.

Squamaria - DC. Fl. fr. II (1805) p. 376.

N.: Olloy (Aigret et François), Bouges (Bell.), Couvin, (G. L.), Waulsort, Lenne, Maurenne (Tonglet).

- 52 L. lobulata Sommerf.; Nyl. (1883) p. 105 cf. Hue Add. Lich. Eur. p. 65.
 N.: Vallée de l'Hermeton (Tonglet).
- 53 L. luteo-alba (Turn.) Nyl. ex Lamy in Bull. Soc. Bot. de Fr. t. XXV (1878) p. 398; Crombie Brit. Lich. I p. 385.

Lichen — Turn. in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 92.

Gyalolechia - Arn. Lich. Jura (1890) p. 91.

Lecidea - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 207 Kicka Fl. Louv.

Caloplaca — Th. Fries Arctoi (1861) p. 220; Kicka Fl. crypt. I p. 234.

Caloplaca cerina var. biatorina Nyl.; Kickx Fl. crypt. I p. 233.

Flandres (West., Kickx). — Fl. or.: Gand (Kickx). — Bt: Court-St-Etienne (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx). — N.: Olloy (Aigret). — Ht: Beaumont (G. L.).

54 L. murorum (Hoffm.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 443.

Lichen - Hoffm. Enum. (1784) p. 63.

Placodium — Leight. Lich. Fl. (1871) p. 175 p. p.

Amphiloma — Koerb. Syst. (1855) p. 111; Kickx Fl. crypt. I p. 230.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 195.

Bi: Nivelles (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx), Groenendael (Él. M.). — Hi: Bois d'Angre (G. L.). — Lx.: Bouillon, Frahan (Del.), Laroche (Dens et Piet.), env. d'Arlon (Paque). — A.: env. de Turnhout (Paque). — N.: Heer, Hastière (Dens et Piet.), env. de Namur (Bell.), Marche-les-Dames (J. M.), Bouvignes (Tonglet).

- var. pusilla Muell.-Arg. Princ. de Class. (1862) p. 379.
- N.: Heer (Dens et Piet.), Leffe (Tonglet).
- var. pusilla f. picta Flagey.

Lx.: Maissin (Aigret et Dolisy).

55 L. mutabilis (Ach.) Nyl.

Urceolaria - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 335.

Aspicilia — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 167; Sydow Flecht. Deutschl. p. 117. env. Courtrai (Wall.).

56 L. ochracea (Schaer.) Nyl. in Crombie Lich. Brit. (1870) p. 46; Crombie Brit. Lich. I p. 375.

Lecidea — Schaer. in Nat. Anz. (1819) p. 11.

Callopisma — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 131.

Caloplaca — Flagey Fl. Lich. Franche-Comté (1885) p. 251.

N.: Hastière (Dens et Piet.), Yvoir, Moniat, Bouvignes, Leffe, env. de Dinant, fréquent (Tonglet), Bonneville (Delhaise), Olloy (Aigret et Franc.).

57 L. pallescens (L.) Nyl. in Bull. Soc. Linn. Normandie sér. 2 t. II (1868) p. 68; Orombie Brit. Lich. I p. 462.

Lichen — L. Fl. Suec. (1755) p. 409.

Lecanora - var. tumidula Schaer. Enum. Lich. (1850) p. 78.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). - Ht: Beloeil (Él. M.). - Lx.: Maissin (Dolisy.).

58 L. pallida (Schreb.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 144; Sydow Flecht. Deutschl. p. 110.

Ht: Baudour, Blaton, Leuze, Flobecq (G. L.). — Lx.: Rochehaut, Frahan (Del.). — Bt: env. de Nivelles (Dens et Piet.).

- var. angulosa Ach. f. minus Arn. ex Oliv. Lich. Orne (1882-84) p. 153.

Bt: Nivelles (Dens et Piet.).

59 L. parella (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 370 p. p.; Crombie Brit. Lich. I p. 461.

Lichen — L. Mant. (1767) p. 132.

Lecanora pallescens var. — Schaer. Enum. (1850) p. 78.

Ochrolechia pallescens var. - Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 149.

Bt: entre Louvain et Winxele (Paque). — N.: Hastière, Heer (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Viel-Salm (Aigret).

60 L. piniperda Koerb. Parerga Lich. (1865) p. 81; Crombie Brit. Lich. I p. 435.

Ht: Beaumont (G. L.).

61 L. polytropa (Ehrh.) Schaer. Enum. Lich. (1850) p. 81 p. p.; Crombie Brit. Lich. I p. 437.

Lichen - Ehrh. Crypt. (1793) n. 294.

Parmelia varia var. — Fries Lich. Eur. (1871) p. 458.

Lx.: Laroche (Troch et G. L.).

62 L. Prevostii (Fries) Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 288; Crombie Brit. Lich. I p. 478.

Gyalecta — Fries Lich. Eur. (1831) p. 197.

N.: Waulsort, Onhaye (Tonglet).

63 L. pruinifera Nyl. (1879) p. 202 cf. Hue Add. Lich. Eur. p. 64.
N.: Froidvaux, entre Bouvignes et Anhée (Tonglet).

64 L. pruinosa (Sm.) Nyl. in Crombie Lich. Brit. (1870) p. 57; Crombie Brit. Lich. I p. 487.

Lichen pruinosus Sm. in Engl. Bot. XXXII (1811) t. 2244.

Sarcogyne — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 267; Kickx Fl. crypt. I p. 260.

Biatorella — Mudd Brit. Lich. (1861) p. 191.

Fl. or.: Gand, Baalegem (Kickx). — Lg.: Esneux (G. L.). — N.: Moniat (Tonglet), Hastière (Dens et Piet.), Bonneville (Delhaise), Olloy (Aigret et François).

65 L. pyracea (Ach.) Nyl. in Not. Sällsk. pro Fl. et Fauna Fenn.

Föch. n. ser. V (1866) p. 129; Crombie Brit. Lich. I p. 383.

Parmelia cerina var. - Ach. Meth. (1803) p. 176.

Callopisma -- Arn. Lich. Jura (1890) p. 89.

' Biatora — Hepp; Kicker Fl. crypt. I p. 263.

Lecidea luteo-alba var. pyracea Ach.; Kickx Fl. Louv. p. 98.

Bi: Villers, Felny (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx). — N.: Olloy (Aigret), Samson (J. M.). — Lx. : Frahan (Del.).

66 L. rimosa Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 71.

Lichen - Oed. Fl. Dan. III (1763) t. 468 fig. 3.

Lx.: entre Villez et Maboge (Dens et Piet.).

67 L. rubra (Hoffm.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 389; Kicka Fl. Louv. p. 101; Crombie Brit. Lich. I p. 457.

Verrucaria - Hoffm. Pl. Lich. I (1789) p. 81.

Parmelia - Ach. Meth. Lich. (1803) p. 170.

Phyalopsis — Koerb. Syst. Lich. (1850) p. 170; Kicka Fl. crypt. I p. 242.

Flandres (Kickx). — N.: env. de Namur (Bell.). — Bt: Corbeek, Héverlé (Paque), env. de Louvain (Kickx). — Lx.: Nolinfaing, Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Bouillon, Frahan (Del.).

68 L. sarcopis (Wahl.) Ach. Syn. (1814) p. 176; Crombie Brit. Lich. I p. 440.

Parmelia - Wahl. in Ach. Meth. Suppl. (1803) p. 40.

Lecanora varia var. — Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 263; Kickw Fl. crypt. 1 p. 239.

Fi. or.: Deleghem (Coem.).

69 L. saxicola (Poll.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 431; Crombie Brit. Lich. I p. 353.

Lichen - Poll. Pl. Pal. (1777) p. 225.

Parmelia — Ach. Method. Lich. (1803) p. 191.

Placodium - Krempelh. Syst. (1856) p. 115; Kicke Fl. crypt. I p. 231.

Squamaria — Tul. Mém. (1852) p. 152.

Placodium ochroleucum DC. Fl. fr. I1 (1805) p. 379; Kickv Fl. Louv. p. 88.

Fl. or.: Gand (Coem.). — Bt: Waterloo (Kickx), Ways, Feluy (Dens et Piet.). — Ht: Angre (G. L.). — Lg.: Statte (G. L.). — Lx.: Laroche (Dens et Piet.). — N.: Vallée de la Meuse (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François), Vallée du Viroin (Aigret).

— var. diffracta (Ach.) Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 133; Crombie Brit. Lich. I p. 354.

Lichen diffractus Ach. Prod. (1798) p. 63.

N.: entre Burnot et Arbre (Él. M.).

— var. versicolor (Pers.) Fries Lich. Scand. (1871) p. 226; Crombie Brit. Lich. I p. 354.

Placodium saxicolum var. versicolor *Koerb*. Syst. Lich. (1855) p. 115; *Kickx* Fl. crypt. I p. 231.

Lichen versicolor Pers. in Ust. Ann. VII (1794) p. 24.

Fl. or. : Destelbergen (Kickx). - Lx. : Ortho (Del.).

L. saxicola var. lignicola (Kickx).

Placodium saxicolum var. lignicolum Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 231.

Fl. or. : env. de Gand (Coem.).

70 L. simplex (Dav.) Nyl. in Crombie Lich. Brit. (1870) p. 57; Crombie Brit. Lich. I p. 490.

Lichen - Dav. in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 283.

Biatorella - Br. et Rost. Dan. (1869) p. 115.

Lecidea - Nyl. Prodr. (1857) p. 146.

Sarcogyne - Nyl. Alg. (1854) p. 357.

N.: Samson (J. M.), Sensenruth (Dens et Piet.).

- 71 L. smaragdula (Wahl.) Nyl. Pyr. or. (1872) p. 10.
 - var. argillacea Hue Lich. de Canisy (1890) p. 68.

N.: entre Rouillon et Rivière (Tonglet).

72 L. sophodes Ach. Lich. Univ. (1810) p. 356; Crombie Brit. Lich. I p. 394.

Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 67.

N.: env. de Namur (Bell.).

73 L. squamulosa (Schrad.) Nyl. in Flora (1872) p. 554; Crombie Brit. Lich. I p. 482.

Lichen - Schrad. Exs. (1797) n. 153.

Acarospora — Th. Fries Scand. (1871) p. 213.

Parmelia - Ach. Method. (1803) p. 181.

Urceolaria — DC. Fl. fr. II (1805) p. 371.

- N.: Waulsort (Dens et Piet.), Anseremme, Moniat (Tonglet), Han-sur-Lesse (G. L.), Marche-les-Dames (J. M.).
- 74 L. subcarnea (Sw.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 365; Crombie Brit. Lich. I p. 422.

Lecidea — Sm. Engl. Fl. V (1833) p. 184.

Lichen — Sw. in Vet. Ak. Handl. (1791) p. 126.

Lecanora sordida var. - Th. Fries.

- tx.: Maissin (Aigret et Doling), entre Bouillon et Corbion (Dens et Piet.), Frahan, Mortehan (Del.). N.: Hermeton (Dens et Piet.), Burnot (Tonglet).
- 75 L. subcircinata Nyl. ex Hue Add. Lich. Eur. (1886) p. 83 n. 580. Psoroma radiosum var. Olivier Lich. Ouest Fr. I (1897) p. 205.
 - N.: Vallée de la Meuse (Dens et Piet.), Olloy (Aigret).

76 L. subdepressa Nyl. in Flora (1873) p. 69; Crombie Brit. Lich. I p. 472.

Lx.: entre Villez et Maboge (Dens et Piet.). — Bt: Villers-la-Ville (Dens et Piet.). — N.: Heer (Dens et Piet.).

77 L. subfusca (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 393; Sydow Flecht. Deutschl. p. 110; Kickx Fl. Louv. p. 102; Kickx Fl. crypt. I p. 236.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 167.

Ht: env. d'Angre (G. L.). — Lx.: env. de Villance (A. D.), Samrée (Él. M.), env. de Bouillon C. (Del.), env. de Bastogne (Germain). — Bt: env. de Bruxelles (A. D.), env. de Louvain (Kickx), Eegenhoven, Héverlé (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.), Marche-les-Dames, Mosseroux (Del.).

- var. argentea Ach. Lich. (1810); Kickx Fl. Louv. p. 102; Kickx Fl. crypt. I p. 287; Sydow Flecht. Deutsch. p. 109.
- Bt: Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque), env. de Louvain (Kickx). Flandres (Kickx).
- var. campestris (Schaer.) Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 33; Sydow Flecht. Deutschl. p. 109.
- N.: Hastière-par-delà, Rouillon (Tonglet). Bt: Tervueren, Schaerbeek (A. D.).
- var. chlarona Ach.; Kickx Fl. crypt. I p. 237.
- 8t: Thisnes-lez-Nivelles (Dens et Piet.). Flandres (Kickx).
- var. coilocarpa (Ach.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 109.
 L. subfusca var. vulgaris Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 140.

Lx.: env. de Neufchâteau (Verheggen).

— var. glabrata (Ach.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 74; Sydow Flecht. Deutschl. p. 159.

Lx.: Laroche (Dens et Piet.).

— var. graminicola Desm. Pl. crypt. sér. 2 fasc. 8 n. 390 ; Kickx Fl. crypt. I 238.

Lecanora subfusca var. minuta *Coem.* ap. West. in Herb. crypt. n. 1324. F1. occ.: Ostende (West.).

— var. hypnorum (Wulf.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 75; Sydow Flecht, Deutsch. p. 109.

Lichen — Wulf. in Jacq. Coll. IV (1790) p. 233 t. 7 fig. 2.

Bt: Tervueren (A. D.).

var. rugosa (Pers.) Nyl.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 109.
 L. subfusca var. distans (Ach.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 74; Kickw Fl. crypt. I p. 237.

Flandres (Kickx). - Lx.: Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen).

78 L. sulphurea (*Hoffin.*) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 399; Crombie Brit. Lich. I p. 428.

Lichen sulphureus Hoffm. Enum. (1784) p. 32.

Zeora — Ach. Syn. (1798) p. 37; Kickx Fl. crypt. I p. 240.

Ht: (Dumont). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Gand (Coem.). — Lx.: Neufchâteau, Straimont, Longlier (Verheggen).

- 79 L. symmicta Ach. Syn. (1814) p. 340; Crombie Brit. Lich. I p. 433.
 - var. maculiformis (Hoffm.).

L. varia var. — Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 83; Kickx Fl. crypt. I p. 239. Verrucaria — Hoffm. Deutschl. Fl. II (1795) p. 195.

Fl. or. : Meirelbeke, Destelbergen (Kickx).

— var. saepincola (Ach.) Nyl. in Flora (1872) p. 249; Crombie Brit. Lich. I p. 434.

Lecidea - Ach. Syn. (1814) p. 35.

Lecanora varia var. - Crombie Lich. Brit. (1870) p. 52.

N.: Dinant (G. L.).

80 L. sympagea (Ach.) Nyl. in Flora (1873) p. 197.

Lichen - Ach. Prod. (1798) p. 105.

Placodium Heppianum Flag. Fl. des Lich. de Franche-Comté (1885) p. 230. Gasparrinia aurantia Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 75.

N.: Hastière, Waulsort (Dens et Piet.), Moniat, Houx, Leffe (Tonglet), Samson (Delhaize), Mosseroux (J. M.). — Ht: Beaumont (G. L.).

81 L. tartarea (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 371 t. 7 fig. 3; Orombie Brit. Lich. I p. 458.

Lichen - L. Sp. pl. (1753) p. 1141.

Ochrolechia - Mass. Ricerche (1852) p. 30.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

— var. arborea Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 80. Patellaria tartarea var. — DO. Fl. fr. II (1805) p. 364.

Lx.: Bois de Lozange et d'Azange (Germain).

82 L. tegularis (*Ehrh.*) Nyl. in Flora (1883) p. 106; Crombie Brit. Lich. I p. 360.

Lichen - Ehrh. Exs. (1785) n. 304.

Amphiloma murorum var. — Ehrh.; Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 230.

Amphiloma murorum var. miniata Th. Fries; Kickx Fl. crypt. I p. 230.

Placodium elegans Kickv Fl. Louv. (1835) p. 88

N.: entre Hastière-par-delà et Heer (Tonglet). — Flandres (Coem.).

- 83 L. teicholyta Ach.; Nyl. Lich. env. Paris (1896) p. 7 in nota. .
 N.: Hastière-par-delà, Heer, Moniat (Tonglet).
 - var. craspedia Ach.
 - N.: Fond des Vaux (Waulsort) (Tonglet).

84 L. Tongleti Hue in Bull. Soc. roy de Bot. de France t. XLIV (1897) p. 427.

N.: Dréhance (Tonglet).

85 L. varia (Ehrh.) Ach. Syn. (1814) p. 161; Crombie Brit. Lich. I p. 412; Kickx Fl. Louv. p. 100; Kickx Fl. crypt. I p. 239.

Lichen - Ehrh. Crypt. (1785) n. 68.

Bt: env. de Louvain (Kickx). — Lx.: env. de Bouillon (Del.). — N.: Houx (Tonglet). — Flandres (Kickx).

86 L. variabilis (*Pers.*) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 369; Crombie Brit. Lich. I p. 391.

Lichen — Pers. in Ust. Ann. (1794) p. 26.

Placodium - Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 138.

Caloplaca - Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 172.

N.: Onhaye (Dens et Piet.), Moniat, Anseremme, env. de Dinant, fréqueut (Tonglet), Mosseroux (J. M.).

87 L. ventosa (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 399; Crombie Brit. Lich. I p. 456.

Lichen - L. Sp. pl. (1753) p. 1141.

Lx.: Mortehan (Del.).

88 L. vitellina (Ehrh.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 403; Kickæ Fl. Louv. p. 99; Crombie Brit. Lich. I p. 368.

Lichen - Ehrh. Exs. (1785) n. 155.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 176.

Calophaca - Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 188.

N.: env. de Namur (Bell.), Rocher de Néviau (Olloy) (Aigret), Burnot (Tonglet). — Bt: env. de Louvain (Kickx). — Lg.: Stavelot (Aigret). — Lx.: Maissin (Aigret et Dolisy), Frahan (Del.), Viel-Salm, Laroche (G. L.).

— var. areolata Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 80.

N.: Burnot, Rouillon (Tonglet).

GYALECTAE.

36 GYALECTA Ach. Lich. Univ. (1810) p. 30.

1 **G. cupularis** (*Ehrh.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1885) p. 172; *Kickæ* Fl. crypt. 1 p. 242.

Lichen - Ehrh.; Koerb. loc. cit.

Lecanora — Duby Bot. Gall. (1830) p. 655.

Lecidea - Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 189.

Lecidea marmoria var. — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 193.

N.: Onhaye, Blaimont, Waulsort (Dens et Piet.), Bonneville (Delhaise), Bouvignes, Anseremme, Dinant, Houx (Tonglet), St.-Servais, Couvin. Mariembourg, Olloy (G. L.), Samson (J. M.). — Fl. or.: Gand, Termonde (Kickx). — Ht: Beaumont (G. L.). — Lx.: Laroche (G. L.), Bouillon (Del.). — Lg.: entre Poulseur et Esneux (G. L.).

URCEOLARIAE

- 37 URCEOLARIA Ach. Meth. (1803) p. 141; Crombie Brit. Lich. I p. 515.
- 1 U. repanda Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 92.

Parmelia - Fries Lich. Eur. (1830) p. 92.

Dirina massiliensis Dur. et Mont. Fl. Alg. 1 (1847-49) p. 257.

Ht: env. de Mons (Dumont). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

2 U. scruposa (L.) Ach. Meth. (1803) p. 147; Crombie Brit. Lich. I Kickx Fl. Louv. p. 102; Kickx Fl. crypt. I p. 243.

Lichen - L. Mant. II (1771) p. 131.

- Bt: Ways, Virginal (Dens et Piet.), Piétrebais (Kickx). Fl. or.: Renaix (Kickx). Lx.: Salm-Château (G. L.), Laroche (Dens et Piet.), Bouillon, Frahan, Cordemoy (Del.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Yvoir, Dinant, Anseremme (G. L.), Hastière, Heer (Dens et Piet.), Wanlin, Houyet (Aigret).
- var. arenaria (Ach.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 90; Kickx
 Fl. crypt. I p. 243; Sydow Flecht. Deutschl. p. 132.

Fl. occ.: Coxyde, Oostduinkerke (Kickx). - Bt: Héverlé (Paque).

var. bryophila (Ehrh.) Schaer. Lich. Eur. p. 90; Kicka Fl. crypt. I p. 243.

Lichen - Ehrh. Exs. (1785) n. 236.

Urceolaria - Ach.; Kicka Fl. Louv. p. 103.

- N: Onhaye, Heer (Dens et Piet.), Rochefort, Han, Olloy (Aigret), env. de Namur (Bell.), Burnot (Él. M.), Bouvignes (G. L.), Leffe (Troch), Hastière (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.). Bt: entre Louvain et Winxele (Paque), Forest, Uccle, Boitsfort, Auderghem, Woluwe (Kickx). Fl. occ.: Aeltre, Lombartzyde (Kickx). Lx.: Nolinfaing, Straimont (Verheggen), Laroche (Dens et Piet.), A C. Ardennes (Del., G. L.). Lg.: entre Poulseur et Esneux (G. L).
- var. ecrustacea Nyl. Prodr. (1857); Kicka Fl. crypt. I p. 243. Fl. or.: Aaltre (Kickx). Fl. occ.: Lombartzyde (Kickx).
- var. vulgaris Koerb.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 132.

N.: Olloy, Couvin, Mariembourg (G. L.). — Ht.: Beaumont (G. L.). — Bt: entre Louvain et Winxele (Paque). — Lx.: Neufchâteau, Longlier, Mont-Plainchamps (Verheggen), Laroche (G. L.).

3 U. striata Duby Bot. Gall. (1830) p. 671.

Urceolaria actinostoma Schaer. Enum. (1850) p. 87.

Verrucaria - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 288.

Lx.: env. de Laroche (Dumont). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 38 PANNARIA Del. in Duby Bot. Gall. (1830) p. 606; Crombie Brit. Lich. I p. 335.
- 1 P. caesia Nyl. Syn. II (1860) p. 37.

N.: Bouvignes (Tonglet).

2 P. hypnorum (Vahl) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 108; Sydow Flecht. Deutschl. p. XVI.

Lecanora - Ach. Syn. (1798) p. 193.

Parmelia - Fries Lich. Eur. (1831) p. 193.

Lx.: Laroche (G. L.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

3 P. lanuginosa (Ach.) Koerb. Syst. Lich. (1885) p. 106; Sydow Flecht. Deutschl. p. 71.

Parmelia - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 465.

Lx.: Nolinfaing, Neufchâteau, Straimont (Verheggen).

4 P. nebulosa (Hoffm.) Nyl. in Mém. Soc. Cherb. II (1853) p. 324; Kicka Fl. crypt. I p. 231; Crombie Brit. Lich. I p. 338.

Psora - Hoffm. Deutschl. Fl. II (1795) p. 166.

Lecanora coronata Hoffm. Pl. Lich. (1795) t. 56 flg. I.

Fl. or.: Aeltre (Kickx). — N.: Poilvache (Tonglet), Hastière-Lavaux (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François), Bonneville (Delhaize). — Ht: Ellezelles (G. L.). — Bt: Héverlé, Pellenberg (Coem.).

5 P. rubiginosa (Thunb.) Del. in Duby Bot. Gall. (1830) p. 606; Kickx Fl. crypt. I p. 232; Crombie Brit. Lich. I p. 336.

Lichen - Thunb. Fl. Cap. (1794) p. 176.

Fl. occ.: env. de Nieuport (Aubert du Petit-Thouars).

— var. caeruleo-badia (Schl.) Mudd Man. (1861) p. 122; ... Crombie Brit. Lich. I p. 337.

Lichen - Schl. Cent. 2 (1805) n. 71.

Pannaria - Sydow Flechten Deutschl. (1887) p. 71.

Pannaria rubiginosa var. conoplea Ach.; Koerb. Syst. Lich. I (1855) p. 105.

Imbricaria conoplea DC. Fl. fr. V (1805) p. 187. Parmelia — Ach.; Moug. et Nestl. Vog. n. 347.

tx.: Route de Samrée (en face de Cielle), Laroche (Él. M.), Frahan (Del.). — N.: Arbre (Él. M.). -- Bt; Foret de Soignes (West. et Wall.). — Ht: Rebecque (Kickx).

37 PANNULARIA Nyl. in Flora (1879) p. 360; Crombie Brit. Lich. I p. 340.

l P. carnosa (Dicks.) Crombie in Grevilla XII (1884) p. 62; Crombie Brit. Lich. I p. 344.

Lichen - Dicks. Crypt. fasc. II (1790) p. 21 t. VI fig. 7.

Massalongia - Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 109.

Parmelia - Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 53.

Lx.: Frahan, Corbion, Rochehaut (Del.), Laroche (G. L.).

2 P. microphylla (Sw.) Nyl. ex Stiz. in St Gall. Nat. Ges. (1882) p. 336; Crombie Brit. Lich. I p. 340.

Lichen - Sw. Vet. Ak. Handl. (1791) p. 301:

Pannaria — Mudd Man. (1861) p. 123.

Lx.: Corbion, Bouillon, Mortehan (Del.). — N.: Vallée de l'Hermeton (Dens et Tonglet).

3 P. nigra (*Huds.*) Nyl. ex Stiz. in St Gall. Nat. Ges. (1882) p. 336; Crombie Brit. Lich. I p. 342.

Lichen - Huds. Fl. Angl. II (1778) p. 524.

Pannaria - Nyl. Pyr. Or. (1872) p. 27.

Bt: Feluy (Dens et Piet.). — N.: Waulsort, Hastière, Onhaye (Dens et Piet.), Valtée du Viroin (Aigret), Vallée de la Meuse (Tonglet), Bonneville (Delhaise).

- 40 COCCOCARPIA Pers. in Gaudich. Voy. Uran. (1826) p. 206; Crombie Brit. Lich. I p. 345.
- C. plumbea (*Lightf.*) *Nyl.* Mém. Soc. Cherb. V (1857) p. 109;
 Orombie Brit. Lich. I p. 346.

Lichen - Lightf. Fl. Scot. II (1777) p. 826 F. 26 fig. inf.

Pannaria - Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 109; Kickx Fl. crypt. I p. 232.

Fl. occ. : Nieuport (Aubert du Petit-Thouars). - Lg. : Aywaille (Del.).

UMBILICARIAE.

- 41 UMBILICARIA Hoffm. Pl. Lich. (1795) p. 109; Crombie Brit. Lich. I p. 322.
- U. pustulata (L.) Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 111; Crombie Brit. Lich. I p. 323.

Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1150.

Lg.: Stavelot (Aigret), Francorchamps (Él. M.). — Ht: Montbliart (Hardy). — N.: Gedinne, Orchimont (Aub.), Lustin, Burnot (Tonglet). — Lx.: Botassard (Dens et Piet.), env. de Bastogne (Germain, Van Bastelaer), Maissin (A. D.), Salm-Château (G. L.), Vielsalm (Aigret), entre Bouillon et Mortehan (Del.).

- 42 GYROPHORA Ach. Meth. (1803) p. 110; Crombie Brit. Lich. I p. 324.
- 1 G: grisea (Sw.) Turn. et Borr. Lich. Brit. (1839) p. 236; Crombie Brit. Lich. I p. 324.

Lichen - Sw. ex Westr. in Vet. Akad. Handl. (1793) p. 52.

Gyrophora murina Ach. in Engl. Bot. (1812) t. 2486; Kicka Fl. Louv. p. 92. Bt: près de l'abbaye de Villers (Kickx).

2 G. polyphylla (L.) Turn. et Borr. Lich. Brit (1839) p. 214; Crombie Brit. Lich. I p. 331.

Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1150.

Lx.: Viel-Salm, Salm-Château (Del.). — Lg.: entre Hockai et la Baraque.

Michel (G. L.), Stavelot (Aigret).

PELTIDEAE.

- 43 NEPHROMIUM Nyl. in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 101 in nota; Crombie Brit. Lich. I p. 282.
- N. laevigatum (Ach.) Nyl. in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 101;
 Crombie Brit. Lich. I p. 283.

Nephroma - Ach. Syn. (1817) p. 242.

Lx.: Longlier, Straimont (Verheggen), Herbeumont, Paliseul, Bertrix (A. D.), Bouillon, Herbeumont (Del.). — Fl. or.: Neder-Eenaeme (Nob.). — Ht: (Dumont).

- var. papyraceum (Hoffm.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 55.
 Peltigera Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 108.
 N. resupinatum var. Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 18.
 Lx.: Bois d'Azy (Germain).
- 2 N. parile (Ach.) Nyl. in Flora (1885) p. 47; Crombie Brit. Lich. I p. 284.

Lichen - Ach. Prodr. (1798) p. 164.

Nephroma laevigatum var. — Mudd Man. (1861) p. 81.

Nephromium laevigatum var. — Crombie Lich. Brit. (1870) p. 28.

Lx.: Bouillon (G. L.).

- 44 PELTIGERA Hoffm. Deutschl. Fl. II (1795) p. 106; Crombie Brit. Lich. I p. 286.
- P. canina (L.) Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 106; Kickx Fl. Louv. p. 91; Kickx Fl. crypt. I p. 214; Crombie Brit. Lich. I p. 287.
 Lichen L. Fl. Suec. (1755) n. 1109.

Peltidea — Gray Nat. arr. I (1821) p. 428.

- Ht: Angre, Stambruges, Blicquy (G. L.). Lx.: Villance, Ochamps, Maissin (A. D.), Bouillon, Paliseul, Viel-Salm, Neufchâteau (G. L.), env. de Bastogne (Germain), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), env. de Bouillon (Del.), Ébly (Él. M.). Bt: Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.). Lb.: Mall (Paque). Flandres (Kickx). A: Vosselaer, Gierle (Paque). N.: env. de Namur (Bell.), Dinant (G. L.), Orchimont, Gedinne (Aub.), Olloy (Aigret et François).
- -- var. crispa Wahlenb. f. sorediata Oliv. Lich. Orne (1882-84) p. 91.

Lx.: Laroche (Dens et Piet.).

var. crispata Kicka Fl. Louv. (1835) p. 91; Kicka Fl. crypt.I p. 215.

Bt: env. de Louvain, St-Gilles (Kickx). — Lb.: Mall (Paque). — Fl. or.: Bottelaere (Donkelaar). — A.: Vosselaer, Gierle (Paque).

P. canina var. membranacea (Ach.) Nyl. Syn. I (1860) p. 324; Kickv Fl. Louv. p. 91; Kickv Fl. crypt. I p. 214; Crombie Brit. Lich. I p. 288.

Peltidea canina var. - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 518.

Lx.: Longlier, Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen). — Bi: env. de Tervueren (Kickx). — N.: Orchimont, Gedinne (Aub.), env. de Namur (Bell.). — Fl. or.: Deurle (Coem.), Rooborst (Kickx).

- var. ulorrhiza Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 20. Lx.: Neufchâteau, Longlier, Straimont (Verheggen).
- 2 P. horizontalis (L.) Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 107; Kickx Fl. crypt. I p. 217; Crombie Brit. Lich. I p. 293.

Lichen - L. Mant. (1771) p. 132.

Peltidea — Gray Nat. arr. I (1821) p. 427.

F1. or.: Bottelaare (Scheidw.), entre St-Gilles-Waas et La Clinge (Kickx).—
Ht: Chimai (G. L.).— Bt: env. de Louvain (Paque), Héverlé (Leburt.).—
Lx.: Neufchâteau, Nolinfaing, Straimont (Verheggen), env. de Bastogne (Van Bastelaer), Laroche (Él. M.), Noire-Fontaine, Frahan, Bouillon (Del.).—
N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Champalle (G. L.), vallée de l'Hermeton (Tonglet), Hastière (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François).— Lg.: Modave (Mansion).

3 P. malacea (Ach.) Fries Lich. Eur. (1831) p. 44; Crombie Brit. Lich. I p. 287.

Peltidea - Ach. Syn. (1814) p. 240.

Lx.: Straimont (Verheggen), Queue de vache, Laroche (Él. M.), Bouillon (Gorge-St-Pierre), Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.), Botassard (Dens et Piet.), Maissin (Aigret et Dolisy).

4 P. polydactyla (Neck.) Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 106; Kickv Fl. Louv. p. 92; Kickv Fl. crypt. I p. 216; Crombie Brit. Lich. I p. 290.

Lichen — *Neck*. Meth. Musc. (1771) p. 85. Peltidea — *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 428.

Fl. or.: env. de Gand, Audenarde, Renaix, Grammont (Kickx).—N.: Falaen, Arbre, Spontin (Él. M.), Bouvignes (Troch), Daverdisse (Del.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François).— Bt.; entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (A. D.), Villers-la-Ville (Él. M.), Linkebeek, Boitsfort (Kickx).— Lb.: Mall (Paque).— N.: env. de Namur (Bell.).— A.: Vosselaer, Gierle (Paque).— Lx.: Hives, Queue de Vache (Él. M.), env. de Bouillon (Del.), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer).

f. microcarpa (Ach.) Nyl. Syn. I (1860) p. 327; Kickx Fl. crypt. I p. 217; Orombie Brit. Lich. I p. 291.

Peltidea polydactyla var. - Ach. Lich. Univ. (1810).

Fl. or.: env. de Gand, Audenarde, Renaix, Grammont (Kickx). — N.: Orchimont (Aub.).

5 P. rufescens (Lightf.) Hoffm. Deutschl. Fl. II (1795) p. 107; Kickx

Fl. Louv. p. 91; Kicka Fl. crypt. I p. 215; Crombie Brit. Lich. I p. 288.

Lichen caninus var. rufescens Lightf. Fl. Scot. II (1777) p. S46.

Lg.:Statte (Mansion). — Ht: Chimai, env. d'Angre (G. L.). — Bt: Rouge-Cloître (A. D.), Forest (Nob.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Kickx) (Paque). — Lx.: Viel-Salm, Bouillon (Del.). Longlier, Nolinfaing (Verheggen), Maissin (A. D.), Laroche (Él. M.). — A.: env. de Turnhout (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Arbre, Bauche (Él. M.), Bouvignes (Touglet).

P. rufescens var. inflexa (Ach.) Nyl. Syn. (1860); Kickw Fl. crypt. I p. 215.

Peltidea canina var. - Ach. Lich. Univ. (1810).

Fl. or.: Rooborst (Kickx). — Fl. occ.: La Panne (Kickx). — Bt.: Corbeek-Loo, Eegenhoven (Paque).

— var. innovans Flotow Deutsch. Lich. (1819) n. 73; Kickx Fl. crypt. I p. 215.

P. canina West. Herb. crypt. n. 217.

Fl. occ. : La Panne (Kickx).

- var. spuria (Ach.) Floerke Deutsche Lich. (1819) p. 19 n. 74; Kicka Fl. crypt. I p. 215.

. P. canina var. — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 285 t. 5 fig. 2.

P. rufescens West. Herb. crypt. X n. 161.

Fl. occ.: Courtrai (West.).

— f. praetexta Floerke in Somm. Lapp. Suppl. (1826) p. 123; Crombie Brit. Lich. I p. 289.

P. rufescens var. crispa Leight. Lich. Fl. ed. 3 (1871) p. 102; Kickx Fl. Louv. p. 91.

A.: Bonheyden (Kickx).

6 P. scutata (Dicks.) Leight. Lich. Fl. (1871) p. 110; Crombie Brit. Lich. I p. 292.

Lichen - Dicks. Crypt. fasc. III (1793) p. 18.

Peltidea - Ach. Meth. (1803) p. 285.

Peltigera polydactyla var. — Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 21; Kickv Fl. crypt. I p. 217.

Fl. occ. : Furnes (Coem.).

7 P. spuria DO. Fl. fr. II (1805) p. 406; Crombie Brit. Lich. I p. 289.

P. canina vár. — Schaer. Spic. (1840) p. 265.

Peltidea - Ach. Meth. (1803) p. 283.

Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 159.

Peltigera pusilla Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 59; Kicke Fl. crypt. I p. 217.

Ht: Stambruges (G. L.). — Fl. or.: Deurle (Coem.). — Bt: Héverlé (Paque). — Lx.: La Maljoyeuse, Maissin (A. D.), Bouillon, Sensenruth (Dens et Piet.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 45 PELTIDEA Ach. Meth. (1803) p. 282; Crombie Brit. Lich. p. 277.
- P. aphtosa (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 516; Crombie Brit. Lich. I p. 278.

Lichen aphtosus L. Fl. Suec. (1755) p. 1098.

Peltigera — DO. Fl. fr. II (1805) p. 406.

Ht: Beaumont (G. L.). — Lx.: Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Bouillon (Dens et Piet.), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Les Hayons (Del.). — N.: Olloy (Aigret et François), Dinant (Tonglet), Vallée de l'Hermeton (Dens et Piet.), Orchimont (Aub.).

2 P. venosa (L.) Ach. Meth. (1803) p. 282; Crombie Brit. Lich. I p. 279.

Lichen - L. Fl. Suec. (1755) n. 1097.

Peltigera — DC. Fl. fr. II (1805) p. 405; Kickv Fl. Louv. p. 92; Kickv Fl. erypt. I p. 218.

Bt: Berthem, Woluwe, Rhode-St-Genèse (Kickx). — Lx.: Frassem, Waltzing, Eischen (Paque), Metzert (G. L.). — Ft. or.: Meirelbeke, Lemberge, Sleydinge, Eecloo (Kickx).

- 46 SOLORINA Ach. Lich. Univ. (1810) p. 27; Crombie Brit. Lich. I p. 279.
- S. saccata (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 27; Crombie Brit. Lich. I p. 280.

Lichen - L. Fl. Suec. (1755) p. 1102.

Peltigera — DC. Fl. fr. VI (1805) p. 408.

Lg.: Statte, Modave (G. L.), Soiron (Halin), Falliez (Dens et Piet.), Comblainau-pont (Del.). — N.: Bouvignes, Anseremme (G. L.), env. de Waulsort (Dens et Piet.), Vallée de la Meuse (Tonglet), Orchimont (Aub.), Montaigle (Él. M.). — Lx.: Maissin (Aigret et Dolisy), Waltzing, Claire-fontaine (Paque). — Beaumont (G. L.).

PARMELIAE.

47 PARMELIA Ach. Meth. (1803) p. 153; Crombie Brit. Lich. I p. 232.

1 P. acetabulum (Neck.) Duby Bot. Gall. II (1830) p. 601; Kickx Fl. crypt. I p. 219; Orombie Brit. Lich. I p. 250.

Lichen - Neck. Delic. (1768) p. 506.

Lobaria - Hoffm.; Kickx Fl. Louv. p. 89.

Ht: Angre (G. L.). — Bt: env. de Bruxelles (A. D.), Limelette, Mousty, Oisquercq (Él. M.), env. de Louvain (Kickx), Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.). — Lx.: Nolinfaing, Hamipré, Longlier, Neufchâteau (Verheggen), Ochamps, Bertrix, Villance (A. D.), Laroche (Él. M.), env. de Bastogne (Germain), Frahan (Del.). env. de St-Hubert (Van Bastelaer). — A.: Vosselaer (Paque). — Fl. or.: Neder-Eenaeme (Nob.), env. d'Audenarde, Gand et Ypres (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Burnot, Spontin (Él. M.), env. de Namur (Bell.).

2 P. aspidota (Ach.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 42.

Parmelia olivacea var. — Ach. Meth. Lich. (1803) p. 214.

P. aspera Mass. Mem. Lich. (1853) p. 53; Kickx Fl. crypt. I p. 219.

Fl. or. : Renaix (Kickx).

3 P. Borreri Turn. in Trans. Linn. Soc. IX (1808) p. 148 pl. 13 fig. 2; Kicka Fl. crypt. I p. 221; Grombie Brit. Lich. I p. 245.

Lichen - Eng. Bot. t. 1780.

Imbricaria - Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 71.

Ht: Leuze, Stambruges (G. L.). — Flandres (Kickx). — Bt: env. de Bruxelles (A. D.), env. de Nivelles (Dens et Piet.), Groenendael (Él. M.), env. de Louvain (Paque). — Lx.: Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen), St-Hubert (A. D.), entre Bouillon et Cordemoy, Frahan (Del.). — A.: env. de Turnhout (Paque).

var. stietica Duby Bot. Gall. (1830) p. 601.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

4 P. caperata (L.) Ach. Meth. (1803) p. 216; Crombie Brit. Lich. I p. 245; Kicka Fl. crypt. I p. 220.

Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1147.

Lobaria — Hoffm. Enum. Lich. (1784) t. 19 fig. 2 t. 20 fig. 2; Kickx Fl. Louv. p. 90.

Ht: Montagne-pelée (G. L.). — Flandres (Kickx). — Bt: env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.), Jauche (Paque), Isque (El. M.), Groenendael, entre Vilvorde et Bergh (Del.). — Lx.: Neufchâteau, Longlier (Verheggen), env. d'Arlon (Paque), Villance, Libin, Lesse (A. D.), env. de Bastogne (Germain). — A.: Vosselaer, Gierle, Broekzyde (Paque). — N.: env. de Namur (Bell. Paque), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François.).

— var. saxicola Müll.-Arg. Princ. Class. (1862); Flagey Lich. Franche-Comté p. 154.

N.: Anthée (Dens et Piet.).

5 P. ciliata (DC.) Nyl. in Flora (1878) p. 247; Crombie Brit. Lich. I p. 233.

Lobaria perlata var. — DC. Fl. fr. V (1805) p. 403.

Lx.: Laroche (Dens et Piet.). - N.: Erpion (Aigret). - Ht: Chimai (G. L.).

6 P. conspersa (Ehrh.) Ach. Meth. (1803) p. 205; Crombie Brit. Lich. I p. 247.

Lichen — Ehrh. in Ach. Prodr. (1798) p. 118.

Ht: env. d'Angre (G. L.). — Lg.: Barse (G. L.), entre Esneux et Hout-si-Plout (G.), env. de Huy (Mansion). — Bt: Bois de la Cambre (A. D.), forêt de Soignes (G. L.). — Lx.: Neufchâteau, Warmifontaine (Verheggen), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Villance, Maissin, Bertrix, Transinne (A. D.), env. de Laroche (Él. M.), Salm-Château (G. L.), env. Bastogne (Germain), Frahan (Del.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Godinne (G. L.), Hastière (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), env. de Namur (Bell.).

P. conspersa var. stenophylla Ach. Meth. (1803) p. 206; Crombie Brit. Lich. I p. 248.

Lg.: Statte (G. L.). — N.: Godinne (Tonglet), Bouvignes (G. L.), Hastière (Dens et Piet.), Olloy (Aigret). — Lx.: Neufchâteau (Verheggen), env. de Villance (A. D.), Laroche (Dens et Piet.).

7 P. exasperata Nyl. Not. Sallsk. pro Fl. et Fauna Fenn. Forhandl. (1866) p. 120 in nota; Crombie Brit. Lich. I p. 251. Collema — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 645.

Ht: Flobecq (G. L.). - Lx.: Libin, Maissin (Aigret et Dolisy), Samrée (Troch et G. L.).

8 P. olivacea (L.) Ach. Meth. (1803) p. 213; Crombie. Brit. Lich. I p. 251; Kicker Fl. crypt. I p. 219.

Lichen - L. Spec. plant. (1763) p. 1610.

Lobaria - Hoffm.; Kickx Fl. Louv. p. 89.

Imbricaria — DO. Fl. fr. II (1805) p. 392.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.) Olloy (Aigret et François).—Lx.: entre Bouillon et Cordemoy (Del.), Maissin (A. D.), env. de Bastogne (Germain).—Bt: Groenendael (Él. M.), Héyerlé, Zoetwater (Paque), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Bruxelles (A. D.).—Flandres (Kickx).—A: Gierle (Paque).—Ht: Leuze, Blicquy, Stambruges, Flobecq, Beaumont (G. L.).

- var. corticola Schaer. Spic. (1840) p. 466.

Bt: Malaise, Rixensart (Él. M.). — N.: Arbre, Montaigle (Él. M.). — tx.: Env. de Neufchâteau (Verheggen).

— f. isidioidea Oliv.

Ht: Flobecq (G. L.). - Lg.: Modave (G. L.).

9 P. olivetorum (Ach.) Nyl. Not. Sallsk. pro F. et Fl. Fenn. Forhandl. (1866) p. 180; Crombie Brit. Lich. I p. 234.

Parmelia perlata var. olivetorum Ach. Lich. Univ. (1810) p. 458.

Bt: Auderghem (A. D.).

10 P. perlata (L.) Ach. Meth. (1803) p. 216; Crombie Brit. Lich. I p. 233; Kickx Fl. crypt. I p. 220.

Lichen — L. Syst. Nat. ed. 12 (1767) p. 712.

Lobaria - DO. Fl. fr. II (1805) p. 403; Kicke Fl. Louv. p. 89.

Ht: Leuze, Stambruges (G. L.). — Flandres (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre Aub.), citadelle de Namur, Marche, Géronsart (Bell.), env. de Namur, (Paque), Dinant (G. L.). — Bt: Groenendael (Él. M.), env. de Louvain (Paque) env. de Bruxelles, (A. D.), Villers-la-Ville, Hives (Él. M.), Anderlecht (G. L.), env. de Louvain (Kickx). — Lx.: Sart, Neufchâteau (Verheggen), Bois de Rollé (Germain). — A.: Vosselaer (Paque). — Lx.: env. d'Arlon (Paque), Maissin, Villance (A. D.), env. de Bouillon (Del.).

— f. innocua Schaer. Enum. Lich. Eur. (1880) p. 34.
Parmelia perlata var. cetrarioides Duf.

Bi : env. de Louvain (Coem.). - N.: Olloy (Delhaise).

P. perlata f. sorediata Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 34; Kickx Fl. crypt. I p. 220.

N.: env. de Namur (Paque). — Flandres (Kickx). — Bt: env. de Louvain (Paque). — A.: Vosselaer (Paque).

11 P. pertusa (Schrank) Schaer. Spic. (1840) p. 457; Crombie Brit. Lich. I p. 261.

Lichen - Schrank Fl. Bavar. II (1789) n. 1513.

Imbricaria diatrypa DO. Fl. fr. II (1805) p. 393.

Bt: Forêt de Soignes (West. et Van Haes.). - Lx.: Frahan (Del.).

12 P. physodes (L.) Ach. Meth. (1803) p. 250; Kickw Fl. crypt. I p. 222; Crombie Brit. Lich. I p. 258.

Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1114.

Imbricaria — DO. Fl. fr. II (1805) p. 393.

Parmelia ceratophylla var. — Schaer. Spic. (1840) p. 458.

Imbricaria physodes et I. vulgaris Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 75.

Ht: Angre (G. L.). — N.: Vallées du Burnot et de la Molignée (Él. M.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François.). — Bt: Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.). — Lx.: Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen), Maissin, Villance (A. D.), env. de Laroche (Él. M.), Frahan, Dohan, Mortehan (Del.), Bois de Lozange (Germain). — A.: env. de Turnhout (Paque). — Flandres (Kickx).

— var. platyphylla Ach. Method. (1803) p. 251; Crombie Brit. Lich. I p. 260.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.).

— f. labrosa Ach. Lich. Univ. (1810) p. 493; Crombie Brit. Lich. I p. 259.

Imbricaria physodes var. — Ach.; Kickx Fl. Louv. p. 86.

Bi: env. de Louvain (Kickx). - Lx.: Viel-Salm (G. L.).

— var. vittata Ach. Meth. (1803) p. 251.

Parmelia vittata Nyl. in Flora (1875) p. 106; Crombie Brit. Lich. I p. 261.

N.: entre Burnot et Arbre (Él. M.). — Lx.: Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen), Viel-Salm (Aigret). — Ht: Erpion (Aigret).

— f. tubulosa (Schaer.) Mudd Man. (1861) p. 97; Crombie Brit. Lich. I p. 259.

Parmelia physodes var. - Kickx Fl. crypt. I p. 223.

P. ceratophylla var. - Schaer. Enum. (1850) p. 42.

Flandres (Kickx). — Lx.: Ochamps, Villance (A. D.), Bois de Lozange (Germain). — Bt: env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (A. D.), Héverlé (Coem.). — A.: env. de Turnhout (Paque).

13 P. prolixa (Ach.) Nyl. in Crombie Lich, Brit. (1870) p. 35; Crombie Brit. Lich, I p. 252.

Parmelia olivacea var. prolixa Ach. Meth. (1803) p. 214.

Ht: env. d'Angre (G. L.). — N.: Heer, Wanlin, Hastière (Dens et Piet.), Louette-St-Pierre (Aub.), Lustin (Tonglet). — Lx.: Salm-Château (G. L.), Laroche (Dens et Piet.), Frahan, Ste-Cécile (Del.), Neufchâteau (Verheggen). — Lg.: entre Esneux et Hout-si-Plout (G.).

- var. perrugata Nyl. Pyr. Or. Nov. (1891) p. 5.
- N.: Fonds de Leffe (Tonglet). Lg.: entre Poulseur et Esneux (G. L.).
- 14 P. saxatilis (L.) Ach. Meth. (1803) p. 204; Kicka Fl. crypt. I p. 222; Orombie Brit. Lich. I p. 240.

Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1142.

Imbricaria retiruga DC. Fl. fr. II (1805) p. 369; Kicka Fl. Louv. p. 87.

Parmelia saxatilis var. - Fries Lich. Scand. (1871) p. 114.

Ht: Leuze, Ligne, Casteau, Angre (G. L.). — Bt: env. de Louvain (Kickx), Auderghem, Tervueren, Bois de la Cambre (A. D.), entre Vilvorde et Bergh (Del.). env. de Gand (Kickx). — Lx.: Sesselich (Paque), Lesse, Ochamps, Smuid, Villance (A. D.), Poix (Él. M.), env. de Bouillon (Del.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François.), Arbre (Él. M.), Dinaut (G. L.). — Lg.: Spa (Nob.), Baraque-Michel (G. L.).

var. Aizonii Delise in Duby Bot. Gall. II (1830) p. 602.
 Parmelia saxatilis var. leucochroa Wallr. Comp. Fl. Germ. III (1831) p. 499.
 P. saxatilis f. furfuracea Schaer. Spic.(1840) p. 455.

Bt: Auderghem (A. D.). — Lx.: Laroche, Mogimont (Dens et Piet.), Villance (A. D.), env. de Bastogne (Germain).

- var. rosaeformis Ach.(?)
 - Fl. or.: Gand (Hors la porte de Courtrai) (Coem.).
- f. corticola.

Imbricaria sinuosa West. Herb. crypt. n. 261.

- N.: Namur (Bell.). Lx.: Nolinfaing, Straimont (Verheggen). Bt: env. de Louvain (Leburt.).
- f. saxicola.
 - Lx.: Nolinfaing, Longlier (Verheggen).
- 15 P. scortea Ach. Lich. Univ. (1810) p. 461; Crombie Brit. Lich. Ip. 240. Lichen -- Ach. Prodr. (1798) p. 119.

Parmelia tiliacea var. scortea Mudd Man. Brit. Lich. (1861) p. 93.

Bi: Nivelles, Braine·l'Alleud, Ophain (Dens et Piet.). — N.: Dave, Wagnée (Bell.).

16 P. sinuosa (Sm.) Ach. Syn. (1814) p. 207; Crombie Brit. Lich. I p. 246; Kickx Fl. crypt. I p. 221.

Lichen — Sm. in Eng. Bot. XXIX (1809) t. 2050.

Fi. or.: env. de Gand (Coem.). — N.: env. de Namur (Bell.). — Bt: entre Vilvorde et Bergh (Del.). — Lx.: env. de Bastogne (Germain).

17 P. sorediata (Ach.) Crombie in Journ. of Bot. (1882) p. 273; Crombie Brit. Lich. I p. 253.

Parmelia stygia var. sorediata Ach. Lich. Univ. (1810) p. 471.

P. olivacea var. saxicola Schaer. Spic. (1850) p. 466.

P. dendritica Pers. in Acta Wetter. II, 1 p. 16.

Lx.: Salm-Château, Baraque de Fraiture (G. L.), Transinne (Aigret), Laroche (Él. M.). — Ht: ? (Dumont).

18 P. subaurifera Nyl. in Flora (1873) p. 22; Crombie Brit. Lich. I p. 252.

Commun (Dens et Piet.).

- 19 P. sulcata Tayl. in Mark. Fl. Hib. II (1836) p. 145; Crombie Brit. Lich. I p. 242.
 - P. saxatilis var. Nyl. Syn. (1860) p. 389.
 - P. saxatilis f. munda Schaer. Spic. (1840) p. 455.
 - P. quercifolia var. Schaer. Enum. (1850) p. 44.
 - Bt: Ophain (Dens et Piet.). N.: Anthée (Dens et Piet.). Lx.: Heyd (Aigret), env. de Bastogne (Germain).
- 20 P. tiliacea (Hoffm.) Ach. Meth. (1803) p. 215; Crombie Brit. Lich. I p. 239; Kickx Fl. crypt. I p. 221.

Lichen - Hoffm. Enum. (1784) p. 26 p. p. t. XVI fig. 2.

Imbricaria quercina DC. Fl. fr. II (1805) p. 390; Kicke Fl. Louy. p. 87.

Parmelia quercifolia var. tiliacea Schaer. Enum. (1850) p. 44.

Imbricaria quercina var. scortea Kickx Fl. Louv. (1835) p. 87.

- A.: Zeverdonck (G. L.).—Ht: Baudour (G. L.).—N.: Erpion (Aigret).—Fl. or.: env. de Renaix (Coem.), Gand (Kickx).—Bt: Tervueren, Alsemberg (Kickx), Limelette, Rixensart, Malaise, Groenendael (Él. M.), Petit-Roculx (Dens et Piet.).—Lx.: Longlier, Hamipré, Neufchâteau (Verheggen), Laroche, (Él. M.), env. de Bouillon (Dens et Piet.), Marche (Aigret). env. de Bastogne (Germain).—N.: Louctte-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Anseremme, Viet (Tonglet), env. de Namur (Bell.).
- -- var. saxicola (Koerb.).

Imbricaria tiliacea var. — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 70.

- N.: Wanlin (Aigret). Lx.: Dohan, Botassard (Dens et Piet.).
 - 48 PARMELIOPSIS Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 105; Crombie Brit. Lich. I p. 262.
- P. aleurites (Ach.) Nyl. in Flora (1872) p. 248; Crombie Brit. Lich. I p. 203.

Lichen - Ach. Prodr. (1798) p. 117.

Imbricaria — DC. Syn. Gall. (1806) p. 84.

A.: env. d'Anvers (West. et Van Haes.).

- 49 PHYSCIA Schreb. ex L. Gen. pl. ed. 8 t. II (1791) p. 768; Crombie Brit. Lich. p. 294.
- 1 P. adglutina (Floerke) Nyl. in Flora (1862) p. 355; Crombie Brit. Lich. I p. 320.

Lecanora — Floerke Deutsche Lich. IV (1815) p. 7.

Physcia obscura var. — Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 226.

Flandres (Kickx).

2 P. aipolia (Ach.) Nyl. in Flora (1870) p. 38; Crombie Brit. Lich. I p. 313.

Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 112.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 209.

Imbricaria aipolia DC. Fl. fr. II (1805) p. 386; Kicker Fl. Louv. p. 85.

Parmelia stellaris var. - Koerb. Syst. (1855) p. 85.

N.: Vallée de la Meuse (Dens et Piet.), env. de Namur (Bell.). — Bi: Eegenhoven, Héverlé (Paque), env. de Louvain (Kickx). — A.: Vosselaer (Paque). — Flandres (Kickx).

3 P. aquila (Ach.) Nyl. in Act. Soc. Lich. Bord. sér. 3, I (1856) p. 309; Crombie Brit. Lich. I p. 310.

Lichen - Ach. Prodr. (1798) p. 109.

Imbricaria — DC. Fl. fr. II (1805) p. 388.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 201.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

4 P. astroidea (Clem.) Nyl. in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1856) p. 308; Crombie Brit. Lich. I p. 316.

· Parmelia — Olem. Eus. Add. (1807) p. 302.

Physcia Clementiana Kicka Fl. crypt. I (1867) p. 226.

Parmelia - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 483.

Imbricaria — Kickx Rech, cent. II (1843) p. 16.

Fl. or.: Tronchiennes, Baarle, St-Denis (Kickx). — Fl. occ.: env. d'Ypres (West.). — Ht: Leuze (G. L.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Vlierbeek, Héverlé (Leburt.).

5 P. caesia (Hoffm.) Nyl. in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1850) p. 368; Kickx Fl. crypt. I p. 224; Crombie Brit. Lich. I 317.

Lichen — Hoffm. Enum. (1784) p. 65 pl. 12 fig. 1.

tb.: Zolder (Dens et Piet.). — Fl. or.: Destelbergen (Coem.), Baelegem (Kickx). — Bt: Groenendael (G. L.), Villers-la-Ville (Dens et Piet.). — Lx.: Neufchâteau, Straimont (Verheggen), env. de Laroche, Hives (Troch et G. L.), Hayons, Rochehaut (Del.). — N.: Erpion, Olloy (Aigret), Bonneville (Delhaise).

6 P. chrysophthalma (L.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 401; Crombie Brit. Lich, I p. 296.

Lichen - L. Mant. II (1771) p. 311.

Borrera - Ach. Lich. Univ. (1818) p. 502; Kicker Fl. Louvain p. 84.

Parmelia — Ach. Meth. (1803) p. 267.

Tornabenia chrysophthalma Mass. Mem. Lich. (1853) p. 42; Kickx Fl. crypt. I p. 212.

Fl. occ.: env. de Mariakerke (Coem.). - Bt: env. de Louvain (Kickx).

7 P. ciliaris (L.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 396; Crombie Brit. Lich. I p. 302.

Lichen - L. Sp. pl. (1753) p. 1144.

Borrera - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 496; Kicke Fl. Louv. p. 83.

Anaptychia — Koerb. Syst. (1855) p. 50; Kickx Fl. crypt. I p. 212.

Ht: Angre, Leuze, Ligne, Ath (G. L.). — Lg.: Baraque-Michel (G. L.). — A.: Weelde, Raevels (Paque). — Fl. or.: Neder-Eenaeme (Nob.). — Flandres (Kickx). — N.: Dinant, Pont-à-Lesse (G. L.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François). — Lx.: Villance (A. D.), Viel-Salm, Bouillon, Arlon, Metzert (G. L.), env. de Bastogne (Germain), Frahan (Del.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Nolinfaing (Verheggen), Sesselich, Stockem (Paque). — Bt: env. de Bruxelles (A. D.), env. de Louvain (Kickx), Héverlé, Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque), Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.).

- var. crinalis Schaer. Enum. (1850) p. 10.

Ht: Angre (G. L.). - Lx.: Ochamps, Libin, Recogne (A. D.).

8 P. lychnea (Ach.) Nyl. ex Journ. of Bot. (1865) p. 288; Crombie Brit. Lich. I p. 300.

Parmelia candelaria var. — Ach. Meth. (1810) p. 187.

Xanthorea parietina var. lychnea Nyl. Mus. Fenn.; Kicka Fl. crypt. Ip. 228.

Physcia parietina var. - Nyl. Syn. (1860) p. 411.

Borrera candelaria Kickx Fl. Louv. (1835) p. 84.

Xanthoria - Arn. Lich. Jura (1884) p. 78.

Flandres (Coem.). — Bt: env. de Bruxelles (Kickx), env. de Louvain (Leburt.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

 P. muscigena (Ach.) Nyl. Syn. I (1860) p. 418; Crombrie Brit. Lich. I p. 309.

Physcia pulverulenta — Leight. Fl. Sappl. p. 479.

Parmelia — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 472.

Lg.: entre Poulseur et Esneux (G. L.).

P. obscura (Ehrh.) Nyl. in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1855)
 p. 309; Kicka Fl. crypt. I p. 225; Crombie Brit. Lich. I p. 318.
 Lichen — Ehrh. Fl. crypt. (1785) n. 177.

Bt: Bergh (Del.), Groenendael (G. L.). — Ht: Leuze, Ligne (G. L.). — Flandres (Kickx). — Lx.: Bouillon, Hayons (Del.). — N.: Olloy, Nismes (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.), Burnot (Al. M.). — Ht: Erpion (Aigret).

- var. cycloselis (Ach.) Schaer. Lich. Eur. (1859) p. 37; Kickx Fl. crypt. I p. 226.

Lichen — Ach. Prodr. (1798) p..113.

Imbricaria - DO. Fl. fr. II (1805) p. 338; Kicky Fl. Louv. p. 86.

Flandres (Kickx). - Bt: Waterloo (Kickx).

- var. muscicola Schaer. Spic. (1840) p. 442.

Ht: Leuze (G. L.).

11 P. parietina (L.) De Not. in Mém. R. Ac. Sc. Turin sér. 2, X (1849) p. 387; Crombie Brit, Lich. I p. 297.

Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1143.

Parmelia - Ach. Meth. (1810) p. 213.

Imbricaria — DC. Fl. fr. II (1805) p. 391; Kicka Fl. Louv. p. 87.

Xanthoria — Th. Fries Arctoi (1861) p. 167 p. p; Kickx Fl. crypt. I p. 227.

Lepra botryoides DO. Fl. fr. II (1805) p. 322; Kickx Fl. Louv. p. 106.

Ht: env. d'Angre (G. L.). — Fl. or.: Neder-Eenaeme (Nob.). — Flandres (Kickx). — A.: env. de Turnhout (Paque). — Lg.: Moresnet (Troch), Olloy (Aigret et François.), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — Bt: Groenendael (Él. M.), env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.). — Lx.: env. de Neufchâteau (Verheggen), Villance, Paliseul, Arlon (A. D.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer).

var. aureola (Ach.) Nyl. Syn. Lich. I (1860) p. 411; Crombie
 Brit. Lich. I p. 298.

Parmelia - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 487.

Xanthoria parietina var. aureola Fries Lich. Eur. (1831) p. 73; Kickw Fl. erypt. I p. 228.

N.: env. de Rochefort (Aigret). — Bt: Ixelles, Schaerbeek (A. D.). — Fl. or.: Eyne (Nob.). — Lx.: Villance, Glaireuse (A. D.). — Fl. occ.: Ostende (Coem.).

- var. ectanea (Ach.) Crombie Brit. Ach. I p. 299 Koerb. Syst. (Lich. (1855) p. 91.

Xanthoria parietina var. - Nyl.; Kickx Fl. crypt. I p. 228.

Parmelia parietina var. — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 464 p. p.

Fl. or.: Destelbergen, Bottelaere (Kickx).

- var. granulata Schaer.; Koerb. Parerga (1865) p. 37.

Bi: env. de Louvain (Paque). - A.: env. de Turnhout (Paque).

— var.pulvinata Mass. Sched. crit. (1855-56) p. 42; Kickx Fl. crypt. I p. 218.

Bt: Corbeek-Loo (Paque). — Flandres (Coem.).

- - f. virescens Nyl. in Bull. Soc. Bot. de Fr. t. XIII (1866) p. 366; Crombie Brit. Lich. I p. 298.

Xanthoria parietina var. chlorina Ohev. Fl. Paris I (1836) p. 621.

Imbricaria parietina var. — Kicka Fl. Louv. (1835) p. 87.

Bt: env. de Louvain (Kickx), Court-St-Étienne (Dens et Piet.). — A.: env. de Turnhout (Paque).

12 P. pityrea (Ach.) Nyl. ex Lamy in Bull. Soc. Bot. Fr. t. XXV (1878) p. 383; Crombie Brit. Lich. I p. 308.

Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 124.

Physcia pulverulenta var. grisea (Schaer.) Kickw Fl. crypt. I (1867) p. 225. Imbricaria grisea DO. Fl. fr. II (1805) p. 387; Kickw Fl. Louv. p. 85.

N.: Leffe (G. L.). — Flandres (Kickx). — Bt.: env. de Louvain (Kickx), Héverlé, Eegenhoven (Paque); Nivelles (Dens et Piet.).

P. pityrea var. farrea (Ach.) Duby Bot. Gall. II (1830) p. 605; Kicka Fl. crypt. I p. 225.

Parmelia - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 483.

Fl. or. : Gand (Coem.).

13 P. polycarpa (Ehrh.) Nyl. ex Lamy in Bull. Soc. bot. de Fr.

t. XXX (1883) p. 359; Crombie Brit. Lich. I p. 299.

Lichen - Ehrh. Exs. (1785) n. 137.

Xanthoria parietina var. — Th. Fries Arctoi (1861) p. 168; Kickx Fl. crypt. I p. 228.

Bt: Nivelles (Dens et Piet.). - Fl. or.: Meirelbeke (Kickx).

14 P. pulverulenta (Schreb.) Nyl. in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1856)

p. 308; Kickw Fl. crypt. I p. 224; Crombie Brit. Lich. I p. 305. Lichen — Schreb. Spic. (1771) p. 128.

Imbricaria — DO. Fl. fr. II (1805) p. 387; Kicka Fl. Louv. p. 86.

Parmelia - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 473.

Ht: Belœil, Stambruges, Leuze (G. L.). — N.: Leffe, Pout-à-Lesse (G. L.). Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Dinant, près de la papeterie (Namur) (Bell.). — Fl. or.: Neder-Eenaeme (Nob.). — Flandres (Kickx). — Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (A. D.), Groenendael (El. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.). — Lx.: Longlier, Neufchâteau, Nolinfaing, Grapfontaine (Verheggen), Villance (A. D.), Bouillon, Frahan (Del.).

- var. allochroa (Ehrh.) Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 136. Lichen - Ehrh. exs. n. 189.

Bt: Nivelles, Tilly (Dens et Piet.).

var. angustata (Hoffm.) Nyl. in Act. Soc. Linn. Bord. sér.
J. I (1856) p. 308; Crombie Brit. Lich. I p. 307.

Lichen - Hoffm. Enum. (1784) p. 7 t. 11 fig. 2.

Physica pulverulenta var. — Ach. Syn. (1804) p. 214; Kickx Fl. crypt. I p. 225.

Flandres (Coem.).

15 P. stellaris (L.) Nyl. in Flora (1870) p. 38; Kicke Fl. crypt. I p. 223; Crombie Brit. Lich. I p. 310.

Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1144.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 209.

Imbricaria — DO. Fl. fr. II (1805) p. 386; Kicka Fl. Louv. p. 85.

Ht: env. d'Angre (G. L.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), env. de Namur (Bell.). — Fl. or.: Neder-Eenaeme (Nob.). — Flandres (Kickx). — Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque), env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.), Villers-la-Ville, Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.). — Lx.: Nolinfaing, Straimont (Verheggen), env. de Bastogne (Germain). — A.: env. de Bouillon (Del.), Vosselaer (Paque).

- - var. ambigua (Schaer.)

Parmelia - Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 39.

N.: env. de Namur (Bell.).

P. stellaris var. leptalea (Ach.) Nyl. Syn. Lich. I (1860) p. 425; Crombie Brit. Lich. I p. 311.

Lichen - Ach. Prodr. (1798) p. 108.

Borrera tenella var. - Ach. Syn. (1824) p. 221; Kickx Fl. Louv. p. 84.

Physica stellaris var. - Nyl. Prodr. (1860) p. 61; Kickw Fl. crypt. I p. 224.

Physcia stellaris var. adscendens Koerb. Syst. (1855) p. 85.

N.: Moniat (Tonglet), Burnot (Él. M.). — Ht: Leuze, env. d'Angre (G. L.). — St: env. de Louvain (Kickx). — Flandres (Kickx).

16 P. tenella (Scop.) Nyl. in Flora (1874) p. 306; Crombie Brit. Lich. I p. 312.

Lichen - Scop. Fl. Carn. (1760) p. 1406.

Physica stellaris var. — Nyl. Syn. Lich. I (1860) p. 436; Kickx Fl. crypt. I p. 224.

Borrera - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 480; Kicka Fl. Louv. p. 84

Ht: Leuze, Ligne, Stambruges (G. L.). — Bt: env. de Louvain (Kickx), Tervueren (Nob.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Bruxelles (A. D.). — Flandres (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.), Olloy (Aigret et François). — Lx.: Noire-Fontaine, Frahan (Del.), env. de Bastogne (Germain).

— f. subbreviata Nyl. (1882) p. 572; Hue Add. Lichen Eur. (1886) p. 53.

Bt: Bornival (Dens et Piet.).

 P. Ulothrix (Ach.) Nyl. in Flora (1875) p. 360, 442; Crombie Brit. Lich. I p. 319.

Lichen - Ach. Prodr. (1798) p. 113.

Physcia obscura var. — Ach. Syn. (1824) p. 217.

Borrera obscura var. - Mudd Man. (1867) p. 110.

Imbricaria — DO. Fl. fr. II (1805) p. 388.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). - Bt: env. de Louvain (Coem.).

var. virella (Ach.) Crombie in Grevillea XV (1887) p. 78;
 Crombie Brit. Lich. I p. 319.

Lichen — Ach. Prodr. (1793) p. 108.

Physcia obscura var. — Leight. Lich. Fl. p. 148; Kickx Fl. crypt. I p. 226. Flandres (Kickx).

18 P. venusta (Ach.) Nyl. ex Lamy in Bull. Soc. bot. de Fr. t. XXV (1878) p. 383; Crombie Brit. Lich. I p. 308.

Physica pulverulenta var. — Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 39; Kickx. Fl. crypt. I p. 225.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 211 t. 8 fig. 5.

Imbricaria — DC. Fl. fr. V (1805) p. 186.

Flandres (Kickx). - Bt: Zoetwater (Paque).

52 STICTINA Nyl. in Flora (1860) p. 66; Crombie Brit. Lich. I p. 265.

 S. fuliginosa (Dicks.) Nyl. Syn. I (1860) p. 347; Crombie Brit. Lich. I p. 267.

Lichen - Dicks. Crypt. fasc. I (1785) p. 13.

Lx.: Laroche (Dens et Piet.), chemin des Libéans (Bouillon) (Del.).

2 S. limbata (Sm.) Nyl. Syn. I (1860) p. 346 Crombie; Brit. Lich. I p. 268.

Lichen - Sm. in Engl. Bot. XVI (1803) t. 1104.

Sticta — Ach. Meth. (1804) p. 280.

Lx.: Hayons (Del.).

3 S. sylvatica (Huds.) Nyl. Syn. I (1860) p. 348; Crombie Brit. Lich. I p. 268.

Lichen - Hvds. Fl. angl. (1762) p. 453.

Sticta - Gray Nat. Arr. I (1821) p. 432.

Pulmonaria - Hoffm. Lich. (1784) t. 4 fig. 2.

Bt: Auderghem, Schaerbeek, Tervueren, Bois de la Cambre (A. D.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Bois de Rollé (Germain), Maissin, Villance (A. D.), Frahan, Mortehan (Del.).

- 53 RICASOLIA De Not. in Giorn. bot. it. I (1846) p. 178; Crombie Brit. Lich. I p. 274.
- 1 R. laetevirens (Lightf.) Leight. Lich. Fl. (1871) p. 121; Crombie Brit. Lich. I p. 276.

Lichen — Lightf. Fl. Scot. II (1777) p. 852.

Lichen herbaceus Huds. Fl. angl. ed. 2 (1778) p. 544.

Sticta - Gray Nat. Arr. I (1821) p. 431.

Ricasolia - Nyl. Prod. (1857) p. 54; Crombie Lich. Brit. p. 32.

N.: Spontin (Él. M.), Vallée de l'Hermeton (Tonglet). — Lx.: Frahan, forêt de Bouillon, Nafraiture, Petit-Fays, Vresse (Del.).

- 54 LOBARINA Nyl. in Flora (1877) p. 233; Crombie Brit. Lich. I p. 279.
- 1 L. scrobiculata (Scop.) Nyl. in Flora (1877) p. 233.

Lichen - Scop. Fl. Carn. (1772) p. 384.

Stictina — Nyl. in Crombie Lich. Brit. (1870) p. 30.

Sticta - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 453.

Ux.: Bois d'Azy (Germain), Arlon (Aigret), Ncufchâteau, Nolinfaing, Straimont (Verheggen), Lesse (A. D.), Queue-de-Vache, Laroche (Él. M.), Metzert (G. L.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 55 LOBARIA Hoffm. Deutsch. Fl. II (1875) p. 138; Crombie Brit. Lich. I p. 271.
- 1 L. pulmonaria (L.) Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 146.

Lichen - L. Fl. Suec. (1755) p. 1087.

Sticta - Hook. Fl. Scott. II (1821) p. 58.

Sticta pulmonacea Ach.; Kickx Fl. Loav. p. 90.

Bt: Duysbourg, Waterloo, Groenendael (Kickx). — Lx.: Nolinfaing, Straimont (Verheggen), Lesse, Paliseul (A. D.), Bouillon, Metzert, Neufchâteau (G. L.), St-Mard (Dens et Piet.), Viel-Salm, Laroche (Aigret), Odeigne (Troch et G. L.), Bois d'Azy (Germain), Rochehaut, Frahan (Del.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Beaumont, Walcourt (Aigret).

- var. pleurocarpa (DC.).

Sticta pulmonaria var. — DO.; Duby Bot. Gall. (1830) p. 600.

Lx.: Bois d'Azy (Germain).

- 56 CETRARIA Ach. Meth. (1803) p. 292 p. p.; Crombie Brit. Lich. I p. 215.
- 1 C. aculeata (Ach.) Fries Syst. Orb. Veg. (1825) p. 239; Crombie Brit. Lich. I p. 217.

Lichen — Schreb. Fl. Lips. (1771) p. 125.

Cornicularia — Ach. Meth. (1803) p. 302; Kickw Fl. Louv. p. 73; Kickw Fl. crypt. I p. 209.

- Ht: Angre (G. L.). Fl. occ.: Oostduinkerke, Knocke (Kickx). N.: Jamagne (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy, env. de Rochefort (Aigret.). Bt: Holsbeek (Paque), Ellewyt (Él. M.). Fl. or.: Lokeren (Paque). A.: Vosselaer, Weelde, Raevels (Paque), Everboden (Kickx). Lx.: Bouillon, Frahan, Cornimont, entre Bouillon et Cordemoy (Del.), Clairefontaine, Sesselich, Stockem (Paque), Maissin, Lesse (A. D.), Laroche (Él. M.), Viel-Salm (G. L.), env. de Bastogne (Germain).
- var. campestris Schaer. Spic. (1823-42) p. 255.

Lb.: Viverselle, Bolderberg, Zonhoven (Dens et Piet.). — Lx.: env. de Bastogne (Germain). — N.: Marche-en-Famenne (Delhaise).

— var. muricata Ach. Lich. Univ. (1810) p. 612.

Cornicularia — Ach. Meth. (1803) t. 6 fig. 2; Kickx Fl. crypt. I p. 209.

Cornicularia aculeata var. odontella Kickx Fl. Louv. (1835) p. 74.

Fl. occ.: Oostduinkerke, Knocke (Kickx). — Ht: Bois d'Angre (G. L.). — Lb.: Campine limbourgeoise (Dens et Piet.). — Lx.: Baraque de Fraiture (G. L.), Heid (Aigret). — N.: Couvin (G. L.). Lustin, Bouvignes, Moniat (Tonglet.). — A.: entre Gheel et Hérenthals, entre Gheel et Veerle (Kickx).

- f. acanthella (Ach.) Nyl. in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 100.
 Cornicularia spadicea var. Ach. Lich. univ. (1810) p. 612.
 Lx.: Transinne (Aigret).
- 2 C. islandica (L.) Ach. Method. (1883) p. 293; Crombie Brit. Lich. I p. 215.

Lichen - L. Sp. pl. (1753) p. 1145 a.

Lg.: Baraque-Michel (Él. M.). — Lx.: Petit-Voir (Verheggen).

3 C. odontella Ach. Syn. (1814) p. 230; Crombie Brit. Lich. I p. 219.
Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 213.

Lx.: env. de Bastogne (Germain).

- 57 PLATYSMA Nyl. in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 100; Crombie Brit. Lich. I p. 219.
- P. glaucum (L.) Nyl. in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1857)
 p. 295; Crombie Brit. Lich. I p. 225.

Lichen - L. Sp. pl. (1753) p. 1148.

Cetraria — Gray Nat. arr. I (1821) p. 433.

th.: Zolder (Dens et Piet.). — Lx.: Nolinfaing, Straimont (Verheggen), Laroche, Samrée (Él. M.), Bois d'Azy et de Luzery (Germain), Toernich, Stockem (Paque), Maissin (Aigret et Dolisy), Samrée (Troch et G. L.), Rochehaut (Del.), env. de Bastogne (Germain). — N.: Gedinne (Troch), Louette-St-Pierre (Del. et Gravet).

f. fallax (Web.) Nyl. Syn. I (1860) p. 314; Crombie Brit.
 Lich. I p. 226.

Lichen - Web. Spicil, Fl. Germ. (1778) p. 144.

Cetraria glauca var. - Hook. Fl. Scott. II (1821) p. 57.

Lx.: Maissin (Aigret et Dolisy), env. Bastogne (Germain).

2 P. pinastri (Scop.) Nyl. in Flora (1869) p. 442; Crombie Brit. Lich. I p. 225.

Lichen - Scop. Fl. Carn. II (1772) p. 382.

Cetraria - Fries Lich. Eur. (1831) p. 40.

Lobaria — Hoffm. Fl. Germ. p. 146.

Lg.: Baraque-Michel (G. L.).

CLADONIEAE

- 58 CLADONIA Hill. Hist. Plant. (1751) p. 91; Wainio Monog. Clad. I p. 5 (1).
- C. acuminata (Ach.) Norrl. Herb. Lich. Fenn. (1875) p. 57; Wainio Monog. Clad. II p. 73.

Cenomyce pityrea var. acuminata Ach. Syn. Lich. (1814) p. 254 p. p.

Cladonia pyxidata var. pityrea f. acuminata Coem. Clad. Belg. (1863) n. 93 et 94.

Bt: Bousval (Dens et Piet.). - N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

⁽¹⁾ Nous n'avons pu introduire dans le relevé des espèces du genre Cladonia tout ce qui a été signalé en Belgique, car la synonymie de ce genre est très complexe et les noms publiés en Belgique sont souvent fort mal en rapport avec les indications des auteurs. Le genre Cladonia est d'ailleurs à réétudier chez nous, d'après les dernières recherches et en particulier, d'après la monographie de M. Wainio, qui lui même a du ranger parmi les formes douteuses un très grand nombre de variétés et de formes des auteurs qui l'ont précédé.

2 C. alpicola (Flot.) Wainio Monog. Clad. II (1894) p. 58.

Cladonia pyxidata var. - Flot. in Flora (1825) p. 340.

Cenomyce decorticata Fries Lich. Suec. Exs. (1824) p. 81, Sched. crit. (1824) p. 18.

Cladonia — Nyl. Coll. Fl. Kar. (1852) p. 177.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

3 C. bacillaris Nyl. Lich. Lapp. or. (1866) p. 179; Wainio Monog. Clad. I p. 88.

C. macilenta var. Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 186.

Cenomyce — Del. in Duby Bot. Gall. (1830) p. 634; Kickx Fl. Louv. 78.

Lx.: Viel-Salm (Aigret). — N.: Olloy (Aigret et François). — Bt: Huldenberg, Boitsfort, Alsenberg, Beersel (Kickx).

4 C. bellidiflora (Ach.) Schaer. Lich. Helv. Spic. (1823) p. 21 p. p.; Wainio Monog. Clad. I p. 199.

Lichen - Ach. Lich. Suec. Prod. (1798) p. 194.

Lx.: Neufchâteau, Petit-Voir, Mont-Plainchamps (Verheggen), Baraque de Fraiture (Troch et G. L.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

5 C. caespiticia (Pers.) Floerke Clad. Comm. (1828) p. 8; Wainio Monog. Clad. I p. 459; Kicka Fl. crypt. I p. 81.

Baeomyces - Pers. in Usteri Ann. Bot. (1794) p. 155.

Cenomyce epiphylla subsp. C. caespiticia Ach. Lich. Univ. (1810) p. 527;
Kickw Fl. Louv. p. 81.

C. agariciformis Arn. Zur Erinn. Wulf. (1882) p. 168.

N.: Godinne, Profondeville (Tonglet). — Fl. or.: env. de Gand, de Grammont et d'Audenarde (Kickx). — Lb.: Zolder (Dens et Piet.). — A.: Tongerloo (Kickx). — Bt.: Braine-l'Alleud, Virginal, Tilly, Court-St-Étienne (Dens et Piet.). — Lg.: env. de Stavelot (Aigret). — Lx.: entre Rochehaut et Cornimont (Del.), Maissin (Aigret et Dolisy).

6 C. cariosa (Ach.) Spreng. in Linn. Syst. Veg. IV (1827) p. 272; Wainio Monog. Clad. I p. 43; Kickx Fl. crypt. I p. 250.

Cenomyce - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 197.

Fl. or.: env. de Gand (Coem.), env. d'Audenarde (Spae). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

7 C. carneola Fries Lich. Eur. Ref. (1831) p. 233; Wainio Monog. Clad. II p. 420.

C. digitata *Hoffm*. Herb. Viv. (1825) p. 457.

C. pyxidata var. carneopallida Floerke Clad. Comm. (1868) p. 67; Kickv Fl. crypt. I p. 250.

Ht: Stambruges, Blaton, Grandglise. Baudour (G. L.). — Lx.: Laroche, entre Villez et Maboge (Dens et Piet.). Neufchâteau. Nolinfaing (Verheggen), Odeigne (G. L.). — N.: Godinne, Profondeville (Tonglet), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Bt: Braine-l'Alleud (Dens et Piet.).

8 C. cenotea (Ach.) Schaer. Lich. Helv. Spic. (1823) p. 35 p. p.;

Wainio Monog. Clad. I p. 471.

Baeomyces cenotea Ach. Meth. Lich. (1803) p. 345.

C. cenotea var. crossota (Ach.) Wainio Monog. Clad. I (1887) p. 478.
Cenomyce cenotea var. — Ach. Syn. Lich. (1814) p. 272.

Cladonia cenotea Nyl. Syn. Lich. (1860) p. 208; Kickw Fl. crypt. 1 p. 254. Fl. or.; Meirelbeke (Coem.). — A.: Vosselaer, Raevels (Paque).

- var. exaltata Nyl. in Sched. (1874); Wainio Monog. Clad. I p. 481.

Cladonia cenotea var. viminialis Schaer. Lich. Helv. (1833) p. 315.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

9 C. coccifera (L.) Willd. Fl. Berol. (1787) p. 361; Wainio Monog. Clad. I p. 149.

· Lichen — L. Spec. Plant. (1753) p. 1151 n. 57.

Cenomyce - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 537; Kickx Fl. Louv. p. 79.

C. cornucopioides Fries; Kickx Fl. crypt. I p. 256.

Cenomyce coccinea Hoffm. Herb. Viv. (1825) p. 456.

Cladonia coccifera var. extensa Schaer. Lich. Helv. Spic. (1833) p. 282; Kicka Fl. Louv. p. 79.

F1. or.: Lokeren (Paque), env. de Gand, d'Audenarde et de Renaix (Kickx).—Ht: Blaton, Baudour, Maisières, St-Ghislain (G. L.).—N.: Olloy, Wanlin, (Aigret), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).—Lx: env. d'Arlon (Lemoine), Frahan (Del.), env. de Bouillon (Dens et Piet.), Chompré, env. de St-Hubert, env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Odeigne (G. L.), env. de Villance (A. D.), Laroche (Él. M.).—A.: Arendonck (Paque).—Lg.: Spa, Winamplanche (Nob.), Marchain (Mansion).—Lb.: Lanaeken (Hardy), Campine limbourgeoise (Dens et Piet.).—Bt: Rixensart, Ellewyt (Él. M.), Court-St-Étienne (Dens et Piet.), Berthem, Tervueren, Auderghem (Kickx), Eegenhoven, Héverlé (Paque).

- var. asotea (Ach.) Wainio Monog. Clad. I (1887) p. 164. Baeomyces cocciferus subsp. B. asoteus Ach. Meth. Lich. (1803) p. 332. Cladonia coccifera var. centralis Floerke Clad. Comm. (1828) p. 93 excl. Syn. p. p.
 - Lx.: Maissin (Aigret et Dolisy).
- var. pleurota (Floerke) Schaer. Lich. Helv. Spic. (1823) p. 25; Wainio Monog. Clad. I p. 168.

Capitularia — Floerke Beschr. Rothfr. Bescherf. (1808) p. 218 p. p.

Cenomyce — Ach. Syn. Lich. (1814) p. 270.

Cenomyce coccifera var. — Sommerf. Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 127: Kickæ Fl. Louv. p. 89.

Cladonia cornucopioides var. pleurota Fries ex Kicka Fl. crypt. I p. 257.

- Bt: Eegenhoven, Héverlé (Paque), Berthem, Tervueren, Auderghem (Kickx).

 FI. or.: Renaix (Coem.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- var. pseudooxyceras (Delise) Arn. Lich. Jura (1884) p. 77.
 stellata var. pseudooxyceras Delise in Herb. ex Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 200; cf. Wainio Monog. Clad. I p. 267.
 - N.: Mariembourg (G. L.).

C. coccifera var. stemmatina (Ach.) Wainio Monog. Clad. I (1887) p. 158.

Cenomyce coccifera subsp. C. stemmatina Ach. Lich. Univ. (1810) p. 537. Cladonia coccifera subsp. C. communis Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 70. Lx.: Neufchâteau, Straimont (Verheggen).

 C. cornuta (L.) Hoffm. Plant. Lich. (1791) t. 25 fig. 1 p. p.; Wainio Monog. Clad. II p. 127.

Lichen — L. Spec. plant. (1753) p. 1152 n. 63 p. p.

Lx.: env. de Laroche (Troch et G. L.), Lesse, Villance (A. D.). — Lg.: Bonne (Modave) (Mansion).

11 C. crispata (Ach.) Flotow Merkw. Flecht. Hirschb. (1839) p. 4; Wainio Monog. Clad. I p. 377.

Baeomyces turbinatus subsp. B. crispatus Ach. Meth. Lich. (1803) p. 341. Cladonia furcata yar. crispata Floerke Clad. Comm. (1828) p. 148.

Hi: Blaton (G. L.). — Lx.: Neufchâteau, Petit-Voir, Longlier (Verheggen). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

— var. cetrariaeformis (Del.) Wainio Monog. Clad. I (1887) p. 392.

Cenomyce gracilis var. cetrariaeformis *Del*. in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 625. N.: Champlon (Coem. Clad. Belg. n. 200).

- 12 C. decorticata (Floerke) Spreng. in Linn. Syst. Veg. IV (1827)
 - p. 271; Wainio Monog. Clad. II p. 67; West. Herb. crypt. n. 1025. Cladonia squamosa Coem. Obs. Lich. West. (1858) p. 19.

Capitularia - Floerke Beschr. Braunfr. Bescherf. (1810) p. 297.

Cladonia (pyxidata) pityrea var. crassiuscula Del. in Duby Bot. Gall. (1830) p. 627; West. loc. cit. et Coem. Clad. Belg. n. 104.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

13 C. deformis (L.) Hoffm. Deutschl. Fl. (1796) p. 120 excl. Syn.; Wainio Monog. Clad. I p. 187.

Lichen — L. Spec. plant. (1753) p. 1152 p. p.

Ht.: Casteau, Maisières (G. L.). - N.: Godinne (Tonglet).

14 C. degenerans (Floerke) Spreng. in Linn. Syst. Veg. IV (1827) p. 273; Wainio Monog. Clad. II p. 135; Kickv Fl. crypt. p. 252.

Baeomyces — Floerke in Berl. Magaz. (1807) p. 283.

Cenemyce gonorega Ach. Lich. Univ. (1810) p. 551.

Lx.: Warmifontaine, Petit-Voir (Verheggen), Baraque de Fraiture (G. L.), Sensenruth (Dens et Piet.). — N.: Bouges (Bell.), Arbre (Él. M.). — A.: Gierle (Paque). — Fl. or.: env. de Renaix, Meirelbeke (Kickx).

15 C. delicata (Ehrh.) Floerke Clad. Comm. (1828) p. 7; Wainio Monog. Clad. I p. 465.

Lichen - Ehrh. Fl. crypt. (1793) n. 247.

Bi: Forêt de Soignes (G. L.).

- 16 C. digitata Schaer. Lich. Helv. Spic. (1823) p. 22,
 - var. monstrosa (Ach.) Wainio Monog. Clad. I (1887)
 p. 128.

Cenomyce digitata var. — Ach. Syn. Lich. (1814) p. 268.

- N.: Profondeville (Tonglet).
- f. prolifera Lam. in Sturm Deutschl. Fl. II Abth. 24 Heft Flecht. Heft I (1832) p. 44 t. 16 fig. f.; cf. Wainio Monog. Clad. I p. 130.
- N.: Godinne (Tonglet).
- 17 C. fimbriata (L.) Fries Lich. Eur. Ref. (1831) p. 222; Kichx Fl. crypt. I p. 350; Wainio Monog. Clad. II p. 246.

Lichen — L. Spec. plant. (1753) p. 1152.

C. pyxidata var. fimbriata Coem. Clad. Belg. (1863) n. 41-46.

Cenomyce pyxidata var. fimbriata Ach. Lich. Univ. (1810) p. 535; Kickx Fl. Louv. p. 79.

Cladonia fimbriata f. denticulata Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 190.

C. pyxidata var. denticulata Floerke Clad. Comm. (1828) p. 55.

Flandres (Kickx). — Bt: env. de Louvain (Kickx). — N.: env. de Namur (Bell). — Ht: Stambruges (G. L.). — Lx.: Neufchâteau, Longlier, Crapfontaine (Verheggen), Montagne de Mardasson (Germain), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer).

— var. nemoxyna (Ach.) Coem. Clad. Belg. (1863) n. 56; Wainio Monog. Clad. II p. 295.

Bacomyces radiatus subsp. B. nemoxynus Ach. Meth. Lich. (1803) p. 302. Cladonia fimbriata f. fibrila Ach. Syn. (1814) p. 256.

- C. fimbriata var. abortiva Ach. Syn. Lich. (1814) p. 255; Kickx Fl. crypt. I p. 251.
- Bt: Braine-l'Alleud (Dens et Piet.). A.: Vosselaer (Paque). Fl. or.: Lokeren, (Paque), env. de Gand (Coem.), Neufchâteau, Longlier (Verheggen). Ht: Camp de Casteau (G. L.).
 - var. ochrochlora (Floerke) Wainio Monog. Clad. II (1894) p. 319.

Cladonia - Floerke Clad. Comm. (1828) p. 75 p. p.

C. fimbriata subsp. C. — Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 51.

N.: Heer (Dens et Piet.).

- var. prolifera (Retz.) Mass. sec. Wainio Monog. Clad. II (1894) p. 271.

Lichen fimbriatus var. — Retz. Fl. Scand. (1779) p. 232.

- Lx.: Straimont, Nolinfaing (Verheggen).
- var. radiata (Schreb.) Coem. Clad. Belg. (1863) n. 55; Kickw Fl. crypt. I p. 251.

Cladonia - Schreb.

C. fimbriata denticulata Rabenh. Krypt. Fl. ed. I (1845) p. 108.

Patellaria fusca m. fimbriata B. tubaeformis c. m. heterodactylum Wallr. Naturg, säulch, Flecht. (1829) p. 136.

Bt: Eegenhoven, Héverlé (Paque). — Fl. or.: Lokeren (Paque), env. de Gand (Coem.). — A.: Vosselaer (Paque). — Lx.: Neufchâteau, Mont-Plainchamps (Verheggen). — Ht: Ellezelles env. de Renaix, Zone siliceuse (G. L.).

C. fimbriata var. simplex (Weiss) Flot. sec. Wainio Monog. Clad. II (1884) p. 256.

Lichen fimbriatus var. - Weiss Fl. crypt. Gotting. (1770) p. 84.

C. pyxidata var. tubaeformis *Hoffm*. Deutschl. Fl. I (1796) p. 122; *Kickx* Fl. crypt. I p. 250.

Cenomyce pyxidata var. tubaeformis Hoffm.; Kickw Fl. Louv. p. 79.

Flandres (Kickx). — Ht: Blaton, Stambruges (G. L.). — Bt: Parc (Paque), env. de Louvain (Kickx), Court-St-Étienne (Dens et Piet.). — N.; Godinne (Tonglet).

var. subulata (L.) Wainio Monog. Clad. II (1894) p. 282.
 Lichen – L. Spec. plant. (1753) p. 1153.

Cenomyce cornuta var. ramosa Del. in Duby Bot. Gall. (1830) p. 628 sec. Wainio loc. cit. p. 135; Kickx Fl. Louv. p. 80.

N.: env. de Namur (Bell.). — Bt: Tervueren (Kickx). — Lx.: Neufchâteau, Hamipré (Verheggen).

18 C. flabelliformis (Floerke) Wainio Monog. Clad. (188) p. 114.

Capitularia - Floerke Beschr. Rothfr. Becherf. (1808) p. 216.

Cenomyce polydactyla Floerke Deutsch. Lich. X (1821) p. 13.

Cladonia incana var. — Schaer. Lich. Helv. Spic. (1833) p. 281.

C. macilenta var. — Schaer.?

C. incana var. polydactyla Schaer.

Lx.: Neufchâteau (Verheggen). — Ht.: Bois d'Anger (G. L.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

19 C. Floerkeana (Fries) Sommerf. Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 128; Wainio Monog. Clad. I p. 72.

Cenomyce - Fries Lich. Suec. Exs. (1824) n. 82, Sched. crit. (1824) p. 18.

Ht: Mont de Frasnes, Ellezelles, Stambruges, Blaton, Angre, Casteau (G. L.). — Lx.: Longlier, Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), Viel-Salm (Aigret), Rochehaut, Frahan (Del.). — Lg.: Stavelot (Aigret). — N.: Burnot (Tonglet).

- 20 C. foliacea (Huds.) Schaer.; Wainio Monog. Clad. II p. 385.
 - var. alcicornis (Lightf.) Schaer. Lich. Helv. Spic. (1833) p. 294; Wainio loc. cit. p. 386.

Lichen - Lightf. Fl. Scott. II (1777) p. 872 p. p.

Cladonia — Fries Lich. Suec. Exs. (1826) n. 210; Kickx Fl. crypt. 1 p. 248.

Lx.: Longlier (Verheggen). — N.: Olloy, entre Wanlin et Houyet (Aigret), Bouvignes, Dinant, Anseremme (Tonglet), Couvin, Mariembourg (G. L.),

- Louette-St-Pierre (Aub.). Fl. occ.: Nieuport (Kickx), Coxyde, La Panne (G. L.), env. d'Adinkerke (Piré).
- C. foliacea var. convoluta (Lam.) Wainio Monog. Clad. II (1894) p. 394.

Lichen — Lam. Encycl. Bot. III (1789) p. 500.

Cladonia alcicornis var. endiviaefolia Floerke Clad. Comm. (1828) p. 25.

- FI. occ.: entre Ostende et Nieuport, Coxyde (G. L.). N.: Rochefort, Han (Aigret et François), Chaleux (G. L.), Bouvignes (Troch), entre Olloy et Nismes (Él. M. et Cardot), Blaimont, Hastière (Dens et Piet.), Dourbes, Mariembourg (G. L.).
 - var. firma (Nyl.) Wainio Monog. Clad. II (1894) p. 400.
 C. alcicornis var. Nyl. Syn. Lich. (1858-60) p. 191.
 - N.: Louette-St-Pierre (Aub.). Lx.: Bouillon, Frahan (Del.).
- 21 C. furcata (Huds.) Schrad. Spic. Fl. Germ. (1780) p. 90; Wainio Monog. Clad. I p. 316; Kickx Fl. Louv. p. 78 et Fl. crypt. I p. 254. Lichen Huds. Fl. Angl. (1762) p. 458.
 - Bt: Limelette, Mousty (Él. M.); env. de Louvain (Kickx), Woluwe-St-Étienne (A. D.). N.: env. de Namur (Bell.), Olloy (Aigret et François), Louette-St-Pierre (Aub.). Lx.: env. de Bouillon (Del.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Maissin, Villance (A. D.), Laroche Libin (Él. M.). Flandres (Kickx). Fl. occ.: env. d'Adinkerke (Piré.).
 - var. palamaea (Ach.) Wainio Monog. Clad. I (1887) p. 347. Baeomyces spinosus var. Ach. Meth. Lich. (1803) p. 359.
 - C. furcata var. implexa Kickv Fl. Louv. (1835) p. 78; cf. Wainio Monog. Clad. I p. 351.
 - Patellaria fusca a. subulata c. craticius Wallr. Naturg. Säulch. Flecht. (1829) p. 142; cf. Wainio loc. cit. p. 352.
 - C. squamosa f. craticia Wallr.
 - AC. (Dens et Piet.). Bt: Alsenberg (Kickx). Lx.: Straimont (Verheggen).
 - var. racemosa (Hoffm.) Floerke Clad. Comm. (1828) p. 152; Wainio Monog. Clad. I p. 324.

Cladonia — Hoffm. Deutsch. Fl. II (1796) p. 144; Kickx Fl. Louv. p. 77.

- C. furcata var. subulata Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 79 p. p.
- Bt: env. de Bruxelles (Kickx). N.: Géronsart, Dave, Namur (Citadelle) (Bell.), Olloy (Aigret et François), Louette-St-Pierre (Aub.), Godinne, Bouvignes (G. L.). Lg.: Barse (Mansion), Baraque-Michel (G. L.). Lx.: env. de Bastogne (Germain), env. de Bouillon (Del.), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Baraque de Fraiture (G. L.), env. d'Arlon (Lemoine).
- var. racemosa f. regalis Floerke Clad. Comm. (1828) p. 154; cf. Wainio Monog. Clad. I p. 335.
- N.: Oignies (Aigret).
- var. recurva Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 115; Wainio Monog. Clad. I p. 345.
- A.: Weelde, Raevels (Paque). N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- var. scabriuscula (Del.) Ocem. Clad. Belg. (1866) Wainio Monog. Clad. I p. 338.

Cenomyce scabriuscula Del. in Duby Bot. Gall. (1830) p. 623.

Cenomyce furcata var. squamulosa *Duf.* Rév. Clad. (1817) p. 31; *Kickw* Fl. Louv. p. 78.

- N.: Lesse (A. D.), env. de Namur (Bell.). Bt: Rouge-Cloître (A. D.), Bois de la Cambre (Kickx).
- 22 C. gracilis (L.) Willd. Fl. Berol. (1787) p. 363; Wainio Monog. Clad. II p. 81; Kickx Fl. crypt. I p. 252.

Lichen — L. Spec. plant. (1753) p. 1152 p. p.

Cenomyce — Duf. Rév. Clad. (1817) p. 15; Kickx Fl. Louv. p. 80.

Cenomyce cornuta Ach.; Kickx Fl. Louv. p. 80.

Scyphophorus — DC. Fl. fr. III (1805) p. 340 p. p.

Lb.: Campine limbourgeoise (Dens et Piet.). — N.: env. de Namur (Bell.). — A.: Vosselaer (Paque), Hérenthals, Oolen (G. L.). — Bt: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — Fl. or.: Lokeren (Paque). — Lx.: env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Villance, Maissin, Lesse (A. D.), Poix, Laroche (El. M.), entre Odeigne et la Baraque de Fraiture (G. L.), Viel-Salm (Aigret), env. de Bouillon (Dens et Piet.), Mortehan (Del.).

— var. aspera Floerke Clad. Comm. (1828) p. 40; Wainio Monog. Clad. II p. 110.

Capitularia gracilis subsp. C. aspera Floerke in Web. Beitr. Naturk. II (1810) p. 259.

- Lx.: Hamipré, Straimont (Verheggen), Sensenruth (Dens et Piet.).
- var. chordalis (Floerke) Schaer. Lich. Helv. Spic. (1823)
- p. 32; Wainio Monog. Clad. II p. 98; Kickv Fl. crypt. I p. 252. Capitularia gracilis subsp. Cap. chordalis Floerke Beschr. Braunf. Becherfl. (1810) p. 324 p. p.

Lb.: Zolder, Zonhoven (Dens et Piet.). — Lg.: Stavelot (Aigret.) — N.: Godinne (Tonglet), Oignies (Aigret). — Lx.: Viel-Salm (Aigret), Longlier, Hamipré, Straimont (Verheggen), Dohan (Dens et Piet.), Frahan, Bouillon (Del.) — A.: Vosselaer (Paque). — Fl. or.: Lokeren (Paque), env. de Renaix (Spae).

- var. dilitata (Hoffm.) Wainio Clad. Monog. II (1894) p. 87.
 Cladonia Hoffm. Deutschl. Fl. (1796) p. 126.
 - C. gracilis var. hybrida Tuck. Syn. Lich. New Engl. (1848) p. 49; Coem. Obs. Lich. West. (1858) p. 19.
 - Lb.: Zolder (Dens et Piet.). N.: Oignies (Aigret).
- var. elongata (Jacq.) Wainio Monog. Clad. II (1894) p. 116.
 Lichen Jacq. Misc. II (1781) p. 368 t. 11 fig. 1.

Cladonia gracilis var. macroceras Floerke Clad. comm. (1828) p. 38.

Lx.: Villance (A. D.).

23 C. leptophylla (Ach.) Floerke Clad. Comm. (1828) p. 19; Wainio Monog. Clad. I p. 29.

Cenomyce - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 568.

Cladonia cariosa var. - Hepp Flecht. Eur. (1860) n. 543.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 24 C. macilenta Hoffm. Deutschl. Fl. (1896) p. 126; Kicka Fl. crypt.
 - I p. 257; Wainio Monog. Clad. I p. 98.
 - C. macilenta var. filiformis Fries Lich. Eur. Ref. (1831) p. 240.
 - C. macilenta var. clavata Schaer. Enum. Lich. (1850) p. 186.
 - Fl. occ.: entre Vladsloo et Beerst (Kickx). Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque), Villers-la-Ville, Virginal (Dens et Piet.). Flandres (Kickx.). Lx.: Rochehaut (Del.), Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), Libin, Samrée (Él. M.), Viel-Salm (G. L.), Baraque de Fraiture (G. L.). Ht: Jurbise, Camp de Casteau (G. L.). N.: Louette-St-Pierro (Λub.), Λrbre (Êl. M.).
- 25 C. papillaria (Ehrh.) Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 117; Wainio Monog. Clad. I (1887) p. 48.

Lichen - Ehrh. Phytophyl. (1780) n. 100.

Papillaria ventricosa Kicka Fl. Louv. (1835) p. 104.

- th.: Zolder, Stockroy, Lummen, Genck (Dens et Piet.). A.: env. de Tongerloo (Van Haes.). Ht: Masnuy (Él. M.), Camp de Casteau (G. L.). N.: Godinno (Tonglet).
- 26 C. pityrea (Floerke) Fries Nov. Sched. crit. (1826) p. 21; Wainio Monog. Clad. II p. 349.

Cenomyce - Ach. Syn. Lich. (1814) p. 254.

Capitularia — Floerke in Berl. Magaz. II (1808) p. 135.

Cladonia pyxidata var. — Nyl. in Le Jolis Lich. Cherb. (1859) p. 17; Kickx Fl. crypt. I p. 249.

C. degenerans var. pityrea Schaer. Lich. Helv. Spic. (1833) p. 304.

Ht: Maisières (G. L.). — A.: Gierle (Paque). — Fl. or.: Ledeberg, Lovendeghem (Coem.). — N.: Arbre, Spontin (Él. M.), Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Linden, Vlierbeeck, Vieux-Héverlé (François). — Lx.: Laroche (Él. M.), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer). — Fl. occ.: Mariakerke (Coem.).

27 C. pyxidata (L.) Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 121; Wainio Monog. Clad. II p. 209; Kickx. Fl. crypt. I p. 249.

Lichen - L. Spec. plant. Il (1753) p. 1151 p. p.

Cenomyce - Ach. Lich. Univ. (1810) p. 534; Kicka Fl. Louv. p. 79.

- N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), env. de Namur (Bell.), Han, Rochefort (Aigret), Vallée du Bocq (Él. M.). Fl. or.: env. de Gand et d'Alost (Kickx). Bt: Groenendael (Él. M.), env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (A. D.), env. d'Ottignies (Él. M.). A.: env. de Turnhout (Paque). Lx.: Villance, Lesse, Maissin, (A. D.), Vallée de l'Ourthe (Él. M.), env. d'Arlon (Paque), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), env. de Bastogne (Germain), env. de St-Hubert (Van Bastelaer).
 - var. chlorophaea (Gaudich.) Floerke Clad. Comm. (1828)
 - p. 70; Wainio Monog. Clad. II p. 232; Kickx Fl. crypt. I p. 249. Cenomyce Gaudich. in Mirbel Rapp. Fl. Mal. (1825) p. 97.

Cladonia fimbriata var. carpophora Rabenh. Krypt. Fl. ed. I (1845) p. 108.

N.: Mariembourg (G. L.). — Fl. or.: Lokeren (Paque), Meirelbeke, Lemberge (Coem.). — Fl. occ.: Ypres (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), entre Rochehaut et Cornimont (Del.). — A.: Vosselaer (Paque). — Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque).

C. pyxidata var. neglecta (Floerke) Mass. Sched. crit. (1855) p. 82; Wainio Monog. Clad. II p. 226.

. Capitularia - Floerke Beschr. Braunfr. Bescherfl. (1810) p. 306.

Cladonia - Spreng. in Linn. Syst. Veg. IV (1827) p. 273.

Cenomyce pyxydata var. staphylia Ach. Syn. Lich. (1814) p. 252; Wainio loc. cit. p. 231.

C. fimbriata var. - Ach. (Ubi?).

Bt: Court-St-Étienne (Dens et Piet.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Neufchâteau, Nolinfaing, Petit-Voir (Verheggen).

— var. pocillum (Ach.) Flot. in Linnaea (1843) p. 19; Wainio Monog. Clad. II p. 241; Kickx Fl. crypt. I p. 249.

Bacomyces - Ach. Meth. Lich. (1803) p. 336.

Cenomyces gonorega Kickx Fl. Louv. p. 80.

N.: Olloy (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.), Vallée de la Meuse C. (Tonglet).

— Fl. occ.: Lombartzyde (Kickx), env. d'Adinkerke (Piré). — Bt: Pellenberg (Kickx). — Lx.: Warmifontaine, Neufchâteau (Verheggen).

28 C. rangiferina (L.) Web. in Wiggers Prim. Fl. Hols. (1780) p. 90; Kicka Fl. Louv. p. 77; Kicka Fl. crypt. I p. 255.

Lichen — L. Sp. plant. (1753) p. 1153 p. p.

C. rangiferina var. gigantea Ach. Lich. Univ. (1810) p. 565.

Ht: Ghlin. Casteau, Stambruges, Erbisoenl, Angre (G. L.). — Fl. or.: Meirelbeke, Renaix (Kickx). — Lx.: Chompré (Van Bastelaer), env. de Villance (A. D.), env. de Bouillon (Del.), Waltzing (Paque), Viel-Salm, Bouillon, Baraque de Fraiture (G. L.), Maissin (Aigret et Dolisy). — Bt: env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (A. D., Kickx). — A.: Vosselaer, Weelde (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Bouvignes (Tonglet), env. de Namur (Bell.). — Lg.: Baraque-Michel (G. L.), Spa (Nob.).

- 29 C. rangiformis Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 114; Wainio Monog. Clad. I p. 357.
 - var. foliosa (Floerke) Wainio Monog. Clad. I (1887) p. 366.
 Cenomyces raugiformis var. Floerke Deutsch. Lich. VIII (1821) p. 15.
 C. pungens var. foliosa Delise in Duby Bot. Gall. II (1830) p. 622.
 - N.: Bouvignes (Tonglet), Louette St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).
 - var. muricata (Del.) Arn. Fl. (1884) p. 88; Wainio Monog. Clad. I p. 369.

Cenomyce — Del. in Duby Bot. Gall. (1830) p. 622.

Cladonia furcata var. pungens f. muricata Oliv. Étud. Clad. (1885) p. 237.

- A.: Weelde, Raevels, entre Turnhout et Raevels (Paque). Lx.: Waltzing, Claire-Fontaine (Paque), Laroche (Dens et Piet.). Fl. occ.: Dunes (Coem.), env. d'Adinkerke (Piré). N.: Hastière-Lavaux (Dens et Piet.).
- var. pungens (Ach.) Wainio Monog. Clad. I (1887) p. 361.
 Lichen Ach. Lich. Suec. Prod. (1798) p. 202.

- Cladonia pungens Ach. Lich. Suec. Prod. (1798) p. 202 sec. Wainio loc. cit., Kickæ Fl. Louv. p. 77.
- C. furcata var. pungens Ach. Lich. Univ. (1810) sec. Fries Lich. Eur. p. 230; Kickw. Fl. crypt. I p. 255.
- F1. or.: Ledeberg, Meirelbeke (Kickx), Lokeren (Paque). B1: Grez (Kickx), Kessel-Loo (Paque). A.: Vosselaer (Paque). Lx.: env. d'Arlon (Paque). env. de Viel-Salm, Champré (Van Bastelaer). N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). Lg.: Huy (Mansion). H1: Angre (G. L.).
- 30 C. squamosa (Scop.) Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 125; Wainio Monog. Clad. I p. 411; Keckw Fl. crypt. I p. 253.

Lighen - Scop. Fl. Carn. II ed. 2 (1772) p. 368 p. p.

- C. squamosa var. ventricosa Fries Lich. Eur. (1831) p. 231.
- C. squamosa var. microphylla Rabenh. Deutschl. Krypt. Fl. (1845) p. 102.
- C. squamosa subsp. O. sparassa Ach. Lich. Univ. (1810) p. 556.
- Bt: Forêt de Soignes (Dens et Piet.), Eegenhoven (Paque). N.: Olloy, Erpion (Dens et Piet.), Louette-St-Pierre (Aub.), Godinue (G. L.), Wanlin (Aigret), Bouges (Bell.). Ht: (Dens et Piet.). Lx.: Laroche (Él. M.), Hives, Maboge (Dens et Piet.). env. de Viel-Salm, Marche (Aigret), Frahan, Rochehaut (Del.), Samrée (Troch et G. L.), Maissin (Aigret et Dolisy), Neufchâteau, Straimont (Verheggen). Fl. or.: Meirelbeke, Lovendeghem (Coem.).
 - var. denticollis (Hoffm.) Wainio Monog. Clad. I (1887)
 p. 421.

Cladonia - Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 125.

C. squamosa var. asperella Floerke Clad. Comm. (1828) p. 132.

Lx.: Dohan (Dens et Piet). - Lg.: Heid, Stavelot (Aigret).

- var. multibrachiata (Floerke) Wainio Monog. Clad. I (1887) p. 437.

Cladonia squamosa B asperella B. multibrachiata Floerke Clad. Comm. (1828) p. 133.

- Lx.: Straimont (Verheggen). N.: Profondeville (Tonglet).
- 31 C. subcariosa Nyl. in Flora (1876) p. 560; Wainio Monog. Clad. I p. 38.

Cladonia alcicornis var. firma Coem. Clad. Belg. (1863) r. 11-13. Sine loco (Coem.).

32 C. sylvatica (L.) Hoffm. Deutsch. Fl. II (1796) p. 114; Wainio Monog, Clad. I p. 18.

Lichen rangiferinus B. sylvaticus L. Sp. plant. (1753) p. 1153 p. p.

var. portentosa (Duf.) Wainio Monog. Clad. I (1887) p. 32.
 Cenomyce — Duf. Rév. Clad. (1817) p. 29.
 Cladonia sylvatica var. erinacea Desm.; Kickw Fl. Louv. (1835) p. 256.

Coemans in Clad. Belg. n. 165. - Bt.: env. de Louvain (Kickx).

C. sylvatica var. sylvestris (Oed.) Wainio Monog. Clad. (1887) p. 20.

Lichen rangiferinus var. sylvestris Oed. in Fl. Dan. III (1770) p. 4 t. 539.

C. sylvatica Hoffm.; Kickx Fl. Louv. p. 77.

Lichen rangiferinus B. sylvaticus L. Sp. plant. (1753) p. 1153 p. p.

C. rangiferina var. sylvatica Wallr.; Fries Lich. Eur. (1831) p. 243; Kickx Fl. crypt. I p. 256.

- N.: Couvin (G. L.). A.: Vosselaer, Weelde (Paque). Flandres (Kickx). Bt: env. de Louvain (Kickx), Héverlé (Paque). Lx.: env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), Waltzing (Paque), Lesse, Maissin (A. D.), env. de Bastogne (Germain), env. de Bouillon (Del.). Ht: Bois d'Angre, Flobecq, Renaix, Ellezelles (G. L.).
- 33 C. uncialis (L.) Web. in Wiggers Prim. Fl. Hols. (1870) p. 90 n. 995 p. p.; Wainio Monog. Clad. I p. 254; Kickx Fl. Louv. p. 78; Kickx Fl. crypt. I p. 256.

Lichen - L. Spec. plant. (1753) p. 1153 p. p.

- C. biuncialis Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 116.
- C. uncialis var. dicraea f. depressa Rabenh.
- C. stellata var. depressa Rabenh. Lich. Eur. exs. X (1857) n. 263; cf. Wainio Monog. Clad. I p. 267.
- Ht: Angre, Stambruges, Grandglise, Ville-Pommerœul, Beaudour, Maisières, Flobecq (G. L.). Lg.: Spa (Nob.). N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). Lx.: Chompré (Van Bastelaer), Viel-Salm (Aigret), Longlier (Verheggen), env. d'Arlon (Paque), Villance (A. D.), Tontelange (G. L.), Bonnert (Lemoine). Fl. or.: Lokeren (Paque), Meirelbeke, Lemberge (Coem.) A.: Vosselaer, Weelde (Paque), Hérenthals, Everboden (Kickx). Lb.: Genck (Paque). Bt: Linkebeek (Kickx).
- var. turgescens Delise in Duby Bot. Gall. (1830) p. 620; cf. Wainio Monog. Clad. I p. 265.

Lx.: Baraque de Fraiture (G. L.).

- 34 C. verticillata (Hoffm.) Schaer. Lich. Helv. Spic. (1823) p. 31; Wainio Monog. Clad. II p. 176.
 - C. pyxidata subsp. C. verticillata Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 122.
 - var. cervicornis (Ach.) Floerhe Clad. Comm. (1878) p. 29; Wainio Monog. Clad. II p. 187.

Lichen — Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 184.

Cladonia - Flot. Lich. Fl. Siles. (1849) p. 31 p. p.

Cenomyce cervicornis subsp. C. prodiga Ach. Lich. Univ. (1810) p. 532.

- Lb.: Zolder, Stockroy, Lummen (Dens et Piet.). Lx.: Laroche (Dens et Piet.), Nenfchâteau, Mont-Plainchamps (Verheggen), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Vyle (G. L.). N.: Han, Wanlin (Aigret), Bouvignes, Moniat (Tonglet), Olloy (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.), Hastière, Waulsort, Anthée (Dens et Piet.). Fl. or.: Renaix (Coem.).
- - var. evoluta Th. Fries; Wainio Monog. Clad. II p. 177.
 - C. verticillata Th. Fries Lich. Arct. (1860) p. 149a.
 - C. verticillata var. evoluta Stein Flecht. Schles. (1879) p. 49.

- Cenomyce allotropa subsp. C. verticillata Ach. Lich. Univ. (1810) p. 555; Kickx Fl. Louv. p. 79.
- C. cervicornis var. verticillata Flot. Lich. Fl. Siles. (1849) p. 3. p. p.; Kickv Fl. crypt. I p. 253.
- Lx.: Dohan, Laroche (Dens et Piet.), Viel-Salm, Salm-Château (Aigret), Herbeumont, Frahan, Rochehaut (Del.).—A.: Cuytehoeven (Westerloo) (Westet Van Haes.).—N.: Mariembourg (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Bell.).—Fl. or.: Meirelbeke (Kickx).—Bt: env. de Louvain (Kickx).
 - 59 STEREOCAULON Schreb. Gen. Pl. (1791) p. 768; Crombie Brit. Lich. I p. 116.
- 1 S. alpinum Laur. in Fries Lich. Eur. (1831) p. 204; Crombie Brit. Lich. I p. 119.

S. tomentosum var. — Crombie Lich. Brit. (1870) p. 17.

Lx.: Straimont (Verheggen).

- 2 S. condensatum Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 130; Crombie Brit. Lich. I p. 121.

 Lb.: Lommel (Dumont).
- 3 S. coralloides *Fries*. Lich. Suec. exs. (1817) n. (1817) n. 118; *Crombie* Brit. Lich. I p. 117.

Lg.: Marchain (Mansion), Stavelot, Francorchamps (Aigret). — Lx.: Viel-Salm (G. L.), Herbeumont (Del.). — N.: Couvin (G. L.).

4 S. paschale (L.) Fries Stirp. Femsj. (1825) p. 35; Kicka Fl. crypt. I p. 258; Crombie Brit. Lich. I p. 118.

Lichen - L. Sp. plant. (1753) p. 1153 p. p.

Fl. occ.: Gheluvelt (Amare). — N.: Willerzie (Del. et Gravet). — Lx.: Herbeumont (Del.).

- 5 S.pileatum Ach. Lich. Univ. (1810) p. 582; Crombie Brit. Lich. Ip. 122.
 S. cereolinum Ach. Syn. (1814) p. 285.
 Lx.: (Dumont).
- 6 S. tomentosum Fries Sched. Crit. III (1824) p. 20 p. p.
 - var. incrustatum (Floerke) Schaer. Spic. (1823) p. 276.
 S. incrustatum Floerke Lich. Dentsch. (1819) n. 77; Kicker Fl. Louv. p. 76.
 A.: Bonheyden (Kickx).
 - 60 LEPROCAULON Nyl. ex Lamy in Bull. Soc. bot. Fr. t. XXV (1878) p. 352; Orombie Brit. Lich. I p. 123.
- 1 L. nanum (Ach.) Nyl. ex Lamy in Bull. Soc. bot. de Fr. t. XXV (1878) p. 352; Crombie Brit. Lich. I p. 123.

Stereocaulon — Ach. Meth. (1803) p. 315.

Lg.: (Dossin). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Bouillon (Dens et Piet.), Frahan (Del.).

USNEAE

- RAMALINA Ach. Lich. Univ. (1810) p. 122; Crombie Brit. Lich. I p. 186.
- R. calicaris (Hoffm.) Nyl. in Bull. Soc. Linn. Norm. sér. 2 IV (1870)
 p. 131; Kickx Fl. crypt. I p. 209; Crombie Brit. Lich. I p. 187.

Lobaria - Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 139 p. p.

Fl. occ.: Mariakerke (Coem.). — Lg.: Modave (G. L.). — Bt: Nivelles, Moustreux (Dens et Piet.). Groenendael. Boitsfort (A. D.), Limelette, Rixensart, Malaise (Él. M.). — Lx.: Villance, Poix, Herbeumont (A. D.), Laroche (Él. M.), Pont de Lagland, Arlon (G. L.), Mortehan, entre Bouillon et Cordemoy (Del.). — N.: Spontin (Él. M.).

2 R. farinacea (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 606; Kickx Fl. Louv. p. 75; Crombie Brit. Lich. I p. 189.

Lichen - L. Sp. plant. (1753) p. 1146.

R. caliaris var. farinacea - Kicka Fl. crypt. I p. 210.

- Ht: Angre (G. L.). Lg.: Lens-St-Remy (Paque), Modave, Hockay (G. L.). Bt: Groenendael (cfl. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), Limelette, Laroche, Malaise (El. M.), env. de Louvain (Kickx). N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Spontin (Él. M.), Walzin, Dinant (G. L.), env. de Namur (Bell.). Lx.: env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Laroche (Él. M.), Viel-Salm (G. L.), env. de Bastogne (Germain), Frahan, entre Bouillon et Cordemoy (Del.), Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen). Flandres (Kickx).
- var. multifida Ach. Lich. Univ. (1810) p. 607; Kickw Fl. crypt.
 I p. 210.

R. calicaris var. — Nyl. Lich. Scand. (1861) p.

Bt: Eegenhoven (Paque). - Fi. or.: Destelbergen (Kickx).

3 R. fastigiata (Pers.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 603 p. p.; Kickx Fl. Louv. p. 76; Crombie Brit. Lich. p. 192.

Lichen — Pers. in Ust. Ann. (1794) p. 256.

R. fraxinea var. — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 38; Kickx Fl. crypt. I R. calicaris var. — Mudd Man. (1867) p. 73; Kickx Fl. crypt. I p. 210. p. 211.

R. fastigiata var. exasperata Kickx Fl. Louv. (1835) p. 76.

N.: St-Servais, Dinant (G. L.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François). — Lx.: env. de Bastogne (Germain), Paliseul, Ochamps, (A. D.), Bouillon, Arlon, Metzert (G. L.), environs de St-Hubert (Van Bastelaer), environs de Bouillon (Del.), Neufchâteau, Mont Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen). — Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque), Groenendael. Boitsfort, Tervueren (A. D.), environs de Louvain (Kickx). — Lg.: Spa (Nob.), Modave (G. L.). — Ht: Leuze, Maisières, Casteau, (G. L.). — Fl. or.: environs de Gand et d'Audenarde (Kickx).

4 R. fraxinea (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 602; Crombie Brit. Lich.

I p. 190; Kicka, Fl. Louv. p. 75; Kicka Fl. crypt. I p. 210.

Lichen — L. Sp. plant. (1753) p. 1146.

R. calicaris var. — Ach. (?).

Ht: Angre, Leuze, Blicquy, Casteau, Belœil (G. L.). — Fl. or.: Neder-Eenaeme (Nob.). — Flandres (Kickx). — Bt: Groenendael (El. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Kickx, Paque), env. de Bruxelles (A. D.), Court-St-Étienne (Nob.). — Lg.: Ambresin (Paque), Spa (Nob.). — A.: Gierle, Vosselaer (Paque). — Lx.: env. d'Arlon (Paque). Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), env. de Laroche (Él. M.), Viel-Salm, Bouillon (G. L.), env. de Bouillon (Del.). — N.: Louette St-Pierre (Aub.), Dinant (G. L.), env. de Namur (Bell.).

- var. ampliata Ach. Lich. Univ. (1810) p. 603; Kicke Fl. crypt. I p. 211; Crombie Brit. Lich. I p. 191.

Parmelia fraxinea var. — Ach. Meth. (1803) p. 259.

Ramalina fraxinea var. crispata Kickw Fl. Louv. (1835) p. 75.

Bt: Héverlé (Paque), env. de Louvain (Kickx). — Flandres (Kickx). — Lx.: Paliseul (A. D.), env. de Bastogne (Germain).

5 R. pollinaria (Westr.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 608; Kicke Fl. Louv. p. 75; Kicke Fl. crypt. I p. 211; Crombie Brit. Lich. I p. 194.

Lichen - Westr. in Vet. Ak. Handl. (1795) p. 56.

- A.: Zeverdonck (G. L.), env. de Malines (Kickx). N.: Bonneville (Delhaise), Forêt, Olloy (Aigret et François), St-Servais (G. L.), Hastière-parde-là (Dens et Piet.). Bt: Groenendael (Él. M.); entre Vilvorde et Bergh (Del.), Boitsfort, Tervueren (A. D.), Court-St-Étienne (Nob.), Nivelles (Dens et Piet.). F1. or.: Neder-Eenaeme (Nob.), Melle, Gontrode (Coem.) Lx.: Laroche (Dens et Piet.). Ht: Stambruges (G. L.).
- var. monophylla Coem. ex Kicka Fl. crypt. I 1867 p. 211. Fl. occ.: Knocke (Coem.).
 - 62 EVERNIA Ach. Lich. Univ. (1810) p. 84; Crombie Brit. Lich. I p. 228.
- 1 E. furfuracea (L.) Fries Lich. Eur. (1831) p. 26; Crombie Brit. Lich. I p. 230.

Lichen — L. Sp. plant. (1753) p. 1146.

Borrera — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 500; Kickx Fl. Louv. p. 84.

Physcia — DO. Fl. fr. II (1805) p. 396.

Bt: Boitsfort (A. D.), Bousval, Tilly, Braine-l'Alleud (Dens et Piet.), entre Kiesecom et Lubbeck (Kickx). — Lx.: Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Villance, Ochamps, Libramont (A. D.), Vielle (Él. M.), Viel-Salm, Arlon, Metzert, Baraque de Fraiture (G. L.), Sesselich, Toernich (Paque), env. de Bastogne (Germain), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), env. de Bouillon (Del.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Hastière, Hives (Dens et Piet.). — Lg.: Spa (Nob.), Baraque-Michel (G. L.). — Ht: Stambruges, Casteau (G. L.).

2 E. prunastri (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 442; Kickx Fl. crypt. I p. 213.

Lichen — L. Sp. plant. (1753) p. 1147.

Evernia — et Evernia vulgaris Ach. loc. cit. (1810).

Physcia — DC. Fl. fr. II (1805) p. 397.

Ramalina — Chev. Fl. Paris I (1836) p. 607; Kickx Fl. Louv. p. 76.

Evernia - var. caespitosa Kickx Rech. cent. III (1846) p. 11.

- Ht: Angre (G. L.), Stambruges, Casteau, Belœil, Leuze, Bois d'Angre (G. L.).—Lg.: Spa (Nob.).—Flandres (Kickx).—N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Anseremme, Pont à-Lesse, Dinant (G. L.).—Bt: Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain, Waremme (Paque), env. de Bruxelles (A. D., Él. M.).—A.: env. de Turnhout (Paque).—Lb.: env. de Tongres (Paque).—Lx.: env. d'Arlon (Paque), Villance, Lesse, Poix, Paliseul (A. D.), env. de Laroche (Él. M.), Metzert (G. L.), env. de Bastogne (Germain), Chompré, env. de St-Hubert (Van Bastelner), Neufchâteau, Straimont, Nolinfaing (Verheggen).—N.: Olloy (Aigret et François), env. de Namur (Bell.).
- var. platyphylla Wallr. Fl. crypt. Germ. I (1831) p. 491.
 N.: Dave, Wagnée (Bell.).
- var. arenaria Fries; Kicka Fl. crypt. I p. 213. Flandres (Kicka).
- f. retusa Ach. Lich. Univ. (1810) p. 443; Crombie Brit.
 Lich. I p. 250; Kickx Fl. crypt. I p. 214.

Parmelia prunastri var. retusa Ach. Meth. (1803) p. 257.

Bt: env. Louvain, Waremme (Paque). — Lb.: Tongres (Paque). — A.: Turnhout (Paque). — Lx.: Arlon (Paque).

- 63 ALECTORIA Ach. Lich. Univ. (1810) p. 592 p. p.; Crombie Brit. Lich. I p. 208.
- A. bicolor (Ehrh.) Nyl., in Mém. soc. Cherb. (1857) p. 98; Crombie Brit. Lich. I p. 214.

Lichen - Ehrh. Beitr. III (1789) p. 82.

Bryopogon jubatum var. — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 5.

Lx.: env. de Bouillon (Del.), Laroche (Dens et Piet.).

2 A. chalybeiformis (Ach.) Nyl. ex Crombie in Grevillea XV (1886) p. 48; Crombie Brit. Lich. I p. 212.

A. jubata var. — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 592.

Cornicularia jubata var. - L. ex Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 5.

Lx.: Rochers du Petit-Moulin près Bastogne (Germain).

3 A. jubata (L.) Nyl. ex Crombie in Journ. of Bot. (1872) p. 233; Crombie Lichen — L. Sp. plant. (1753) p. 1155.

Parmelia - Ach. Meth. (1803) p. 272.

Cornicularia - Chev. Fl. Paris I (1836) p. 602.

- N.: Gedinne (Troch), Louette-St-Pierre (Aub.). Lx.: Rochehaut (Del.), Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen). Maissin, Paliseul (A. D.), Metzert (G. L.), entre Samrée et la Baraque de Fraiture (Troch et (G. L.).
- var. prolixa (Ach.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 5.
 Cornicularia jubata var. Ach. Lich. Univ. (1810) p. 592.

Lx.: Bois d'Azy, de Luzery (Germain).

4 A. implexa (*Hoffm.*) Nyl. ex Norrl. in Med. Soc. pro Fauna et Flora Fenn. I (1876) p. 14; Crombie Brit. Lich. I p. 213.

Usnea - Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 134.

Alectoria jubata var. prolixa f. cana Ach.; Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 5. Alectoria — Leight. Lich. Fl. p. 88.

Lg.: Stavelot (Aigret). — Lx.: Laroche (Deus et Piet.), Bois de Majeret (Germain).

USNEA Dill. Musc. (1741) p. 56 p. p.; Crombie Brit. Lich. I p. 201.

1 **U. articulata** (*L.*) *Hoffm*. Deutsch. Fl. II (1795) p. 135; *Crombie* Brit. Lich. I p. 206.

Lichen — L. Sp. plant. (1753) p. 1156.

Usnea barbata var. — Ach. Meth. Lich. (1803) p. 313.

Lx.: env. de Bouillon (Del.), Chompré (Van Bastelaer), Paliseul, Framont (A. D.), Pont de Lagland (G. L.), St-Mard (Dens et Piet.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Linden (Leburt.).

2 U. ceratina (Huds.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 610; Crombie Brit. Lich. I p. 205.

Lichen - Huds. Fl. angl. (1762) p. 461.

Lx.: Nolinfaing (Verheggen), env. de Bastogne (Germain).

3 U. dasypoga (Ach.) Nyl. ex Stiz. in St-Gall. Nat. Gesell. (1876) p. 201; Crombie Brit. Lich. I p. 203.

Usnea barbata var. — Ach. Meth. (1803) p. 312.

Lx.: Nolinfaing, Mont-Plainchamps (Verheggen), St-Mard (Dens et Piet.), Samrée (Troch et G. L.).

 — var. plicata (Ach.) Nyl. in Flora (1885) p. 299; Crombie Brit. Lich. I p. 204.

Lichen - Ach. Prod. (1798) p. 225.

Usnea - Ach. Meth. Lich. (1803) p. 316.

Usnea barbata var. - Kickx Fl. Louv. (1835) p. 74.

Bt: Hoeylaert, Waterloo (Kickx). — N.: citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Paliscul, Framont, Villance (A. D.), Pont de Lagland (G. L.), Neufchâteau, Straimont (Verheggen).

4 U. florida (L.) Ach. Meth. (1803) p. 307; Crombie Brit. Lich. I p. 202; Kickx Fl. Louv. p. 74; Kickx Fl. crypt. I p. 208.

Flandres (Kickx). — Lx.: Chompré (Van Bastelaer). — Bt: Dohan, Botassart (Dens et Piet.), Pellenberg, Lubbeck, Boitsfort (Kickx). — N.: Gedinne (Tonglet), env. de Ciney (Aigret), Villance, Paliseul (A. D.), Pont de Lagland (G. L.), Neufchâteau (Couturier), env. de Bastogne (Germain), env. de Bouillon (Del.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. villosa Ach.; Kickx Fl. Crypt. I p. 208.

Fl. or. : Renaix (Coem.).

5 **U. hirta** (L.) Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 133; Crombie Brit. Lich. I p. 203.

Lichen - L. Sp. plant. (1753) p. 1155.

Usnea florida var. hirta Ach. Meth. Lich. (1803) p. 309.

Usnea barbata var. - Fries; Kickx Fl. crypt. I p. 208.

Bt: env. de Louvain (Paque), Groenendael (A. D.), Nivelles, Tilly (Dens et Piet.). — Ht: Stambruges, Augre (G. L.). — Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx), Houthulst (Kickx). — Lx.: env. d'Arlon (Paque), Frahan, Bouillon (Del.), Neufcháteau, Longlier. Nolinfaing (Verheggen), Laroche (Dens et Piet.), Louette-St-Pierre (Aub.), Godinne (G. L.).

Obs. — On a signalé l'U. barbata dans les localités suivantes:

Ht: Stambruges (G. L.). Angre (G. L.). — Bt: Groenendael (G. L.). — Lx.: cnv. de Neufchâteau (Verheggen), Samrée (Él. M.), Paliseul, Framont, Villance (A. D.), env. de Bastogne (Germain).

Mais comme cette espèce a été démembrée en U. hirta, florida et dasypoga, nous ne pourrions savoir à laquelle de ces trois espèces il faut rapporter ces localités.



TABLE DES GENRES

ADMIS

DANS LE VOLUME I

Acanthostigma .		324	Bacidia	475	Carlia	260
Acetabula		383	Bacillus	24	Castagnea	179
Achlya		200	Bacterium	23	Catenella	189
Achnanthes		71	Bactrospora	453	Catolechia	480
Achnanthidium.		71	Badhamia	2	Cenangella	433
Acolium		455	Baeomyces	474	Cenangium	431
Acrospermum .		370	Bangia	180	Cenococcum	229
A 11 2		115	Barlaea	388	α .	184
Actinocyclus Actinoptychus .	٠	114	Batrachospermum.	181	0 1 1	151
A glacenene	٠	318	43 45° 2 "	111	CI II	32
Aglaospora		175	Bellerochea	422	0 1 1	80
Alaria	•	535		422		326
Alectoria	٠		Belonium	62	Ceratosphaeria	
Amaurochaeta .	۰	7	Berkeleya		Ceratostoma	242
Amphipleura		62	Bertia	278	Ceratostomella	258
Amphipropra.		66	Biatora	477	Ceriospora	301
Amphisphaeria.	٠	296	Biatorina	477	Cetraria	519
Amphora		32	Biddulphia	111	Chaetoceros	106
Amphoridium .		377	Bilimbia	476	Chaetocladia	204
Amylocarpus		230	Bisporella	421	Chaetomium	243
Anabaena		16	Blitrydium	452	Chaetomorpha	165
Anaulus		111	Bodo	29	Chaetonema	161
Ancylistes		211	Bombardia	251	Chaetophora	159
Anixia		225	Bommerella	244	Chaetosphaeria	310
Anthophysa		28	Bostrychia	191	Chaetosphaeridium	161
Anthostoma		252	Botrydium	167	Chaetostylum	203
Anthostomella .		252	Botryococcus	154	Chantransia	182
Anthithamnion .		183	Botryosphaeria	264	Chara	169
Aphanizomenon.	·	17	Boudierella	424	Characium	151
Aphanomyces .		200	Brefeldia	8	Chilomonas	30
Aphanothece.	٠	14	Bremia	195	Chilonectria	340
Apiosporium.		225	Bryopsis	168	Chitinospora	301
Aponectria		317	Buellia	474	Chlamydomonas .	145
Arcyria		9	Bulbochaete	164	Chlorogonium	31
Arthonia	۰	455	Bulgaria	437	Chlorosplenium.	405
A 15	*	376	Dangara		Chondrioderma.	4
4 24 75 11	۰	457			CII I	185
Arthothelium . Arthrocladia	٠	178	Calicium . :	454	Chromophyton	30
4 12 2	٠	128	Calletum . :	183	C1 1 1 1 11	187
A - 1 1	٠	424	Calloria	437		214
Ascobolus	٠	424		484	Chytridium	396
Ascophanus	٠		Callopisma	348	Ciboria	214
Ascophyllum		176	Calonectria		Cladochytrium	520
Asperococcus		175	Calosphaeria	231	Cladonia	
Asterina		226	Calospora	327	Cladophora	165
Asterionella		84	Calothrix	19	Cladostephus	173
Asterocystis		207	Campylodiscus	96	Clathrocystis	13
Auliscus		113	Campylosira	87	Clathroptychium .	8
Aulographum .		362	Capnodium	227	Claviceps	350

Closterium	117	Diatrype		240	Fabraea		446
	309	Diatrypella		241	Farlowia		362
Clypeosphaeria						•	185
Coccocarpia	503	Dichaena		365	Fastigaria		
Coccomyces	446	Dictydium		8	Fenestella		334
				153	Fracchiaea		231
Cocconeis	74	Dictyosphaerium					
Coelastrum	147	Dictyostelium .		12	Fragilaria		84
	230	Dictyota		180	Fucodium		177
Coelosphaeria				200	Fucus		177
Coelosphaerium	13	Dictyuchus			Fucus	•	
Coleochaete	164	Didymella		274	Fuligo		3
				5	**		
Collema	459	Didymium					
Collemodium	461	Didymosphaeria		294			
	370	Dilophia		338	Galactinia		387
Colpoma				88	Genea		229
Comatricha	7	Dimerogramma.					
Comesia	419	Dimerosporium.		226	Geoglossum		382
	200	Dinobryum		31	Geopyxis		381
Completoria		Dinouryum	4	_	Cibbana		281
Conferva	158	Diplotomma		473	Gibbera		
Coniocybe	453	Discina		386	Gibberella		349
		Discitive,	•	123	Gibberidea		318
Coprolepa	248	Disphinctium .				*	
Corallina	192	Ditopella		263	Gigartina		185
Cotatilio		Diterin		107	Glenodinium		32
Cordyceps	351	Ditylum				•	154
Coronellaria	406	Docidium		122			
	232	Donkinia		63	Gloiotrichia		20
Coronophora	-	Donkina		355	Gloniella		365
Coryne	438	Dothidea					
Coscinodiscus	115	Dothidella		354	Gloniopsis		366
en a		Dottifuella		448	Glonium		363
Cosmarium	124	Dothiora					
Craterium	3	Draparnaldia		160	Gnomonia		276
Chilerents	9	Dame - 4°		185	Gnomoniella		259
Cribraria		Dumontia			Godronia	-	434
Cryptoderris	326	Durella		450			
Cryptodiscus	440				Gomphonema .		67
Cryptourscus					Gomphosphaeria		13
Cryptomonas	30						138
Cryptosphaeria	239	Ectocarpus		172	Gonatyzogon, .		
Cryptosphac ia					Goniocarpon		379
Cryptospora	330	Ectrogella		208	Goniotrichum .		192
Cryptosporella	265	Elachista		173			
	240	Elaphomyces .	•	228	Gonium		145
Cryptovalsa					Gorgoniceps		423
Crumenula	434	Eleutheromyces		310			
Cucurhitaria	332	Empusa		200	Gracilaria		188
		Empusa			Grammatophora		91
Cyathicula	404	Enchnoa		230	Chambia		466
Cyclotella	109	Enchnosphaeria		324	Graphis		-
Culindananan	162	The owner own		37	Griffithsia		184
Cylindrocapsa		Encyonema			Gyalecta		500
Cylindrospermum.	17	Endocarpon		377	Cyarocta		
Cylindrotheca	106	Endogone		230	Gymnoascus		217
	93	Tindogono	٠		Gymnogongrus.		186
Cymatopleura		Endomyces		217	Gymnozyga		138
Cymatosira	86	Endopyrenium .		371			
Cymbella	35	Enteridium		8	Gyrometra		380
					Gyrophora		503
Cyphelium	454	Enteromorpha .		156	GJIOPHOIW		00
Cystoclonium	186	Entophlyctis		213			
	193	Enichles	•	352			
Cystopus		Epichloe			Unamatagaggg		145
Cystoseira	178	Epicymatia		277	Haematococcus.		
*		Epithemia		75	Halidrys		178
		Epithemia			Hantzschia		97
		Eremosphaera .		151	Hantaschia		10
Daldinia	257	Erinella		423	Hapalosiphon .		18
Dansen		Friegraphoppie		281	Helminthosphaeria	ì	244
Dasya	1371	Eriosphaeria			Holotiella		491
Dasyscypha	416	Erysiphe		222	Helotiella		46:
Delesseria		Euastrum		128	Helotium		397
		Discourse .			Helvella		
Delitschia		Eucampia		111			
Denticula	91	Eudorina		146	Hemiarcyria		11
Dermatea	430	Euglena		29	Hercospora		282
							158
Dermatella	421	Eunotia		77	Herposteiron	0	
Dermatocarpon	371	Eupodiscus		113	Herpotrichia		311
				224	Heteromita	П	29
Desmarestia	175	Eurotium				•	
Desmidium	136	Eurvachora		354	Heterosphaeria.		149
	80	17		238	Himanthalia		177
Desmogonium						*	
Detonia	386	Eutypella		236	Hormiscia		157
Diachaea	6	Evernia		534	Humaria		389
							110
Diaporthe	282	Exoascus		216	Hyalodiscus		
Diatoma	90				Hyalotheca		137
					-		

Hydnobolites.			229	Lomentaria.			189	Nephromium			501
Hydnotrya .			229	Lonhidium	-		361	Niptera		•	4.07
Hydrodiction.	•	٠	140	Lophidium . Lophiosphaer		•	1)~~	Miptera	•		421
Trade alacation.	•	•	140	горинозрцает.	la.	٠	357	Nitella			170
Hydrolapatha		•	188	Lophiostoma.			359	Nitophyllum.			188
Hydrarus			31	Lophiotrema.			35S	Nitzschia Nodularia			97
Hypocopra .		_	246	Lophium			369	Nodularia			12
Hypocrea			217	Lophodermiu	· ·			Manta a			17
Ham de		۰	0.17	Pobitogerung	ш.		307	Nostoc			15
Hypodermium				Lycogala			10	Nummularia.			258
Hypomyces .			341	Lyngbya			14				
Hyponectria.			340	9 0 9							
Hypospila								Ossilania			4130
				3.6				Ocellaria			
Hypoxylon .				Macropodiscus	8 .		389	Odontotrema.			441
Hysterium .			363	Marchaliella.			226	Oedogonium.			162
Hysterographi	inm		366	Massaria			299	Olpidiopsis .			
		•	400	Massariella .				Olmidium.		*	507
				Massariena .			200	Olpidium			206
				Massarina			350	Ombrophila.			435
Isthmia			110	Mastigamoeba			28	Omphalaria.			458
				Mastogloia .			38	Onychonema.			120
				Mastogioia .	۰	٠	0U3				
			220	Melanconis .			281	Onygena			
Kalmusia			319	Melanconiella			299	Oocystis			153
Karschia	,		450	Melanomma.			313	Oomyces			
Karstenula .			328	Melanopsamm				Onographo		•	4(10)
Kickvella	•	•	1)1)7					Opegrapha .			400
Kickxena.			220	Melanospora.			341	Ophiobolus . Ophiocytium.			335
Kirchneriella			150	Meliola			227	Ophiocytium.			149
				Melobesia			191	Orbilia			346
				Melogramma	•	-	320	Oscillatoria .		•	15
Laghrian			392					Oscillatoria .		*	10
Lachnea				Melomastia .			324	Ostropa			370
Lachnella				Melosira			107	Otidea			386
Lachnellula.			413	Meridion			89				
Lagenidium .			210	Merismopedia							
								25 11			306
Laminaria				Mesocarpus.				Padina		0	180
Lamproderma			(5	Mesogloia			179	Palmella			154
Lasiobolus .			428	Mesotaenium			117	Pandorina			145
Lasiobotrys .			9.95	Metasphaeria	•	٠	320				
Lastobourys .	•	۰	911					Pannaria			
Lasiosphaeria			311	Micrasterias.				Pannularia .			
Latrostium .			20ú	Micrococcus.			21	Parmelia			507
Laurencia			189	Micromyces.			209	Parmeliopsis.			
Lacanactis .			463	Misuspediana		•	111				
				Micropodiscus				Patellaria	٠		450
Lecania			484	Microsphaeria				Patellea			450
Lecanidion .			451	Microspira .			27	Patinella			449
Lecanora			485	Microspora .				Pediastrum .			
				Microspora :		•	160				
Lecidea		*		Microthamnio	1 .		101	Peltidea			
Lecidella				Microthelia .			377	Peltigera			504
Lecidiopsis .			455	Microthyrium			356	Penium			120
Lecothecium.			463	Mischococcus			1.19	Perichaena . Peridinium .		•	()
T am an ac	•	*	181	Mischiococous	•	•	381	reficilatina .			0.1
Lemanea	٠	٠	101	Mitrula	*		291	Peridinium .			31
Lembosia			363	Mollisia			406	Perisporium.			226
Lenormandia			378	Monographos			340	Peronia			88
Lentomita			378	Monostroma		-	155	Dononognone		•	105
Dentomita.	4	•	010	Monostroma.		۰	100	Peronospora.			130
Leocarpus			3	Morchella			379	Pertusaria			483
Leotia			435	Mortierella .			204	Pezicula	4	106.	405
Lenidoderma.			6	Mucor			201	Peridinium . Perisporium . Peronospora . Petusaria . Peziza . Pezizella . Phacidium . Phacus . Phacopeziza .		,	384
Lanna	•	•	928	Mrachagidia	•	•	159	Desirella	•		400
Lepra		۰	510	Mycobacidia.		•	100	Pezizella			40%
Leprocaulon.	9		933	Mycobilimbia			452	Phacidium .			442
Leptogium .			461	Mycoblastus.			473	Phacus			30
Leptomitus .			199	Mytilidion .			364	Phaeopeziza.		•	420
Loptomitus	•		1	Margaretine	•	•	010			٠	
Leptophrys .		0		Myzocytium.			210	Phialea			399
Leptorhaphis			376					Philocopra .			248
Leptosphaeria			301					Phlyctis			481
Letendraea .			348	Naevia			439	Dhluntonhuduin	3770	*	213
		•						Phlyctochytriu			
Licmophora.			89	Navicula			40	Phomatospora			262
Linospora			337	Nectria			343	Phormidium.			14
Lithodesmium			111	2.00			339	Phragmonaevia			441
Lizonia			277					Diagmonaevia	b		
		•		Nemacyclus.		٠	442	Phycomyces .			203
Lobaria			519	Neotiella			395	Phyllachora.			352
Lobarina			518	Nephrocytium			153	Phyllactinia.			219

	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR								
	Phyllitis		174	Quaternaria		233	Sphaerophorus.		378
	Phyllophora		186		44		Sphaerospora .	W	394
			263					10	347
	Physalospora			D 15		200	Spaerostilbe		218
	Physarum		2	Ramalina		533	Sphaerotheca .		
	Physcia		513	Raphidium		150	Sphaerozosma .		
	Physma		458	Raphoneis		87	Sphaerulina		323
	Physoderma		215	Rasmussenia		28	Sphinctrina		454
	Phytophthora .		194	Rebentischia		301	Spiloma		379
	Dilaina .		201	Reticularia		. 9		•	371
	Pilaira						Spilonema		
	Pilayella		172	Rhabdonema		92	Spinellus		203
	Pilobolus		201	Rhamphoria			Spirillum	*	27
	Pilaira Pilayella Pilobolus Piptocephalis .		205	Rhipidodendrum		28	Spirogyra,		139
	Pirottaea		412	Rhizina		383	Spirotaenium .		116
	Pitva		397	Rhizocarpus		467	Sporochnus		179
	Pitya	117	371	Rhizoclonium .		167	Sporodinia		203
	Plagiogramma .		88	Rhizomyxa		209	Sporomega		369
	Plagiotropis		67	Rhizophidium .	30	211	Sporormia	Ċ	317
	Plasmodiophora.		1	Phinanus .		204			6
	Plasmodiophora.			Rhizopus			Spumaria		435
	Plasmopara		194	Rhizosolenia			Stammaria		
	Plasmophagus .		208	Rhodochorton .		183	Staurastrum		132
	Planosarcina		22	Rhodymenia		187	Staurogenia		153
	Platysma		520	Rhoicosphenia.		71	Stauroneis		39
	Pleomassaria		327	Rhopographus .		356	Staurospermum.		144
	Pleonectria		350	Rhytisma		447	Stegia		446
	Pleophragmia .	-	332	Ricasolia		518	Stemonitis	•	7
	701 1 1		332	Rinodina		484		-	114
				Dimulai			Stephanodiscus.		532
4	Pleospora		328	Rivularia	20	19	Stereocaulon		
	Pleotrachelus .		208	Robergea		370	Stichococcus		155
	Pleurococcus .		154	Roesieria		453	Stichococcus Stictina		518
	Pleurogsigma .		63	Rosellinia		249	Stictis		441
	Pleurotaeniopsis		123	Ryparobius		429	Stigeoclonium .		160
	Plocamium		187				Stigmatea		273
	Plowrightia		355				Stigonema		18
	Pocillum		434	Saccharomyces.		457	Stigonema Streptococcus .		20
	Podosphaera	•	218	Saccobolus		425	Striatella		93
	Dolublactic			Saccountus			Striatella	*	
	Polyblastia		375	Saccorhiza		176	Stypocaulon		173
	Polyides		189	Sagedia		375	Suriraya	0	94
	Polyphagus		214	Saprolegnia		199	Synalissa		458
	Polysiphonia		189	Sarcina		22	Syncephalastrum		206
	Polystigma		340	Sargassum		178	Syncephalis		205
	Polytoma		31	Scenedesmus .		146	Synchytrium .		208
	Poronia		255	Schizochlamys .		152	Syncripta	Û	31
	Porphyra	11/4	181	Schizogonium .	18	155	Syncripta Synedra		80
	Porphyridium .		13			357	Systema		00
	Dropolis.		438	Schizostoma.		362			
	Propolis			Schizothyrium .			m		00
	Protococcus		154	Schizoxylum		442	Tabellaria		92
	Protomyces		458	Sciadium		149	Taonia		179
	Protoventuria .		296	Scirrhia		355			411
	Pseudographis .		365	Scleroderris		433	Taphrina		215
	Pseudohelotium.		403	Sclerotinia		395	Teichospora		331
	Pseudomonas .		27	Scoliopleura		62	Tetmemorus		121
	Pseudopeziza .		444	Scytonema		18	Tetracyclus		92
	Pseudophacidium		449	Scytosiphon		174	Tetraedron		150
	Pseudoplactania		389			484			29
		*		Secoliga		7.7 2 2 2 2 2 2	Tetramitus	•	152
	Pseudovalsa	•	318	Septocarpus		214	Tetraspora	•	
	Psora		481	Seynesia	٠.	357	Thalloidima	•	472
	Ptilota		184	Sillia		338	Thamnidion		203
	Punctaria		174	Solenopeziza		420	Thelenella		484
	Pyrenopeziza .		409	Solorina		507	Thelidium		371
	Pyrenophora		330	Sorastrum		147	Thelotrema	. 18	481
	Pyrenothea	-	470	Sordaria		244	Thorea.		181
			375	Spathularia		383	mi.		319
	Pyrenula					182			4
	Pyronema		387	Spermothamnion			Tilmadoche		
	Pythium		199	Sphacelaria		173	Tolypella		171
				Sphaerella		266	Tolypellopsis		171
				Sphaeroderma .		265	Tolypothrix		18

Toninia	473	Ulva			156	Verrucaria .	1	372
Toxonidea	62	Umbilicaria			503	Vibrissea		
Trachelomonas.	30				219	Vidalia		
Trematosphaeria	315	Urceolaria			501	Volvox		146
Trentepohlia	161	Urospora .			158			
Trichia	10	Usnea			536			
Trichopeziza	414	Ustulina .			257	Westella		154
Trichosphaerella	264							
Trichosphaeria.	264							
Trochila	445	Valsa			233	Xanthidium.		124
Tromera	419	Valsaria .			299	Xylaria		254
Tuber	229	Valsella .			237	Xylogramma		441
Tubulina	8	Van Heurck	ia		61			
Tympanis	432	Vaucheria			168			
		Venturia .			279	Zignoella		
		Verpa	٠		381	Zygnema		138

A MORNING ON THE

HARLAST JEROLE

